

(25) ベゴニア

病害虫	防除法	参考事項																										
茎腐病(リゾクトニア菌)	(耕種の・物理的防除) 1 苗床及び鉢用土を消毒する (共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項を参照)。 2 通風を良くし、過度のかん水を避ける。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 下記薬剤のいずれかを処理する。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>リゾレックス水和剤</td></tr><tr><td>オーソサイド水和剤 80</td></tr></table> 2 下記薬剤により土壌消毒を行う。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>キルパー</td></tr></table>	薬剤名	リゾレックス水和剤	オーソサイド水和剤 80	薬剤名	キルパー	○ 茎の地際に褐色の病斑ができ、拡大して茎を取り巻くようになると折れやすくなる。 ○ 高温多湿のとき多発する。																					
薬剤名																												
リゾレックス水和剤																												
オーソサイド水和剤 80																												
薬剤名																												
キルパー																												
灰色かび病	(耕種の・物理的防除) 1 通風を良くし、日照時間をなるべく多く与える。かん水過多を避ける。 (薬剤防除) 農薬登録情報 <table><tr><th>薬剤名</th><th>備考</th></tr><tr><td>アフエットフロアブル</td><td></td></tr><tr><td>ゲッター水和剤</td><td></td></tr><tr><td>サンヨール</td><td>アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。</td></tr><tr><td>セイビアーフロアブル 20</td><td></td></tr><tr><td>チオノックフロアブル/</td><td></td></tr><tr><td>トレノックスフロアブル</td><td></td></tr><tr><td>ピクシオDF</td><td></td></tr><tr><td>ファンタジスタ顆粒水和剤</td><td></td></tr><tr><td>フルピカフロアブル</td><td></td></tr><tr><td>ボトキラー水和剤</td><td></td></tr><tr><td>ポリオキシシンAL水溶剤</td><td>ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。</td></tr><tr><td>ポリベリン水和剤</td><td></td></tr></table>	薬剤名	備考	アフエットフロアブル		ゲッター水和剤		サンヨール	アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。	セイビアーフロアブル 20		チオノックフロアブル/		トレノックスフロアブル		ピクシオDF		ファンタジスタ顆粒水和剤		フルピカフロアブル		ボトキラー水和剤		ポリオキシシンAL水溶剤	ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。	ポリベリン水和剤		
薬剤名	備考																											
アフエットフロアブル																												
ゲッター水和剤																												
サンヨール	アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。																											
セイビアーフロアブル 20																												
チオノックフロアブル/																												
トレノックスフロアブル																												
ピクシオDF																												
ファンタジスタ顆粒水和剤																												
フルピカフロアブル																												
ボトキラー水和剤																												
ポリオキシシンAL水溶剤	ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。																											
ポリベリン水和剤																												

病害虫	防除法	参考事項																																
うどんこ病	(耕種的・物理的防除) 1 通風を良くし、日照時間をなるべく多く与える。かん水過多を避ける。 2 抵抗性品種を栽培する。																																	
	(薬剤防除) 農薬登録情報																																	
	<table><thead><tr><th>薬剤名</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>アグロケア水和剤</td><td></td></tr><tr><td>アフェットフロアブル</td><td></td></tr><tr><td>アンビルフロアブル</td><td></td></tr><tr><td>カリグリーン</td><td>肥料効果あり。展着剤必須。</td></tr><tr><td>サプロール乳剤/セーフガード乳剤</td><td></td></tr><tr><td>サンヨール</td><td>アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。</td></tr><tr><td>ショウチノスケフロアブル</td><td></td></tr><tr><td>ダコニール1000</td><td>花卉の着色期以降に葉害あり。</td></tr><tr><td>トリフミン水和剤</td><td></td></tr><tr><td>パレード20フロアブル</td><td></td></tr><tr><td>パンチョTF顆粒水和剤</td><td></td></tr><tr><td>パンチョTFジェット</td><td></td></tr><tr><td>ピリカット乳剤</td><td>アブラムシ類にも登録あり。</td></tr><tr><td>ポリオキシシンAL水溶剤</td><td>ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。</td></tr><tr><td>モレスタン水和剤</td><td>開花中の花卉に葉害あり。</td></tr></tbody></table>	薬剤名	備考	アグロケア水和剤		アフェットフロアブル		アンビルフロアブル		カリグリーン	肥料効果あり。展着剤必須。	サプロール乳剤/セーフガード乳剤		サンヨール	アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。	ショウチノスケフロアブル		ダコニール1000	花卉の着色期以降に葉害あり。	トリフミン水和剤		パレード20フロアブル		パンチョTF顆粒水和剤		パンチョTFジェット		ピリカット乳剤	アブラムシ類にも登録あり。	ポリオキシシンAL水溶剤	ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。	モレスタン水和剤	開花中の花卉に葉害あり。	
	薬剤名	備考																																
	アグロケア水和剤																																	
	アフェットフロアブル																																	
	アンビルフロアブル																																	
	カリグリーン	肥料効果あり。展着剤必須。																																
	サプロール乳剤/セーフガード乳剤																																	
	サンヨール	アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。																																
	ショウチノスケフロアブル																																	
	ダコニール1000	花卉の着色期以降に葉害あり。																																
	トリフミン水和剤																																	
	パレード20フロアブル																																	
	パンチョTF顆粒水和剤																																	
	パンチョTFジェット																																	
	ピリカット乳剤	アブラムシ類にも登録あり。																																
ポリオキシシンAL水溶剤	ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。																																	
モレスタン水和剤	開花中の花卉に葉害あり。																																	
斑点細菌病	(耕種的・物理的防除) 1 過度のかん水を避ける。葉面散水をしない。換気、保温に努める。 2 病株を直ちに処分する。	○ 葉に水浸状の小斑点を生じ、やがて大型不整形の褐色病斑となる。 ○ 高温多湿時、特にエラチオールペゴニアに発生が多い。																																