

(37) つつじ類

病害虫	防除法	参考事項
白紋羽病	(耕種的・物理的防除) 1 共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項を参照する。	
もち病	(耕種的・物理的防除) 1 病葉を除去する。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 4月中旬頃から5月にかけて数回バシタック水和剤75又はZボルドーを散布する。	
褐斑病	(耕種的・物理的防除) 1 落葉は集めて処分する。 2 枝が混み合って風通しが悪くならないように、剪定を行う。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 秋から春先にかけて下記薬剤のいずれかを散布する。 <u>薬剤名</u> クプロシールド ダコニール1000 トップジンM水和剤	
カイガラムシ類	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 マシン油乳剤(97%)によるカイガラムシ類の防除法 <u>薬剤名</u> アタックオイル エアータック乳剤	
コガネムシ類 幼虫	(耕種的・物理的防除) 1 有機質肥料を多用しない。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 下記薬剤のいずれかを散布する。 <u>薬剤名</u> アクタラ粒剤5 オンコル粒剤5 ガゼット粒剤 ダイアジノンSLゾル トクチオン細粒剤F フォース粒剤	○ ガゼットはコガネムシ類の登録である。
ツツジグンバイ	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 年数回の発生を繰り返すので、被害のめだつ5～8月に下記薬剤のいずれかを散布する。 <u>薬剤名</u> アドマイヤーフロアブル オルトラン水和剤 ジェイエース水溶剤 スカウトフロアブル スミチオン乳剤 トレボン乳剤 2 ガゼット粒剤又はモスピラン粒剤、スタークル/アルパリン粒剤を株元散布する。	

病害虫	防除法	参考事項
センチュウ類	<p>(耕種的・物理的防除)</p> <p>1 連作しない。</p> <p>(薬剤防除) 農薬登録情報</p> <p>1 バスアミド/ガスタード微粒剤、イシユクセンチュウにはディ・トラペックス油剤を用いて土壌消毒する。</p>	