

(2) ソルガム

病害虫	防除法	参考事項			
ハト、スズメ、カラス、キジ、ムクドリ、キジバト	(耕種的・物理的防除) 1 標準より深播きにし、鎮圧を十分行う。 (薬剤防除) 農業登録情報 【ハト】・【スズメ】・【カラス】・【キジ】・【ムクドリ】・【キジバト】 1 キヒゲンR-2フロアブルを塗沫処理する。				
アブラムシ類	(薬剤防除) 農業登録情報 1 下記薬剤のいずれかを散布する。 2 抵抗性が発達しやすいので、同一剤の連用は避ける。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>オルトラン水和剤</td></tr><tr><td>モスピラン顆粒水溶剤</td></tr></table>	薬剤名	オルトラン水和剤	モスピラン顆粒水溶剤	
薬剤名					
オルトラン水和剤					
モスピラン顆粒水溶剤					
ツマジロクサヨトウ	(耕種的・物理的防除) 1 草丈が高く薬剤散布が困難な場合や隣接ほ場へのドリフトが懸念される場合は、早期刈り取りまたはすき込みを実施する。 2 収穫が可能な場合、早期刈取りを行い、刈取り後は速やかに耕うんする。 3 直ちに収穫が困難な場合は、速やかにすき込みを行う。すき込みの深さの目安は12cm以上とし、2回以上実施する。 (薬剤防除) 農業登録情報 1 発生初期にオルトラン水和剤を散布する。 2 老齢幼虫には効果が低下するため、若齢幼虫のうちに防除する。				