

(4) 豆類

ア だいず 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
クリアター細粒剤F (ベンチオカーブ:8.0%、 ペンディメタリン:0.8%、 リニュロン:1.2%)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
サターンバアロ粒剤 (プロメトリン:0.8%、 ベンチオカーブ:8.0%)	一年生雑草		
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン:2.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤ ツリグサ科、キク科、アブラナ 科を除く)	砂壤土～埴土	
ロロックス粒剤 (リニュロン:1.5%)	一年生雑草		

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
エコトップP乳剤 (ジメテナミドP:8.5%、 リニュロン:12%)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	1 発芽直前の処理は避ける。 2 皮膚と目に刺激性がある。
カーメックスD (DCMU:80%)	一年生雑草		
クリアター乳剤 (ベンチオカーブ:50%、 ペンディメタリン:5.0%、 リニュロン:7.5%)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
ゲザガード50 (プロメトリン:50%)	畑地一年生雑草	砂壤土～埴土	
サターンバアロ乳剤 (プロメトリン:5.0%、 ベンチオカーブ:50%)	一年生雑草		1 発芽直前の処理は避ける。
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン:44.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤ ツリグサ科、キク科、アブラナ 科を除く)		
フィールドスターP乳剤 (ジメテナミドP:64%)	一年生雑草(アカザ科・アブラ ナ科・タデ科を除く)		
ブロールプラス乳剤 (ジメテナミドP:6.7%、 ペンディメタリン:6.5%、 リニュロン 11.4%)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
ラッソー乳剤 (アラクロール:43%)	一年生雑草	全土壌	
ロロックス (リニュロン:50%)	一年生雑草	砂土を除く	1 浸水や冠水のおそれがある 場合は使用しない。 2 イネ科雑草には効果が劣る。
モーティブ乳剤 (ジメテナミドP:19.7% ペンディメタリン 23.1%)	一年生雑草		

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
アタックショット乳剤 (フルチアセトメチル:2.0%)	一年生広葉雑草		1 展開していただいずの葉に 褐変、縮葉等の薬害を生じるこ とがある。 2 散布液が霧状になると薬害 が強く出ることがあるため、除 草剤用のドリフト低減ノズル を使用する。 3 生育の進んだ雑草には効果 が劣るので、時期を失しないよ うに散布する。
サンダーボルト007 (グリホサートイソプロピルア ミン塩:30%、 ピラフルフェンエチル:0.16%)	一年生雑草		
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム 塩:44.7%)	一年生雑草、コウキヤガラ		
ナブ乳剤 (セトキシジム:20%)	一年生イネ科雑草(スズメノカ タビラを除く)		
ホーネスト乳剤 (テブラロキシジム:10%)	一年生イネ科雑草		
ボルトフロアブル (キザロホップエチル:7.0%)	一年生イネ科雑草(スズメノカ タビラを除く)		
パワーガイザー液剤 (イマザモックスアンモニウ ム塩:0.85%)	一年生雑草		
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		
ラウンドアップマックスロー ド (グリホサートカリウム 塩:48%)	一年生雑草		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP:17.5%)	一年生イネ科雑草(スズメノカ タビラを除く)、シバムギ、レッ ドトップ		
草枯らし (グリホサートイソプロピルア ミン塩:41%)	一年生雑草		
大豆バサグラン液剤(ナトリウ ム塩) (ベンタゾンナトリウム 塩:40%)	一年生雑草(イネ科を除く)		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

イ らっかせい 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス:3.0%)	一年生雑草		
ゴーゴーサン細粒剤F (ベンディメタリン:2.0%)	一年生雑草		
サターンバアロ粒剤 (プロメトリン:0.8%、 ベンチオカーブ:8.0%)	一年生雑草		
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン:2.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		
ロロックス粒剤 (リニュロン:1.5%)	一年生雑草		

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
クリアターン乳剤 (ベンチオカーブ:50%、 ベンディメタリン:5.0%、 リニュロン:7.5%)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
クレマート乳剤 (ブタミホス:50%)	一年生雑草		
ゲザガード50 (プロメトリン:50%)	畑地一年生雑草	砂壤土～埴土	
ゴーゴーサン乳剤 (ベンディメタリン:30%)	一年生雑草	砂土を除く	
サターンバアロ乳剤 (プロメトリン:5.0%、 ベンチオカーブ:50%)	一年生雑草		
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン:44.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		
ラッソー乳剤 (アラクロール:43%)	一年生雑草	全土壌	
ロロックス (リニュロン:50%)	一年生雑草	砂土を除く	1 浸水や冠水のおそれがある場合は使用しない。 2 イネ科雑草には効果が劣る。

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
ナブ乳剤 (セトキシジム:20%)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

ウ 使用回数の留意点

(ア) 除草剤は剤ごとに使用基準回数が定められているので注意する。

(イ) また、除草剤の成分ごとに使用基準回数が定められているので、体系処理で複数の除草剤を使用する場合には個々の成分の使用回数が使用基準回数を超えないように注意する。