

(5) いも類

ア さつまいも (かんしょ) [農薬登録情報](#)

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス:3.0%)	一年生雑草		
トレファノサイド粒剤 2.5 (トリフルラリン:2.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		
ロロックス粒剤 (リニュロン:1.5%)	一年生雑草		

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン:30%)	一年生雑草	砂土を除く	
デュアールゴールド (S-メトラクロール:83.7%)	一年生雑草		
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン:44.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		
ラッソー乳剤 (アラクロール:43%)	一年生雑草	全土壌	
ロロックス (リニュロン:50%)	一年生雑草		
	一年生広葉雑草		

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
草枯らし (グリホサートイソプロピルアミン塩:41%)	一年生雑草		
グリホス液剤 (グリホサートイソプロピルアミン塩:41%)	一年生雑草		
ザクサ液剤 (グルホシネート P ナトリウム塩 11.5%)	一年生雑草		
タッチダウン i Q (グリホサートカリウム塩:44.7%)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム:20%)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		
ポルトフロアブル (キザロホップエチル:7.0%)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩:48%)	一年生雑草		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP:17.5%)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)、シバムギ、レドトップ		

- 注意事項
- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
 - ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
 - ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

イ ジャがいも（ばれいしょ） [農薬登録情報](#)

（ア）土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
クリアター細粒剤F (ベンチオカーブ:8.0%、 ペンディメタリン:0.8%、 リニュロン:1.2%)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
クレマートU粒剤 (ブタミホス:3.0%)	一年生雑草		
コンボラル (トリフルラリン:1.2%、 ペンディメタリン:1.2%)	一年生雑草(ツユクサ、キク科 を除く)	砂壤土～埴土	
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン:2.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤ ツリグサ科、キク科、アブラナ 科を除く)		
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン:2.0%)	一年生雑草		1 ばれいしょ(マルチ栽培)で 登録 2 ばれいしょ(マルチ栽培を除 く)で登録

（イ）土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
カーメックスD (DCMU:80%)	一年生雑草		
クリアター乳剤 (ベンチオカーブ:50%、 ペンディメタリン:5.0%、 リニュロン:7.5%)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
クレマート乳剤 (ブタミホス:50%)	一年生雑草		
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン:30%)	一年生雑草		
デュアールゴールド (S-メトラクロール:83.7%)	一年生雑草		
フィールドスターP乳剤(ジメ テナミドP:64.0%)	一年生雑草(アカザ科・アブラ ナ科・タデ科を除く)		
モーティブ乳剤 (ジメテナミドP:19.7%、 ペンディメタリン:23.1%)	一年生雑草		
ロロックス (リニュロン:50%)	一年生雑草	砂土を除く	1 イネ科雑草には効果が劣る。 2 マルチ栽培では使用をさけ る。

（ウ）茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム 塩:11.5%)	一年生雑草		
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム 塩:44.7%)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム:20%)	一年生イネ科雑草(スズメノカ タビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

ウ さといも [農薬登録情報](#)

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
クリアター細粒剤F (ベンチオカーブ:8.0%、 ペンディメタリン:0.8%、 リニュロン:1.2%)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
クレマートU粒剤 (ブタミホス:3.0%)	一年生雑草		
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン:2.0%)	一年生雑草		
コンボラル (トリフルラリン:1.2%、 ペンディメタリン:1.2%)	一年生雑草(ツユクサ、キク科 を除く)	砂壤土～埴土	
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン:2.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤ ツリグサ科、キク科、アブラナ 科を除く)		

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス:50%)	一年生雑草		
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン:30%)	一年生雑草	砂土を除く	1 マルチ栽培では畦間に使用 する。
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン:44.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤ ツリグサ科、キク科、アブラナ 科を除く)		
ロロックス (リニュロン:50%)	一年生雑草	砂土を除く	1 イネ科雑草には効果が劣る。 2 マルチ栽培では使用をさけ る。

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネート P ナトリウム 塩 11.5%)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム:20%)	一年生イネ科雑草(スズメノカ タビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

エ やまのいも 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマートU粒剤 (ブタミホス:3.0%)	一年生雑草		
コンボラル (トリフルラリン:1.2%、 ペンディメタリン:1.2%)	一年生雑草(ツユクサ、キク科 を除く)	全土壌	
トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン:2.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤ ツリグサ科、キク科、アブラナ 科を除く)		
ロロックス粒剤 (リニュロン:1.5%)	一年生雑草	砂土を除く	1 イネ科雑草には効果が劣る。

(イ) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
クレマート乳剤 (ブタミホス:50%)	一年生雑草		
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン:30%)	一年生雑草	砂土を除く	
コダールS水和剤 (プロメトリン 26.6%、 S-メトラクロール 24.8%)	一年生雑草	全土壌(但し、砂土を除く)	
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン:44.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤ ツリグサ科、キク科、アブラナ 科を除く)		
ロロックス (リニュロン:50%)	一年生雑草	砂土を除く	1 イネ科雑草には効果が劣る。 2 マルチ栽培では使用をさける。

(ウ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネート P ナトリウム 塩 11.5%)	一年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム:20%)	一年生イネ科雑草(スズメノカ タビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		
ホーネスト乳剤 (テブラロキシジム:10%)	一年生イネ科雑草		
ポルトフロアブル (キザロホップエチル:7.0%)	一年生イネ科雑草(スズメノカ タビラを除く)		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP:17.5%)	一年生イネ科雑草(スズメノカ タビラを除く)		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

オ 使用回数の留意点

(ア) 除草剤は剤ごとに使用基準回数が定められているので注意する。

(イ) また、除草剤の成分ごとにも使用基準回数が定められているので、体系処理で複数の除草剤を使用する場合には個々の成分の使用回数が使用基準回数を超えないように注意する。