

(9) 桑 農薬登録情報

ア 土壌処理剤(粒剤・粉粒剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
カソロン粒剤 4.5 (DBN:4.5%)	一年生雑草		1 連用を避ける。 2 砂土や腐植の少ない土壌、新植桑園では使用しない。 3 葉にかかると薬害が生じるので、春期桑の発芽前に使用する。
	一年生雑草(マメ科を除く)、多年生広葉雑草(マメ科を除く)		
クレマートU粒剤 (ブタミホス:3.0%)	一年生雑草		
ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン:2.0%)	一年生雑草		
サターンバアロ粒剤 (プロメトリン:0.8%、 ベンチオカーブ:8.0%)	一年生雑草		
ロロックス粒剤 (リニュロン:1.5%)	一年生雑草		

イ 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
アーザラン液剤 (アシュラム:37%)	一年生雑草、キク科、タデ科の 多年生雑草		
	キク科、ヒルガオ科、タデ科の 多年生雑草		
カーメックスD (DCMU:80%)	一年生雑草		1 砂土や腐植の少ない土壌、新植桑園では、薬害が出やすいので使用量を厳守する。 2 展着剤を加用すると発生初期の雑草にも効果がある。 3 同一土壌処理剤の連続使用は、なるべく避ける。
ゲザガード50 (プロメトリン:50%)	畑地一年生雑草	砂壤土～埴土	
ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン:30%)	一年生雑草	全土壌	
ラッソー乳剤 (アラクロール:43%)	一年生雑草	全土壌	
ロロックス (リニュロン:50%)	一年生雑草		1 蚕に対して影響があるので、桑葉にはかからないようにする。 2 砂土や腐植の少ない土壌、新植桑園では、薬害が出やすいので使用量を厳守する。 3 展着剤を加用すると発生初期の雑草にも効果がある。 4 イネ科雑草に効果が劣る。 5 同一土壌処理剤の連続使用は、なるべく避ける。

ウ 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム 塩:44.7%)	一年生及び多年生雑草		
ナブ乳剤 (セトキシジム:20%)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム 塩:48%)	一年生及び多年生雑草		

ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP:17.5%)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)、シバムギ、レドトップ		
------------------------------	----------------------------------	--	--

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

エ 使用回数の留意点

- (ア) 除草剤は剤ごとに使用基準回数が定められているので注意する。
- (イ) また、除草剤の成分ごとにも使用基準回数が定められているので、体系処理で複数の除草剤を使用する場合には個々の成分の使用回数が使用基準回数を超えないように注意する。