

(2) 除草剤使用方法

ア うめ 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
カーメックスD (DCMU:80%)	一年生雑草		

(イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム 塩:11.5%)	一年生雑草		
	多年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

イ かき 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
カーメックスD (DCMU:80%)	一年生雑草		
ロロックス (リニュロン:50%)	一年生雑草		

(イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム 塩:11.5%)	一年生雑草		
	多年生雑草		
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		
	多年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

ウ かんきつ 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
カーメックスD (DCMU:80%)	一年生雑草		

(イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム 塩:11.5%)	一年生雑草		
	多年生雑草		
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム 塩:44.7%)	一年生雑草		
	多年生雑草		
	スギナ		
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		
	多年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム 塩:48%)	一年生雑草		
	多年生雑草		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP:17.5%)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
	チガヤ、ススキ等の多年生イネ科雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

エ なし 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン:44.5%)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		
ラッソー乳剤 (アラクロール:43%)	一年生雑草		
ロロックス (リニュロン:50%)	一年生雑草		

(イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩:11.5%)	一年生雑草		
	多年生雑草		
タッチダウン i Q (グリホサートカリウム塩:44.7%)	一年生雑草		
	多年生雑草		
	スギナ		
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		
	多年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩:48%)	一年生雑草		
	多年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

オ ブルーベリー 農薬登録情報

(ア) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	適用土壌	備考
バスタ液剤 (グルホシネート:18.5%)	一年生雑草		
	多年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。