

### 3. 協会けんぽ（全国健康保険協会）の状況

#### 1) 健診受診者及び検査項目別検査値状況

年齢階級別の健診受診者数は表 76 のとおりであった。65～74 歳の受診者数で全体の 12.2%となった。（図 105 参照）

検査項目別の受診者数、平均値、中央値、標準偏差は表 77 のとおりであった。

表 76 年齢階級別受診者数（協会けんぽ）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
男性	受診者数(人)	33,816	40,707	33,580	25,417	21,264	14,477	7,775	177,036
	割合(%)	19.1	23.0	19.0	14.4	12.0	8.2	4.4	100.0
女性	受診者数(人)	22,321	28,127	25,229	20,856	15,591	9,492	5,191	126,807
	割合(%)	17.6	22.2	19.9	16.4	12.3	7.5	4.1	100.0
合計	受診者数(人)	56,137	68,834	58,809	46,273	36,855	23,969	12,966	303,843
	割合(%)	18.5	22.7	19.4	15.2	12.1	7.9	4.3	100.0




図 105 性・年齢階級別受診割合（協会けんぽ）

表 77 検査項目別受診者数・平均値・中央値・標準偏差（協会けんぽ）

		受診者数(人)	平均値	中央値	標準偏差
男性	BMI	177,016	24.7	24.2	3.9
	腹囲	177,012	86.9	86.0	10.3
	収縮期血圧	173,565	128.8	127.0	17.8
	拡張期血圧	173,549	80.5	80.0	12.3
	中性脂肪	176,969	136.1	107.0	116.5
	HDL コレステロール	176,968	58.5	56.0	15.8
	LDL コレステロール	176,967	128.1	127.0	33.1
	GOT	176,969	26.0	23.0	16.9
	GPT	176,969	30.7	24.0	22.9
	γGT	176,968	53.6	34.0	69.7
	空腹時血糖	159,662	102.7	97.0	25.3
	HbA1c	81,609	5.7	5.5	0.9
	eGFR	170,309	75.4	74.8	14.1
	女性	BMI	126,800	22.8	22.0
腹囲		126,743	80.4	79.4	10.6
収縮期血圧		120,208	122.0	120.0	18.6
拡張期血圧		120,198	74.1	73.0	12.1
中性脂肪		126,780	90.0	75.0	61.8
HDL コレステロール		126,779	72.8	71.0	17.6
LDL コレステロール		126,775	126.6	124.0	32.4
GOT		126,778	21.7	20.0	21.1
GPT		126,778	19.6	16.0	15.6
γGT		126,779	27.2	19.0	32.3
空腹時血糖		110,300	94.2	92.0	16.2
HbA1c		67,885	5.6	5.5	0.7
eGFR		107,266	77.0	75.9	14.1

## 2) 検査項目別該当割合

### ①メタボリックシンドローム

男性のメタボリックシンドローム該当の割合は、図 106-1、表 78-1 のとおり 40～44 歳が 16.6%と最も低く、年齢階級が上がるにしたがって高くなり、70～74 歳では 36.0%であった。

メタボリックシンドローム予備群は、どの年齢階級も 18.1%～21.0%以内であり、年齢の若い方に若干該当が多い傾向はみられたが、年齢階級による大きな違いはなかった。

予備群と該当を合わせた割合は、男性が 40～44 歳が 36.9%で最も低く、年齢階級が上がるにしたがって高くなり 70～74 歳が 54.1%と最も高くなった。

女性のメタボリックシンドローム該当の割合は図 106-2、表 78-2 のとおり 40～44 歳が 3.3%と最も低く、年齢階級が上がるにしたがって高くなり、70～74 歳で 13.7%と最も高くなった。

メタボリックシンドローム予備群は、40～44 歳が 5.2%と最も低く、50～54 歳が最も高く 7.7%であった。

予備群と該当を合わせた割合は、40～44 歳が 8.5%と最も低く、年齢階級が上がるごとに増加し、70～74 歳は 20.3%で最も高くなった。




図 106-1 メタボ該当及び予備群の割合 協会けんぽ(男性)




図 106-2 メタボ該当及び予備群の割合 協会けんぽ(女性)

表 78-1 メタボ該当及び予備群該当率 協会けんぽ(男性)

		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	合計
人数(人)	非該当	20,818	22,693	17,066	12,197	9,718	6,449	3,453	92,394
	予備群	6,711	8,334	6,861	4,968	3,917	2,707	1,360	34,858
	該当	5,481	8,686	8,830	7,630	6,950	4,800	2,713	45,090
	合計	33,010	39,713	32,757	24,795	20,585	13,956	7,526	172,342
割合(%)	非該当	63.1	57.1	52.1	49.2	47.2	46.2	45.9	53.6
	予備群	20.3	21.0	20.9	20.0	19.0	19.4	18.1	20.2
	該当	16.6	21.9	27.0	30.8	33.8	34.4	36.0	26.2
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	該当予備群合計	36.9	42.9	47.9	50.8	52.8	53.8	54.1	46.4

表 78-2 メタボ該当及び予備群該当率 協会けんぽ(女性)

		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	合計
人数(人)	非該当	19,287	23,782	20,669	16,541	11,934	6,992	3,744	102,949
	予備群	1,104	1,675	1,831	1,423	1,030	650	310	8,023
	該当	698	1,194	1,422	1,717	1,450	990	641	8,112
	合計	21,089	26,651	23,922	19,681	14,414	8,632	4,695	119,084
割合(%)	非該当	91.5	89.2	86.4	84.0	82.8	81.0	79.7	86.5
	予備群	5.2	6.3	7.7	7.2	7.1	7.5	6.6	6.7
	該当	3.3	4.5	5.9	8.7	10.1	11.5	13.7	6.8
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	該当予備群合計	8.5	10.8	13.6	16.0	17.2	19.0	20.3	13.5

## ②肥満（BMI25 以上または腹囲基準値以上）

肥満（BMI25 以上または腹囲基準値以上）の割合は、男性は図 107-1、表 79-1 のとおり 40～44 歳が 53.9%で最も低く、65～69 歳で 60.3%と最も高かった。女性は図 107-2、表 79-2 のとおり 40～44 歳の 23.4%に対し、70～74 歳は 29.4%と年齢階級が高くなるにしたがい割合が増加した。

腹囲が基準以上かつ BMI25 以上の割合は、男性は 50 歳～54 歳が 41.8%で最も高く、年齢階級が上がるにつれて減少する傾向がみられた。女性では 40～44 歳が 13.0%と最も低く、70～74 歳で 16.8%と最も高くなった。

腹囲のみ基準以上の割合は、男性が女性より多かったが、男女とも年齢階級が上がるにしたがって増加した。

BMI25 以上のみの割合は、男性では 1.4～2.8%であったのに対し、女性は 7.7～9.8%と、男性に比べて割合が高かった。男女とも 45～49 歳の該当率が最も高く、男女とも年齢階級が高い方が該当率は少なかった。




図 107-1 肥満該当の割合 協会けんぽ（男性）




図 107-2 肥満該当の割合 協会けんぽ（女性）

表 79-1 肥満該当の割合 協会けんぽ（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数(人)	基準未満	15,567	17,513	13,572	10,267	8,537	5,761	3,183	74,400
	腹囲<85 &BMI≥25	927	1,137	918	545	412	286	112	4,337
	腹囲≥85 &BMI<25	4301	5,388	5,035	4,444	4,236	3,367	1,921	28,692
	腹囲≥85 &BMI≥25	13012	16,665	14,051	10,156	8,075	5,060	2,555	69,574
	合計	33,807	40,703	33,576	25,412	21,260	14,474	7,771	177,003
割合(%)	基準未満	46.0	43.0	40.4	40.4	40.2	39.8	41.0	42.0
	腹囲<85 &BMI≥25	2.7	2.8	2.7	2.1	1.9	2.0	1.4	2.5
	腹囲≥85 &BMI<25	12.7	13.2	15.0	17.5	19.9	23.3	24.7	16.2
	腹囲≥85 &BMI≥25	38.5	40.9	41.8	40.0	38.0	35.0	32.9	39.3
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	肥満該当	54.0	57.0	59.6	59.6	59.8	60.2	59.0	58.0

表 79-2 肥満該当の割合 協会けんぽ（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数(人)	基準未満	17,058	20,960	18,477	15,144	11,265	6,720	3,666	93,290
	腹囲<85 &BMI≥25	2,115	2,751	2,215	1,666	1,244	765	398	11,154
	腹囲≥85 &BMI<25	199	314	473	604	582	421	254	2,847
	腹囲≥85 &BMI≥25	2903	4,093	4,060	3,439	2,497	1,586	873	19,451
	合計	22,275	28,118	25,225	20,853	15,588	9,492	5,191	126,742
割合(%)	基準未満	76.6	74.5	73.2	72.6	72.3	70.8	70.6	73.6
	腹囲<85 &BMI≥25	9.5	9.8	8.8	8.0	8.0	8.1	7.7	8.8
	腹囲≥85 &BMI<25	0.9	1.1	1.9	2.9	3.7	4.4	4.9	2.2
	腹囲≥85 &BMI≥25	13.0	14.6	16.1	16.5	16.0	16.7	16.8	15.3
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	肥満該当	23.4	25.5	26.8	27.4	27.7	29.2	29.4	26.4

### ③高血圧

高血圧該当の割合は男女とも年齢階級が上がるにしたがって増加した。男性では図 108-1、表 80-1 のとおり 40～44 歳は 22.6%、70～74 歳は 67.9%、女性では図 108-2、表 80-2 のとおり 40～44 歳は 10.2%、70～74 歳は 59.0%であった。

高血圧予備群の割合は男性では 11.2%～15.8%内とほぼ横ばいであったが、女性では 40～44 歳は 8.9%であり、65～69 歳で最も高く 14.9%となった。

降圧薬の服薬率は、男女とも加齢に伴い増加し、70～74 歳では男性は 47.8%、女性は 36.9%であった。服薬率は、男性よりも女性の方がいずれの年齢階級も少なかった。




図 108-1 高血圧該当及び予備群の割合と服薬率 協会けんぽ（男性）




図 108-2 高血圧該当及び予備群の割合と服薬率 協会けんぽ（女性）

表 80-1 高血圧該当及び予備群の割合と服薬率 協会けんぽ（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数（人）	非該当	20,548	20,869	14,105	8,604	5,610	3,383	1,594	74,713
	予備群	5,182	6,331	5,075	3,554	2,652	1,716	847	25,357
	該当	7,510	12,776	13,779	12,810	12,470	8,980	5,153	73,478
	合計	33,240	39,976	32,959	24,968	20,732	14,079	7,594	173,548
割合（%）	非該当	61.8	52.2	42.8	34.5	27.1	24.0	21.0	43.1
	予備群	15.6	15.8	15.4	14.2	12.8	12.2	11.2	14.6
	該当	22.6	32.0	41.8	51.3	60.1	63.8	67.9	42.3
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数（人）	服薬あり	1,802	4,378	6,075	7,030	7,961	6,175	3,715	37,136
	服薬なし	32,014	36,329	27,505	18,387	13,303	8,302	4,060	139,900
	合計	33,816	40,707	33,580	25,417	21,264	14,477	7,775	177,036
割合（%）	服薬あり	5.3	10.8	18.1	27.7	37.4	42.7	47.8	21.0
	服薬なし	94.7	89.2	81.9	72.3	62.6	57.3	52.2	79.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 80-2 高血圧該当及び予備群の割合と服薬率 協会けんぽ（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数（人）	非該当	17,246	19,407	15,346	11,069	6,820	3,264	1,284	74,436
	予備群	1,907	2,840	2,992	2,536	2,043	1,298	662	14,278
	該当	2,167	4,669	5,806	6,244	5,665	4,136	2,797	31,484
	合計	21,320	26,916	24,144	19,849	14,528	8,698	4,743	120,198
割合（%）	非該当	80.9	72.1	63.6	55.8	46.9	37.5	27.1	61.9
	予備群	8.9	10.6	12.4	12.8	14.1	14.9	14.0	11.9
	該当	10.2	17.3	24.0	31.5	39.0	47.6	59.0	26.2
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数（人）	服薬あり	500	1,535	2,513	3,395	3,325	2,710	1,916	15,894
	服薬なし	21,821	26,592	22,716	17,461	12,266	6,782	3,275	110,913
	合計	22,321	28,127	25,229	20,856	15,591	9,492	5,191	126,807
割合（%）	服薬あり	2.2	5.5	10.0	16.3	21.3	28.6	36.9	12.5
	服薬なし	97.8	94.5	90.0	83.7	78.7	71.4	63.1	87.5
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

#### ④脂質異常症

男性は図 109-1、表 81-1 のとおり 55～59 歳が 60.7%と最も高く、その後は年齢階級が高くなるにしたがい該当率が低下し、70～74 歳では 57.5%であった。

女性は図 109-2、表 81-2 のとおり 40～44 歳は 23.4%であったが、年齢階級が上がるにしたがって該当率が増加し、70～74 歳では 67.1%と最も高くなっていた。

脂質異常症に対する薬の服薬率は、男女とも加齢に伴い増加した。40～59 歳までは男性が女性を上回っていたが、60 歳以降は女性が男性を上回り、70～74 歳では、女性が男性より 8.2%高くなっていた。




図 109-1 脂質異常症該当割合と服薬率 協会けんぽ（男性）




図 109-2 脂質異常症該当割合と服薬率 協会けんぽ（女性）

表 81-1 脂質異常症該当割合と服薬率 協会けんぽ（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数（人）	非該当	15,552	16,872	13,210	9,981	8,481	6,000	3,299	73,395
	該当	18,255	23,827	20,358	15,429	12,779	8,471	4,468	103,587
	合計	33,807	40,699	33,568	25,410	21,260	14,471	7,767	176,982
割合（%）	非該当	46.0	41.5	39.4	39.3	39.9	41.5	42.5	41.5
	該当	54.0	58.5	60.6	60.7	60.1	58.5	57.5	58.5
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数（人）	服薬あり	1,203	2,719	3,450	3,739	3,947	2,999	1,802	19,859
	服薬なし	32,613	37,988	30,130	21,678	17,317	11,478	5,973	157,177
	合計	33,816	40,707	33,580	25,417	21,264	14,477	7,775	177,036
割合（%）	服薬あり	3.6	6.7	10.3	14.7	18.6	20.7	23.2	11.2
	服薬なし	96.4	93.3	89.7	85.3	81.4	79.3	76.8	88.8
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 81-2 脂質異常症該当割合と服薬率 協会けんぽ（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数（人）	非該当	17,092	19,499	14,086	8,993	5,912	3,386	1,706	70,674
	該当	5,226	8,619	11,140	11,862	9,673	6,106	3,484	56,110
	合計	22,318	28,118	25,226	20,855	15,585	9,492	5,190	126,784
割合（%）	非該当	76.6	69.3	55.8	43.1	37.9	35.7	32.9	55.7
	該当	23.4	30.7	44.2	56.9	62.1	64.3	67.1	44.3
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数（人）	服薬あり	350	747	1,535	2,752	3,175	2,416	1,631	12,606
	服薬なし	21,971	27,380	23,694	18,104	12,416	7,076	3,560	114,201
	合計	22,321	28,127	25,229	20,856	15,591	9,492	5,191	126,807
割合（%）	服薬あり	1.6	2.7	6.1	13.2	20.4	25.5	31.4	9.9
	服薬なし	98.4	97.3	93.9	86.8	79.6	74.5	68.6	90.1
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

⑤糖尿病

糖尿病該当の割合は、男性が女性より多く、男女とも年齢が上がるにしたがい増加した。男性は図 110-1、表 82-1 のとおり 40～44 歳は 5.1%であり、70～74 歳では 23.0%、女性では図 110-2、表 82-2 のとおり 40～44 歳は 1.9%、70～74 歳では 11.0%であった。

糖尿病予備群の割合も、男女とも年齢が上がるにしたがい増加し、男性は 40～44 歳は 5.0%、70～74 歳は 14.8%、女性は 40～44 歳は 2.2%、70～74 歳は 13.9%であり、男性より女性のほうが加齢に伴い予備群が大きく増加していた。

血糖を下げる薬の服薬率は、男女とも加齢に伴い増加し、70～74 歳では男性は 15.8%、女性は 6.5%であった。




図 110-1 糖尿病該当及び予備群割合と服薬率 協会けんぽ（男性）




図 110-2 糖尿病該当及び予備群割合と服薬率 協会けんぽ（女性）

表 82-1 糖尿病該当及び予備群の割合と服薬率 協会けんぽ（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数(人)	非該当	30,174	34,417	26,443	18,626	14,561	9,406	4,801	138,428
	予備群	1,685	2,798	2,977	2,685	2,674	1,905	1,137	15,861
	該当	1,703	3,186	3,918	3,913	3,868	3,028	1,769	21,385
	合計	33,562	40,401	33,338	25,224	21,103	14,339	7,707	175,674
割合(%)	非該当	89.9	85.2	79.3	73.8	69.0	65.6	62.3	78.8
	予備群	5.0	6.9	8.9	10.6	12.7	13.3	14.8	9.0
	該当	5.1	7.9	11.8	15.5	18.3	21.1	23.0	12.2
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数(人)	服薬あり	793	1,687	2,237	2,418	2,544	2,042	1,232	12,953
	服薬なし	33,023	39,020	31,343	22,999	18,720	12,435	6,542	164,082
	合計	33,816	40,707	33,580	25,417	21,264	14,477	7,774	177,035
割合(%)	服薬あり	2.3	4.1	6.7	9.5	12.0	14.1	15.8	7.3
	服薬なし	97.7	95.9	93.3	90.5	88.0	85.9	84.2	92.7
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 82-2 糖尿病該当及び予備群の割合と服薬率 協会けんぽ（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数(人)	非該当	21,212	26,106	22,686	17,745	12,690	7,383	3,859	111,681
	予備群	481	989	1,378	1,735	1,701	1,205	717	8,206
	該当	426	759	933	1,199	1,080	833	566	5,796
	合計	22,119	27,854	24,997	20,679	15,471	9,421	5,142	125,683
割合(%)	非該当	95.9	93.7	90.8	85.8	82.0	78.4	75.0	88.9
	予備群	2.2	3.6	5.5	8.4	11.0	12.8	13.9	6.5
	該当	1.9	2.7	3.7	5.8	7.0	8.8	11.0	4.6
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数(人)	服薬あり	193	402	508	688	665	529	336	3,321
	服薬なし	22,128	27,725	24,721	20,168	14,926	8,963	4,855	123,486
	合計	22,321	28,127	25,229	20,856	15,591	9,492	5,191	126,807
割合(%)	服薬あり	0.9	1.4	2.0	3.3	4.3	5.6	6.5	2.6
	服薬なし	99.1	98.6	98.0	96.7	95.7	94.4	93.5	97.4
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

### ⑥習慣的な喫煙者

習慣的に喫煙している者の割合は、いずれの年齢階級においても男性が女性より多かった。男性は図 111-1、表 83-1 のとおり 40～44 歳では 44.8%で一番高く、70～74 歳では 23.7%であった。

女性は図 111-2、表 83-2 のとおり 45～49 歳は 18.1%であったが、加齢とともに減少し 70～74 歳では 7.3%であった。




図 111-1 習慣的に喫煙している者 協会けんぽ（男性）




図 111-2 習慣的に喫煙している者 協会けんぽ（女性）

表 83-1 習慣的に喫煙している者の割合 協会けんぽ（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数 人	非喫煙	18,674	23,073	18,890	14,991	13,562	10,193	5,932	105,315
	喫煙	15,142	17,634	14,690	10,425	7,702	4,284	1,843	71,720
	合計	33,816	40,707	33,580	25,416	21,264	14,477	7,775	177,035
割合 %	非喫煙	55.2	56.7	56.3	59.0	63.8	70.4	76.3	59.5
	喫煙	44.8	43.3	43.7	41.0	36.2	29.6	23.7	40.5
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 83-2 習慣的に喫煙している者の割合 協会けんぽ（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計
人数 人	非喫煙	18,815	23,036	21,013	17,862	13,639	8,568	4,811	107,744
	喫煙	3,506	5,091	4,216	2,994	1,952	924	380	19,063
	合計	22,321	28,127	25,229	20,856	15,591	9,492	5,191	126,807
割合 %	非喫煙	84.3	81.9	83.3	85.6	87.5	90.3	92.7	85.0
	喫煙	15.7	18.1	16.7	14.4	12.5	9.7	7.3	15.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

⑦慢性腎臓病（受診勧奨群又は保健指導群）

慢性腎臓病該当（受診勧奨群又は保健指導群）の割合は男性が図 112-1、表 84-1 のとおり 40～44 歳 14.6%、70～74 歳で 38.7%となった。女性では図 112-2、表 84-2 のとおり 40～44 歳 11.3%、70～74 歳で 29.7%となった。

慢性腎臓病の受診勧奨群の割合は男性 40～44 歳 3.2%、70～74 歳で 9.8%となった。女性では 40～44 歳 2.2%、70～74 歳で 5.4%となった。

慢性腎臓病の保健指導群（保健指導 1 及び 2）の割合は男性 40～44 歳 11.4%、70～74 歳で 28.9%となった。女性では 40～44 歳 9.1%、70～74 歳で 24.3%となった。




図 112-1 慢性腎臓病該当の割合 協会けんぽ（男性）




図 112-2 慢性腎臓病該当の割合 協会けんぽ（女性）

表 84-1 慢性腎臓病受診勧奨群又は保健指導群該当割合 協会けんぽ（男性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計	
人数 (人)	非該当	27,980	32,975	26,156	18,804	14,436	9,108	4,464	133,923	
	受診勧奨群	1,043	1,421	1,441	1,287	1,179	1,111	712	8,194	
	保健指導群	3,747	5,006	4,808	4,309	4,270	3,357	2,108	27,605	
	再掲	保健指導 1	3,023	3,272	2,584	1,804	1,452	980	534	13,649
		保健指導 2	724	1,734	2,224	2,505	2,818	2,377	1,574	13,956
	合計	32,770	39,402	32,405	24,400	19,885	13,576	7,284	169,722	
割合 (%)	非該当	85.4	83.7	80.7	77.1	72.6	67.1	61.3	78.9	
	受診勧奨群	3.2	3.6	4.4	5.3	5.9	8.2	9.8	4.8	
	保健指導群	11.4	12.7	14.8	17.7	21.5	24.7	28.9	16.3	
	再掲	保健指導 1	9.2	8.3	8.0	7.4	7.3	7.2	7.3	8.0
		保健指導 2	2.2	4.4	6.9	10.3	14.2	17.5	21.6	8.2
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	慢性腎臓病 該当	14.6	16.3	19.3	22.9	27.4	32.9	38.7	21.1	

表 84-2 慢性腎臓病受診勧奨群又は保健指導群該当割合 協会けんぽ（女性）

		40～44 歳	45～49 歳	50～54 歳	55～59 歳	60～64 歳	65～69 歳	70～74 歳	合計	
人数 (人)	非該当	16,353	20,726	18,665	14,575	9,770	5,520	2,716	88,325	
	受診勧奨群	409	558	391	330	294	216	208	2,406	
	保健指導群	1,676	2,307	2,449	2,593	2,070	1,340	940	13,375	
	再掲	保健指導 1	1,360	1,451	1,035	742	459	324	232	5,603
		保健指導 2	316	856	1,414	1,851	1,611	1,016	708	7,772
	合計	18,438	23,591	21,505	17,498	12,134	7,076	3,864	104,106	
割合 (%)	非該当	88.7	87.9	86.8	83.3	80.5	78.0	70.3	84.8	
	受診勧奨群	2.2	2.4	1.8	1.9	2.4	3.1	5.4	2.3	
	保健指導群	9.1	9.8	11.4	14.8	17.1	18.9	24.3	12.8	
	再掲	保健指導 1	7.4	6.2	4.8	4.2	3.8	4.6	6.0	5.4
		保健指導 2	1.7	3.6	6.6	10.6	13.3	14.4	18.3	7.5
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	慢性腎臓病 該当	11.3	12.1	13.2	16.7	19.5	22.0	29.7	15.2	