

平成 27 年県民健康・栄養調査 報告書

平成 29 年 3 月

千葉県

は じ め に

千葉県では、「県民が健康でこころ豊かに暮らす社会の実現」を基本理念とした「健康ちば21（第2次）」を平成25年3月に策定し、健康づくり施策を展開しています。

また、平成28年12月に、第3次千葉県食育推進計画を策定し、『ちばの恵み』を取り入れたバランスのよい食生活の実践による生涯健康で心豊かな人づくり」を基本目標に、食育の推進に取り組んでいるところです。

これらの計画に基づく健康づくり等の取り組みを効果的に推進・評価するためには、県民の健康・栄養に関する現状等を正しく把握することが大変重要となります。

本県では、5年毎に県民健康・栄養調査を実施しており、このたび、平成27年11月に実施した結果を取りまとめました。

今後は、この調査結果を、県民が健康で生き生きと生活できるための健康づくり施策にいかして参ります。

本報告書が、保健医療関係者の皆様はもとより、県民の方々の健康づくりの資料として広く活用され、健康づくりや食生活改善の一助になれば幸いです。

終わりに、この調査に御協力いただきました県民の皆様、関係者の方々に、心より感謝申し上げます。

平成29年3月

千葉県健康福祉部長 飯田 浩子

目 次

I 調査の概要	1
1 調査の目的	1
2 調査の対象	1
3 調査項目及び調査の時期	1
4 調査の要領	2
5 結果の集計	3
6 解析対象客体の概要	6
7 本書利用上の留意点	10
8 調査票様式等	12
(1)身体状況調査票	12
(2)栄養摂取状況調査票	13
(3)生活習慣調査票①	16
(4)生活習慣調査票②	19
(5)食品群分類表	21
(6)職業分類表	27
II 結果の概要	29
(1)体型に関する状況	30
(2)栄養・食生活に関する状況	34
(3)身体活動・運動に関する状況	47
(4)飲酒に関する状況	49
(5)生活習慣病等に関する状況	51
(6)食習慣の状況	54
(7)睡眠・喫煙・歯の状況	71
III 結果	83
1. 栄養素等摂取状況調査の結果	84
エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)	84
食品群別摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)	131
食品群別食塩摂取量(20歳以上性・年齢階級別)	207
野菜類摂取状況別栄養素等摂取量(男女、20歳以上)	216
野菜類摂取状況別食品群別摂取量(男女、20歳以上)	217
2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果	218
朝、昼、夕別にみた1日の食事構成(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)	218
朝食状況別栄養素等摂取量(男女、20歳以上)	221
朝食状況別食品群別摂取量(男女、20歳以上)	222

3. 身体状況調査の結果	223
身長状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)	223
体重状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)	224
腹囲状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)	225
BMI状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)	226
体型状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)	227
低栄養傾向(BMI \leq 20)の高齢者の割合(65歳以上、性別)	227
体型別栄養素等摂取量(20歳以上、男女)	228
体型別食品群別摂取量(20歳以上、男女)	229
高齢者の低栄養傾向別栄養素等摂取量(65歳以上、男女)	230
高齢者の低栄養傾向別食品群別摂取量(65歳以上、男女)	231
歩行数(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)	232
運動習慣状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)	233
糖尿病と言われたことのある者の割合(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)	234
糖尿病の治療を受けている者の割合(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)	235
4. 生活習慣調査①の結果(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)	236
(1) 栄養・食生活に関する状況	236
栄養成分表示を参考にする者の状況	236
必要だと思う栄養成分表示の項目	237
主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が1日2回以上ある者の状況	238
主食、主菜、副菜のうち組み合わせて食べられないもの	239
外食の利用状況	240
持ち帰りの弁当や惣菜の利用状況	241
(2) 身体活動・運動に関する状況	242
運動ができる場所の状況	242
運動のために整備を希望する場所	245
(3) 睡眠に関する状況	246
1日の平均睡眠時間	246
睡眠の質の状況	247
睡眠の確保の妨げとなっていることの状況	248
睡眠の確保のために必要なことの状況	249
(4) 喫煙に関する状況	250
喫煙の状況	250
喫煙習慣の状況	251
1日の喫煙本数	252
禁煙・節煙の意志	253
禁煙治療が受けられる医療機関の状況	254
受動喫煙の機会「家庭」(現在喫煙者、「無回答・重回答」を除く)	255
受動喫煙の機会「職場」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)	256
受動喫煙の機会「学校」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)	257

受動喫煙の機会「飲食店」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)	258
受動喫煙の機会「遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)	259
受動喫煙の機会「行政機関(市役所、町村役場、公民館など)」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)	260
受動喫煙の機会「医療機関」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)	261
受動喫煙の機会「公共交通機関」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)	262
受動喫煙の機会「路上」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)	263
受動喫煙の機会「子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)	264
受動喫煙の機会「家庭」	265
受動喫煙の機会「職場」	266
受動喫煙の機会「学校」	267
受動喫煙の機会「飲食店」	268
受動喫煙の機会「遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)」	269
受動喫煙の機会「行政機関(市役所、町村役場、公民館など)」	270
受動喫煙の機会「医療機関」	271
受動喫煙の機会「公共交通機関」	272
受動喫煙の機会「路上」	273
受動喫煙の機会「子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)」	274
受動喫煙防止対策の推進を望む場所	275
受動喫煙防止対策の推進を望む場所(現在喫煙者、「無回答」を除く)	276
(5) 飲酒に関する状況	277
飲酒の頻度	277
1日あたりの飲酒量	278
飲酒習慣の状況	279
生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者の状況	280
「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」に関する知識	281
(6) 歯・嚥下に関する状況	282
歯の本数	282
歯の本数が24本以上、20本以上の者の状況	283
咀嚼の状況	284
食べ方や食事の様子	285
(7) 居住する地域に関する状況	286
お互いに助け合っていると感じている者の状況	286
信頼できると感じている者の状況	287
お互いにあいさつをしていると感じている者の状況	288
問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとしていると感じている者の状況	289

5. 生活習慣調査②の結果(20 歳以上性・年齢階級別、20 歳以上年齢調整値)	290
(1)食生活の状況	290
朝食を食べる頻度(習慣)	290
人と比較した際の食べる速さの自覚	291
満腹になるまで食べる者の状況	292
就寝前 2 時間以内に夕食をとることが週 3 回以上ある者の状況	293
夕食後に間食をとることが週 3 回以上ある者の状況	294
清涼飲料をほぼ毎日飲む者の状況	295
家庭の煮物の味付けが濃いと感じる者の状況	296
汁物を 1 日 2 杯以上飲む者の状況	297
単品料理を週 3 日以上食べる者の状況	298
めん類の汁をほとんど全部飲む者の状況	299
塩蔵品を食べる日が週 3 回以上ある者の状況	300
漬物や味付けしてあるおかずに、調味料をかけることが多い者の状況	301
漬物を 1 日 2 回以上食べる者の状況	302
1 日あたりの食塩摂取目標量を知っている者の状況	303
1 日あたりの食塩摂取目標量の知識に関する状況	304
食塩の表示を参考にする者の状況	305
減塩に取り組んでいる者の状況	306
1 日あたりの望ましい野菜摂取量を知っている者の状況	307
1 日あたりの望ましい野菜摂取量の知識に関する状況	308
野菜摂取量に関する自覚の状況	309
1 週間のうちの食事づくりの頻度	310
食を通したコミュニケーションの状況	311
(2)体重及び生活習慣病等に関する状況	312
高血圧(血圧が高い)と言われたことのある者の割合	312
高血圧の治療を受けている者の状況	313
血中コレステロール(総コレステロールまたは LDL コレステロール)が高いと言われたことのある者の割合	314
血中コレステロールの治療を受けている者の状況	315
過去 1 ヶ月間の健康状態	316
この 1 年間で体重が 3kg 以上増加した者の状況	317
この 1 年間で体重が 3kg 以上減少した者の状況	318
6. 食習慣・生活習慣別の体型・食塩摂取量の比較(20 歳以上、男女)	319
食習慣・生活習慣別 BMI の比較	319
食習慣・生活習慣別 肥満者の割合の比較	320
食習慣・生活習慣別 1 日の食塩摂取量(g)の比較	321
食習慣・生活習慣別 1 日の食塩摂取量(g/1000kcal)の比較	322
食塩過剰摂取につながる食習慣の数別 食塩摂取量の平均値	323

IV 参考(重み付けしていない平均値の結果)	325
1. 栄養素等摂取状況調査の結果	326
栄養素等摂取量(1歳以上、性・年齢階級別)	326
栄養素等摂取量(20歳以上、性別、保健所別)	338
栄養素等摂取量(20歳以上、性別、二次医療圏別)	346
食品群別摂取量(1歳以上、性・年齢階級別)	350
食品群別摂取量(20歳以上、性別、保健所別)	356
食品群別摂取量(20歳以上、性別、二次医療圏別)	360
2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果	362
朝、昼、夕別にみた1日の食事構成比(1歳以上、性・年齢階級別)	362
欠食状況別栄養素等摂取量(20歳以上、性別)	364
欠食状況別食品群別摂取量(20歳以上、性別)	372
外食状況別栄養素等摂取量(20歳以上、性別)	380
外食状況別食品群別摂取量(20歳以上、性別)	388
3. 身体状況調査の結果	396
身長・体重(1歳以上、体重は妊婦除外、性・年齢階級別)	396
体型の状況(15歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	397
体型の状況(20歳以上、性別、妊婦除外、保健所別)	398
体型の状況(20歳以上、性別、妊婦除外、二次医療圏別)	399
腹囲・BMI(6歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)	400
歩行数(20歳以上、性別、保健所別)	401
年齢・体型別 平均歩行数(20歳以上、性別)	401
4. 食塩摂取量との関係(20歳以上、性別)	402
野菜類摂取量と食塩摂取量の関係	402
エネルギー摂取量と食塩摂取量の関係	402
たんぱく質摂取量と食塩摂取量の関係	403
BMIと食塩摂取量の関係	403
5. 野菜類摂取量との関係(20歳以上、性別)	404
野菜類摂取量と食物繊維摂取量の関係	404
野菜類摂取量とカリウム摂取量の関係	404
野菜摂取量別(350g以上、350g未満) 主食、主菜、副菜を組合せた食事が1日2回以上である 頻度の状況	405
6. 職業の状況(性・年齢階級別)	406

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、県民の健康づくりを効果的に推進するため、県民の栄養摂取量及び生活習慣の状況等を明らかにし、広く健康増進施策等に必要な基礎資料を得ることを目的として実施した。

2 調査の対象

調査の対象は、千葉県内の世帯及び世帯員とし、平成26年国民生活基礎調査地区及び平成22年国勢調査地区より無作為に抽出した21単位区に、平成27年国民健康・栄養調査指定地区として厚生労働大臣から指定された14単位区を加えた35単位区内の世帯（718世帯）及び世帯員（満1歳以上、1,814人）を標本とした。

なお、以下の世帯及び世帯員は、厚生労働省が実施する「国民健康・栄養調査」と統一して除外した。

<世帯>

- ・世帯主が外国人である世帯
- ・3食とも集団的な給食を受けている場合
- ・平成26年国民生活基礎調査地区に設定された単位区より抽出された調査地区において、国民生活基礎調査への協力が得られなかった世帯
- ・本調査の依頼をしたが協力を得られなかった世帯
- ・全く面会できないなど調査実施不能であった世帯

<世帯員>

- ・1歳未満
- ・在宅患者で疾病等の理由により流動状の食品や薬剤のみを摂取又は投与されている場合など通常の食事をしていない者
- ・調査期間を通じて調査対象世帯に在住していない者（出張、入院、単身赴任者、出稼ぎ者など）
- ・厚生労働省が実施する下記の調査の対象であることが判明した者
 - ※「21世紀出生児縦断調査」（平成13年1月10日から同月17日の間および7月10日から同月17日の間、平成22年5月10日から同月24日の間に生まれた子供であり、当該調査の対象となっている者）
 - ※「中高年者縦断調査」（平成27年10月末現在で60歳から69歳であり、当該調査の対象となっている者）

3 調査項目及び調査の時期

（1）調査項目

本調査は、身体状況調査、栄養摂取状況調査及び生活習慣調査からなり、調査項目は以下のとおりである。

1）身体状況調査

- ア．身長・体重（満1歳以上）
- イ．腹囲（満6歳以上）
- ウ．1日の身体活動量（歩行数）（満20歳以上）（栄養摂取状況調査票に記録）

エ. 糖尿病診断及び治療の有無（満 20 歳以上）

オ. 医師からの運動禁止の有無（満 20 歳以上）

カ. 運動習慣：1 週間の運動日数、運動を行う日の平均運動時間、運動の継続年数（満 20 歳以上）

2) 栄養摂取状況調査（満 1 歳以上）

ア. 世帯の状況：氏名、生年月日、性別、妊婦（週数）・授乳婦の別、世帯主との続柄、
仕事の種類

イ. 食事状況：朝・昼・夕食別、家庭食・外食・欠食等の区分

ウ. 食物摂取状況：料理名、食品名、使用量、廃棄量、世帯員ごとの案分比率(朝・昼・夕・間食別)

3) 生活習慣調査①及び②（満 20 歳以上）

食生活、食習慣、食に関する意識、身体活動、休養（睡眠）、飲酒、喫煙、歯の健康等に関する生活習慣全般を質問紙調査により把握した。

(2) 調査時期

身体状況調査：平成 27 年 11 月中

栄養摂取状況調査：平成 27 年 11 月中の 1 日（日曜日及び祝日は除く）

生活習慣調査：平成 27 年 11 月中

4 調査の要領

(1) 調査員の構成

調査員は知事が任命し、医師、管理栄養士、保健師、事務担当者等をもって構成した。

(2) 調査票の様式

ア. 身体状況調査票（12 ページ参照）

イ. 栄養摂取状況調査票（13 ページ参照）

ウ. 生活習慣調査票①（16 ページ参照）

エ. 生活習慣調査票②（20 ページ参照）

(3) 調査方法

1) 身体状況調査

あらかじめ調査員が配布した調査票に被調査者本人が記入し、後日、調査員が回収する方法により行った。身長、体重、腹囲については、測定方法を事前に説明して家庭で測定させ、自己申告とした。歩行数は、歩数計を事前に配布して、測定法を説明し、これに従って測定後、歩数及び装着状況を記録させた。糖尿病診断及び治療の有無、医師からの運動禁止の有無、運動習慣は、質問紙調査とした。

2) 栄養摂取状況調査

調査員である管理栄養士等が被調査世帯を直接訪問し、世帯の代表者あるいは食事づくり担当者に面接の上、記入方法を説明、記入状況を点検するとともに不備な点の是正や記入の説明にあたった。

調査日は、祝祭日、冠婚葬祭その他特別に食物摂取に変化のある日を避け、被調査世帯においてなるべく普通の摂取状態にある日に実施し、被調査者の積極的協力を得るため、調査開始前に被調査地区の住民に対して調査の趣旨を十分説明した。食事内容の記録は、摂取した食物を秤や計量カップ等を用いて秤量記入させたが、使用量が少ない食物や、外食など秤量が困難な場合は、目安量

をもって記入させた。

3) 生活習慣調査①及び②

栄養摂取状況調査票と併せて配布し、後日、調査員が回収する方法により行った。

(4) 調査に関する秘密の保持

この調査は世帯や個人の私的なことに及ぶ場合もあるため、その個人情報の保護と管理に万全を期すように留意した。

5 結果の集計

提出された調査票は、県立保健医療大学健康科学部栄養学科の協力を得て、集計を行った。

(1) 栄養素等摂取量の算出

栄養素等摂取量は、国民健康・栄養調査方式業務支援システム「食事しらべ 2015※」を用いて、「日本食品標準成分表 2010（科学技術庁資源調査会、現文部科学省資源室）」（以下、「成分表 2010」という。）により算出した。

栄養素等摂取量は、調理後（ゆで、油炒め等）の成分値が成分表 2010 に収載されている食品には、これを用いた。また、その他の食品については、成分表 2010 に収載されている調理による「重量変化率」を加味して算出した。

※国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 栄養疫学研究部国民健康・栄養調査研究室。

(2) 食品群分類

食品群分類（P21）は、厚生労働省が実施する「国民健康・栄養調査」と統一した。注意点については下記のとおり。

ア. 分類

- ①「ジャム」は「果実類」に分類
- ②「味噌」は「調味料・香辛料類」に分類
- ③「マヨネーズ」は「調味料・香辛料類」に分類

イ. 重量

食品の重量は、調理を加味した数量となり、米は「めし」・「かゆ」など、「干しそば」は「ゆでそば」など、「藻類」の「乾燥わかめ」は「水戻しわかめ」など、「嗜好飲料類」の「茶葉」は「茶浸出液」などで算出した。

(3) 食事内容

食事内容は、厚生労働省が実施する「国民健康・栄養調査」と統一し、次の区分により集計した。

ア. 家庭食

家庭で作った食事や弁当を食べた場合。

イ. 調理済み食

すでに調理されたものを買ってきたり、出前をとって家庭で食べた場合。

ウ. 外食

飲食店での食事、及び家庭以外の場所で出前をとったり、市販のお弁当を買って食べるなど家庭

で調理せずに、食べる場所も家庭ではない場合（食事内容は「イ．調理済み食」と同じ）。

エ．給食

- ・ 保育所・幼稚園給食（教職員は、職場給食）
- ・ 学校給食（教職員は、職場給食）
- ・ 職場給食

オ．その他

- ・ 菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた場合
- ・ 錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンク剤のみの場合
- ・ 食事をしなかった場合（欠食）

カ．調査不能

（４）職業の分類

職業の分類は、厚生労働省が実施する「国民健康・栄養調査」と統一した。

（５）肥満の判定

BMI（Body Mass Index）を用いて判定した。

$BMI = \text{体重 kg} \div (\text{身長 m})^2$

肥満の判定基準は、下記のとおりである。

判定	低体重（やせ）	普通	肥満
BMI	18.5 未満	18.5 以上 25.0 未満	25.0 以上

（「日本肥満学会（2011 年）による肥満の判定基準」より）

（６）運動習慣等の判定

運動習慣、喫煙習慣、飲酒習慣、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の判定は、厚生労働省が実施する「国民健康・栄養調査」と統一した。

ア．運動習慣

運動習慣がある者とは、1 回 30 分以上、週 2 日以上、1 年間以上継続して運動している者とした。

イ．喫煙習慣

現在習慣的に喫煙している者（現在喫煙者）とは、たばこを「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」と回答した者とした。

過去喫煙者とは、たばこを「以前は吸っていたが、1 ヶ月以上吸っていない」と回答した者とした。

非喫煙者とは、たばこを「吸わない」と回答した者とした。

ウ．飲酒習慣

飲酒習慣のある者とは、週 3 日以上、飲酒日 1 日あたり 1 合以上飲酒すると回答した者とした。

エ．生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者とは、1 日当たりの純アルコール摂取量が男性で 40g 以上、女性 20g 以上の者とし、次の方法で算出した。

- ①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～3日×5合以上」
- ②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～3日×5合以上」

(7) 統計量の算出

ア. 記述統計

平均値または割合、標準偏差、標準誤差、パーセンタイル（連続変数のみ）の算出は「地域健康・栄養調査基本集計 ver.1.52」ソフトウェア（開発 国立保健医療科学院 横山徹彌）を使用し、クラスター抽出法による標本抽出を考慮した算出を行った。

本調査で観察された結果から、千葉県民（20歳以上）の実際の状況を推定するため、次のような調整（重み付け）をして統計量を算出した。なお調整（重み付け）を行わない統計量は、20歳未満の結果を含めて参考資料に掲載した。

- ①年齢階級別は、保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するため、保健所別に抽出率の逆数で重みづけをして算出した。
- ②県全体の推定値（P6 参照）を得るために①に加えて平成 27 年の千葉県の男女別人口構成に調整した（結果表の「(再掲) 20 歳以上※1」）。
- ③年次比較及び全国との値の比較には、①に加えて平成 22 年国勢調査の全国男女計の人口構成に調整した（結果表の「(再掲) 20 歳以上※2」）。

イ. 年次比較及び全国との値の比較

前回調査値（平成 22 年）及び全国との比較は、20 歳以上の点推定値（平均値または割合）と標準誤差から、2 群の差の Z 検定を行った。Z 検定には、「地域健康・栄養調査各種計算ツール」（作成 国立保健医療科学院 横山徹爾）を使用した。

ウ. 群間比較

朝食状況別等の群間における栄養素等及び食品群別摂取量の比較は、20 歳以上の対象者データを用い、共分散分析により年齢、保健所による影響を調整した調整平均を算出し、調整平均の t 検定を行った。

食習慣別の BMI 及び食塩摂取量の比較は、妊娠・授乳中の者を除外し、生活習慣調査における該当設問に欠損がなく、栄養摂取状況調査を実施し、身長及び体重の測定がある 20 歳以上の対象者データで行った。群間の比較は t 検定を用いた。また、食塩摂取過剰につながる 6 つの食習慣の該当総数により、人数がほぼ等しくなるよう 3 群（0 つ、1 つ、2 つ以上）に分けての食塩摂取量の比較は、食塩摂取量を目的変数、各群の順序番号を説明変数とした線形回帰分析を行い、回帰係数の P 値により傾向性の検定を行った。

これらの群間比較には、JMP Pro バージョン 12 (SAS Institute Inc.) を使用した。

エ. 有意水準

各検定の有意水準は 5%を用いた。有意差があった場合は、結果の概要における集計結果の評価に係るコメントを「有意に高い（低い、増加した、減少した）」「有意な傾向性がみられた」と表記した。

県全体の推定値の計算方法

県全体の推定値を得るためには、保健所別に抽出率の逆数で重み付けし、さらに平成 27 年の県の男女別人口構成に調整した。すなわち、保健所 h (1,2,3.....16)、年齢階級 a (= 1,2,3...M) の重み $W_{h,a}$ を

$$W_{h,a} = \frac{1}{P_h} \times \frac{N_a}{\sum_{i=1}^{16} \left[\frac{1}{P_i} \times n_{i,a} \right]}$$

として集計を行った。ここで、 P_h は保健所 h での抽出率、すなわち、

$$P_h = \frac{\text{保健所}h\text{の全標本数}}{\text{保健所}h\text{の全人口}}$$

であり、 N_a は年齢階級 a の県人口、 $n_{i,a}$ は保健所 i での年齢階級 a の標本数である。

(年次推移、国との比較の値には、平成 22 年国勢調査の全国男女計の人口構成を用いて算出している)

6 解析対象客体の概要

(1) 調査世帯数

無作為抽出された調査地区に在住する全世帯 718 世帯を調査対象世帯とし、そのうち 508 世帯で調査を実施した。

(2) 対象者数

栄養摂取状況調査、身体状況調査、生活習慣調査における実施者数 (いずれかの調査を 1 つでも実施した者) は、1,217 人であり、これを解析対象者とした。

調査実施状況は、次のとおりである。

ア. 二次医療圏・保健所別 調査実施状況

二次医療圏	保健所	調査対象世帯数	実施世帯数	調査対象者数	調査実施者数	実施状況					実施率
						栄養摂取状況	身体状況	歩数	生活習慣①	生活習慣②	
		(世帯)	(世帯)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	
千葉	千葉市	62	36	130	72	51	68	45	68	68	55.4%
東葛南部	習志野	34	26	98	69	61	69	53	57	57	70.4%
	市川	67	52	160	111	101	102	98	104	104	69.4%
	船橋市	24	10	78	30	28	25	16	24	17	38.5%
	小計	125	88	336	210	190	196	167	185	178	62.5%
東葛北部	松戸	50	35	119	78	72	78	50	61	61	65.5%
	野田	42	31	112	80	66	73	51	67	67	71.4%
	柏市	44	29	114	63	48	52	35	60	60	55.3%
	小計	136	95	345	221	186	203	136	188	188	64.1%
印旛	印旛	48	34	146	93	81	87	62	67	68	63.7%
香取海匝	香取	47	22	61	28	27	27	23	26	26	45.9%
	海匝	34	26	87	64	52	63	42	55	55	73.6%
	小計	81	48	148	92	79	90	65	81	81	62.2%
山武長生夷隅	山武	40	32	102	76	76	76	59	68	68	74.5%
	長生	55	43	145	108	103	107	81	86	87	74.5%
	夷隅	44	32	108	81	79	81	51	62	62	75.0%
	小計	139	107	355	265	258	264	191	216	217	74.6%
安房	安房	44	42	117	104	98	104	75	95	95	88.9%
君津	君津	44	28	128	76	74	76	59	62	62	59.4%
市原	市原	39	30	109	84	73	79	59	66	66	77.1%
総数		718	508	1,814	1,217	1,090	1,167	859	1,028	1,023	67.1%

※実施率は分母を調査対象者数、分子は調査実施数

イ．性・年齢階級別 調査実施状況

		総数	1- 6 歳	7-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70 歳 以上
全 体	調査実施者総数	1217	52	78	48	83	107	158	164	219	308
	栄養摂取	1090	49	70	45	75	100	132	147	197	275
	身体状況	1176	50	75	46	79	104	149	160	214	299
	身長・体重計測	1167	50	75	46	79	103	149	159	213	293
	腹囲計測	1096	8	69	45	73	101	148	159	207	286
	運動習慣	816	－	－	－	62	83	116	119	179	257
	歩数	859	－	－	－	64	90	118	145	191	251
	生活習慣①	1028	－	－	－	81	107	158	161	217	304
	生活習慣②	1023	－	－	－	82	106	156	162	217	300
男 性	調査実施者総数	564	22	36	27	38	49	73	82	101	136
	栄養摂取	513	22	33	27	35	48	61	74	89	124
	身体状況	549	22	35	25	37	49	68	82	97	134
	身長・体重計測	546	22	35	25	37	49	68	82	97	131
	腹囲計測	513	2	30	25	34	49	68	82	93	130
	運動習慣	373	－	－	－	28	38	47	61	79	120
	歩数	400	－	－	－	31	41	53	72	86	117
	生活習慣①	474	－	－	－	37	49	73	81	100	134
	生活習慣②	472	－	－	－	37	48	72	81	101	133
女 性	調査実施者総数	653	30	42	21	45	58	85	82	118	172
	栄養摂取	577	27	37	18	40	52	71	73	108	151
	身体状況	627	28	40	21	42	55	81	78	117	165
	身長・体重計測	621	28	40	21	42	54	81	77	116	162
	腹囲計測	583	6	39	20	39	52	80	77	114	156
	運動習慣	443	－	－	－	34	45	69	58	100	137
	歩数	459	－	－	－	33	49	65	73	105	134
	生活習慣①	554	－	－	－	44	58	85	80	117	170
	生活習慣②	551	－	－	－	45	58	84	81	116	167

※－は当該項目の調査対象外である。

ウ．保健所別 性年齢階級

年齢階級 (歳)		総 数	習 志 野	市 川	松 戸	野 田	印 旛	香 取	海 匠	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	千 葉 市	船 橋 市	柏 市
総 数	総数	1217	69	111	78	80	93	28	64	76	108	81	104	76	84	72	30	63
	1- 6	52	1	2	1	6	6	0	4	0	4	2	3	7	8	4	4	0
	7-14	78	9	0	9	6	10	2	2	4	10	9	3	4	8	0	2	0
	15-19	48	2	2	7	1	8	0	2	4	6	8	3	2	2	0	0	1
	20-29	83	8	9	5	5	6	0	4	7	7	5	9	4	3	6	2	3
	30-39	107	5	12	1	12	9	5	5	6	6	5	7	6	14	6	6	2
	40-49	158	18	8	13	10	17	2	4	6	16	19	11	8	9	6	4	7
	50-59	164	9	24	10	6	16	3	4	22	16	13	11	9	7	9	3	2
	60-69	219	7	18	8	24	12	10	16	11	26	11	21	12	10	14	1	18
	70 以上	308	10	36	24	10	9	6	23	16	17	9	36	24	23	27	8	30
男 性	総数	564	33	50	31	36	42	13	29	38	51	36	48	41	40	30	15	31
	1- 6	22	1	1	0	1	1	0	1	0	4	0	1	2	6	2	2	0
	7-14	36	6	0	4	3	5	1	0	2	5	3	3	2	2	0	0	0
	15-19	27	1	0	4	0	4	0	0	3	5	5	1	2	1	0	0	1
	20-29	38	4	3	1	1	3	0	3	4	2	2	6	2	1	2	1	3
	30-39	49	3	6	0	5	3	1	3	4	3	3	2	5	7	1	3	0
	40-49	73	8	5	7	6	5	1	3	2	8	9	3	1	4	5	3	3
	50-59	82	4	12	4	2	9	2	1	12	5	6	8	8	3	4	1	1
	60-69	101	3	9	2	12	6	4	9	5	14	4	8	6	4	5	1	9
	70 以上	136	3	14	9	6	6	4	9	6	5	4	16	13	12	11	4	14
女 性	総数	653	36	61	47	44	51	15	35	38	57	45	56	35	44	42	15	32
	1- 6	30	0	1	1	5	5	0	3	0	0	2	2	5	2	2	2	0
	7-14	42	3	0	5	3	5	1	2	2	5	6	0	2	6	0	2	0
	15-19	21	1	2	3	1	4	0	2	1	1	3	2	0	1	0	0	0
	20-29	45	4	6	4	4	3	0	1	3	5	3	3	2	2	4	1	0
	30-39	58	2	6	1	7	6	4	2	2	3	2	5	1	7	5	3	2
	40-49	85	10	3	6	4	12	1	1	4	8	10	8	7	5	1	1	4
	50-59	82	5	12	6	4	7	1	3	10	11	7	3	1	4	5	2	1
	60-69	118	4	9	6	12	6	6	7	6	12	7	13	6	6	9	0	9
	70 以上	172	7	22	15	4	3	2	14	10	12	5	20	11	11	16	4	16

エ. 職業の状況

	総数	専門的・技術 的職業従事者	管理的職 業従事者	事務 従事者	販売 従事者	サービス職業 従事者	保安職業 従事者	農業 従事者
総数	1217	99	47	78	55	72	11	29
男性	564	61	43	29	26	17	10	16
女性	653	38	4	49	29	55	1	13

	林業 従事者	漁業 従事者	運輸・通信 従事者	生産工程・ 労務作業者	家事 従事者	その他 (無職)	保育園児	幼稚園児
総数	0	2	18	89	235	203	14	17
男性	0	2	18	64	16	138	7	9
女性	0	0	0	25	219	65	7	8

	その他 幼児	小学校低 学年	小学校中 学年	小学校高 学年	中学生	その他の 学生	不 明
総数	17	17	20	18	31	58	87
男性	6	6	7	9	15	32	33
女性	11	11	13	9	16	26	54

7 本書利用上の留意点

集計客体数並びに結果の概要に掲載している数値は四捨五入のため、内訳合計が総数と合わないことがある。

結果表において、「0」は数値が表章単位に満たないもの、「－」は該当数値のないことを示す。

(参考文献)

・横山徹爾. 地域健康・栄養調査基本集計 version 1.52 使用説明書.

http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/download/eiyocalc/index_j.html

・長野県健康福祉部. 平成 25 年度県民健康・栄養調査報告.

<http://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-choju/kenko/kenko/kenko/chosa/chousa25-2.html>

・千葉県総合企画部統計課. 千葉県年齢別・町丁字別人口平成 27 年度 平成 27 年 4 月 1 日現在.

<https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/nenreibetsu/h27/h27-index.html>

・総務省統計局. 人口推計 平成 22 年国勢調査による基準人口（日本人人口）.

<http://www.stat.go.jp/data/jinsui/9.htm>

・横山徹爾. 地域健康・栄養調査各種計算ツール.

<http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/download/eiyocalc/tools.xls>

・厚生労働科学研究費補助金循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業「健康増進施策推進・評価のための健康・栄養モニタリングシステムの構築」研究班. 健康増進施策推進・評価のための健康・栄養調

査データ活用マニュアル 2011 年 11 月 30 日版.

<http://www0.nih.go.jp/eiken/chosa/pdf/20111215.pdf>

・ SAS Institute Inc. 2015. SAS/STAT® 14.1 User's Guide. The SURVEYMEANS Procedure. Cary, NC:SAS Institute Inc.

・ SAS Institute Inc. 2015. 「JMP® 12 基本的な回帰モデル」 Cary, NC: SAS Institute Inc

票查調況狀体身

地区番号	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>	<input type="text"/>	市郡番号	<input type="text"/>
世帯番号	<input type="text"/>	<input type="text"/>				世帯員番号			<input type="text"/>
性別	1 男		2 女						
年齢	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(平成 27 年 11 月 1 日現在)			保健所			



腹囲（おなか周り）の測定に御協力をお願いします！

＜腹囲計測の留意点＞


- 腹囲は、力を抜いて立って立った状態でへその高さと測定してください。
- (測られる方は、両足をそろえ、両腕はからだの横に自然に下げ、おなかにな力が入らないようにしてください。)
- 測定者は、測られる方の正面に立ち、巻き尺を腹部に直接あててください。
- (洗濯ばさみ等で服を巻きあげると良いです。)
- 巻き尺が水平にきちんと巻かれているかを確認し、普通の呼吸で息をはいた終わりに、メモリを0.5cm間隔で読み取ってください。
- 腹部をのぞき込まないように注意してください。
- なお、できるだけ飲食直後の測定を避けるようにする。

※正確な計測を行うため、下着などは着用せずに、直接腹部を計測してください。

順手

- ① 軽く両腕をあげてもらい、へその高さに巻き尺をあてる。
- ②③ 背中や腰に巻き尺が水平に巻かれているか確認する。
- ④ 測定する時は、両腕をからだの横に自然に下げてもらい、普通の呼吸で呼吸の終わりに目盛りを読み取る。

※一人暮らしなどで測定者がおらず自分で測定する場合は、鏡の前に横向きで立ち、巻き尺が水平に巻かれているかを確認して計測してください。



※ この調査票において、運動とは、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に行うものをいいます。

栄養摂取状況調査票

地区番号 -

市郡番号

世帯番号

調査日 平成27年 月 日

保健所

調査員氏名

確認者氏名



千葉県マスコットキャラクター
チョーパくん

千葉県

I 世帯状況・II 食事状況

「栄養摂取状況調査票の書き方」に沿って、記入してください。

I 世帯状況		II 食事状況		身体状況	
1.世帯員番号	2.氏名	3.生年月日	4.性別	5.世帯主との続柄 ※1 参照	6.妊娠・授乳
01		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1 男 2 女	01	1 妊娠している <input type="checkbox"/> 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
02		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1 男 2 女		1 妊娠している <input type="checkbox"/> 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
03		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1 男 2 女		1 妊娠している <input type="checkbox"/> 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
04		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1 男 2 女		1 妊娠している <input type="checkbox"/> 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
05		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1 男 2 女		1 妊娠している <input type="checkbox"/> 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
06		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1 男 2 女		1 妊娠している <input type="checkbox"/> 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
07		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1 男 2 女		1 妊娠している <input type="checkbox"/> 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
08		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1 男 2 女		1 妊娠している <input type="checkbox"/> 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している
09		1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1 男 2 女		1 妊娠している <input type="checkbox"/> 週 2 分娩後満6か月未満で現在授乳している 3 分娩後満6か月未満で現在授乳していない 4 分娩後満6か月以上で現在授乳している

※1 世帯主との続柄
01 世帯主 05 孫 09 祖父
02 世帯主の配偶者 06 孫の配偶者 10 兄弟姉妹
03 子 07 世帯主の父母 11 その他の親族
04 子の配偶者 08 配偶者の父母 12 その他(親族以外)

世帯主の配偶者(夫又は妻)の祖父・兄弟姉妹はそれぞれ「09 祖父」「10 兄弟姉妹」に含めます。兄弟姉妹の配偶者は「10 兄弟姉妹」に含めます。「配偶者」には事実上夫婦として生活しているが、婚姻届けを提出していない場合も含めます。

7.仕事の 種類	II 食事状況			身体状況	
	朝	昼	夕	1日の身体活動量(歩数) (20歳以上)	歩数計の装着状況 朝起きてから寝るまで、(お風呂と着けていたか。(入浴、水泳中などを除く)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ (いずれかに、レ印をつけて下さい)

問5 あなたは、持ち帰りの弁当や惣菜をどのくらい利用していますか。
該当する番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- | | | | |
|---|--------|---|---------|
| 1 | 毎日2回以上 | 5 | 週1回 |
| 2 | 毎日1回 | 6 | 週1回未満 |
| 3 | 週4～6回 | 7 | 全く利用しない |
| 4 | 週2～3回 | | |

問6 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所はありますか。
それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて
下さい。

※周辺とは、自宅から徒歩、自転車、車でそれぞれ10分以内程度、あるいは通勤・通学路上にあって気軽に行けることを意味するものとします。

	1. ある	2. ない	3. わからない
ア 運動が行える公園	1	2	3
イ 安全な歩道や自転車道など	1	2	3
ウ 海岸、河原、山など	1	2	3
エ 体育館	1	2	3
オ フール	1	2	3
カ グランド、テニスコート、野球場など	1	2	3
キ スポーツジム、フィットネスクラブ	1	2	3
ク 地域センター、公民館など	1	2	3

問7 あなたの周辺に、運動ができる場所が整備されるとすれば、次のどれを望みますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

※ここでの運動とは、スポーツやトレーニングなどのような健康づくりや体力向上など、目的をもって余暇時間に行われる活動のことです。

- | | | | |
|---|----------------|----|--------------------|
| 1 | 運動が行える公園 | 6 | グラウンド、テニスコート、野球場など |
| 2 | 安全な歩道や自転車道など | 7 | スポーツジム、フィットネスクラブ |
| 3 | 整備された海岸、河原、山など | 8 | 地域センター、公民館など |
| 4 | 体育館 | 9 | その他 |
| 5 | プール | 10 | 特にない |

問8 ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 5時間未満
- 2 5時間以上 6時間未満
- 3 6時間以上 7時間未満
- 4 7時間以上 8時間未満
- 5 8時間以上 9時間未満
- 6 9時間以上

問9 睡眠の質についておたずねします。あなたはこの1ヶ月間に、次のようなことが週3回以上ありましたか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

- 1 寝付き（布団に入ってから眠るまでに要する時間）に、い
- 2 つもより時間がかかった
- 3 夜間、睡眠途中で目が覚めて困った
- 4 起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れな
- 5 かった
- 6 睡眠時間が足りなかった
- 7 睡眠全体の質に満足できなかった
- 8 日中、眠気を感じた
- 9 上記1～6のようなことはなかった

問10 あなたの睡眠の確保の妨げとなっていることは何ですか。あてはまる番号をすべて選んで○印を付けてください。

- | | | | |
|---|------|----|---------------------------|
| 1 | 仕事 | 6 | 通勤・通学の所要時間 |
| 2 | 家事 | 7 | 睡眠環境（音、照明など） |
| 3 | 育児 | 8 | 就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中すること |
| 4 | 介護 | 9 | その他 |
| 5 | 健康状態 | 10 | 特に困っていない |

問 11 あなたが、自分の睡眠の確保のために必要なことは何ですか。最もあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| 1 就労時間の短縮 | 6 通勤・通学時間の短縮 |
| 2 家事のサポート | 7 睡眠環境を整える |
| 3 育児のサポート | 8 就寝前に携帯電話、メール、
ゲームなどに熱中しない |
| 4 介護のサポート | 9 その他 |
| 5 健康状態の改善 | 10 特になし |

問 12 あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号 1 つに○をつけて下さい。

- 1 毎日吸っている
2 時々吸う日がある
3 以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない
4 吸わない
- 問 13 へ

(問 12-1) あなたは通常、1日に何本たばこを吸いますか。
(「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答え下さい。)

--	--	--	--

本

(問 12-2) たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 やめたい
- 2 本数を減らしたい
- 3 やめたくない
- 4 わからない

(問 12-3) 身近に禁煙治療が受けられる医療機関がありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 ある
2 ない
3 わからない

問 13 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。次のアからコの場所について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「イ 職場」欄に記入して下さい。

	1. 1. ほぼ毎日	2. 2. 週に数回程度	3. 3. 週に1回程度	4. 4. 月に1回程度	5. 5. 全くなかった	6. 6. 行かなかった
ア 家庭	1	2	3	4	5	
イ 職場	1	2	3	4	5	6
ウ 学校	1	2	3	4	5	6
エ 飲食店	1	2	3	4	5	6
オ 遊技場 (ゲームセンター、 パチンコ、競馬場など)	1	2	3	4	5	6
カ 行政機関 (市役所、町村役場、公民 館など)	1	2	3	4	5	6
キ 医療機関	1	2	3	4	5	6
ク 公共交通機関	1	2	3	4	5	6
ケ 路上	1	2	3	4	5	6
コ 子供が利用する 屋外の空間 (公園、通学路など)	1	2	3	4	5	6

問 14 あなたが、受動喫煙の防止対策が今よりも推進されることを望む場所がありますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

- | | | | |
|---|----------------------|----|------------------|
| 1 | 家庭 | 6 | 行政機関 |
| 2 | 職場 | | (市役所、町村役場、公民館など) |
| 3 | 学校 | 7 | 医療機関 |
| 4 | 飲食店 | 8 | 公共交通機関 |
| 5 | 遊技場 | 9 | 路上 |
| | (ゲームセンター、パチンコ、競馬場など) | 10 | 子供が利用する屋外の空間 |
| | | | (公園、通学路など) |
| | | 11 | 特にない |

問 15 あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 毎日
- 2 週 5 ～ 6 日
- 3 週 3 ～ 4 日
- 4 週 1 ～ 2 日
- 5 月に 1 ～ 3 日
- 6 ほとんど飲まない
- 7 やめた
- 8 飲まない（飲めない）

問 16 へ

（問 15 で 1、2、3、4、5 と答えた方にお聞きます。）

（問 15-1）お酒を飲む日は 1 日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 1 合（180ml）未満
- 2 1 合以上 2 合（360ml）未満
- 3 2 合以上 3 合（540ml）未満
- 4 3 合以上 4 合（720ml）未満
- 5 4 合以上 5 合（900ml）未満
- 6 5 合（900ml）以上

清酒 1 合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。
 ビール・発泡酒中瓶 1 本（約 500ml）、焼酎 2 0 度（135ml）、
 焼酎 2 5 度（110ml）、焼酎 3 5 度（80ml）、チューハイ 7 度（350ml）、
 ウィスキーダブル 1 杯（60ml）、ワイン 2 杯（240ml）

問 16 飲酒の知識についておたずねします。「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」とは、男女それぞれ 1 日平均でどのくらいだと思いますか。清酒に換算[※]し、あてはまる番号をそれぞれ 1 つ選んで○印をつけて下さい。

※清酒 1 合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。
 ビール・発泡酒中瓶 1 本（約 500ml）、焼酎 2 0 度（135ml）、
 焼酎 2 5 度（110ml）、焼酎 3 5 度（80ml）、チューハイ 7 度（350ml）、
 ウィスキーダブル 1 杯（60ml）、ワイン 2 杯（240ml）

ア 男性の場合

- 1 1 合（180ml）以上
- 2 2 合（360ml）以上
- 3 3 合（540ml）以上
- 4 4 合（720ml）以上
- 5 5 合（900ml）以上
- 6 わからない

イ 女性の場合

- 1 1 合（180ml）以上
- 2 2 合（360ml）以上
- 3 3 合（540ml）以上
- 4 4 合（720ml）以上
- 5 5 合（900ml）以上
- 6 わからない

問 17 自分の歯[※]は何本ありますか。

※自分の歯には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。親知らずを抜くと全部で 28 本が正常ですが、28 本より多かったり少なかったりすることもあります。0 本の場合は、0 と書いて下さい。

自分の歯は 本ある。

問 18 かんで食べるときの状態について、あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

- 1 何でもかんで食べることができる
- 2 一部かめない食べ物がある
- 3 かめない食べ物が多い
- 4 かんで食べることはできない

問 19 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。次のアからオの質問について、あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

	1. はい	2. いいえ
ア ゆっくりよくかんで食事をする	1	2
イ 半年前に比べて固いものが食べにくくなった	1	2
ウ お茶や汁物等でむせることがある	1	2
エ 口の渇きが気になる	1	2
オ 左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる	1	2

問 20 あなたのお住まいの地域についておたずねします。次のアからエの質問について、あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

	1. 強くそう思う	2. どちらかといえそう思う	3. どちらともいえない	4. どちらかといえそう思わない	5. 全くそう思わない
ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている	1	2	3	4	5
イ あなたのお住まいの地域の人々は、信頼できる	1	2	3	4	5
ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いにあいさつをしている	1	2	3	4	5
エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする	1	2	3	4	5

ご協力ありがとうございました。

生活習慣調査票②

(満20歳以上の方はご記入下さい。)

地区番号 -

市郡番号

世帯番号

世帯員番号

性別 ☐ 1 男 ☐ 2 女

年齢 (平成27年11月1日現在)

保健所 _____



千葉県マスコットキャラクター
チーノくん

千葉県

- 問1 あなたはふだん朝食を食べますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
- | | |
|-------------|-------------|
| 1 ほとんど毎日食べる | 2 週2～3日食べない |
| 3 週4～5日食べない | 4 ほとんど食べない |

- 問2 あなたは、人と比較して食べる速度が速いですか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
- | | | |
|------|-------|------|
| 1 速い | 2 ふつう | 3 遅い |
|------|-------|------|

- 問3 あなたは、ついついお腹いっぱい食べるほうですか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
- | | |
|------|-------|
| 1 はい | 2 いいえ |
|------|-------|

- 問4 あなたは、就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
- | | |
|------|-------|
| 1 はい | 2 いいえ |
|------|-------|

- 問5 あなたは、夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
- | | |
|------|-------|
| 1 はい | 2 いいえ |
|------|-------|

- 問6 あなたは、甘みのある茶類やコーヒー、炭酸飲料、ジュース、スポーツドリンクなどをほぼ毎日飲みますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
- | | |
|------|-------|
| 1 はい | 2 いいえ |
|------|-------|

- 問7 あなたの家庭の煮物などの味付けは濃いほうですか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
- | | |
|------|-------|
| 1 はい | 2 いいえ |
|------|-------|

- 問8 あなたは、汁物(みそ汁、スープ類)を1日2杯以上飲みますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。
- | | |
|------|-------|
| 1 はい | 2 いいえ |
|------|-------|

- 1 -

- 問9 あなたは、単品料理(牛丼、天丼などの丼物、カレーライスやめん類など)を食べる日は、週に3日以上ですか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 はい 2 いいえ

- 問10 あなたは、めん類の汁をほとんど全部飲みますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 はい 2 いいえ

- 問11 あなたは、塩蔵品(塩さけ、たらこ、佃煮等)を食べる日は、週に3日以上ですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 はい 2 いいえ

- 問12 あなたは、漬物や味付けしてあるおかずに、しょうゆやソースをかけることが多いですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 はい 2 いいえ

- 問13 あなたは、漬物を1日2回以上食べますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 はい 2 いいえ

- 問14 あなたは、1日の食塩の摂取目標量を知っていますか。

1 はい 2 いいえ → 問15へ

(問14-1)それは何グラムですか。

()グラム

- 問15 あなたは、食品購入時、食塩の表示(ナトリウム量や食塩相当量、「減塩」などの表示)を参考にしていますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 はい 2 いいえ

- 問16 あなたは、ふだんの食事において、減塩に取り組んでいますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 積極的に取り組んでいる
2 少し取り組んでいる
3 あまり取り組んでいない
4 まったく取り組んでいない

- 問17 あなたは、健康のために1日に食べることが望ましい野菜の重量を知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

1 はい 2 いいえ → 問18へ

(問17-1)それは何グラムですか。

()グラム

- 問18 あなたは、ふだんの食事で十分に野菜を食べていると思いますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

1 十分に食べていると思う
2 やや不足気味だと思う
3 不足していると思う

- 問19 あなたは、1週間のうち、どれくらいの頻度で食事づくり(調理)をしていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

1 ほとんど毎日2回以上 2 ほとんど毎日1回
3 週2～5日 4 週1回以下

- 問20 あなたは、家族や友達と食卓を囲み、食事を楽しむ機会を持つなど、食を通じたコミュニケーションをとっていますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 毎食している 2 ほとんどしている
3 時々している 4 あまりしていない
5 全くしていない

- 2 -

- 3 -

問 21 あなたはこれまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 ある 2 ない → 問 22 へ

↓
(問 21-1) 現在、高血圧の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けていますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 受けている 2 受けていない

問 22 あなたはこれまでに医療機関や健診で血中コレステロール（総コレステロールまたはLDLコレステロール）が高いといわれたことがありますか。あてはまる番号1つ選んで○印をつけてください。

1 ある 2 ない → 問 23 へ

↓
(問 22-1) 現在、血中コレステロールの治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けていますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 受けている 2 受けていない

問 23 全体的に見て、過去1ヶ月間のあなたの健康状態はいかがでしたか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

1 最高に良い 2 とても良い
3 良い 4 あまり良くない
5 良くない 6 ぜんぜん良くない

問 24 この1年間で体重が3kg以上増加しましたか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

1 はい 2 いいえ

問 25 この1年間で体重が3kg以上減少しましたか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

1 はい 2 いいえ

・ 4. 御協力ありがとうございました。

食品群分類表

大分類	大分類番号	中分類	中分類番号	小分類	小分類番号	食 品 名
穀類	1	米・加工品	1	米	1	玄米、半つき米、七分つき米、精白米、はいが精米、玄米めし、半つき米めし、七分つき米めし、精白米めし、はいが精米めし、玄米全かゆ、半つき米全かゆ、七分つき米全かゆ、精白米全かゆ（20 %がゆ）、玄米五分かゆ、半つき米五分かゆ、七分つき米五分かゆ、精白米五分かゆ、玄米おもゆ、半つき米おもゆ、七分つき米おもゆ、精白米おもゆ、陸稲玄米、陸稲半つき米、陸稲七分つき米、陸稲精白米、陸稲玄米めし、陸稲半つき米めし、陸稲七分つき米めし、陸稲精白米めし
				米加工品	2	アルファ化米、おにぎり、焼きおにぎり、きりたんぼ、上新粉、ビーフン、米こうじ、もち、赤飯、あくまき、白玉粉、道明寺粉
		小麦・加工品	2	小麦粉類	3	薄力粉、中力粉、強力粉、全粒粉強力粉、ホットケーキミックス粉、天ぷら粉
				パン類 (菓子パンを除く)	4	食パン、コッペパン、乾パン、フランスパン、ライ麦パン、ぶどうパン、ロールパン、クロワッサン、イングリッシュマフィン、ナン
				菓子パン類	5	あんパン、クリームパン、ジャムパン、チョココロネ
				うどん、中華めん類	6	生うどん、ゆでうどん、干しうどん、ゆで干しうどん、乾そうめん・ひやむぎ、ゆでそうめん・ひやむぎ、乾手延そうめん・手延ひやむぎ、ゆで手延そうめん・手延ひやむぎ、生中華めん、ゆで中華めん、蒸し中華めん、干し中華めん、ゆで干し中華めん、生沖縄そば、ゆで沖縄そば、干し沖縄そば、ゆで干し沖縄そば
				即席中華めん	7	インスタントラーメン（油揚げ味付け）、インスタントラーメン（油揚げ）、インスタントラーメン（非油揚げ）、中華カップめん（油揚げ）、焼そばカップめん（油揚げ）、中華カップめん（非油揚げ）、和風カップめん（油揚げ）
				パスタ類	8	マカロニ・スパゲッティ、ゆでマカロニ・ゆでスパゲッティ
				その他の小麦加工品	9	生麴、親世ふ、小町ふ、板ふ、車ふ、竹輪ふ、小麦胚芽、ぎょうざの皮、しゅうまいの皮、ピザクラスト、生パン粉、半生パン粉、乾燥パン粉
		その他の穀類・加工品	3	そば・加工品	10	そば粉（全粒粉、ひきぐるみ）、内層粉そば粉、中層粉そば粉、表層粉そば粉、そば米、生そば、ゆでそば、干しそば、ゆで干しそば
				とうもろこし・加工品	11	とうもろこし（玄穀）、フライ味付けジャイアントコーン、ポップコーン、コーンフレーク
				その他の穀類	12	アマランサス、あわ、あわもち、オートミール、七分つき押麦、押麦、米粒麦、乾大麦めん、ゆで大麦めん、麦こがし、きび・もちきび、はとむぎ、ひえ、もろこし（精白粒）、全粒粉ライ麦粉、ライ麦粉
いも類	2	いも・加工品	4	さつまいも・加工品	13	さつまいも、さつまいも（蒸し・ふかし）、さつまいも（焼きいも）、干しいも
				じゃがいも・加工品	14	じゃがいも、じゃがいも（蒸し・ふかし）、じゃがいも（水煮）、乾燥マッシュポテト
				その他のいも・加工品	15	きくいも、こんにやく精粉、板こんにやく、生いもこんにやく、しらたき、さといも、さといも（水煮）、さといも（冷凍）、みずいも、みずいも（水煮）、やつがしら、やつがしら（水煮）、いちよういも、ながいも、ながいも（水煮）、やまといも、じねんじょ、だいじょ
		でんぶん・加工品	5	でんぶん・加工品	16	タピオカ粉、くず粉、米でん粉、小麦でん粉、さつまいもでん粉、かたくり粉、コーンスターチ、くずきり（乾）、くずきり（ゆで）、タピオカパール、緑豆はるさめ、はるさめ
砂糖・甘味料類	3	砂糖・甘味料類	6	砂糖・甘味料類	17	黒砂糖、和三盆糖、上白糖、三温糖、グラニュー糖、白ざら（上ざら）糖、中ざら（黄ざら）糖、角砂糖、氷砂糖、コーヒースーガー、パウダースーガー、水あめ、はちみつ、メープルシロップ
豆類	4	大豆・加工品	7	大豆(全粒)・加工品	18	乾燥国産大豆、ゆで大豆、乾燥大豆（米国産）、乾燥大豆（中国産）、乾燥大豆（ブラジル産）、大豆（水煮缶）、きな粉（全粒）、きな粉（脱皮）、ぶどう豆（煮豆）
				豆腐	19	木綿豆腐、絹ごし豆腐、ソフト豆腐、充てん豆腐、沖縄豆腐、ゆし豆腐、焼き豆腐、凍り豆腐、豆腐よう、蒸し豆腐竹輪、焼き豆腐竹輪
				油揚げ類	20	生揚げ、油揚げ、がんもどき
				納豆	21	糸引き納豆、挽きわり納豆、五斗納豆、寺納豆（塩辛納豆、浜納豆）
				その他の大豆加工品	22	おから（旧来製法）、おから（新製法）、豆乳、調製豆乳、豆乳飲料・麦芽コーヒー、生湯葉、干し湯葉、金山寺みそ、ひしおみそ
		その他の豆・加工品	8	その他の豆・加工品	23	乾燥あずき、ゆであずき、ゆで小豆缶詰、こしあん、さらしあん、つぶしあん、乾燥いんげんまめ、ゆでいんげんまめ、うずら豆（煮豆）、いんげんまめこしあん、豆きんとん、乾燥えんどう、ゆでえんどう、グリーンピース（揚げ豆）、塩豆、うぐいす豆、乾燥ささげ、ゆでささげ、乾燥そらまめ、フライビーンズ（揚げそら豆）、おたふく豆、ふき豆、乾燥たけあずき、乾燥ひよこまめ、ゆでひよこまめ、フライ味付けひよこまめ、乾燥べにばないんげん、ゆでべにばないんげん、乾燥らいまめ、乾燥りよくとう、ゆでりよくとう、乾燥レンズまめ
種実類	5	種実類	9	種実類	24	アーモンド、アーモンド（フライ味付け）、あざ、えごま、カシューナッツ（フライ味付け）、かばちんの種（いり味付け）、かやの実（いり）、ぎんなん、ぎんなん（ゆで）、くり、くり（ゆで）、くり（甘露煮）、甘ぐり（焼ぐり）、くるみ（いり）、けしの実、ココナッツパウダー、ごま（乾）、ごま（いり）、ごま（むき）、しいの実、すいかの種（いり味付け）、とちの実（蒸し）、はすの実（生）、はすの実（乾）、ひしの実、ピスタチオ（いり味付け）、ひまわりの種（フライ味付け）、ブラジルナッツ（フライ味付け）、ヘーゼルナッツ（フライ味付け）、ペカン（フライ味付け）、マカダミアナッツ（いり味付け）、まつの実、まつの実（いり）、らっかせい（乾）、らっかせい（いり）、バターピーナッツ、ピーナッツバター、らっかせい、らっかせい（ゆで）

大分類	大分類番号	中分類	中分類番号	小分類	小分類番号	食 品 名
野菜類	6	緑黄色 野菜	10	トマト	25	トマト、ミニトマト、ホールトマト缶詰
				にんじん	26	葉にんじん、にんじん、にんじん（ゆで）、にんじん・皮むき、にんじん・皮むき（ゆで）、にんじん（冷凍）、きんとき（京にんじん）、きんとき（ゆで）、きんとき・皮むき、きんとき・皮むき（ゆで）、ミニキャロット
				ほうれん草	27	ほうれん草、ほうれん草（ゆで）、ほうれん草（冷凍）
				ピーマン	28	青ピーマン、青ピーマン（油炒め）、赤ピーマン、赤ピーマン（油炒め）、黄ピーマン、黄ピーマン（油炒め）、トマピー
				その他の 緑黄色 野菜	29	あさつき、あさつき（ゆで）、あしたば、あしたば（ゆで）、アスパラガス、アスパラガス（ゆで）、さやいんげん、さやいんげん（ゆで）、エンダイブ、トウモロコシ、さやえんどう、さやえんどう（ゆで）、おおさかしりな、おおさかしりな（ゆで）、おかひじき、おかひじき（ゆで）、オクラ、オクラ（ゆで）、かぶ葉、かぶ葉（ゆで）、日本かぼちゃ、日本かぼちゃ（ゆで）、西洋かぼちゃ、西洋かぼちゃ（ゆで）、西洋かぼちゃ（冷凍）、そうめんかぼちゃ、からしな、きょうじゃにんにく、きょうな、きょうな（ゆで）、キンサイ、キンサイ（ゆで）、クレソン、ケール、こごみ、こまつな、こまつな（ゆで）、さんとうさい、さんとうさい（ゆで）、ししとうがらし、しそ葉、しその実、じゅうろくささげ、じゅうろくささげ（ゆで）、しゅんぎく、しゅんぎく（ゆで）、じゅんさい水煮びん詰、すぐきな、せり、せり（ゆで）、タアサイ、タアサイ（ゆで）、かいわれだいこん、葉だいこん、だいこん葉、だいこん葉（ゆで）、つまみな、たいさい、たかな、たらめ、たらめ（ゆで）、チンゲンサイ、チンゲンサイ（ゆで）、つくし、つくし（ゆで）、つるな、つるむらさき、つるむらさき（ゆで）、葉とうがらし、葉とうがらし（油炒め）、生とうがらし、乾燥とうがらし、ゆでとんぶり、長崎はくさい、長崎はくさい（ゆで）、なずな、なばな／花らい・茎、なばな／花らい・茎（ゆで）、なばな／茎・葉、なばな／茎・葉（ゆで）、にら、にら（ゆで）、花にら、黄にら、茎にんにく、茎にんにく（ゆで）、葉ねぎ、こねぎ、野沢菜、のびる、パクチョイ、バジル、パセリ、ひのな、広島菜、ふだんそう、ふだんそう（ゆで）、ブロッコリー、ブロッコリー（ゆで）、みずかけな、切りみつば、切りみつば（ゆで）、根みつば、根みつば（ゆで）、糸みつば、糸みつば（ゆで）、芽キャベツ、芽キャベツ（ゆで）、芽たで、モロヘイヤ、モロヘイヤ（ゆで）、ようさい、ようさい（ゆで）、よめな、よもぎ、よもぎ（ゆで）、リーキ、リーキ（ゆで）、サラダ菜、リーフレタス、サニーレタス、ロケットサラダ、わけぎ、わけぎ（ゆで）
		その他の 野菜	11	キャベツ	30	キャベツ、キャベツ（ゆで）、グリーンボール、レッドキャベツ
				きゅうり	31	きゅうり
				大根	32	大根、大根（ゆで）、大根・皮むき、大根・皮むき（ゆで）、切干し大根
				たまねぎ	33	たまねぎ、たまねぎ（水さらし）、たまねぎ（ゆで）、赤たまねぎ
				はくさい	34	はくさい、はくさい（ゆで）
				その他の 淡色 野菜	35	アーティチョーク、アーティチョーク（ゆで）、アスパラガス水煮缶詰・ホワイトアスパラガス、うど、山うど、枝豆、枝豆（ゆで）、枝豆（冷凍）、スナップえんどう、グリーンピース、グリーンピース（ゆで）、グリーンピース（冷凍）、グリーンピース水煮缶詰、かぶ、かぶ（ゆで）、かぶ・皮むき、かぶ・皮むき（ゆで）、カリフラワー、カリフラワー（ゆで）、かんぴょう、かんぴょう（ゆで）、菊、菊（ゆで）、菊のり、くわい、くわい（ゆで）、コールラビ、コールラビ（ゆで）、ごぼう、ごぼう（ゆで）、しかくまめ、葉しょうが、しょうが、しろり、ずいき、ずいき（ゆで）、干しずいき、干しずいき（ゆで）、すぐきな根、ズッキーニ、セロリ、ぜんまい、ぜんまい（ゆで）、干しぜんまい、干しぜんまい（ゆで）、そらめ、そらめ（ゆで）、たけのこ、たけのこ（ゆで）、たけのこ（水煮缶詰）、チコリー、つわぶき、つわぶき（ゆで）、とうがん、とうがん（ゆで）、スイートコーン、スイートコーン（ゆで）、スイートコーン（冷凍ホール）、スイートコーン（冷凍カーネル・全粒）、クリームコーン缶詰、ホールカーネルコーン缶詰、ヤングコーン、トレビス、なす、なす（ゆで）、べいなす、べいなす（油揚げ）、にがうり、にがうり（油炒め）、にんにく、根深ねぎ、はつか大根、はやとうり、ビート、ビート（ゆで）、ふき、ふき（ゆで）、ふきのとう、ふきのとう（ゆで）、ふじまめ、へちま、へちま（ゆで）、ホースラディッシュ、まこも、みょうが、みょうがたけ、むかご、アルファルファもやし、大豆もやし、大豆もやし（ゆで）、ブラックマッペもやし、ブラックマッペもやし（ゆで）、緑豆もやし、緑豆もやし（ゆで）、ゆり根、ゆり根（ゆで）、エシヤロット、ルバーブ、ルバーブ（ゆで）、レタス、コスレタス、れんこん、れんこん（ゆで）、生わさび、生わらび、わらび（ゆで）、干しわらび
				野菜ジュース	12	野菜ジュース
				野菜ジュース	36	トマトジュース缶詰、トマトミックスジュース缶詰、にんじんジュース缶詰
		漬け物	13	葉類 漬け物	37	おおさかしりな・塩漬、かぶ葉・塩漬、かぶ葉・ぬかみそ漬、からしな・塩漬、きょうな・塩漬、さんとうさい・塩漬、たいさい・塩漬、たかな漬、野沢菜・塩漬、野沢菜・調味漬、はくさい・塩漬、キムチ、ひのな・甘酢漬、広島菜・塩漬、みずかけな漬
				たくあん・ その他の 漬け物	38	かぶ・塩漬、皮むきかぶ・塩漬、かぶ・ぬかみそ漬、皮むきかぶ・ぬかみそ漬、きゅうり・塩漬、きゅうり・しょうゆ漬、きゅうり・ぬかみそ漬、スイート型ピクルス、サワー型ピクルス、ザーサイ、しょうが・酢漬、しょうが・甘酢漬、しろり・塩漬、しろり・奈良漬、すぐき漬、だいこん・ぬかみそ漬、塩押しだいこん・たくあん漬、干しだいこん・たくあん漬、守口漬、だいこん・べったら漬、だいこん・みそ漬、福神漬、しなちく・塩抜き塩蔵、なす・塩漬、なす・ぬかみそ漬、なす・こうじ漬、なす・からし漬、なす・しば漬、はやとうり・塩漬、やまごぼう・みそ漬、生らっきょう、らっきょう甘酢漬、わさび漬、梅漬（塩漬）、梅漬（調味漬）、梅干し、梅干し（調味漬）、梅びしお、オリーブピクルスグリーン、オリーブピクルスライプ、オリーブピクルススタッフド

大分類	大分類番号	中分類	中分類番号	小分類	小分類番号	食 品 名
果実類	7	生果	14	いちご	39	いちご
				柑橘類	40	いよかん（いよ）、早生みかん、みかん（うんしゅう）、早生みかん（内皮なし）、みかん（うんしゅう）（内皮なし）、みかん缶詰（果肉）、ネーブル、バレンシアオレンジ、スイーティー、きんかん、グレープフルーツ、グレープフルーツ缶詰、さんぽうかん、すだち（皮）、タンゴール、タンゼロ、なつみかん、なつみかん缶詰、はっさく、ひゅうがなつ、ひゅうがなつ（内皮なし）、ぶんたん、ぶんたん（ざぼん漬）、ぼんかん、ゆず（皮）、レモン全果
				バナナ	41	バナナ、乾燥バナナ
				りんご	42	りんご、りんご缶詰
				その他の生果	43	あけび果肉、あけび果皮、アセロラ、アテモヤ、アボカド、あんず、干しあんず、あんず缶詰、いちじく、干しいちじく、いちじく缶詰、うめ、柿（甘柿）、洗抜き柿、干し柿、かりん、キウイフルーツ、キワノ、グアバ、グズベリー、ぐみ、ココナッツミルク、ココナッツウォーター、スターフルーツ、さくらんぼ、アメリカンチェリー、さくらんぼ缶詰、ざくろ、すいか、すもも、生ブルー、ドライブルー、チェリモヤ、ドリアン、なし、なし缶詰、中国なし、西洋なし、西洋なし缶詰、干しなつめ、干しなつめやし、パインアップル、パインアップル缶詰、パインアップル砂糖漬、ハスカップ、ババイヤ、未熟ババイヤ、ビタヤ、びわ缶詰、ぶどう、干しぶどう、ぶどう缶詰、ブルーベリー、ホワイトサボテ、まくわうり、マルメロ、マンゴー、マンゴスチン、温室メロン、露地メロン、もも、もも缶詰果肉、ネクタリン、やまもも、ライチー、ラズベリー、乾燥りゅうがん
		ジャム	15	ジャム	44	あんずジャム（高糖度）、あんずジャム（低糖度）、イチゴジャム（高糖度）、イチゴジャム（低糖度）、マーマレード（高糖度）、マーマレード（低糖度）、ぶどうジャム、ブルーベリージャム、りんごジャム
		果汁・果汁飲料	16	果汁・果汁飲料	45	アセロラ10%果汁入り飲料、梅20%果汁入り飲料、ストレートみかんジュース（天然果汁）、濃縮還元みかんジュース、果粒入りみかんジュース、みかん50%果汁入り飲料、みかん20%果汁入り飲料、みかん缶詰（液汁）、ストレートオレンジジュース（天然果汁）、濃縮還元オレンジジュース、オレンジ50%果汁入り飲料、オレンジ30%果汁入り飲料、かぼす果汁、グアバ20%果汁入り飲料（ネクター）、グアバ10%果汁入り飲料、グレープフルーツストレートジュース（天然果汁）、グレープフルーツ濃縮還元ジュース、グレープフルーツ50%果汁入り飲料、グレープフルーツ20%果汁入り飲料、シキワシャー果汁、シキワシャー10%果汁入り飲料、すだち果汁、だいたい果汁、パインアップルストレートジュース（天然果汁）、パインアップル濃縮還元ジュース、パインアップル50%果汁入り飲料、パインアップル10%果汁入り飲料、パッションフルーツ果汁、ぶどうストレートジュース（天然果汁）、ぶどう濃縮還元ジュース、ぶどう70%果汁入り飲料、ぶどう10%果汁入り飲料、もも30%果汁入り飲料（ネクター）、もも缶詰液汁、ゆず果汁、ライム果汁、りんごストレートジュース（天然果汁）、りんご濃縮還元ジュース、りんご50%果汁入り飲料、りんご30%果汁入り飲料、レモン果汁
きのこ類	8	きのこ類	17	きのこ類	46	えのきたけ、えのきたけ（ゆで）、えのきたけ味付け缶詰、乾燥黒きくらげ（灰褐色）、乾燥黒きくらげ（灰褐色）（ゆで）、乾燥黒きくらげ、乾燥黒きくらげ（ゆで）、乾燥白きくらげ（ゆで）、黒あわびたけ、生しいたけ、生しいたけ（ゆで）、乾しいたけ、乾しいたけ（ゆで）、はたけしめじ、おなしめじ、おなしめじ（ゆで）、本しめじ、たもぎたけ、なめこ、なめこ（ゆで）、なめこ水煮缶詰、ぬめりすぎたけ、うすひらたけ、エリンギ、ひらたけ、ひらたけ（ゆで）、まいたけ、まいたけ（ゆで）、乾燥まいたけ、マッシュルーム、マッシュルーム（ゆで）、マッシュルーム水煮缶詰、まつたけ（松茸）、松茸水煮缶詰、やなぎまつたけ
藻 類	9	藻 類	18	藻 類	47	干しあおさ、青のり、のり（干しあまのり）、焼きのり/詳細不明の「のり」、味付けのり、蒸し干しあらめ、すき干し岩のり、干しえごのり、おきうと、おごのり（塩蔵塩抜き）、干しかわのり、うみぶどう、らうすこんぶ、干しがごめ昆布、長こんぶ、松前こんぶ、まこんぶ干し/詳細不明の「こんぶ（乾燥）」、日高こんぶ、利尻こんぶ、刻み昆布、削り昆布、塩昆布、昆布つくだ煮、すいぜんじのり（干し水戻し）、干してんぐさ、ところてん、干し寒天、寒天（ゼリー状）、赤とさか（塩蔵塩抜き）、青とさか（塩蔵塩抜き）、干しひじき、干しひとえぐさ、のりつくだ煮、ふのり、干しまつも、むかでのり（塩蔵塩抜き）、沖縄もずく（塩蔵塩抜き）、もずく（塩蔵塩抜き）、生わかめ（原藻）、わかめ（乾燥）、わかめ（乾燥水戻し）、板わかめ、わかめ（灰干し乾燥水戻し）、カットわかめ、生わかめ、茎わかめ（塩蔵塩抜き）、生めかぶわかめ
魚介類	10	生魚介類	19	あじ、いわし類	48	まあじ（あじ）、まあじ（水煮）、まあじ（あじ）（焼き）、大西洋あじ、大西洋あじ（水煮）、大西洋あじ（焼き）、むろあじ、むろあじ（焼き）、うるめいわし、かたくちいわし、まいわし、まいわし（水煮）、まいわし（焼き）、めざし、めざし（焼き）、まさば、まさば（水煮）、まさば（焼き）、大西洋さば、大西洋さば（水煮）、大西洋さば（焼き）、さば（しめさば）、さんま、さんま（焼き）、しまあじ養殖、にしん、かずのこ
				さけ、ます	49	からふとます、からふとます（焼き）、ぎんざけ養殖、ぎんざけ養殖（焼き）、さくらます（マス）、さくらます（焼き）、しろさけ、しろさけ（水煮）、しろさけ（焼き）、大西洋さけ養殖、大西洋さけ養殖（焼き）、にじます海面養殖、にじます海面養殖（焼き）、にじます淡水養殖、べにざけ、べにざけ（焼き）、ますのすけ、ますのすけ（焼き）
				たい、かれい類	50	あこうだい、あまだい、あまだい（水煮）、あまだい（焼き）、いしだい、いとよりだい、いとよりだい（すり身）、いばだい、おひょう、まがれい、まがれい（水煮）、まがれい（焼き）、まこがれい、子持ちがれい、子持ちがれい（水煮）、ぎんだら、きんめだい、きだい、くろだい、ちだい、まだい天然、まだい養殖、まだい養殖（水煮）、まだい養殖（焼き）、すけとうだら、すけとうだら・すり身、たら（すきみだら）、まだら、まだら（焼き）、しらこ、ひらめ天然、ひらめ養殖、みなみだら

大分類	大分類番号	中分類	中分類番号	小分類	小分類番号	食 品 名
魚介類	10	生魚介類	19	まぐろ、かじき類	51	くろかじき、まかじき、めかじき、春かつお、秋かつお、そうだかつお、かつお（なまり節：蒸しかつお）、きはだまぐろ、くろまぐろ・赤身、くろまぐろ・脂身、びんなが、みなみまぐろ・赤身、みなみまぐろ・脂身、めじまぐろ、めばちまぐろ
				その他の生魚	52	あいなめ、あなご、あなご（蒸し）、あまご養殖、あゆ天然、あゆ天然（焼き）、あゆ内臓、あゆ内臓（焼き）、あゆ養殖、あゆ養殖（焼き）、あゆ養殖 内臓、あゆ養殖 内臓（焼き）、アラスカめぬけ、あんこう、あんこう（きも・肝：内臓）、いかなご、いさぎ、いわな養殖、うぐい、うなぎ養殖、うなぎ（きも・肝：内臓）、うなぎ（白焼き）、うなぎ（かば焼）、うまづらはぎ、えい、えそ、おいかわ、おおさが・おこぜ、かさご、かじか、かじか（水煮）、かます、かます（焼き）、かわはぎ、かんばち、きす、きちじ、きびなご、キングクリップ、ぐち（いしもち）、ぐち（いしもち）（焼き）、こい養殖、こい養殖（水煮）、こい養殖 内臓、こち、めごち、このしろ、あぶらつのざめ、よしきりざめ、ふかひれ、さより、さわら、さわら（焼き）、しいら、したびらめ、しらうお、シルバー、すずき、たかさご、たかべ、たちうお、ちか、テラピア、どじょう、どじょう（水煮）、とびうお、なまず、にぎす、はぜ、はたはた、はまふえふき、はも、バラクータ、ひらまさ、とらふぐ養殖、まふぐ、ふな、ふな（水煮）、ぶり、ぶり（焼き）、はまち養殖、ほうほう、ホキ、ほっけ、ばら、ほんもろこ、マジェランあいなめ、まながつお、むつ、むつ（水煮）、めじな、めばる、メルルサ、やつめうなぎ、やまめ養殖、わかさぎ
				貝類	53	あかがい、あげまき、あさり、あわび、いがい・ムール貝、いたやがい養殖、かき養殖、かき養殖（水煮）、さざえ、さざえ（焼き）、しじみ、貝柱たいらがい、たにし、つぶ、とこぶし、とりがい、斧足、ばいがい、ばかがい、はまぐり、はまぐり（水煮）、はまぐり（焼き）、ちょうせんはまぐり、ほたてがいがい、ほたてがいがい（水煮）、ほたて貝柱、ほっきがいがい、みるがいがい水管、うに
				いか、たこ類	54	あかい、けんさきいか、こういか、するめいか、するめいか（水煮）、するめいか（焼き）、ほたるいか、ほたるいか（ゆで）、やうりいか、いいだこ、まだこ、まだこ（ゆで）、なまこ、ほや
				えび、かに類	55	あまえび、いせえび、くるまえび養殖、くるまえび養殖（ゆで）、くるまえび養殖（焼き）、素干し、さくらえび（ゆで）、大正えび、しばえび、ブラックタイガー養殖、がざみ、毛がに、毛がに（ゆで）、ずわいがに、ずわいがに（ゆで）、たらばがに、たらばがに（ゆで）、おきあみ、おきあみ（ゆで）、ゆでしゃこ
		魚介加工品	20	魚介（塩蔵、生干し、乾物）	56	まあじ（あじ）（開き干し）、まあじ（あじ）（開き干し、焼き）、むろあじ（開き干し）、むろあじ（くさや）、うるか、いかなご（煮干し）、うるめいわし（丸干し）、かたくちいわし（煮干し）、まいわし（塩いわし）、まいわし（生干し）、まいわし（丸干し）、しらす干し、しらす干し（ちりめん）、たたみいわし、かたくちいわし（みりん干し）、まいわし（みりん干し）、うまづらはぎ（味付け開き干し）、かつお（なまり節）、かつお節、かつお削り節、かつお（削り節つくだ煮）、かつお（塩辛・内臓、酒盗）、干しかれい、きびなご（調味干し）、キャビア、このしろ（甘酢漬）、塩ます、新巻きさけ、新巻きさけ（焼き）、塩ざけ、イクラ、すじこ、めふん、べにざけ（くん製）、さば節、塩さば、さば（開き干し）、さんま（開き干し）、さんま（みりん干し）、ししゃも（生干し）、ししゃも（生干し、焼き）、からふとししゃも（生干し）、からふとししゃも（生干し、焼き）、たらこ、たらこ（焼き）、辛子めんたいこ、塩だら、たら（干しだら）、たら（でんぶ）、身欠きにしん、にしん（開き干し）、にしん（くん製）、かずのこ（乾）、かずのこ（塩蔵水戻し）、はたはた（生干し）、ほっけ（塩ほっけ）、ほっけ（開き干し）、からすみ、やつめうなぎ（干し）、あわび（干し）、あわび（塩辛）、ほたて貝柱（干し貝柱）、さくらえび（素干し）、さくらえび（煮干し）、えび（干しえび）、かに（がん漬）、ほたるいか（くん製）、するめ、いか（さきいか）、いか（くん製）、いか塩辛（赤作り）、あみ（塩辛）、うに（粒うに）、うに（練うに）、塩蔵塩抜きくらげ、なまこ（このわた）、ほや（塩辛）
				魚介（缶詰）	57	いわし水煮缶詰、いわし味付け缶詰、いわしトマト漬缶詰、いわし油漬缶詰、いわしかば焼缶詰、かつお味付け缶詰、かつお油漬缶詰、からふとます水煮缶詰、しろさけ水煮缶詰、さば水煮缶詰、さばみそ煮缶詰、さば味付け缶詰、さんま味付け缶詰、さんまかば焼缶詰、まぐろ水煮缶詰（ライト）、まぐろ水煮缶詰（ホワイト）、まぐろ味付け缶詰、まぐろ油漬缶詰（ライト）、まぐろ油漬缶詰（ホワイト）、あさり水煮缶詰、あさり味付け缶詰、あわび水煮缶詰、エスカルゴ水煮缶詰、かきくん製油漬缶詰、トップシエル味付け缶詰、ほたて貝柱水煮缶詰、もがい味付け缶詰、ずわいがに水煮缶詰、たらばがに水煮缶詰、いか味付け缶詰
				魚介（佃煮）	58	いかなご（つくだ煮）、いかなご（あめ煮）、かたくちいわし（田作り）、かじか（つくだ煮）、かつお（角煮）、はぜ（つくだ煮）、はぜ（甘露煮）、ふな（甘露煮）、わかさぎ（つくだ煮）、わかさぎ（あめ煮）、あさり（つくだ煮）、はまぐり（つくだ煮）、えび（つくだ煮）、ほたるいか（つくだ煮）、いか（切りいかあめ煮）、いか（いかあられ）、あみつくだ煮
				魚介（練り製品）	59	かに風味かまぼこ、昆布巻きかまぼこ、す巻きかまぼこ、蒸しかまぼこ、焼き抜きかまぼこ、焼き竹輪、だて巻、つみれ、なると、はんぺん、さつま揚げ
				魚肉ハム、ソーセージ	60	魚肉ハム、魚肉ソーセージ
		畜肉	21	牛肉	61	牛かた（和牛）、牛かた皮下脂肪なし（和牛）、牛かた赤肉（和牛）、牛かた脂身（和牛）、牛かたロース（和牛）、牛かたロース皮下脂肪なし（和牛）、牛かたロース赤肉（和牛）、牛リブロース（和牛）、牛リブロース皮下脂肪なし（和牛）、牛リブロース赤肉（和牛）、牛リブロース脂身（和牛）、牛サーロイン（和牛）、牛サーロイン皮下脂肪なし（和牛）、牛サーロイン赤肉（和牛）、牛ばら（和牛）、牛もも（和牛）、牛もも皮下脂肪なし（和牛）、牛もも赤肉（和牛）、牛もも脂身（和牛）、牛そともも（和牛）、牛そともも皮下脂肪なし（和牛）、牛そともも赤肉（和牛）、牛ランプ（和牛）、牛ランプ皮下脂肪なし（和牛）、牛ランプ赤肉（和牛）、牛ヒレ（和牛）、牛かた/部位不明の牛肉、牛

大分類	大分類番号	中分類	中分類番号	小分類	小分類番号	食 品 名
肉類	11	畜肉	21	牛肉	61	かた皮下脂肪なし/部位不明の牛肉赤肉、牛かた赤肉、牛かた脂身、牛かたロース、牛かたロース皮下脂肪なし、牛かたロース赤肉、牛リブロース、牛リブロース（焼き）、牛リブロース（ゆで）、牛リブロース皮下脂肪なし、牛リブロース赤肉、牛リブロース脂身、牛サーロイン、牛サーロイン皮下脂肪なし、牛サーロイン（赤肉）、牛ばら、牛もも、牛もも皮下脂肪なし、牛もも皮下脂肪なし（焼き）、牛もも皮下脂肪なし（ゆで）、牛もも赤肉、牛もも脂身、牛そともも、牛そともも皮下脂肪なし、牛そともも赤肉、牛ランプ、牛ランプ皮下脂肪なし、牛ランプ赤肉（和牛）、牛ヒレ、牛かた（輸入牛）、牛かた皮下脂肪なし（輸入牛）、牛かた赤肉（輸入牛）、牛かた脂身（輸入牛）、牛かたロース（輸入牛）、牛かたロース皮下脂肪なし（輸入牛）、牛かたロース赤肉（輸入牛）、牛リブロース（輸入牛）、牛リブロース皮下脂肪なし（輸入牛）、牛リブロース赤肉（輸入牛）、牛リブロース脂身（輸入牛）、牛サーロイン（輸入牛）、牛サーロイン皮下脂肪なし（輸入牛）、牛サーロイン赤肉（輸入牛）、牛ばら（輸入牛）、牛もも（輸入牛）、牛もも皮下脂肪なし（輸入牛）、牛もも赤肉（輸入牛）、牛もも脂身（輸入牛）、牛そともも（輸入牛）、牛そともも皮下脂肪なし（輸入牛）、牛そともも赤肉（輸入牛）、牛ランプ（輸入牛）、牛ランプ皮下脂肪なし（輸入牛）、牛ランプ赤肉（輸入牛）、牛ヒレ（輸入牛）、子牛肉リブロース、子牛肉ばら、子牛肉もも、牛ひき肉、牛舌、牛腱、牛尾、ローストビーフ、コンビーフ缶詰、牛味付け缶詰、ビーフジャーキー、スモークタン
				豚肉	62	豚かた、豚かた皮下脂肪なし、豚かた赤肉、豚かた脂身、豚かたロース、豚かたロース皮下脂肪なし、豚かたロース赤肉、豚かたロース脂身、豚ロース、豚ロース皮下脂肪なし（焼き）、豚ロース（ゆで）、豚ロース皮下脂肪なし、豚ロース赤肉、豚ロース脂身、豚ばら、豚もも、豚もも皮下脂肪なし、豚もも皮下脂肪なし（焼き）、豚もも皮下脂肪なし（ゆで）、豚もも赤肉、豚もも脂身、豚そともも、豚そともも皮下脂肪なし、豚そともも赤肉、豚そともも脂身、豚ヒレ赤肉、豚中型かた（黒ぶた）、豚中型かた皮下脂肪なし（黒ぶた）、豚中型かた赤肉（黒ぶた）、豚中型かた脂身（黒ぶた）、豚中型かたロース（黒ぶた）、豚中型かたロース皮下脂肪なし（黒ぶた）、豚中型かたロース赤肉（黒ぶた）、豚中型かたロース脂身（黒ぶた）、豚中型かたロース皮下脂肪なし（黒ぶた）、豚中型かたロース赤肉（黒ぶた）、豚中型かたロース脂身（黒ぶた）、豚中型ロース（黒ぶた）、豚中型ロース皮下脂肪なし（黒ぶた）、豚中型ロース赤肉（黒ぶた）、豚中型ロース脂身（黒ぶた）、豚中型ばら（黒ぶた）、豚中型もも（黒ぶた）、豚中型もも皮下脂肪なし（黒ぶた）、豚中型もも赤肉（黒ぶた）、豚中型もも脂身（黒ぶた）、豚中型そともも（黒ぶた）、豚中型そともも皮下脂肪なし（黒ぶた）、豚中型そともも赤肉（黒ぶた）、豚中型そともも脂身（黒ぶた）、豚中型ヒレ赤肉（黒ぶた）、豚ひき肉、豚舌、豚足ゆで、豚軟骨ゆで
				ハム、ソーセージ類	63	骨付ハム、ボンレスハム、ロースハム、ショルダーハム、プレスハム、混合プレスハム、チョップドハム、促成生ハム、長期熟成生ハム、ベーコン、ロースベーコン、ショルダーベーコン、ウインナーソーセージ、セミドライソーセージ、ドライソーセージ、フランクフルトソーセージ、ボロニアソーセージ、リオナソーセージ、レバーソーセージ、混合ソーセージ、生ソーセージ、焼き豚
				その他の畜肉	64	いのしし、いのぶた、うさぎ赤肉、馬肉、しか肉、マトンロース、マトンもも、ラムかた（子羊）、ラムロース（子羊）、ラムもも（子羊）、やぎ赤肉
		鳥肉	22	鶏肉	65	成鶏手羽、成鶏むね、成鶏むね（皮なし）、成鶏もも、成鶏もも（皮なし）、成鶏ささ身、鶏手羽、鶏むね、鶏むね（皮なし）、鶏もも、鶏もも（焼き）、鶏もも（ゆで）、鶏もも（皮なし）、鶏もも・皮なし（焼き）、鶏もも・皮なし（ゆで）、鶏ささ身、鶏ささ身（焼き）、鶏ささ身（ゆで）、鶏ひき肉、鶏皮（むね）、鶏皮（もも）、鶏軟骨、焼き鳥缶詰
				その他の鳥肉	66	あいがも、あひる、うずら、かも皮なし、きじ皮なし、しちめんちょう皮なし、すずめ、はと皮なし、ほろほろちょう皮なし
		肉類（内臓）	23	肉類（内臓）	67	牛心臓、牛肝臓、牛じん臓、牛第一胃/部位不明の牛モツ、牛第二胃、牛第三胃、牛第四胃、牛小腸、牛大腸、牛直腸、牛子宮、豚心臓、豚肝臓、豚じん蔵、豚胃（ゆで）、豚小腸（ゆで）、豚大腸（ゆで）、豚子宮、レバーペースト、スモークレバー、鶏心臓、鶏肝臓、鶏筋胃、フォアグラ（ゆで）
		その他の肉類	24	鯨肉	68	くじら肉、くじらうねす、くじら本皮、くじらさらしくじら
				その他の肉・加工品	69	いなごつくだ煮、かえる、すっぽん、はちの子缶詰
卵類	12	卵類	25	卵類	70	うこっけい卵、うずら卵、うずら卵水煮缶詰、鶏卵、ゆで卵、ボーチドエッグ、鶏卵水煮缶詰、加糖全卵、乾燥全卵、卵黄、ゆで卵黄、加糖卵黄、乾燥卵黄、卵白、ゆで卵白、乾燥卵白、たまご豆腐、厚焼きたまご（砂糖入り）、だし巻きたまご、ピータン
乳類	13	牛乳・乳製品	26	牛乳	71	ジャージー種生乳、ホルスタイン種生乳、普通牛乳、濃厚加工乳、低脂肪加工乳、脱脂乳液状乳
				チーズ	72	エダムチーズ、エメンタールチーズ、カテージチーズ、カマンベールチーズ、クリームチーズ、ゴーダチーズ、チェダーチーズ、粉チーズ、ブルーチーズ、プロセスチーズ、チーズスプレッド（ぬるチーズ）
				発酵乳・乳酸菌飲料	73	プレーンヨーグルト（全脂無糖ヨーグルト）、加糖ヨーグルト（脱脂加糖ヨーグルト）、ヨーグルトドリンク、乳酸菌飲料・乳製品、乳酸菌飲料・殺菌乳製品一希釈タイプ、非乳製品乳酸菌飲料
		その他の乳類	27	その他の乳類	75	母乳、やぎ乳

大分類	大分類 番号	中分類	中分類 番号	小分類	小分類 番号	食 品 名
油脂類	14	油脂類	28	バター	76	有塩バター、無塩バター、発酵バター
				マーガリン	77	ソフトタイプマーガリン、ファットスプレッドマーガリン
				植物性 油脂	78	オリーブ油、ごま油、米ぬか油、サフラワー油、大豆油、調合油、とうもろこし油、なたね油、ひまわり油、綿実油、落花生油
				動物性 油脂	79	牛脂（ヘット）、ラード（豚脂）
				その他の 油脂	80	パーム油、パーム核油、やし油、ショートニング
菓子類	15	菓子類	29	和菓子類	81	甘納豆（あずき）、甘納豆（いんげんまめ）、甘納豆（えんどう）、あん入り生八つ橋、今川焼、ういろう、うぐいすもち、かしわもち、カステラ、かのこ、かるかん、きび団子、ぎゅうひ、きりざんしょ、きんぎょく糖、きんつば、草もち、くし団子（あん）、くし団子（しょうゆ）、げつべい、桜もち（関東風）、桜もち（関西風）、大福もち、タルト、ちまき、ちやつう、どら焼、ねりきり、カステラまんじゅう、くずざくら、くりまんじゅう、とうまんじゅう、蒸しまんじゅう、あんまん、肉まん、もなか、ゆべし、練りようかん、水ようかん、蒸しようかん、あめ玉、芋かりんとう、おこし、おのろけ豆、黒かりんとう、白かりんとう、ごかぼう、炭酸せんべい、かわらせんべい、巻きせんべい、ごま入り南部せんべい、しおがま、中華風クッキー、ひなあられ（関東風）、ひなあられ（関西風）、揚げせんべい、甘辛せんべい、あられ、塩せんべい、衛生ボーロ、そばボーロ、松風、三島豆、八つ橋、らくがん、麦らくがん、もちこしらくがん、小麦粉あられ
				ケーキ・パ ストリー類	82	シュークリーム（エクレー）、スポンジケーキ、ショートケーキ、デニッシュペストリー、イーストドーナッツ、ケーキドーナッツ、パイ皮、アップルパイ、ミートパイ、バターケーキ、ホットケーキ、カスタードクリーム入りワッフル、ジャム入りワッフル
				ビスケッ ト類	83	ウエハース、オイルスプレークラッカー、ソーダクラッカー、サブレ、パフパイ、ハードビスケット、ソフトビスケット、プレッツェル、ロシアケーキ
				キャン デー類	84	キャラメル、錠菓・果汁系、ゼリーキャンデー、ゼリービーンズ、チャイナマーブル、ドロップ、バタースコッチ、ブリットル・いり落花生入り、マシュマロ
				その他 の菓子類	85	プリン・カスタードプディング、オレンジゼリー、コーヒーゼリー、ミルクゼリー、ワインゼリー、パバロア、コーンスナック、ポテトチップス、成形ポテトチップス、カバーリングチョコレート、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレート、マロングラッセ、板ガム、糖衣ガム、風船ガム
嗜好 飲料類	16	アルコール 飲料	30	日本酒	86	清酒、純米酒、本醸造酒、吟醸酒、純米吟醸酒、白酒
				ビール	87	淡色ビール、黒ビール、スタウトビール、発泡酒
				洋酒・そ の他	88	白ワイン、赤ワイン、ロゼ（ワイン）、紹興酒、35度しょうちゅう（甲類）、25度しょうちゅう（乙類）、ウイスキー、ブランデー、ウォッカ、ジン、ラム、マオタイ酒、梅酒、合成清酒、薬味酒、キエラソー、スイートワイン、ペパーミント、ベルモット甘口タイプ、ベルモット辛口タイプ
				茶	89	玉露茶葉、玉露（浸出液）、抹茶（粉末）、せん茶茶葉、せん茶（浸出液）、かみいり茶（浸出液）、番茶（浸出液）、ほうじ茶（浸出液）、玄米茶（浸出液）、ウーロン茶（浸出液）、紅茶茶葉、紅茶（浸出液）
				コーヒー ココア	90	コーヒー（ドリップ式、浸出液）、インスタントコーヒー（粉末）、コーヒー飲料、ビュアココア（粉末）、ミルクココア（粉末）
調味料・ 香辛料類	17	その他の 嗜好飲料	31	その他の 嗜好飲料	91	甘酒、昆布茶（粉末）、炭酸飲料果実色（無果汁）、コーラ、サイダー、麦茶（浸出液）
		調味料	32	ソース	92	ウスターソース、中濃ソース、濃厚（トンカツ）ソース
				しょうゆ	93	濃口しょうゆ、うす口しょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆ、しろしょうゆ
				塩	94	食塩、並塩、精製塩
				マヨネーズ	95	マヨネーズ（全卵型）、卵黄型マヨネーズ
		その他の 調味料	32	味噌	96	甘みそ、淡色辛みそ、赤色辛みそ、麦みそ、豆みそ、粉末淡色辛みそ、ペーストタイプ即席みそ
				その他の 調味料	97	本みりん、本直しみりん、トウバンジャン、チリペッパーソース、ラー油、穀物酢、米酢、ワインピネガー、りんご果実酢、かつおだし、昆布だし、かつお昆布だし、しいたけだし、煮干しだし、鳥がらだし、中華だし、洋風だし、固形コンソメ、顆粒風味調味料、ストレートめんつゆ、三倍濃厚めんつゆ、オイスターソース（かき油）、マーボー豆腐の素、ミートソース、トマトピューレー、トマトペースト、トマトケチャップ、トマトソース、チリソース、ノンオイル和風ドレッシング、フレンチドレッシング、サウザンアイランドドレッシング、カレールウ、ハヤシルウ、酒かす、みりん風調味料
		香辛料・ その他	33	香辛料・ その他	98	ゼラチン、オールスパイス、オニオンパウダー、粉からし、練りからし、マスタード（練り・フレンチマスタード）、マスタード（粒入り・荒挽きマスタード）、カレー粉、クローブ、黒こしょう、白こしょう、混合こしょう、さんしょう、シナモン、粉しょうが、おろししょうが、セージ、タイム、チリパウダー、とうがらし、ナツメグ、ガーリックパウダー、おろしにんにく、粉末バジル、乾燥パセリ、パプリカ、からし粉入り粉わさび、練りわさび、圧搾パン酵母、乾燥パン酵母、ベーキングパウダー

職業分類表

番号	職業分類項目	仕 事 の 種 類
所得（賃金・給料、営業利益など）を伴う仕事についている方（内職、アルバイト、パートを含む）		
01	専門的・技術的職業従事者	研究者、技術者、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、臨床・衛生検査技師、歯科衛生士、栄養士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、社会福祉専門職業従事者（保育士など）、法務従事者（裁判官、検察官、弁護士など）、公認会計士、税理士、教員、宗教家、文芸家、記者、編集者、美術家、写真家、デザイナー、イラストレーター、漫画家、音楽家、舞台芸術家、その他の専門的・技術的職業従事者（個人教師、職業スポーツ従事者など）
02	管理的職業従事者	管理的公務員（議会議員、知事、市長など）、会社・団体等役員、会社・団体等管理職員（工場長、支店長、駅長、会社課長など）、その他の管理的職業従事者
03	事務従事者	一般事務従事者（総務事務員、受付・案内事務員、秘書など）、会社事務従事者、外勤事務従事者（集金人など）、運輸・通信事務従事者、その他の事務従事者（速記者、タイピスト、キーパンチャー、電子計算機オペレーターなど）
04	販売従事者	商品販売従事者（小売店主、飲食店主、販売店員、商品仕入・販売外交員、商品仲介人など）、販売類似職業従事者（不動産仲介人、保険外交員、質屋店主・店員など）
05	サービス職業従事者	家庭生活支援サービス職業従事者（家政婦（夫）、家事手伝い、訪問介護員（ホームヘルパー）など）、生活衛生サービス職業従事者（理容師、美容師、クリーニング職など）、飲食物調理従事者、接客・給仕職業従事者、居住施設・ビル等管理人、その他のサービス職業従事者（旅行・観光案内人、物品一時預かり人など）
06	保安職業従事者	自衛官、警察官、看守、消防員、警備員など
07	農業作業	農耕、養蚕、養鶏、養蜂、養畜、植木職、造園師など
08	林業作業	育林、伐木・造材、集材・運材、製炭・製薪など
09	漁業作業	漁労作業、海草・貝採取、漁労船の船長・航海士・機関長・機関士、水産養殖など
10	運輸・通信従事者	自動車運転者、鉄道・船舶・航空機運転従事者、その他の運輸従事者（車掌、鉄道輸送関連業務従事者、甲板員、船舶機関員、検車係など）、通信従事者（無線通信技術従事者、有線通信員、電話交換手、郵便・電報外務員など）
11	生産工程・労務作業	製造作業 [金属材料、化学製品、窯業製品、土石製品、食料品、飲料・たばこ、衣服・繊維製品、木・竹・草・つる製品、パルプ・紙・紙製品、ゴム・プラスチック製品、革・革製品、その他]、組立・修理作業 [一般機械器具、電気機械器具、運送機械、計量計測機器・光学機械器具]、金属加工作業者、金属溶接・溶断作業、紡績作業、印刷・製本作業、ボイラー工、建設機械運転作業、電気作業、採掘作業、とび職、鉄筋工、建設作業、土木作業従事者、運搬労務作業、その他の労務作業（清掃員など）
上記（01～11）の仕事をしていない方		
12	家事従事者	一般家庭の主婦等日常家事に従事することを常態としている人
13	その他	無職（高齢・病気・障害などの理由による場合も含む）
14	保育園児	保育所へ通うことを常態としている幼児
15	幼稚園児	幼稚園へ通うことを常態としている幼児
16	その他の幼児	保育所や幼稚園に通っていない幼児
17	小学校低学年	小学1、2年生
18	小学校中学年	小学3、4年生
19	小学校高学年	小学5、6年生
20	中学生	中学1～3年生
21	その他の学生	高校生、大学生、大学院生、各種専門学校生など

Ⅱ 結果の概要

1 グラフ値について

- (1) 年齢階級別の値: 保健所別に抽出率の逆数で重み付け(保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するため)をした値。
- (2) 総数の値: 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際の H27 人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- (3) 年次推移及び全国値との比較の値: 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと H22 国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。(そのため、年次推移の値は平成22年県民健康・栄養調査報告書の値と異なる。)
- (4) P17 の結果は共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。
- (5) P45～47 の結果は算術平均値。(重み付けのない平均値。)

2 解析対象者数は、()内で併記した。

(1) 体型に関する状況

1. 肥満とやせの状況

肥満者(BMI $\geq 25\text{kg/m}^2$)の割合は男性 31.2%、女性 17.3%であり、男性は約 3 人に 1 人、女性は約 6 人に 1 人である。肥満者の割合が最も高いのは、男性が 20 歳代 41.2%、女性が 60 歳代 24.0%である。また肥満者の割合は、平成 22 年調査に比べほぼ横ばいである。

20～69 歳男性の肥満者の割合は 32.5%、40～69 歳男性の肥満者の割合は 30.5%であり、平成 22 年調査に比べほぼ横ばいである。

40～69 歳女性の肥満者の割合は 18.1%であり、平成 22 年調査に比べほぼ横ばいである。

20 歳代女性のやせの者(BMI $< 18.5\text{kg/m}^2$)の割合は 18.9%であり、平成 22 年調査に比べほぼ横ばいである。

低栄養傾向(BMI $\leq 20\text{kg/m}^2$)の 65 歳以上の高齢者は、13.8%である。

図 1 体型の状況(20 歳以上、性・年齢階級別)




図 2-1 肥満者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)




図 2-2 肥満者の割合、年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)





図 2-3 肥満者の割合、全国値比較(20 歳以上、性別、年齢調整値)



※全国:平成27年国民健康・栄養調査より

図 2-4 肥満者の割合

(20～69 歳、男性、年齢調整値)




図 2-5 肥満者の割合

(40～69 歳、男性、年齢調整値)




図 2-6 肥満者の割合

(40～69 歳、女性、年齢調整値)




図 3 やせの割合

(20～29 歳、女性、年齢調整値)





図 4 低栄養傾向 ($BMI \leq 20 \text{kg/m}^2$) の高齢者の割合 (65 歳以上、男女計)



2. 体重の増減の状況

この1年間に体重が3kg以上増加した者は男性14.5%、女性14.7%であり、男女ともに30歳代で高く、男性24.3%、女性29.2%である。

この1年間に体重が3kg以上減少した者は男性9.1%、女性10.3%である。

図 5-1 この1年間に体重が3kg以上増加したと回答した者の割合(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 この1年間に体重が3kg以上増加しましたか。]

全体





図 5-2 この1年間に体重が3kg以上減少したと回答した者の割合(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 この1年間に体重が3kg以上減少しましたか。]

全体



(2) 栄養・食生活に関する状況

1. 朝食欠食状況

調査を実施した日に朝食を欠食した者の割合は、男性 13.3%、女性 10.3%である。年齢別にみると、欠食する者の割合が高いのは、30 歳代男性 23.2%、40 歳代男性 21.0%、20 歳代女性 22.4%、40 歳代女性 22.8%である。

図 6-1 朝食欠食状況(20 歳以上、性・年齢階級別)

※栄養摂取状況調査より。調査を実施した日(特定の 1 日)における朝食を欠食した割合





図 6-2 朝食欠食状況 年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)

※栄養摂取状況調査より。調査を実施した日(特定の 1 日)における朝食を欠食した割合



習慣的に朝食を欠食している者（週2日以上食べない者）は、男性24.9%、女性15.2%である。
 欠食している者の割合は男女ともに20歳代で最も高く、男性50.8%、女性37.8%である。
 平成22年調査に比べ、ほとんど毎日食べている者の割合は、男女ともにほぼ横ばいである。

図 7-1 朝食欠食状況(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたはふだん朝食を食べますか。]※習慣的な朝食の摂取状況に関する設問の結果。





図 7-2 朝食欠食状況、年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)※習慣的




2. 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の状況

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上、ほぼ毎日と回答した者の割合は、男性41.9%、女性47.3%である。男女ともに30歳代で最も低く、男性31.7%、女性22.4%である。

図8 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上、ほぼ毎日と回答した者の割合

(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、主食(ごはん、パン、麺類などの料理)、主菜(魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理)、副菜(野菜類、海藻類、きのこ類を主材料にした料理)の3つを組み合わせて食べることが1日2回以上あるのは週に何日ありますか。]




3. 主食・主菜・副菜のうち組み合わせさせて食べられないもの

主食・主菜・副菜のうち、組み合わせさせて食べられないものは、男女共に副菜が最も高く、男性 76.1%、女性 75.0%である。若い世代ほど、その傾向にある。

図9 主食・主菜・副菜のうち組み合わせさせて食べられないものの割合(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 主食・主菜・副菜のうち、組み合わせさせて食べられないのはどれですか。※複数回答]



4. 野菜摂取量

野菜摂取量の平均値は男性 317.6g、女性 299.2g である。男女ともに 30 歳代で最も少なく、男性 247.2g、女性 225.4g である。男性の野菜摂取量は平成 22 年調査に比べ有意に増加している。

図 10-1 野菜摂取量の平均値(20 歳以上、性・年齢階級別)




図 10-2 野菜摂取量の平均値、年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)





図 10-3 野菜摂取量の全国値との比較(20 歳以上、性別、年齢調整値)




※全国:平成27年国民健康・栄養調査より

5. 朝食欠食の有無別野菜摂取量

男女共に、朝食欠食者の野菜摂取量は、朝食喫食者に比べて少ない。

図 11 朝食欠食の有無別野菜摂取量の平均値(20 歳以上、性別)



※朝食欠食の状況は栄養摂取状況調査の結果を用いている(調査を実施した日(特定の 1 日)における朝食の結果)

6. 食塩摂取量

食塩摂取量の平均値は男性 11.0g、女性 9.4g である。摂取量は男女ともに年々減少しつつあるが、平成 22 年調査に比べ、男女ともにほぼ横ばいである。

図 12-1 食塩摂取量の平均値(20 歳以上、性・年齢階級別)




図 12-2 食塩摂取量の平均値、年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)





図 12-3 食塩摂取量の全国値との比較(20 歳以上、性別、年齢調整値)




※全国:平成27年国民健康・栄養調査より

食品群別食塩摂取量をみると、調味料から食塩を約7割摂取している。食塩摂取量の多い人は、調味料から男性は約8～9g、女性は約7～8gを摂取している。男女ともに、魚介類と漬物からの摂取量は年齢とともに増える傾向にある。

※図 12-4 から図 12-11 は、食塩を多くとっている食品の状況をより詳しく把握するために、実際の食塩摂取量とその割合の両方を掲載している。

図 12-4 食品群別食塩摂取量(g) (20 歳以上、男女計)



摂取量平均値10.2g(926)

注) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際の H27 人口構成に合わせるための重み付けをした値

図 12-5 食品群別食塩摂取量の割合(%) (20 歳以上、男女計)





図 12-6 食品群別食塩摂取量(g) (20 歳以上、摂取量別)

※男性 多い:8g 以上/少ない:8g 未満、女性 多い:7g 以上/少ない:7g 未満

(日本人の食事摂取基準 2015 食塩摂取量の目標量により群分け)



注) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際の H27 人口構成に合わせるための重み付けをした値

図 12-7 食品群別食塩摂取量の割合(%) (20 歳以上、摂取量別)

※男性 多い:8g 以上/少ない:8g 未満、女性 多い:7g 以上/少ない:7g 未満

(日本人の食事摂取基準 2015 食塩摂取量の目標量により群分け)





図 12-8 食品群別食塩摂取量(g) (20 歳以上、中央値別)

※中央値: 男性 10.5g 以上/未満で二区分、女性 8.9g 以上/未満で二区分



注) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際の H27 人口構成に合わせるための重み付けをした値

図 12-9 食品群別食塩摂取量の割合(%) (20 歳以上、中央値別)

※中央値: 男性 10.5g 以上/未満で二区分、女性 8.9g 以上/未満で二区分





図 12-10 食品群別食塩摂取量 (g) (20 歳以上、性・年齢階級別)


食塩摂取量(g)



注) 保健所別に抽出率の逆数で重み付け (保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するため) をした値

図 12-11 食品群別食塩摂取量の割合(%) (20 歳以上、性・年齢階級別)

食塩摂取量(%)



(3) 身体活動・運動に関する状況

1. 運動習慣者の状況

運動習慣のある者の割合は男性 35.4%、女性 29.1%である。男女ともに 30 歳代で運動習慣のある者の割合が最も低く、男性 6.5%、女性 14.9%である。平成 22 年調査に比べ、男女ともに運動習慣のある者の割合は有意に増加している。

図 13-1 運動習慣のある者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)




図 13-2 運動習慣のある者の割合、年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)





図 13-3 運動習慣のある者の割合、全国値との比較(20 歳以上、性別、年齢調整値)



※全国:平成27年国民健康・栄養調査より

※運動習慣がある者:1 回 30 分以上、週 2 日以上、1 年間以上継続して運動している者

2. 歩行数の状況

歩行数の平均値は男性 8015 歩、女性 7521 歩である。平成 22 年調査に比べ、男性はほぼ横ばい、女性は有意に増加している。

図 14-1 歩行数の平均値(20 歳以上、性・年齢階級別)




図 14-2 歩行数の平均値 年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)





図 14-3 歩行数の平均値と全国値との比較(20 歳以上、性別、年齢調整値)



※全国:平成27年国民健康・栄養調査より

(4) 飲酒に関する状況

1. 飲酒の状況

飲酒習慣のある者の割合は男性 31.6%、女性 7.6%である。男性は 40 歳代で 49.0%、50 歳代で 49.1%、女性は 40 歳代で 21.2%と高くなっている。

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている者の割合は、男性 11.4%、女性 7.9%である。男性は 50 歳代で高く 21.5%、女性は 40 歳代で高く 21.2%である。

平成 22 年調査に比べ、男性は生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている者の割合が有意に減少した。

図 15-1 飲酒習慣のある者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)





図 15-2 飲酒習慣のある者の割合、年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)



※飲酒習慣のある者:週 3 日以上、飲酒日 1 日あたり1合以上飲酒すると回答した者

清酒 1 合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒中瓶 1 本 (約 500ml)、焼酎 20 度 (135ml)、焼酎 25 度 (110ml)、

焼酎 35 度 (80ml)、チューハイ 7 度 (350ml)、ウイスキーダブル 1 杯 (60ml)、ワイン 2 杯 (240ml)

図 15-3 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)





図 15-4 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合、年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)



※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

- ①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」
- ②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

(5)生活習慣病等に関する状況

1. 生活習慣病の状況

医療機関や健診で高血圧症と言われたことのある者の割合は男性 31.7%、女性 22.6%である。糖尿病と言われたことのある者の割合は男性 12.8%、女性 7.7%である。脂質異常症と言われたことのある者の割合は男性 35.4%、女性 34.6%である。平成 22 年調査と比べると、全疾患男女ともにほぼ横ばいである。

図 16-1 医療機関や健診で高血圧、糖尿病、脂質異常症と言われたことがある者の割合

(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 これまでに医療機関や健診で高血圧と言われたことがありますか。

これまでに医療機関や健診で糖尿病と言われたことがありますか。

これまでに医療機関や健診で血中コレステロール(総コレステロールまたは LDL コレステロール)が高いと言われたことがありますか。]




図 16-2 高血圧と言われたことのある者の割合 年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)




図 16-3 糖尿病と言われたことのある者の割合 年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)





図 16-4 脂質異常症と言われたことのある者の割合 年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)




2. 健康状態の自覚

過去1ヶ月間の健康状態の自覚は、良い（最高に良い・とても良い・良い）と回答した者の割合は男性 78.8%、女性 76.8%である。良いと回答した者の割合が低いのは男性 20 歳代 58.6%、女性 40 歳代 71.3%、50 歳代 70.7%、70 歳以上 69.6%である。


図 17 過去1ヶ月間の健康状態の自覚(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 全体的に見て、過去1ヶ月間のあなたの健康状態はいかがでしたか。]

男性



女性




(6)食習慣の状況

1. 食べる速度

人と比較した際に食べる速度が速いと感じる者の割合は、男性 37.1%、女性 24.9%である。男性は20歳代、30歳代、40歳代で40.0%以上が、女性は30歳代、40歳代、50歳代で30.0%以上が人よりも食べるのが速いと回答している。

図 18 人と比較した際の食べる速さの自覚(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、人と比較して食べる速度が速いですか。]




2. 満腹になるまで食べることについて

満腹になるまで食べていると回答した者の割合は男性 60.9%、女性 58.1%である。男性は 40 歳代 81.9%、女性は 20 歳代 75.2%で最も割合が高い。

図 19 満腹になるまで食べていると回答した者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、つついお腹いっぱい食べるほうですか。]

全体




3. 就寝前 2 時間以内の夕食について

就寝前 2 時間以内に夕食を食べることが週 3 回以上と回答した者の割合は、男性 39.2%、女性 19.6%である。男性は 30 歳代 65.0%、女性は 20 歳代 33.7%で最も高い。

図 20 就寝前 2 時間以内に夕食を食べることが週 3 回以上と回答した者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ありますか。]

全体



4. 夕食後の間食について


夕食後に間食を食べることが週3回以上と回答した者の割合は男性 19.8%、女性 22.0%である。男性は 40 歳代 28.3%、女性は 20 歳代 36.2%で最も高い。

図 21 夕食後に間食を食べることが週3回以上と回答した者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ありますか。]

全体

■男性 □女性



5. 清涼飲料の摂取頻度について


清涼飲料をほぼ毎日飲むと回答した者の割合は男性 47.7%、女性 34.5%である。男性は 40 歳代 62.6%、女性は 40 歳代 44.0%で最も高い。

図 22 清涼飲料をほぼ毎日飲むと回答した者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、甘みのある茶類やコーヒー、炭酸飲料、ジュース、スポーツドリンクなどをほぼ毎日飲みますか。]

全体

■男性 □女性




6. 家庭の煮物などの味付けについて

家庭の煮物の味付けが濃いと感ずると回答した者の割合は、男性 27.6%、女性 27.5%である。

図 23 家庭の煮物などの味付けが濃いと感ずると回答した者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたの家庭の煮物などの味付けは濃いほうですか。]




7. 汁物(みそ汁、スープ類)を飲む習慣

汁物を 1 日 2 杯以上飲むと回答した者の割合は、男性 29.6%、女性 19.7%である。

図 24 汁物を1日2杯以上飲むと回答した者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、汁物(みそ汁、スープ類)を1日2杯以上飲みますか。]



8. 単品料理(丼物、カレーライス、めん類など)を食べる習慣


単品料理を週3日以上食べると回答した者の割合は男性 30.4%、女性 14.5%である。

男性は20歳代で51.7%と最も高く、年齢とともに低くなる傾向にある。女性は、30歳代で35.6%と最も高い。

図 25 単品料理を週3日以上食べると回答した者の割合(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、単品料理(牛丼、天丼などの丼物、カレーライスやめん類など)を食べる日は、週に3日以上ですか。]

全体




9. めん類の汁を飲む習慣

めん類の汁をほとんど全部飲むと回答した者の割合は男性 37.8%、女性 15.0%である。男性は50歳代で60.0%と最も高い。

図 26 めん類の汁をほとんど全部飲むと回答した者の割合(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、めん類の汁をほとんど全部飲みますか。]

全体




10. 塩蔵品(塩さけ、たらこ、佃煮など)を食べる習慣

塩蔵品(塩さけ、たらこ、佃煮など)を週3日以上食べると回答した者の割合は、男性は14.4%、女性は15.1%である。男女ともに年齢とともに割合が高くなる傾向にある。

図 27 塩蔵品(塩さけ、たらこ、佃煮など)を週3日以上食べると回答した者の割合
(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、塩蔵品(塩さけ、たらこ、佃煮など)を食べる日は、週に3日以上ですか。]




11. 調味料をかける習慣

漬物や味付けしてあるおかずに、調味料をかけることが多いと回答した者の割合は、男性22.8%、女性4.6%である。男性は60歳代で30.8%と最も高い。

図 28 漬物や味付けしてあるおかずに、調味料をかけることが多いと回答した者の割合
(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、漬物や味付けしてあるおかずに、しょうゆやソースをかけることが多いですか。]




12. 漬物を食べる習慣

漬物を1日2回以上食べると回答した者の割合は、男性12.7%、女性13.2%である。男女ともに60歳代以上で増加し、70歳以上で30.0%以上となり最も高い。

図 29 漬物を1日2回以上食べると回答した者の割合(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、漬物を1日2回以上食べますか。]

全体



13. 食塩摂取量の知識について

1日あたりの食塩摂取目標量を知っていると回答した者の割合は、男性10.0%、女性24.8%である。また、正しく目標量を回答できた者の割合は、男性5.3%、女性10.5%である。

図 30-1 1日あたりの食塩摂取目標量を知っていると回答した者の割合(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、1日の食塩の摂取目標量を知っていますか。]

全体





図 30-2 1日あたりの食塩摂取目標量(男性 8g 未満、女性 7g 未満)を正確に回答できた者の割合

(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 (1 日あたりの食塩摂取量について)何グラムですか]



日本人の食事摂取基準(2015)では、男性 8.0g 未満、女性 7g 未満が食塩摂取量の目標値となっています。

注 1) 生活習慣調査② 問 14 で 1 日の食塩摂取目標量を知らないと回答した者を「知らない」として算出


注 2) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際の H27 人口構成に合わせるための重み付けをした値

14. 食品の食塩の表示の活用状況

食塩の表示を参考にしていると回答した者の割合は男性 20.9%、女性 36.8%である。男女ともに、年齢とともに割合が高くなる傾向にある。

図 31 食品購入時に食塩の表示を参考にしていると回答した者の割合(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、食品購入時、食塩の表示(ナトリウム量や食塩相当量、「減塩」などの表示)を参考にしていますか。]



15. 減塩の取り組み状況


減塩に取り組んでいる（積極的に取り組んでいる・少し取り組んでいる）と回答した者の割合は、男性 38.2%、女性 64.0%である。

男女ともに、取り組んでいる者の割合は年齢とともに高くなる傾向にある。


図 32 減塩に取り組んでいると回答した者の割合（20 歳以上、性・年齢階級別）

[問 あなたは、ふだんの食事において、減塩に取り組んでいますか。]

男性



女性



16. 野菜摂取量の知識について

1日あたりの望ましい野菜摂取量を知っていると回答した者の割合は、男性 10.7%、女性 21.2%である。

また、正しく目標量を回答できた者の割合は、男性 7.4%、女性 16.4%である。

図 33-1 1日あたりの望ましい野菜摂取量を知っていると回答した者の割合(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、健康のために1日に食べることが望ましい野菜の重量を知っていますか。]

全体

□男 性 □女 性





図 33-2 1日あたりの望ましい野菜摂取量(350g以上)を正確に回答できた者の割合

(20歳以上、性・年齢階級別)

[問 (1日あたりの望ましい野菜摂取量について)何グラムですか]

全体

□ 350g未満と回答した者 □ 350g以上と回答した者 □ 知らない ■ 無回答



健康日本 21(第二次)、健康ちば 21(第2次)では、野菜摂取量の目標値を 350g としています。

注 1) 生活習慣調査② 問 17 で 1 日の野菜摂取目標量を知らないと回答した者を「知らない」として算出

注 2) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際の H27 人口構成に合わせるための重み付けをした値


17. 野菜の摂取状況(自覚)

野菜を十分に食べていると思うと回答した者の割合は男性 31.7%、女性 34.7%である。男女ともに、50 歳以上から、十分に食べていると思う者が増加する。


図 34 野菜摂取に関する自覚(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、ふだんの食事で十分に野菜を食べていると思いますか。]

男性



女性




18. 食を通じたコミュニケーションの状況

食事の時、誰かと一緒に食卓を囲むなど、食を通じたコミュニケーションをとっている者（毎食している・ほとんどしている・時々している）の割合は、男性 76.7%、女性 87.8%である。


図 35 食事の時、誰かと一緒に食卓を囲むなど、食を通じたコミュニケーションをとっている者の割合
(20 歳以上、性・年齢階級別)

[問 あなたは、家族や友達と食卓を囲み、食事を楽しむ機会を持つなど、食を通じたコミュニケーションをとっていますか。]

男性



女性



19. 食習慣と体型及び食塩摂取量

＜食習慣と BMI の平均値＞

20～39 歳、65 歳以上の男性は、「人と比較して食べる速度が速い」「満腹まで食べる」「よく噛んで食べない」者の方が、そうでない者に比べて BMI が有意に高い。

また、65 歳以上の男性は「夕食後に夜食をとることが週 3 回以上ある」者の方が、そうでない者に比べ BMI が有意に高い。

40～64 歳、65 歳以上の女性は、「満腹まで食べる」者の方が、そうでない者に比べ BMI が有意に高い。また 65 歳以上の女性は「人と比較して食べる速度が速い」者の方が、そうでない者に比べ BMI が有意に高い。

BMI の平均値は「人と比較して食べる速度が速い」「満腹まで食べる」「夕食後に夜食をとることが週 3 回以上ある」「よく噛んで食べない」と回答した者の方が高かった。

＜食習慣と食塩摂取量の平均値＞

20～39 歳男性は「塩蔵品を週 3 日以上食べる」者は、そうでない者に比べ食塩摂取量が有意に多い。

40～64 歳男性は「麺類の汁を全部飲む」者は、そうでない者に比べ食塩摂取量が有意に多い。

20～39 歳女性は「汁物を 1 日 2 杯以上飲む」者はそうでない者に比べ、食塩摂取量が有意に多い。

40～64 歳女性は「漬物を 1 日 2 回以上食べる」者はそうでない者に比べ食塩摂取量が有意に多い。


65 歳以上女性は「汁物を 1 日 2 杯以上飲む」「塩蔵品を週 3 日以上食べる」「漬物を 1 日 2 回以上食べる」者はそうでない者に比べ食塩摂取量が有意に多い。

食塩摂取量の平均値は「汁物を 1 日 2 杯以上飲む」「麺類の汁を全部飲む」「塩蔵品を週 3 日以上食べる」「漬物を 1 日 2 回以上食べる」と回答した者の方が高かった。

＜食塩過剰摂取につながる食習慣の数別の食塩摂取量の平均値＞

男女ともに、食塩のとりすぎにつながる食習慣の数が増えると食塩摂取量が多くなるという有意な傾向性が見られた。




図 36 食習慣と BMI の平均値(20 歳以上)



生活習慣調査②より

- *1 : 普段朝食を食べるか。
- *2 : 人と比較して食べる速度が速いですか。
- *3 : ついつい満腹になるまで食べる方か。
- *4 : 就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週 3 回以上あるか。
- *5 : 夕食後に夜食をとることが週 3 回以上あるか。
- *6 : ゆっくりよく噛んで食事をするか。

図 37 食習慣と食塩摂取量の平均値(20 歳以上)




生活習慣調査②より

- *1 : 汁物の摂取頻度。『はい』1 日 2 杯以上、『いいえ』1 日 2 杯未満。
- *2 : 丼物、カレー、麺類の摂取頻度。『はい』週 3 日以上、『いいえ』週 3 日未満。
- *3 : 麺類の汁を全部飲む。『はい』全部飲む、『いいえ』全部飲まない。
- *4 : 塩蔵品の摂取頻度。『はい』週 3 日以上、『いいえ』週 3 日未満。
- *5 : 漬物や味付け済みの食品に醤油やソースをかける。『はい』かける、『いいえ』かけない。
- *6 : 漬物の摂取頻度。『はい』1 日 2 回以上、『いいえ』1 日 2 回未満。

図 38 食塩過剰摂取につながる食習慣の数別の食塩摂取量の平均値(20 歳以上)

全体

(項目数) □0つ ▨1つ □2つ以上



上記の項目数は、下記の設問に対して『はい』と回答した数である。(最少0つ～最大6つ)

生活習慣調査②より

問8：あなたは、汁物(味噌汁、スープ類)を1日2杯以上飲みますか。

問9：あなたは、単品料理(牛丼、天丼などの丼物、カレーライスや麺類など)を食べる日は週に3日以上ですか。

問10：あなたは、めん類の汁をほとんど全部飲みますか。

問11：あなたは、塩蔵品(塩さけ、たらこ、佃煮など)を食べる日は週に3日以上ですか。

問12：あなたは、漬物や味付けしてあるおかずに、しょうゆやソースをかけることが多いですか。

問13：あなたは、漬物を1日2回以上食べますか。

(7)睡眠・喫煙・歯の状況

1. 睡眠の状況

1日の平均睡眠時間は、男性は「6時間以上7時間未満」が多く39.6%、女性は6時間未満が多く40.8%である。年次推移は、ほぼ変わらない状況である。

図 39-1 1日の平均睡眠時間（20歳以上、性・年齢階級別）

[問 ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。]





図 39-2 1 日の平均睡眠時間 年次推移(20 歳以上、男女計、年齢調整値)




2. 喫煙の状況

現在習慣的に喫煙している者の割合は、男性 28.5%、女性 4.8%である。男性では 40 歳代で 38.4%、女性では 50 歳代で 7.7%と最も割合が高い。

平成 22 年に比べて現在喫煙者の割合は、男女共に減少し、女性は有意に減少している。


図 40-1 喫煙の状況（20 歳以上、性・年齢階級別） [問 あなたはたばこを吸いますか。]



※現在習慣的に喫煙している者とは、たばこを「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」と回答した者。

過去喫煙者とは、「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」と回答した者。

図 40-2 現在習慣的に喫煙している者の割合 年次推移（20 歳以上、性別、年齢調整値）



※平成17、22年は

現在習慣的に喫煙している者：「これまで合計 100 本以上または 6 か月以上たばこを吸っている(吸っていた)」者のうち、「この 1 ヶ月間に毎日またはときどきたばこを吸っている」と回答した者。

過去習慣的に喫煙していた者：「これまで合計 100 本以上または 6 か月以上たばこを吸っている(吸っていた)」者のうち、「今は吸っていない」と回答した者。

喫煙しない者：「まったく吸ったことがない」又は「吸ったことはあるが、合計 100 本未満で 6 ヶ月未満である」と回答した者。

3. 現在習慣的に喫煙している者の喫煙本数

現在習慣的に喫煙している者における1日あたりの喫煙本数の平均値は、男性15.8本、女性14.8本である。平成22年に比べ、男女ともにほぼ横ばいである。

1日に21本以上吸う者の割合は、男性9.5%、女性16.6%である。平成22年と比べ男女ともに横ばいである。

図 41-1 現在習慣的に喫煙している者の平均喫煙本数（20歳以上、性・年齢階級別）

[問 あなたは、通常、1日何本たばこを吸いますか。]




図 41-2 現在習慣的に喫煙している者の平均喫煙本数 年次推移（20歳以上、性別、年齢調整値）




図 42-1 現在習慣的に喫煙している者の喫煙本数の分布（20 歳以上、性・年齢階級別）





図 42-2 現在習慣的に喫煙している者の喫煙本数分布 年次推移(20 歳以上、性別、年齢調整値)




4. 現在習慣的に喫煙している者における禁煙の意思

現在習慣的に喫煙している者における禁煙の意思について、「やめたい」と回答した者は男性 22.5%で、女性 36.2%である。

図 43 現在習慣的に喫煙している者における喫煙の意思（20 歳以上、性・年齢階級別）

[問 たばこをやめたいと思いますか。]



5. 受動喫煙の環境

現在喫煙者を除き、この1ヶ月間に受動喫煙を受ける機会のあった者の割合は、男性では「飲食店」で高く、次に「遊技場」の順で高い。女性は「路上」が高く、次に「飲食店」が高い。


非喫煙者が受動喫煙防止対策の推進を望むのは、「路上」が最も高く、次に「飲食店」が高い。

(※「受動喫煙をうける機会のあった者」とは「月1回程度」以上の受動喫煙の機会を有する者)

図 44 受動喫煙の機会


(現在喫煙者・無回答・重回答を除く、「家庭」以外は「行かなかった」を除く、20歳以上、性別)

[問 あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。]



※現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者 ※屋外：子供が利用する屋外の空間(講演、通学路など)

図 45 非喫煙者における受動喫煙防止対策が推進されることを望む場所



6. 歯の本数の状況

自分の歯を 20 本以上有する者の割合は、男女とも 40 歳代で 9 割を超えるが、年齢と共に減少する。

平成 22 年に比べ、60 歳（55～64 歳）で 24 本以上の歯を有する者の割合は、男女ともに高くなっており、女性は有意に高くなっている。80 歳（75～84 歳）で 20 本以上の歯を有する者の割合は、男女ともに平成 22 年に比べ有意に高い。

図 46 自分の歯を 20 本以上有する者の割合（40 歳以上、性・年齢別）

〔問 自分の歯は何本ありますか。（親知らず、入歯、ブリッジ、インプラントは含みません。

さし歯は含みます。）〕






図 47 60 歳（55～64 歳）で 24 本以上、80 歳（75～84 歳）で 20 本以上の歯を有する者の割合（性別）

60 歳（55～64 歳）で 24 本以上の歯を有する者の割合（年齢調整値）




80 歳（75～84 歳）で 20 本以上の歯を有する者の割合（年齢調整値）



何でもかんで食べることができる者は、50 歳代で 8 割台になり、高齢になるほど何でもかんで食べることができる者の割合は減少している。70 歳以上では何でもかんで食べることができる者は 62.4%である。

図 48 かんで食べる時の状況(20 歳以上、男女計、年齢階級別)

[問 かんで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んでください。]



Ⅲ 結果

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

エネルギー(kcal)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1999	701	97	669	675	1034	1255	1610	1828	2238	3211	3613	4302	4302
	30-39歳	100	1837	523	75	621	688	1027	1215	1466	1778	2162	2499	2902	3841	3852
	40-49歳	132	1903	571	47	842	842	1129	1262	1482	1816	2295	2708	3043	3551	3568
	50-59歳	147	1884	521	50	713	1026	1174	1299	1522	1830	2169	2492	2694	4253	5060
	60-69歳	197	1913	470	29	804	823	1186	1394	1646	1891	2160	2501	2907	3383	3618
	70歳以上	275	1900	454	35	674	955	1180	1328	1554	1909	2202	2504	2619	3202	3537
	(再掲)20-39歳	175	1903	605	52	621	724	1033	1247	1551	1813	2195	2590	3185	3897	4302
	(再掲)40-64歳	352	1898	522	27	713	929	1178	1280	1540	1830	2188	2497	2805	3523	5060
	(再掲)65歳以上	399	1902	467	30	674	874	1155	1331	1555	1902	2187	2511	2709	3306	3537
	(再掲)20歳以上*1	926	1920	543	21	621	832	1141	1299	1554	1860	2203	2545	2898	3600	5060
男性	(再掲)20歳以上*2	926	1920	540	22	621	830	1138	1308	1554	1865	2202	2527	2894	3600	5060
	20-29歳	35	2370	770	205	1193	1198	1265	1482	1749	2206	3180	3648	3907	4302	4302
	30-39歳	48	2015	560	104	779	779	984	1195	1735	2035	2230	2865	3010	3852	3852
	40-49歳	61	2095	618	104	1184	1184	1225	1306	1698	1942	2470	2880	3421	3568	3568
	50-59歳	74	2065	424	49	832	984	1399	1611	1734	2098	2357	2521	2768	3350	3350
	60-69歳	89	2152	501	51	832	832	1372	1545	1903	2155	2440	2891	3075	3618	3618
	70歳以上	124	2074	408	52	674	1019	1413	1519	1802	2071	2361	2567	2689	3465	3537
	(再掲)20-39歳	83	2160	673	77	779	779	1194	1299	1751	2099	2455	3211	3653	4302	4302
	(再掲)40-64歳	168	2075	497	51	713	1158	1261	1484	1738	2024	2331	2695	2905	3561	3618
	(再掲)65歳以上	180	2110	456	48	674	970	1398	1521	1819	2096	2412	2611	2889	3430	3537
女性	(再掲)20歳以上*1	431	2118	559	33	674	967	1261	1464	1753	2076	2412	2852	3299	3785	4302
	(再掲)20歳以上*2	431	2116	551	32	674	944	1261	1467	1756	2078	2398	2802	3297	3780	4302
	20-29歳	40	1699	463	100	669	669	774	1070	1354	1726	1888	2323	2537	3033	3033
	30-39歳	52	1695	446	91	621	621	1070	1215	1438	1656	1918	2298	2739	2918	2918
	40-49歳	71	1716	452	59	842	842	982	1129	1367	1744	1998	2273	2456	3308	3308
	50-59歳	73	1706	549	67	789	983	1097	1213	1363	1612	1938	2198	2673	5060	5060
	60-69歳	108	1727	346	37	804	804	1150	1274	1533	1747	1946	2048	2235	3021	3028
	70歳以上	151	1757	440	36	861	872	1082	1252	1446	1684	2047	2336	2534	3178	3383
	(再掲)20-39歳	92	1696	451	72	621	641	930	1129	1433	1674	1912	2303	2552	3033	3033
	(再掲)40-64歳	184	1722	487	47	789	834	1100	1228	1382	1725	1954	2209	2413	3701	5060
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	219	1742	409	27	804	864	1135	1259	1476	1687	2005	2273	2438	2906	3383
	(再掲)20歳以上*1	495	1721	446	30	621	804	1071	1236	1436	1710	1958	2250	2441	3006	5060
	(再掲)20歳以上*2	495	1719	447	32	621	801	1071	1236	1435	1709	1955	2244	2443	2994	5060
	(再掲)20歳以上*2	495	1719	447	32	621	801	1071	1236	1435	1709	1955	2244	2443	2994	5060

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

総たんぱく質(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	79.3	31.8	6.0	18.3	21.8	33.7	45.0	58.1	77.6	94.4	111.2	148.8	184.4	184.4
	30-39歳	100	66.2	19.5	2.4	24.3	24.3	33.1	41.4	53.9	65.2	76.2	96.1	102.5	119.0	119.1
	40-49歳	132	70.2	23.0	2.4	21.7	22.9	35.2	42.4	56.6	66.2	80.9	107.4	114.3	127.4	127.5
	50-59歳	147	69.9	20.9	1.5	14.8	30.3	44.1	44.0	54.5	68.3	83.2	94.5	103.3	152.2	155.9
	60-69歳	197	74.5	20.8	1.9	28.1	29.1	40.2	51.9	61.3	71.1	84.2	102.0	117.5	137.7	137.8
	70歳以上	275	72.3	19.0	1.9	14.5	34.1	42.2	47.3	58.3	71.7	82.6	98.2	102.3	126.7	142.1
	(再掲)20-39歳	175	71.6	26.0	2.5	18.3	24.1	33.8	44.1	54.8	67.9	83.4	102.5	112.7	160.8	184.4
	(再掲)40-64歳	352	70.5	21.0	1.3	14.8	28.7	40.2	44.2	56.9	67.6	81.9	100.9	111.9	129.0	155.9
	(再掲)65歳以上	399	73.2	20.0	1.8	14.5	33.9	42.2	50.4	59.1	71.8	83.3	100.4	113.1	133.1	142.1
	(再掲)20歳以上※1	926	72.4	23.1	1.5	14.5	27.5	40.0	45.7	57.1	70.3	83.4	101.7	112.9	156.3	184.4
男性	(再掲)20歳以上※2	926	72.4	22.9	1.5	14.5	27.5	40.0	45.8	57.1	70.4	83.4	101.6	112.8	156.2	184.4
	20-29歳	35	92.2	39.0	12.0	27.7	27.7	38.5	43.9	63.1	83.4	110.4	150.3	161.7	184.4	184.4
	30-39歳	48	72.3	24.3	5.5	24.3	24.3	26.8	34.3	60.0	74.4	89.1	102.5	111.4	119.1	119.1
	40-49歳	61	77.6	26.1	3.6	21.7	21.7	35.5	50.6	59.9	74.6	101.1	114.1	126.8	127.5	127.5
	50-59歳	74	73.5	18.2	2.0	14.8	18.2	43.9	53.9	61.8	77.8	85.3	91.9	96.8	148.2	148.2
	60-69歳	89	83.0	22.8	3.1	30.0	30.0	49.2	55.7	67.8	81.7	100.5	114.2	132.4	137.8	137.8
	70歳以上	124	77.1	18.2	2.3	14.5	38.3	50.9	53.8	63.9	78.1	88.8	100.1	102.2	133.9	142.1
	(再掲)20-39歳	83	80.4	32.5	5.4	24.3	24.3	29.3	40.5	60.2	76.9	99.1	114.0	147.0	184.4	184.4
	(再掲)40-64歳	168	76.1	21.6	1.9	14.8	23.0	44.5	51.9	60.7	75.9	86.8	102.0	114.4	132.1	148.2
	(再掲)65歳以上	180	79.3	20.5	2.2	14.5	33.6	50.7	53.9	65.0	79.1	89.6	102.2	119.5	137.8	142.1
女性	(再掲)20歳以上※1	431	78.8	25.7	2.3	14.5	23.9	39.4	51.2	60.8	77.7	91.6	110.8	124.7	155.8	184.4
	(再掲)20歳以上※2	431	78.6	25.4	2.3	14.5	24.0	39.5	51.2	61.1	77.9	91.2	110.6	122.3	155.6	184.4
	20-29歳	40	68.9	19.5	4.1	18.3	19.2	31.7	45.0	52.2	68.8	81.5	90.2	101.4	131.1	131.1
	30-39歳	92	61.4	12.8	2.5	26.8	26.8	45.1	47.4	53.6	57.3	70.6	76.4	85.8	104.5	104.5
	40-49歳	71	62.9	16.8	2.5	28.7	28.7	34.2	40.6	50.9	62.7	77.9	82.0	90.8	119.7	119.7
	50-59歳	73	66.5	22.1	2.7	32.0	36.4	39.4	42.6	47.2	65.9	74.8	103.3	103.4	155.9	155.9
	60-69歳	108	67.8	16.4	1.9	28.1	28.4	43.1	50.8	57.4	65.3	77.0	87.2	103.6	118.4	118.6
	70歳以上	151	68.3	18.7	2.5	31.6	34.0	41.2	43.4	55.0	67.2	78.8	95.7	103.0	119.7	122.0
	(再掲)20-39歳	92	64.4	16.2	2.1	18.3	23.8	37.6	47.3	53.4	63.4	75.2	84.0	90.8	131.1	131.1
	(再掲)40-64歳	184	64.9	18.8	1.9	28.7	28.7	38.3	42.6	51.0	64.9	74.7	89.8	101.9	127.8	155.9
女性	(再掲)65歳以上	219	68.5	18.3	2.1	28.1	32.6	41.4	45.0	55.3	67.0	78.7	92.3	103.5	119.5	122.0
	(再掲)20歳以上※1	495	66.0	17.9	1.2	18.3	28.6	40.0	43.8	54.0	65.3	76.8	86.2	99.5	118.0	155.9
	(再掲)20歳以上※2	495	65.9	17.9	1.2	18.3	28.5	40.1	44.0	54.0	65.2	76.2	86.1	99.6	117.8	155.9

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

動物性たんぱく質(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	46.9	24.5	4.4	7.2	7.2	15.0	17.7	27.7	42.2	58.7	77.7	94.1	124.9	124.9
	30-39歳	100	36.1	15.6	1.1	0.1	3.0	14.6	18.9	25.4	32.3	46.2	63.3	66.6	76.3	76.4
	40-49歳	132	41.0	18.9	2.3	3.3	6.5	14.3	18.3	28.4	39.5	50.4	68.9	76.5	94.9	95.6
	50-59歳	147	35.9	15.3	1.1	5.8	6.6	9.5	14.8	26.6	33.9	48.9	54.6	60.0	83.6	114.4
	60-69歳	197	39.1	16.3	1.6	5.2	7.7	16.3	20.6	27.3	35.9	48.0	65.6	69.3	82.5	88.5
	70歳以上	275	37.5	14.0	1.4	0.0	12.1	16.0	18.7	27.2	36.7	46.5	57.5	62.8	72.0	89.9
	(再掲)20-39歳	175	40.5	20.4	1.8	0.1	7.2	15.5	18.7	26.5	36.8	52.0	67.5	76.4	106.2	124.9
	(再掲)40-64歳	352	37.9	16.6	1.2	3.3	6.8	13.5	17.4	27.2	36.1	47.5	56.9	68.8	91.7	114.4
	(再掲)65歳以上	399	38.4	15.2	1.4	0.0	11.2	16.0	19.9	27.6	36.9	46.9	59.0	67.9	82.4	89.9
	(再掲)20歳以上※1	926	39.5	18.1	1.2	0.0	7.1	14.7	18.6	27.2	37.2	50.5	64.2	72.6	97.7	124.9
	(再掲)20歳以上※2	926	39.4	17.9	1.2	0.0	7.1	14.7	18.6	27.2	37.0	50.4	63.3	71.3	97.5	124.9
男性	20-29歳	35	53.8	31.1	9.1	7.2	7.2	10.0	16.4	25.8	51.8	76.6	95.0	106.9	124.9	124.9
	30-39歳	48	41.6	19.3	3.9	0.1	0.6	8.1	15.9	25.1	40.7	62.5	66.8	67.7	76.4	76.4
	40-49歳	61	46.4	21.9	3.2	3.3	4.5	10.4	17.4	33.2	41.8	62.9	76.5	88.6	95.6	95.6
	50-59歳	74	38.7	14.9	1.5	6.8	6.9	13.9	21.6	30.9	36.3	51.5	55.8	62.0	114.4	114.4
	60-69歳	89	44.0	17.9	2.7	5.9	6.6	17.5	21.9	31.3	42.0	55.8	68.3	75.0	88.5	88.5
	70歳以上	124	40.2	13.5	1.5	0.0	12.7	18.5	22.6	30.2	38.8	48.9	58.7	60.1	88.8	89.9
	(再掲)20-39歳	83	46.6	25.3	4.2	0.1	2.4	8.7	16.4	25.4	42.6	64.4	76.9	91.3	124.9	124.9
	(再掲)40-64歳	168	41.7	18.1	1.8	3.3	6.8	13.9	20.9	31.5	39.9	52.3	65.6	76.2	95.1	114.4
	(再掲)65歳以上	180	42.0	15.5	1.5	0.0	12.7	18.4	22.4	31.3	39.5	51.4	64.8	69.2	88.6	89.9
	(再掲)20歳以上※1	431	43.8	20.5	2.1	0.0	7.1	15.6	19.6	30.6	40.4	54.7	69.3	78.0	102.6	124.9
	(再掲)20歳以上※2	431	43.5	20.2	2.0	0.0	7.1	15.8	19.8	30.4	40.2	54.2	69.1	77.4	102.5	124.9
女性	20-29歳	40	41.3	15.7	3.2	9.1	11.0	15.3	18.2	31.1	39.7	53.3	61.3	65.7	81.2	81.2
	30-39歳	92	31.7	10.0	2.1	7.5	7.5	15.6	19.3	25.8	29.3	37.4	49.0	52.3	56.8	56.8
	40-49歳	71	35.8	13.5	1.7	7.4	8.9	14.8	18.3	26.7	35.0	43.5	53.5	64.1	91.0	91.0
	50-59歳	73	33.1	15.6	1.5	5.8	5.8	7.3	11.1	21.8	31.0	45.7	54.2	60.6	74.9	74.9
	60-69歳	108	35.2	13.9	1.6	5.2	10.6	14.1	20.2	26.2	33.4	42.3	51.6	60.1	82.1	82.1
	70歳以上	151	35.3	14.1	2.0	0.9	11.4	14.5	16.9	25.8	35.2	43.2	53.6	63.2	69.4	73.7
	(再掲)20-39歳	92	35.6	13.4	1.8	7.5	7.6	17.8	19.3	26.6	33.3	44.2	56.5	59.1	81.2	81.2
	(再掲)40-64歳	184	34.0	14.0	0.9	5.8	6.2	11.4	15.3	24.1	32.6	43.3	53.5	55.8	68.6	91.0
	(再掲)65歳以上	219	35.7	14.3	1.8	0.9	10.6	14.4	17.0	26.1	35.4	43.1	52.4	63.2	81.7	82.1
	(再掲)20歳以上※1	495	35.2	14.0	1.0	0.9	7.4	14.7	18.6	26.0	34.2	43.4	53.5	61.2	74.2	91.0
	(再掲)20歳以上※2	495	35.1	14.0	1.0	0.9	7.4	14.7	18.6	26.0	34.2	43.3	53.5	59.5	74.3	91.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

植物性たんぱく質(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	32.5	11.5	1.7	8.5	8.5	17.2	19.3	24.6	31.9	40.1	48.9	54.0	59.5	59.5
	30-39歳	100	30.1	9.9	1.7	6.1	7.4	14.2	17.6	24.7	28.1	35.0	44.8	51.4	56.5	56.5
	40-49歳	132	29.2	9.9	1.1	8.3	13.2	15.1	16.7	21.0	28.1	35.7	42.6	49.3	58.4	61.3
	50-59歳	147	34.1	11.7	1.0	7.7	12.8	17.5	21.5	26.6	31.9	41.0	48.5	53.7	85.0	101.7
	60-69歳	197	35.4	10.0	1.1	12.1	12.4	18.2	23.1	29.0	35.3	42.6	49.6	52.1	61.6	71.6
	70歳以上	275	34.8	9.8	0.7	11.6	14.0	19.7	22.9	27.8	34.7	40.5	47.3	52.5	61.9	66.6
	(再掲)20-39歳	175	31.1	10.6	1.1	6.1	8.4	14.3	18.7	24.7	30.3	36.1	47.4	54.0	57.5	59.5
	(再掲)40-64歳	352	32.6	11.1	0.7	7.7	12.7	16.2	18.4	25.3	31.3	39.5	47.5	51.8	60.4	101.7
	(再掲)65歳以上	399	34.8	9.8	0.6	11.6	14.4	19.6	22.9	27.8	34.4	40.2	47.8	52.1	62.0	71.6
	(再掲)20歳以上※1	926	32.9	10.7	0.6	6.1	12.1	16.7	19.6	25.8	31.7	39.3	47.9	52.2	58.7	101.7
男性	(再掲)20歳以上※2	926	33.0	10.7	0.6	6.1	12.1	16.7	19.9	25.8	31.9	39.5	47.9	52.4	59.1	101.7
	20-29歳	35	38.4	11.3	3.3	17.6	17.6	18.3	20.9	32.5	36.4	45.9	54.0	57.6	59.5	59.5
	30-39歳	48	30.6	10.2	2.2	7.9	7.9	13.1	16.5	24.2	31.1	35.5	45.5	49.8	53.0	53.0
	40-49歳	61	31.2	10.6	1.9	13.2	13.2	15.2	18.2	19.8	30.9	38.1	45.6	51.0	61.3	61.3
	50-59歳	74	34.7	10.4	1.2	7.7	8.8	16.1	22.6	28.3	33.8	42.0	48.2	52.5	66.3	66.3
	60-69歳	89	39.0	10.5	1.3	13.2	13.9	20.0	26.6	31.7	38.2	44.8	53.3	55.3	71.6	71.6
	70歳以上	124	36.9	9.8	1.1	14.2	14.8	21.5	25.7	29.2	37.1	44.2	47.9	53.3	65.7	66.6
	(再掲)20-39歳	83	33.8	11.3	1.6	7.9	9.6	14.3	18.5	25.6	34.3	41.0	51.6	54.0	59.5	59.5
	(再掲)40-64歳	168	34.3	10.7	1.0	7.7	13.1	16.6	18.5	27.8	34.4	42.4	48.1	51.9	61.1	66.3
	(再掲)65歳以上	180	37.3	10.1	1.0	14.2	15.1	21.2	25.7	30.2	37.1	44.3	51.2	53.8	66.6	71.6
女性	(再掲)20歳以上※1	431	35.0	10.9	0.7	7.7	12.5	17.0	19.9	27.4	35.1	42.6	50.0	54.0	61.0	71.6
	(再掲)20歳以上※2	431	35.1	10.8	0.7	7.7	12.4	17.0	20.5	27.8	35.2	42.6	50.0	54.0	61.0	71.6
	20-29歳	40	27.7	9.2	1.9	8.5	8.5	8.7	18.5	20.8	26.1	32.6	39.9	46.2	49.8	49.8
	30-39歳	92	29.7	9.6	1.9	6.1	6.1	14.2	18.6	25.8	28.0	32.5	44.3	54.7	56.5	56.5
	40-49歳	71	27.1	8.8	1.3	8.3	9.7	14.9	16.1	21.3	25.9	31.3	38.1	48.5	56.5	56.5
	50-59歳	73	33.4	12.8	2.1	16.2	16.3	17.3	21.4	25.0	31.7	37.4	49.5	53.6	101.7	101.7
	60-69歳	108	32.6	8.8	1.2	12.1	12.2	17.7	21.6	26.6	33.2	37.9	44.1	48.6	55.2	57.0
	70歳以上	151	33.0	9.5	0.7	11.6	13.4	19.3	22.2	26.5	31.1	38.9	46.7	51.8	59.1	62.7
	(再掲)20-39歳	92	28.9	9.5	1.4	6.1	7.1	14.1	18.6	24.7	27.6	32.8	41.9	48.2	56.5	56.5
	(再掲)40-64歳	184	30.9	11.3	1.4	8.3	11.3	15.8	17.2	23.7	29.2	36.3	45.9	51.8	66.7	101.7
総数	(再掲)65歳以上	219	32.8	9.1	0.6	11.6	13.4	19.3	22.3	26.6	31.9	38.5	45.6	50.9	56.8	62.7
	(再掲)20歳以上※1	495	30.8	10.0	0.8	6.1	8.9	15.7	19.4	24.7	29.2	36.3	44.4	49.1	56.5	101.7
	(再掲)20歳以上※2	495	30.9	10.1	0.8	6.1	8.7	15.8	19.4	24.7	29.3	36.2	44.5	49.2	56.4	101.7

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

総脂質(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	66.2	30.1	5.0	13.0	15.5	25.1	33.2	43.2	62.6	82.8	113.5	124.7	164.7	164.7
	30-39歳	100	59.4	24.1	3.4	14.0	14.6	21.1	34.1	47.5	54.7	71.5	83.6	106.2	167.3	167.8
	40-49歳	132	61.7	26.0	1.5	10.1	17.2	26.9	31.1	44.5	57.8	77.8	100.3	112.2	149.5	153.1
	50-59歳	147	57.8	27.7	2.6	14.4	16.7	27.8	32.7	42.6	56.6	66.2	84.9	101.5	153.5	170.4
	60-69歳	197	58.1	20.6	1.7	13.2	17.7	27.4	32.1	42.0	57.1	69.8	87.9	100.8	113.4	118.8
	70歳以上	275	53.9	18.8	1.6	14.3	19.6	26.9	31.2	40.1	51.1	65.0	78.6	84.9	106.7	155.8
	(再掲)20-39歳	175	62.2	26.9	2.7	13.0	15.1	23.8	33.9	44.7	57.9	74.8	95.0	118.4	162.1	167.8
	(再掲)40-64歳	352	59.9	23.9	1.7	10.1	17.9	26.4	32.4	43.7	58.2	70.4	90.3	103.9	135.6	170.4
	(再掲)65歳以上	399	54.6	19.1	1.3	13.2	19.0	27.5	31.9	41.6	52.5	65.3	79.6	92.7	103.6	155.8
	(再掲)20歳以上※1	926	59.5	24.0	1.3	10.1	17.7	27.1	33.0	43.3	56.5	70.8	89.1	103.1	142.3	170.4
男性	(再掲)20歳以上※2	926	59.4	23.9	1.4	10.1	17.7	27.0	33.0	43.5	56.5	70.5	89.0	103.1	142.0	170.4
	20-29歳	35	76.9	34.5	8.4	26.5	28.4	33.8	35.6	46.3	71.0	110.5	129.4	145.7	164.7	164.7
	30-39歳	48	63.0	25.1	4.1	14.0	14.1	18.3	34.5	48.2	60.2	77.4	87.7	106.6	167.8	167.8
	40-49歳	61	65.4	28.0	3.3	23.2	27.6	30.4	33.6	44.4	59.3	87.4	105.4	121.2	129.2	129.2
	50-59歳	74	59.8	20.5	2.1	17.1	20.6	31.0	34.3	48.4	58.5	70.0	88.3	103.5	138.8	138.8
	60-69歳	89	65.8	21.0	2.1	13.2	16.8	29.5	36.1	53.2	66.9	73.2	100.7	101.0	118.8	118.8
	70歳以上	124	56.6	19.0	2.4	14.3	19.3	28.4	32.6	43.5	54.0	67.2	83.2	93.9	113.6	114.1
	(再掲)20-39歳	83	68.6	29.9	3.9	14.0	14.4	32.3	35.3	48.2	66.2	81.7	114.9	130.0	167.8	167.8
	(再掲)40-64歳	168	63.0	23.5	1.7	16.7	23.4	31.1	34.1	47.6	59.5	74.4	100.8	106.9	129.2	138.8
	(再掲)65歳以上	180	58.9	20.3	2.3	13.2	18.6	29.1	33.1	44.7	58.1	69.5	91.6	96.1	113.3	118.8
女性	(再掲)20歳以上※1	431	64.1	25.4	1.6	13.2	16.3	31.1	34.3	47.0	60.7	77.7	96.5	114.1	144.6	167.8
	(再掲)20歳以上※2	431	63.8	25.1	1.6	13.2	15.9	31.1	34.4	47.2	60.6	77.4	95.9	113.6	144.5	167.8
	20-29歳	40	57.6	23.1	5.2	13.0	13.7	22.6	25.8	37.0	54.7	75.1	89.6	96.0	125.1	125.1
	30-39歳	92	56.5	23.1	4.4	17.7	18.0	22.4	32.5	43.6	52.3	65.5	76.4	113.8	134.5	134.5
	40-49歳	71	58.0	23.6	3.1	10.1	10.1	19.8	27.2	44.4	57.8	70.2	81.6	91.1	153.1	153.1
	50-59歳	73	55.9	24.5	4.0	14.4	14.4	27.4	30.5	39.7	53.0	64.9	82.8	118.1	170.4	170.4
	60-69歳	108	52.2	18.5	1.9	14.8	17.6	25.4	30.5	38.7	52.1	60.0	76.9	80.8	113.9	114.2
	70歳以上	151	51.8	18.5	1.7	14.6	19.3	25.1	30.3	39.1	49.0	61.3	76.8	81.9	123.1	155.8
	(再掲)20-39歳	92	56.9	23.0	3.5	13.0	18.2	22.6	31.7	42.4	53.6	68.0	86.7	102.2	134.5	134.5
	(再掲)40-64歳	184	56.9	24.1	2.9	10.1	13.5	23.3	28.7	40.2	56.6	69.5	81.6	96.9	157.0	170.4
女性	(再掲)65歳以上	219	51.3	17.4	1.2	14.6	20.2	27.1	30.4	39.1	49.6	60.7	75.5	81.6	103.0	155.8
	(再掲)20歳以上※1	495	54.9	21.6	1.7	10.1	18.6	24.5	30.3	40.0	52.5	65.3	80.7	89.6	133.1	170.4
	(再掲)20歳以上※2	495	55.0	21.7	1.8	10.1	18.7	24.4	30.3	40.1	52.5	65.3	80.8	90.2	133.1	170.4

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

動物性脂質(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	35.2	21.0	2.5	3.6	5.3	10.4	14.0	18.7	28.3	46.1	67.9	76.8	107.5	107.5
	30-39歳	100	31.2	14.5	1.9	0.0	2.7	10.0	13.9	22.2	30.6	38.3	53.3	62.2	76.3	76.4
	40-49歳	132	33.0	19.3	2.3	2.9	4.3	7.7	12.8	17.4	28.1	43.4	62.2	74.4	79.8	110.0
	50-59歳	147	27.6	17.3	1.6	0.6	0.6	5.6	8.1	15.2	24.9	34.6	51.4	65.9	83.9	95.1
	60-69歳	197	27.1	12.7	1.0	1.5	6.9	9.0	11.4	17.6	26.0	34.5	44.6	52.8	60.1	72.2
	70歳以上	275	25.9	12.5	1.1	0.0	3.5	6.6	11.2	17.5	25.5	31.9	42.7	47.2	71.3	81.9
	(再掲)20-39歳	175	32.8	17.5	1.1	0.0	4.4	10.2	14.0	21.3	30.1	39.5	57.7	67.8	95.4	107.5
	(再掲)40-64歳	352	29.4	17.3	1.0	0.6	3.0	7.0	10.5	16.2	26.4	36.7	53.9	65.9	80.0	110.0
	(再掲)65歳以上	399	26.4	12.8	0.9	0.0	3.5	7.5	10.8	17.5	25.7	33.9	43.2	47.9	72.2	81.9
	(再掲)20歳以上※1	926	30.0	16.6	0.6	0.0	3.7	8.2	11.8	18.1	27.2	37.7	53.0	65.0	79.4	110.0
男性	(再掲)20歳以上※2	926	29.9	16.4	0.6	0.0	3.7	8.1	11.8	18.2	27.2	37.7	52.6	64.7	79.2	110.0
	20-29歳	35	39.3	24.1	5.5	6.5	6.5	7.1	12.0	17.6	36.7	53.7	68.1	84.8	107.5	107.5
	30-39歳	48	35.5	16.1	2.0	0.0	0.9	11.2	13.3	23.6	37.1	39.7	63.9	64.9	76.4	76.4
	40-49歳	61	35.6	21.5	2.9	2.9	4.6	11.0	13.9	15.8	28.2	52.0	74.4	74.6	80.1	80.1
	50-59歳	74	30.4	18.7	2.3	0.6	2.1	6.0	8.2	19.5	27.1	38.1	62.6	75.1	95.1	95.1
	60-69歳	89	31.0	13.1	1.6	1.5	3.8	11.2	13.0	20.5	30.0	37.5	52.9	57.3	72.2	72.2
	70歳以上	124	27.0	12.5	1.4	0.0	4.1	6.3	10.3	17.7	26.5	35.0	44.1	47.2	69.7	72.5
	(再掲)20-39歳	83	37.1	19.7	2.2	0.0	3.7	11.3	12.7	23.3	37.0	49.1	67.2	68.1	107.5	107.5
	(再掲)40-64歳	168	31.5	18.8	1.6	0.6	5.0	7.2	12.1	17.9	27.3	39.5	64.8	74.5	80.4	95.1
	(再掲)65歳以上	180	28.9	13.4	1.2	0.0	4.1	8.5	11.9	19.5	28.3	36.8	46.0	56.1	64.2	72.5
女性	(再掲)20歳以上※1	431	32.9	18.1	1.1	0.0	4.5	9.3	12.6	19.6	29.7	41.6	62.6	67.8	80.7	107.5
	(再掲)20歳以上※2	431	32.7	17.9	1.0	0.0	4.4	9.1	12.6	19.9	29.7	41.4	58.1	67.6	80.7	107.5
	20-29歳	40	31.9	17.7	3.3	3.6	4.2	11.8	15.1	21.9	27.1	36.2	71.3	76.7	94.1	94.1
	30-39歳	92	27.7	12.0	3.0	3.8	3.8	9.2	14.0	18.3	23.9	35.0	45.2	53.2	57.7	57.7
	40-49歳	71	30.5	16.6	2.6	4.3	4.3	6.9	8.9	17.9	28.1	39.1	56.4	60.9	110.0	110.0
	50-59歳	73	24.9	15.4	2.0	0.7	0.7	2.9	8.1	14.4	24.4	31.4	49.8	55.0	82.2	82.2
	60-69歳	108	24.0	11.4	1.3	2.9	6.9	7.9	10.0	15.9	20.6	32.2	39.9	44.5	64.9	68.1
	70歳以上	151	25.0	12.5	1.3	3.0	3.2	6.6	11.2	17.0	23.6	30.4	41.2	46.7	75.9	81.9
	(再掲)20-39歳	92	29.4	14.7	2.3	3.6	3.7	9.7	15.2	20.2	26.6	35.1	47.5	59.4	94.1	94.1
	(再掲)40-64歳	184	27.2	15.6	1.0	0.7	1.1	6.9	8.5	15.6	24.4	35.2	51.4	59.1	77.4	110.0
女性	(再掲)65歳以上	219	24.5	12.1	1.1	2.9	3.3	7.5	10.3	16.1	23.5	30.4	40.0	44.6	68.8	81.9
	(再掲)20歳以上※1	495	27.0	14.3	0.8	0.7	3.6	8.1	10.4	16.9	24.8	34.9	44.9	54.9	76.5	110.0
	(再掲)20歳以上※2	495	27.0	14.3	0.9	0.7	3.2	8.1	10.3	16.8	24.8	34.8	44.9	54.9	76.5	110.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

植物性脂質(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	31.0	16.9	2.6	1.9	1.9	6.2	13.1	18.7	29.2	40.7	51.4	62.9	112.5	112.5
	30-39歳	100	28.2	19.3	3.3	1.2	2.2	6.2	10.4	14.8	24.3	36.1	51.4	71.9	100.7	100.7
	40-49歳	132	28.7	15.8	1.8	2.2	2.4	9.0	12.4	18.2	27.0	36.1	48.1	55.8	102.4	113.8
	50-59歳	147	30.2	14.8	1.8	4.1	7.6	12.2	15.1	19.2	27.9	38.2	44.6	56.4	97.4	115.6
	60-69歳	197	31.1	16.0	1.7	2.9	4.9	10.0	12.9	18.0	27.3	42.2	53.1	60.4	71.3	92.4
	70歳以上	275	28.0	14.2	1.0	2.0	6.4	9.9	12.4	17.9	24.7	35.6	47.6	56.7	71.3	75.3
	(再掲)20-39歳	175	29.3	18.3	2.4	1.2	2.1	6.2	10.7	16.4	25.7	37.3	51.4	63.2	100.2	112.5
	(再掲)40-64歳	352	30.5	15.9	1.4	2.2	2.5	10.1	13.0	18.6	28.1	40.0	49.0	57.8	77.5	115.6
	(再掲)65歳以上	399	28.2	14.3	0.8	2.0	6.7	10.6	13.2	17.5	24.7	37.5	48.0	57.1	68.3	92.4
	(再掲)20歳以上※1	926	29.5	16.2	1.1	1.2	2.6	9.7	12.5	18.1	26.6	38.5	50.8	59.8	79.0	115.6
男性	(再掲)20歳以上※2	926	29.6	16.3	1.2	1.2	2.6	9.7	12.5	18.1	26.6	38.6	50.8	60.0	81.3	115.6
	20-29歳	35	37.6	18.1	4.3	2.0	2.0	16.2	18.6	25.1	32.0	48.9	63.0	69.2	112.5	112.5
	30-39歳	48	27.4	18.6	3.7	1.2	1.2	2.7	9.4	14.8	24.2	38.5	54.0	67.3	100.7	100.7
	40-49歳	61	29.9	14.5	2.5	2.2	2.2	10.1	14.7	18.3	28.4	39.4	49.0	60.1	72.7	72.7
	50-59歳	74	29.4	11.3	1.2	4.1	4.2	11.0	14.5	22.6	29.5	37.6	43.5	44.6	65.2	65.2
	60-69歳	89	34.7	16.0	2.1	2.9	5.1	12.4	14.5	21.9	32.6	46.9	58.4	66.6	79.4	79.4
	70歳以上	124	29.6	15.1	1.7	2.2	6.4	10.6	13.9	18.3	25.2	39.1	53.9	60.3	72.1	75.3
	(再掲)20-39歳	83	31.6	18.9	2.8	1.2	1.6	3.0	13.8	18.6	26.9	40.9	56.1	65.0	112.5	112.5
	(再掲)40-64歳	168	31.4	13.9	1.1	2.2	2.4	11.8	15.0	20.8	30.5	40.5	49.0	57.2	70.7	72.7
	(再掲)65歳以上	180	30.0	15.2	1.4	2.2	6.6	10.7	14.0	18.2	26.2	40.4	53.4	60.7	69.5	79.4
女性	(再掲)20歳以上※1	431	31.1	16.1	1.2	1.2	2.4	10.1	14.0	18.5	28.4	40.8	52.3	62.7	73.5	112.5
	(再掲)20歳以上※2	431	31.1	16.1	1.2	1.2	2.4	10.1	14.0	18.6	28.4	40.8	52.3	62.7	73.5	112.5
	20-29歳	40	25.7	14.0	2.7	1.9	1.9	3.5	8.4	14.5	24.3	36.6	42.1	58.2	61.7	61.7
	30-39歳	92	28.8	20.0	4.1	2.5	2.5	8.8	10.7	14.8	25.3	34.9	44.9	87.3	99.5	99.5
	40-49歳	71	27.6	17.0	2.1	2.4	2.4	8.7	11.1	16.6	24.9	34.5	42.9	62.3	113.8	113.8
	50-59歳	73	31.0	17.6	3.3	8.8	8.8	12.6	15.8	17.8	25.9	39.6	48.4	72.7	115.6	115.6
	60-69歳	108	28.2	15.5	1.8	4.7	4.9	8.3	12.1	17.0	24.1	39.1	51.5	59.5	87.0	92.4
	70歳以上	151	26.7	13.4	1.2	2.0	5.8	9.7	11.5	17.4	24.7	32.9	45.9	53.1	73.5	75.2
	(再掲)20-39歳	92	27.5	17.7	2.9	1.9	2.2	6.8	10.4	14.8	25.0	36.5	41.7	61.0	99.5	99.5
	(再掲)40-64歳	184	29.6	17.6	2.3	2.4	3.5	9.1	12.3	17.5	25.8	38.5	49.0	66.7	114.2	115.6
総数	(再掲)65歳以上	219	26.8	13.4	0.9	2.0	6.3	9.7	12.4	17.4	24.6	32.7	46.1	53.9	72.8	92.4
	(再掲)20歳以上※1	495	27.9	16.3	1.4	1.9	3.6	9.0	11.5	16.9	25.2	35.4	46.6	59.2	95.6	115.6
	(再掲)20歳以上※2	495	28.0	16.4	1.5	1.9	3.7	9.0	11.5	16.7	25.3	35.7	47.0	59.4	95.9	115.6

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

トリアシルグリセロール当量(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	61.5	29.4	4.8	12.8	16.1	22.4	27.7	40.7	58.4	77.3	111.5	115.6	158.3	158.3
	30-39歳	100	55.9	24.1	3.1	5.4	13.9	18.6	31.7	42.2	51.2	67.8	78.7	98.8	156.7	157.1
	40-49歳	132	56.1	24.1	1.5	9.2	14.1	25.5	27.2	40.1	52.2	69.5	88.0	94.3	141.0	147.3
	50-59歳	147	52.7	22.7	2.6	9.6	15.2	25.8	29.0	34.9	48.7	60.6	80.0	105.6	139.2	153.0
	60-69歳	197	52.4	19.4	1.5	9.6	15.0	20.8	27.1	38.8	52.4	65.0	79.0	91.8	103.9	111.6
	70歳以上	275	47.6	17.6	1.4	12.5	14.5	20.2	25.8	35.3	46.0	59.1	70.6	76.5	100.8	151.6
	(再掲)20-39歳	175	58.2	26.5	2.6	5.4	14.7	19.6	29.3	41.7	52.8	72.0	92.1	111.9	152.5	158.3
	(再掲)40-64歳	352	54.5	22.9	1.6	9.2	15.9	24.5	28.5	38.7	52.4	65.6	86.1	97.8	126.2	153.0
	(再掲)65歳以上	399	48.5	17.9	1.1	9.6	14.5	21.6	27.0	35.7	47.0	59.5	71.7	79.1	94.5	151.6
	(再掲)20歳以上※1	926	54.3	23.3	1.3	5.4	15.3	22.5	28.0	39.4	50.8	65.9	83.2	96.4	132.7	158.3
男性	(再掲)20歳以上※2	926	54.3	23.2	1.3	5.4	15.3	22.1	28.2	39.5	50.8	65.8	81.9	96.4	131.5	158.3
	20-29歳	35	71.4	33.9	8.1	24.0	26.6	32.3	35.6	42.8	65.8	86.2	124.0	143.8	158.3	158.3
	30-39歳	48	60.6	25.3	3.9	5.4	6.8	15.5	27.9	45.2	60.4	74.7	88.6	103.6	157.1	157.1
	40-49歳	61	59.8	25.2	3.2	20.0	21.6	26.3	29.7	41.2	54.5	84.4	89.8	109.0	124.9	24.9
	50-59歳	74	55.9	21.3	2.3	16.3	19.5	28.7	32.2	40.5	53.2	64.8	87.1	107.3	123.8	123.8
	60-69歳	89	59.6	19.8	1.9	9.6	13.7	25.8	31.9	46.7	60.9	68.0	86.3	94.8	111.6	111.6
	70歳以上	124	49.9	17.5	2.2	12.5	13.8	21.9	28.2	37.1	49.9	61.1	74.6	79.2	107.8	110.7
	(再掲)20-39歳	83	65.0	29.4	3.7	5.4	11.7	24.0	33.0	44.7	60.6	75.4	105.4	124.8	158.3	158.3
	(再掲)40-64歳	168	58.1	22.5	1.7	13.6	16.7	26.5	31.7	41.8	56.3	69.6	88.0	101.7	124.0	124.9
	(再掲)65歳以上	180	52.2	18.6	2.0	9.6	13.9	22.2	29.1	39.9	51.3	63.3	78.4	85.8	105.4	111.6
女性	(再掲)20歳以上※1	431	59.1	24.6	1.5	5.4	15.4	26.0	31.7	41.9	56.5	72.3	89.9	111.6	142.5	158.3
	(再掲)20歳以上※2	431	58.8	24.4	1.5	5.4	15.4	25.9	31.7	41.9	56.4	71.7	88.5	111.6	142.4	158.3
	20-29歳	40	53.5	22.7	5.1	12.8	13.7	19.4	23.2	35.9	49.8	73.4	87.5	99.4	111.3	111.3
	30-39歳	92	52.1	22.5	3.9	14.5	15.1	19.5	31.7	40.3	48.4	61.7	70.3	106.1	130.5	30.5
	40-49歳	71	52.6	22.6	2.7	9.2	9.2	19.0	26.1	39.4	52.0	62.2	78.4	84.4	147.3	147.3
	50-59歳	73	49.5	23.7	3.6	9.6	9.6	25.7	26.6	32.5	42.8	60.3	77.2	106.0	153.0	153.0
	60-69歳	108	46.7	17.1	1.8	12.1	14.6	17.6	25.7	33.9	46.9	56.0	68.9	72.6	107.8	109.7
	70歳以上	151	45.7	17.6	1.7	14.5	14.5	18.4	24.0	33.9	43.2	55.1	69.3	74.6	119.5	151.6
	(再掲)20-39歳	92	52.7	22.5	3.3	12.8	15.3	19.5	25.4	40.0	48.7	61.7	78.6	99.4	130.5	130.5
	(再掲)40-64歳	184	50.8	22.8	2.5	9.2	9.2	18.2	26.3	33.8	48.5	60.9	76.0	85.6	148.6	153.0
女性	(再掲)65歳以上	219	45.5	16.7	1.1	13.3	14.5	19.6	25.6	34.0	44.5	54.1	66.4	73.4	98.7	151.6
	(再掲)20歳以上※1	495	49.5	20.8	1.7	9.2	14.6	19.5	26.4	35.6	47.5	60.2	73.1	83.4	129.6	153.0
	(再掲)20歳以上※2	495	49.7	21.0	1.8	9.2	14.6	19.5	26.5	35.6	47.5	60.3	74.2	85.2	129.6	153.0
	(再掲)20歳以上※2	495	49.7	21.0	1.8	9.2	14.6	19.5	26.5	35.6	47.5	60.3	74.2	85.2	129.6	153.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

炭水化物(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	261.7	87.0	10.1	74.7	78.5	129.6	177.3	197.9	243.2	305.7	370.7	447.5	534.3	534.3
	30-39歳	100	240.5	83.0	12.3	60.6	67.2	138.9	152.0	171.1	226.0	293.0	344.4	392.2	555.8	556.7
	40-49歳	132	247.9	80.7	9.5	93.7	100.2	128.5	152.6	185.3	238.9	282.8	372.6	419.0	452.6	457.3
	50-59歳	147	251.8	77.4	8.0	106.1	124.6	153.9	165.2	202.2	244.0	292.1	343.6	368.5	592.7	716.0
	60-69歳	197	257.9	66.6	4.3	102.5	127.6	159.8	179.0	213.9	251.2	293.4	340.2	394.9	476.9	505.3
	70歳以上	275	268.9	71.1	6.5	89.2	121.8	161.2	178.2	215.6	265.7	315.7	369.1	399.4	423.5	467.5
	(再掲)20-39歳	175	249.1	85.0	7.8	60.6	74.8	136.7	157.6	187.8	237.9	297.7	357.3	387.4	543.7	556.7
	(再掲)40-64歳	352	251.3	75.5	5.7	93.7	105.9	145.7	161.6	199.1	245.4	289.1	343.4	387.2	457.2	716.0
	(再掲)65歳以上	399	266.0	71.3	5.5	89.2	121.9	156.6	178.4	214.2	260.3	311.9	363.4	399.7	439.2	505.3
	(再掲)20歳以上※1	926	257.3	78.5	3.5	60.6	100.1	148.3	167.1	203.5	250.7	302.3	361.5	399.6	476.5	716.0
	(再掲)20歳以上※2	926	257.2	78.4	3.5	60.6	100.1	149.1	167.1	203.5	250.8	302.3	359.4	399.1	477.0	716.0
男性	20-29歳	35	313.2	86.6	21.5	152.8	155.0	184.3	213.0	245.4	299.8	365.6	463.8	505.4	534.3	534.3
	30-39歳	48	261.8	97.2	17.4	70.0	70.0	129.0	163.8	182.3	278.6	309.7	407.8	451.0	556.7	556.7
	40-49歳	61	272.3	86.7	16.2	100.0	100.0	138.8	160.0	220.7	261.3	335.1	419.1	425.6	457.3	457.3
	50-59歳	74	277.1	67.6	9.2	106.1	110.3	174.4	198.3	231.1	269.7	326.0	361.2	387.6	454.7	454.7
	60-69歳	89	280.2	73.6	7.5	124.0	126.8	170.1	185.5	232.4	283.8	314.3	393.6	404.4	505.3	505.3
	70歳以上	124	290.3	64.3	8.9	121.4	122.7	180.1	211.0	251.1	291.5	335.2	373.6	398.9	431.3	467.5
	(再掲)20-39歳	83	282.8	95.9	9.4	70.0	72.1	153.5	168.3	208.5	280.6	322.0	410.6	477.6	556.7	556.7
	(再掲)40-64歳	168	273.6	74.0	8.5	100.0	113.2	158.3	177.8	228.2	268.6	322.0	375.2	420.6	457.3	457.3
	(再掲)65歳以上	180	290.0	68.8	7.7	121.4	123.6	180.2	208.9	244.0	289.3	334.9	394.0	401.4	477.6	505.3
	(再掲)20歳以上※1	431	281.2	81.3	5.4	70.0	107.7	159.4	177.8	228.2	278.4	324.6	388.1	420.9	522.9	556.7
	(再掲)20歳以上※2	431	281.4	80.6	5.3	70.0	108.5	160.7	178.4	228.2	279.7	324.4	384.8	419.3	523.3	556.7
女性	20-29歳	40	220.1	61.8	14.2	74.7	74.7	99.6	147.9	193.8	209.3	267.2	317.4	354.5	356.8	356.8
	30-39歳	92	223.3	65.5	13.0	60.6	60.6	134.4	150.7	166.9	218.3	257.3	339.6	346.7	366.8	366.8
	40-49歳	71	224.0	66.8	9.4	93.7	96.6	118.9	134.3	170.4	219.2	276.7	303.2	332.4	412.7	412.7
	50-59歳	73	226.9	78.7	9.0	107.2	123.5	149.4	160.0	178.9	211.7	253.4	303.6	336.0	716.0	716.0
	60-69歳	108	240.6	55.1	5.4	102.5	102.5	150.7	167.1	204.4	234.1	281.6	310.1	333.8	410.5	411.2
	70歳以上	151	251.4	71.8	6.1	89.2	100.8	149.7	171.9	197.0	245.0	299.1	338.5	397.4	443.0	452.3
	(再掲)20-39歳	92	222.0	63.7	10.3	60.6	68.5	127.3	150.7	177.0	214.3	258.0	325.7	345.0	366.8	366.8
	(再掲)40-64歳	184	229.2	70.4	7.3	93.7	103.5	131.7	156.7	179.2	224.7	267.9	307.2	334.3	491.0	716.0
	(再掲)65歳以上	219	247.5	67.7	5.0	89.2	103.9	150.0	171.0	199.0	242.3	291.5	330.2	390.2	428.6	452.3
	(再掲)20歳以上※1	495	233.2	67.7	4.5	60.6	94.8	136.4	158.9	186.5	225.9	276.1	319.2	344.0	412.6	716.0
	(再掲)20歳以上※2	495	232.5	67.7	4.7	60.6	94.1	136.5	158.9	186.3	225.4	274.4	318.5	343.5	412.4	716.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ナトリウム(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	3687	1199	192	946	973	1763	1977	2862	3744	4446	4971	5589	9829	9829
	30-39歳	100	3838	1229	160	1162	1450	2054	2304	2797	3952	4695	5624	5734	8033	8035
	40-49歳	132	3861	1565	131	1052	1068	1461	1742	2881	3665	4525	6269	6850	8054	8094
	50-59歳	147	4092	1340	133	675	760	2030	2447	3322	3972	4770	5829	6241	9012	11048
	60-69歳	197	4129	1542	173	1606	1606	1995	2388	3103	3900	4796	6458	7640	8409	8599
	70歳以上	275	4198	1504	108	1292	1831	2203	2405	2982	3910	5224	6605	6946	7797	9122
	(再掲)20-39歳	175	3776	1216	128	946	1059	1930	2243	2810	3880	4543	5322	5732	7710	9829
	(再掲)40-64歳	352	4000	1448	81	675	1075	1629	2287	3083	3927	4769	5874	6617	8257	11048
	(再掲)65歳以上	399	4187	1530	86	1292	1821	2163	2419	2982	3907	5194	6607	6987	8089	9122
	(再掲)20歳以上※1	926	4010	1429	66	675	1161	1977	2311	3001	3919	4795	5947	6720	8080	11048
	(再掲)20歳以上※2	926	4015	1422	68	675	1169	1989	2344	3002	3922	4795	5930	6706	8084	11048
男性	20-29歳	35	4063	1254	362	1028	1028	1233	2402	3322	4009	4934	5590	6196	6995	6995
	30-39歳	48	4072	1268	269	1162	1162	1910	2147	3066	4255	5014	5556	5876	7958	7958
	40-49歳	61	4199	1728	304	1052	1052	1468	1678	2981	4000	5461	6711	7036	8094	8094
	50-59歳	74	4517	1227	209	675	984	2133	2936	3912	4527	5428	6092	6390	6734	6734
	60-69歳	89	4568	1582	219	1988	1992	2254	3009	3595	4193	5225	7096	8107	8599	8599
	70歳以上	124	4527	1494	163	1972	2049	2600	2898	3198	4276	5669	6752	7019	8730	9122
	(再掲)20-39歳	83	4069	1255	202	1028	1028	1835	2178	3166	4154	4981	5369	5941	7958	7958
	(再掲)40-64歳	168	4394	1475	159	675	1137	1751	2388	3397	4333	5331	6365	6771	8378	8494
	(再掲)65歳以上	180	4547	1541	128	1972	1991	2257	2890	3268	4174	5709	6831	7293	8661	9122
	(再掲)20歳以上※1	431	4327	1454	97	675	1076	1999	2539	3334	4293	5214	6367	6899	8144	9122
	(再掲)20歳以上※2	431	4338	1444	97	675	1102	2023	2575	3335	4296	5215	6365	6899	8147	9122
女性	20-29歳	40	3383	1072	200	946	1059	1706	1943	2599	3439	3969	4564	4723	9829	9829
	30-39歳	92	3649	1174	130	1607	1607	2223	2326	2754	3256	4174	5517	5730	8035	8035
	40-49歳	71	3531	1318	185	1143	1143	1198	2009	2821	3343	4093	5462	6315	7878	7878
	50-59歳	73	3672	1322	173	803	803	1874	2281	2963	3650	4239	4789	5453	11048	11048
	60-69歳	108	3788	1426	189	1606	1606	1787	2211	2853	3454	4389	5621	7199	8048	8061
	70歳以上	151	3928	1463	125	1292	1456	2101	2347	2787	3692	5014	6242	6759	7113	8526
	(再掲)20-39歳	92	3540	1135	119	946	1500	1939	2285	2700	3396	4100	5110	5644	9829	9829
	(再掲)40-64歳	184	3611	1312	122	803	865	1561	2117	2886	3533	4250	5069	5682	8602	11048
	(再掲)65歳以上	219	3908	1465	89	1292	1669	2077	2376	2804	3656	4706	6253	6921	7742	8526
	(再掲)20歳以上※1	495	3691	1330	61	803	1172	1935	2280	2811	3511	4315	5614	6184	7801	11048
	(再掲)20歳以上※2	495	3684	1321	61	803	1178	1935	2286	2811	3511	4300	5576	6112	7818	11048

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

カリウム(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	2448	1049	231	555	574	836	1196	1816	2290	2922	3730	5068	5111	5111
	30-39歳	100	1975	756	136	418	418	693	1178	1449	1969	2343	3071	3332	4529	4536
	40-49歳	132	2267	954	117	601	601	933	1208	1652	2200	2754	3373	4372	5074	5108
	50-59歳	147	2411	823	66	794	890	1239	1430	1892	2269	2773	3715	4084	4553	5394
	60-69歳	197	2713	896	66	783	915	1392	1621	2082	2716	3293	3757	4105	5408	7611
	70歳以上	275	2831	989	128	681	1057	1545	1676	2087	2705	3525	4050	4585	5522	6266
	(再掲)20-39歳	175	2167	915	114	418	428	797	1196	1539	2053	2697	3147	3791	5099	5111
	(再掲)40-64歳	352	2417	893	60	601	639	1035	1369	1865	2332	2936	3515	4081	4971	7611
	(再掲)65歳以上	399	2793	975	98	681	938	1475	1635	2081	2702	3488	3990	4598	5412	6266
	(再掲)20歳以上※1	926	2465	969	66	418	623	1034	1364	1833	2308	3053	3741	4209	5157	7611
男性	(再掲)20歳以上※2	926	2462	964	65	418	623	1035	1365	1834	2299	3053	3733	4159	5161	7611
	20-29歳	35	2694	1241	391	737	737	955	1298	2014	2326	3095	5073	5099	5111	5111
	30-39歳	48	2075	918	208	418	418	646	736	1397	2157	2650	3128	3793	4536	4536
	40-49歳	61	2479	1119	197	880	880	917	922	1486	2312	3069	4228	4875	5108	5108
	50-59歳	74	2314	792	107	794	832	1116	1470	1890	2080	2741	3620	4070	4398	4398
	60-69歳	89	2850	986	106	783	864	1420	1680	2144	2853	3317	4074	4677	7611	7611
	70歳以上	124	2910	964	124	812	1378	1546	1837	2110	2819	3571	4172	4432	5895	6266
	(再掲)20-39歳	83	2328	1099	158	418	418	692	1007	1587	2196	2832	3882	5063	5111	5111
	(再掲)40-64歳	168	2487	980	100	783	865	959	1377	1878	2331	3054	3758	4311	5093	7611
	(再掲)65歳以上	180	2884	973	102	812	1188	1510	1710	2090	2842	3502	4193	4668	5701	6266
女性	(再掲)20歳以上※1	431	2549	1045	81	418	667	941	1356	1879	2346	3124	3976	4678	5122	7611
	(再掲)20歳以上※2	431	2555	1039	80	418	654	961	1376	1888	2350	3129	3951	4662	5141	7611
	20-29歳	40	2248	826	214	555	555	799	1022	1726	2146	2913	3173	3607	3756	3756
	30-39歳	92	1894	591	99	504	504	998	1217	1511	1932	2314	2549	3253	3421	3421
	40-49歳	71	2061	710	115	601	601	638	1211	1688	2014	2358	2987	3212	4323	4323
	50-59歳	73	2506	847	102	856	925	1305	1370	1972	2435	3063	3874	4051	5594	5594
	60-69歳	108	2907	809	89	815	870	1355	1603	2078	2540	3163	3667	3823	5535	5597
	70歳以上	151	2766	1008	143	681	891	1483	1620	2076	2508	3524	4039	4869	5386	5400
	(再掲)20-39歳	92	2038	714	115	504	526	889	1208	1530	1992	2490	2974	3309	3756	3756
	(再掲)40-64歳	184	2347	795	81	601	601	1209	1356	1811	2332	2809	3394	3908	4244	5394
女性	(再掲)65歳以上	219	2723	972	108	681	897	1462	1613	2072	2532	3484	3919	4576	5393	5597
	(再掲)20歳以上※1	495	2380	878	67	504	605	1207	1360	1771	2266	2916	3660	3916	5257	5597
	(再掲)20歳以上※2	495	2367	871	66	504	606	1207	1346	1758	2253	2913	3608	3910	5185	5597

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

カルシウム(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	611	482	88	58	60	130	224	346	462	766	1275	1857	2014	2014
	30-39歳	100	451	265	42	55	55	110	197	274	404	550	839	1048	1287	1287
	40-49歳	132	508	308	44	85	85	158	211	275	418	656	926	1199	1392	1770
	50-59歳	147	537	266	21	103	112	181	218	313	510	684	936	1058	1366	1462
	60-69歳	197	560	253	23	106	138	220	271	391	544	709	825	999	1366	2001
	70歳以上	275	616	306	34	74	128	186	258	434	553	763	1069	1238	1538	2238
	(再掲)20-39歳	175	516	377	29	55	55	124	200	279	433	593	1032	1269	1969	2014
	(再掲)40-64歳	352	533	280	23	85	104	165	230	313	499	698	919	1054	1388	2001
	(再掲)65歳以上	399	599	294	25	74	139	193	257	415	540	741	1013	1237	1483	2238
	(再掲)20歳以上※1	926	549	324	16	55	79	170	224	326	491	676	952	1208	2001	2238
男性	(再掲)20歳以上※2	926	548	322	15	55	78	171	224	326	491	671	952	1200	1954	2238
	20-29歳	35	715	587	186	75	75	130	224	342	463	869	1651	1902	2014	2014
	30-39歳	48	447	296	67	55	55	80	152	274	395	551	883	1232	1287	1287
	40-49歳	61	549	331	47	153	161	203	235	274	458	721	952	1232	1394	1394
	50-59歳	74	508	289	28	103	107	165	209	259	479	625	965	1058	1460	1460
	60-69歳	89	591	281	34	106	117	234	286	395	562	730	964	1207	2001	2001
	70歳以上	124	624	312	34	74	98	173	258	434	588	754	1132	1299	1565	2238
	(再掲)20-39歳	83	556	455	60	55	55	83	176	276	414	616	1225	1553	2014	2014
	(再掲)40-64歳	168	539	305	26	103	112	173	233	289	481	717	963	1064	1443	2001
	(再掲)65歳以上	180	616	305	29	74	119	191	266	432	568	753	1103	1291	1369	2238
女性	(再掲)20歳以上※1	431	567	362	28	55	74	162	213	316	495	713	1029	1303	2009	2238
	(再掲)20歳以上※2	431	567	359	26	55	74	162	212	323	499	711	1029	1292	2008	2238
	20-29歳	40	528	363	87	58	58	127	206	333	461	541	1046	1454	1769	1769
	30-39歳	92	455	241	39	63	63	164	211	261	457	563	873	1046	1062	1062
	40-49歳	71	469	279	48	85	85	103	158	277	403	553	918	963	1770	1770
	50-59歳	73	566	240	35	111	129	187	251	437	551	695	757	1095	1462	1462
	60-69歳	108	535	226	24	111	124	189	241	388	536	681	824	918	1347	1351
	70歳以上	151	609	301	40	74	168	208	254	418	538	764	1043	1200	1600	1649
	(再掲)20-39歳	92	484	297	44	58	60	140	223	277	462	539	930	1055	1769	1769
	(再掲)40-64歳	184	527	254	29	85	85	158	225	352	510	686	815	967	1342	1770
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。 <p>注2) P1はパーセンタイルを表す。</p>	(再掲)65歳以上	219	585	286	29	74	153	200	252	408	538	737	965	1149	1536	1649
	(再掲)20歳以上※1	495	532	280	16	58	93	173	229	330	491	653	910	1054	1531	1770
	(再掲)20歳以上※2	495	530	279	17	58	95	173	229	327	491	651	908	1052	1529	1770

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

マグネシウム(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	250	98	20	49	50	107	140	207	241	284	381	466	548	548
	30-39歳	100	214	78	14	56	58	93	120	172	200	259	335	357	489	490
	40-49歳	132	240	92	12	67	67	116	125	174	232	289	374	422	519	538
	50-59歳	147	260	89	8	71	93	141	150	201	248	309	395	423	545	581
	60-69歳	197	285	94	9	88	111	138	159	230	286	340	404	448	550	786
	70歳以上	275	282	95	10	66	135	161	172	205	275	344	422	468	533	607
	(再掲)20-39歳	175	229	88	10	49	63	94	123	174	220	269	350	386	502	548
	(再掲)40-64歳	352	258	93	7	67	81	121	148	192	250	306	378	425	521	786
	(再掲)65歳以上	399	282	94	8	66	119	158	171	206	274	344	419	463	532	607
	(再掲)20歳以上※1	926	258	95	6	49	78	122	148	189	248	308	381	438	515	786
(再掲)20歳以上※2	926	258	95	6	49	78	123	145	190	248	308	380	438	515	786	
男性	20-29歳	35	276	117	37	88	88	117	145	207	247	319	470	496	548	548
	30-39歳	48	228	89	20	65	65	82	99	174	234	271	351	380	490	490
	40-49歳	61	263	105	18	109	109	117	123	173	256	321	421	442	538	538
	50-59歳	74	258	85	11	71	75	143	149	202	248	328	394	397	517	517
	60-69歳	89	314	105	12	112	112	143	169	248	304	377	440	504	786	786
	70歳以上	124	296	93	11	66	128	166	182	217	293	359	436	464	543	607
	(再掲)20-39歳	83	248	103	16	65	65	90	117	176	241	284	383	495	548	548
	(再掲)40-64歳	168	272	100	9	71	96	121	148	200	266	338	398	438	531	786
	(再掲)65歳以上	180	299	95	9	66	127	162	177	228	295	360	435	464	548	607
	(再掲)20歳以上※1	431	272	102	7	65	79	120	148	205	259	339	416	468	530	786
(再掲)20歳以上※2	431	273	102	7	65	77	120	149	206	259	339	415	468	530	786	
女性	20-29歳	40	229	75	17	49	49	89	130	180	226	266	336	368	392	392
	30-39歳	52	202	66	13	56	56	94	116	169	190	249	289	349	366	366
	40-49歳	71	217	72	12	67	67	86	126	174	218	259	303	364	427	427
	50-59歳	73	262	92	14	96	104	138	150	200	248	300	415	434	581	581
	60-69歳	108	263	79	10	88	97	134	157	207	259	310	355	404	488	498
	70歳以上	151	271	95	12	77	113	160	164	197	254	318	417	469	537	541
	(再掲)20-39歳	92	213	70	11	49	52	103	125	171	210	258	307	355	392	392
	(再掲)40-64歳	184	244	84	10	67	67	125	141	187	242	294	349	422	527	581
	(再掲)65歳以上	219	269	91	9	77	99	157	163	198	255	317	404	455	531	541
	(再掲)20歳以上※1	495	243	85	7	49	72	123	148	183	239	292	357	411	495	581
(再掲)20歳以上※2	495	242	85	7	49	73	123	147	183	236	291	357	407	490	581	

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

リ/(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1130	521	102	241	265	458	643	786	1002	1343	1710	2391	2623
	30-39歳	100	939	319	41	280	280	346	571	745	927	1115	1378	1521	1832
	40-49歳	132	1010	366	41	392	392	538	603	750	976	1159	1646	1805	1934
	50-59歳	147	1013	312	27	236	421	565	652	837	963	1219	1440	1523	2063
	60-69歳	197	1082	308	24	371	501	650	701	881	1075	1243	1465	1590	2237
	70歳以上	275	1076	311	32	206	484	628	708	853	1049	1229	1485	1691	1976
	(再掲)20-39歳	175	1017	423	42	241	275	379	631	768	939	1207	1516	1653	2557
	(再掲)40-64歳	352	1023	328	23	236	427	565	625	807	975	1211	1433	1646	1935
	(再掲)65歳以上	399	1079	315	28	206	484	628	704	861	1055	1233	1505	1674	1997
	(再掲)20歳以上※1	926	1047	367	23	206	326	550	654	802	1007	1227	1511	1676	2433
男性	(再掲)20歳以上※2	926	1047	364	23	206	324	550	657	807	1009	1227	1509	1670	2421
	20-29歳	35	1317	643	202	314	314	473	619	887	1219	1523	2417	2560	2623
	30-39歳	48	1011	385	89	280	280	304	385	779	1029	1323	1523	1557	1835
	40-49歳	61	1092	423	57	479	493	559	592	744	988	1319	1800	1878	1937
	50-59歳	74	1034	304	32	236	297	621	675	849	1019	1221	1341	1491	2438
	60-69歳	89	1193	343	42	371	371	686	777	959	1191	1394	1570	1672	2410
	70歳以上	124	1135	314	40	206	556	687	756	884	1149	1323	1569	1779	2146
	(再掲)20-39歳	83	1136	525	93	280	280	328	461	803	1067	1378	1584	1779	2361
	(再掲)40-64歳	168	1076	353	30	236	455	586	663	836	1030	1253	1559	1810	2288
	(再掲)65歳以上	180	1159	331	36	206	474	689	757	899	1154	1346	1575	1766	2362
女性	(再掲)20歳以上※1	431	1123	416	38	206	290	524	657	857	1083	1336	1585	1835	2542
	(再掲)20歳以上※2	431	1123	412	37	206	289	523	674	866	1090	1334	1574	1835	2539
	20-29歳	40	978	333	77	241	257	394	619	772	918	1150	1507	1628	1757
	30-39歳	92	882	243	43	291	291	620	635	723	823	1062	1243	1360	1521
	40-49歳	71	930	281	41	392	392	501	585	719	928	1080	1267	1416	2347
	50-59歳	73	993	320	50	385	476	537	585	800	904	1174	1483	1533	2006
	60-69歳	108	995	246	25	392	502	608	655	846	967	1147	1300	1374	1939
	70歳以上	151	1027	301	36	347	422	621	665	827	993	1168	1446	1667	1895
	(再掲)20-39歳	92	921	286	40	241	291	487	636	746	849	1084	1311	1515	1757
	(再掲)40-64歳	184	970	291	32	385	391	536	595	776	927	1119	1397	1491	1903
総数	(再掲)65歳以上	219	1017	288	30	347	464	620	667	832	990	1157	1414	1612	1897
	(再掲)20歳以上※1	495	971	289	18	241	349	565	638	783	938	1129	1363	1515	1816
	(再掲)20歳以上※2	495	969	289	18	241	348	565	637	783	934	1127	1363	1516	1811

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

鉄(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	8.0	3.4	0.8	1.2	1.2	2.3	4.3	6.2	7.1	9.9	12.1	15.2	17.3	17.3
	30-39歳	100	7.0	2.7	0.4	2.7	2.7	2.9	4.1	5.2	6.7	8.1	10.3	13.7	16.1	16.1
	40-49歳	132	7.1	2.6	0.3	2.1	2.3	2.9	3.7	5.4	6.8	8.6	10.8	11.9	16.7	18.5
	50-59歳	147	7.9	3.2	0.3	1.7	2.1	4.0	4.5	6.0	7.3	9.3	11.5	11.5	18.9	19.9
	60-69歳	197	8.7	3.1	0.4	3.2	3.4	4.1	4.9	6.4	8.3	10.8	13.2	14.4	16.8	18.2
	70歳以上	275	9.1	3.1	0.3	2.1	3.7	4.6	5.6	6.8	8.2	11.1	13.4	14.7	18.1	19.7
	(再掲)20-39歳	175	7.4	3.1	0.4	1.2	1.7	2.8	4.2	5.4	6.9	8.8	11.2	14.0	16.5	17.3
	(再掲)40-64歳	352	7.8	3.1	0.3	1.7	2.5	3.7	4.2	5.8	7.3	9.5	11.6	13.8	17.5	19.9
	(再掲)65歳以上	399	8.9	3.1	0.2	2.1	3.6	4.6	5.3	6.7	8.2	10.8	13.1	14.7	17.8	19.7
	(再掲)20歳以上※1	926	8.0	3.1	0.3	1.2	2.5	3.6	4.5	6.0	7.5	9.8	12.2	14.2	17.6	19.9
男性	(再掲)20歳以上※2	926	8.0	3.1	0.3	1.2	2.5	3.7	4.5	6.0	7.5	9.8	12.3	14.2	17.6	19.9
	20-29歳	35	8.7	4.0	1.3	2.6	2.6	2.8	4.3	6.2	7.9	11.1	15.2	16.1	16.5	16.5
	30-39歳	48	7.3	3.0	0.6	2.7	2.7	2.7	3.2	5.1	7.1	9.1	10.5	14.3	16.1	16.1
	40-49歳	61	7.8	2.6	0.4	3.0	3.0	3.0	4.5	5.7	7.2	9.9	10.9	12.1	12.7	12.7
	50-59歳	74	7.6	2.6	0.3	1.7	1.8	3.6	4.5	6.0	7.2	9.6	11.3	11.7	14.6	14.6
	60-69歳	89	9.4	3.2	0.5	3.6	3.6	4.3	5.7	6.9	9.0	11.8	14.4	14.7	18.2	18.2
	70歳以上	124	9.4	3.0	0.4	2.1	3.6	4.9	6.1	7.0	9.0	11.7	13.6	14.8	17.3	17.4
	(再掲)20-39歳	83	7.9	3.5	0.6	2.6	2.7	2.7	3.6	5.2	7.3	9.6	13.4	16.2	16.5	16.5
	(再掲)40-64歳	168	8.0	2.9	0.2	1.7	2.3	3.7	4.5	6.1	7.4	10.0	12.0	13.3	14.6	16.2
	(再掲)65歳以上	180	9.4	3.0	0.3	2.1	3.6	5.1	5.7	7.0	9.0	11.6	13.7	14.9	17.1	18.2
女性	(再掲)20歳以上※1	431	8.4	3.2	0.3	1.7	2.6	3.6	4.6	6.3	7.7	10.4	12.8	14.4	16.5	18.2
	(再掲)20歳以上※2	431	8.4	3.2	0.3	1.7	2.6	3.6	4.6	6.3	7.9	10.4	12.8	14.5	16.5	18.2
	20-29歳	40	7.5	2.8	0.7	1.2	1.2	1.8	4.0	6.0	6.9	9.3	11.2	12.1	17.3	17.3
	30-39歳	92	6.7	2.5	0.4	2.8	2.8	3.1	4.4	5.3	6.4	8.1	9.2	13.8	14.1	14.1
	40-49歳	71	6.5	2.5	0.4	2.1	2.1	2.8	3.6	5.1	6.5	7.5	8.9	10.6	18.5	18.5
	50-59歳	73	8.2	3.7	0.7	2.0	2.4	4.1	4.5	5.9	7.5	8.6	13.8	16.7	19.9	19.9
	60-69歳	108	8.1	2.9	0.4	3.2	3.3	4.0	4.4	6.0	7.9	10.1	11.8	13.1	16.9	16.9
	70歳以上	151	8.8	3.2	0.3	2.7	3.7	4.6	5.5	6.5	7.9	10.5	13.1	14.7	19.2	19.7
	(再掲)20-39歳	92	7.0	2.6	0.4	1.2	1.3	3.0	4.4	5.5	6.7	8.1	10.8	12.2	17.3	17.3
	(再掲)40-64歳	184	7.6	3.2	0.4	2.0	2.2	3.7	4.1	5.4	7.3	8.5	11.2	15.1	18.8	19.9
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	8.6	3.1	0.3	2.7	3.3	4.5	5.0	6.5	7.9	10.3	12.6	14.3	18.7	19.7
	(再掲)20歳以上※1	495	7.7	3.1	0.3	1.2	2.1	3.7	4.5	5.6	7.2	9.0	11.8	13.8	17.8	19.9
	(再掲)20歳以上※2	495	7.7	3.1	0.3	1.2	2.1	3.7	4.5	5.6	7.2	8.9	11.8	13.8	17.8	19.9
	(再掲)20歳以上※2	495	7.7	3.1	0.3	1.2	2.1	3.7	4.5	5.6	7.2	8.9	11.8	13.8	17.8	19.9

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

亜鉛(mg)	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	9.3	3.8	0.6	2.3	2.3	4.3	5.0	6.9	8.6	10.4	16.3	16.7	24.4	24.4
	30-39歳	100	7.9	2.4	0.4	2.5	2.5	4.3	5.0	6.3	7.5	9.6	11.1	12.6	16.0	16.0
	40-49歳	132	8.3	3.3	0.4	2.7	2.7	4.1	4.6	6.0	8.0	10.2	12.0	14.1	20.0	20.3
	50-59歳	147	8.2	2.4	0.2	2.6	3.1	4.4	5.5	6.6	8.3	9.7	10.6	12.1	17.9	18.0
	60-69歳	197	8.5	2.8	0.2	3.1	3.4	4.8	5.7	6.8	7.9	10.0	11.8	14.5	18.2	18.9
	70歳以上	275	8.4	3.0	0.2	2.0	3.9	4.5	5.2	6.3	8.0	9.7	11.9	14.2	18.9	20.1
	(再掲)20-39歳	175	8.5	3.1	0.3	2.3	2.5	4.3	5.0	6.6	8.0	9.9	12.0	16.0	18.0	24.4
	(再掲)40-64歳	352	8.3	2.7	0.2	2.6	2.7	4.4	5.2	6.6	8.2	9.7	11.0	12.7	18.1	20.3
	(再掲)65歳以上	399	8.5	3.0	0.2	2.0	3.4	4.4	5.3	6.5	8.0	9.7	12.0	14.3	18.7	20.1
	(再掲)20歳以上※1	926	8.5	3.0	0.2	2.0	2.9	4.4	5.2	6.5	8.1	9.9	11.9	14.2	18.3	24.4
男性	(再掲)20歳以上※2	926	8.5	3.0	0.2	2.0	2.9	4.4	5.2	6.6	8.1	9.9	11.9	14.2	18.1	24.4
	20-29歳	35	10.7	4.5	1.1	4.3	4.3	4.7	5.9	7.5	9.1	13.7	16.7	18.3	24.4	24.4
	30-39歳	48	8.8	2.8	0.6	2.9	2.9	3.8	5.2	7.4	8.6	10.9	12.6	13.9	16.0	16.0
	40-49歳	61	9.2	3.8	0.7	2.7	2.7	4.4	4.6	6.0	8.4	11.7	13.9	18.2	20.3	20.3
	50-59歳	74	8.7	2.2	0.2	2.6	2.8	4.8	6.2	7.2	8.6	9.8	10.8	12.5	17.9	17.9
	60-69歳	89	9.3	2.7	0.3	3.1	3.1	5.8	6.6	7.4	9.2	10.5	11.8	15.4	18.9	18.9
	70歳以上	124	9.2	3.1	0.3	2.0	4.3	5.1	5.6	7.1	8.7	10.8	14.1	15.1	18.5	18.7
	(再掲)20-39歳	83	9.6	3.7	0.4	2.9	2.9	4.3	5.3	7.4	9.0	11.1	15.9	16.6	24.4	24.4
	(再掲)40-64歳	168	9.0	3.0	0.3	2.6	2.9	4.5	5.2	7.0	8.6	10.3	12.0	14.6	19.6	20.3
	(再掲)65歳以上	180	9.3	3.1	0.3	2.0	3.4	5.2	5.8	7.2	8.7	10.9	14.1	14.9	18.7	18.9
女性	(再掲)20歳以上※1	431	9.3	3.3	0.2	2.0	3.2	4.6	5.5	7.2	8.7	10.9	13.5	16.1	19.4	24.4
	(再掲)20歳以上※2	431	9.3	3.2	0.2	2.0	3.3	4.6	5.6	7.2	8.7	10.9	13.5	16.1	19.1	24.4
	20-29歳	40	8.1	2.6	0.5	2.3	2.3	3.2	4.9	6.8	8.3	9.8	10.5	12.5	17.0	17.0
	30-39歳	92	7.2	1.9	0.3	2.5	2.5	4.9	5.0	5.6	7.2	8.4	10.0	10.3	11.9	11.9
	40-49歳	71	7.4	2.2	0.3	2.7	2.7	3.3	4.3	5.9	7.3	9.4	10.2	10.7	13.8	13.8
	50-59歳	73	7.7	2.5	0.3	3.1	3.1	3.9	4.7	5.7	7.1	9.2	10.6	12.1	18.0	18.0
	60-69歳	108	7.9	2.8	0.4	3.4	3.4	4.2	5.4	6.3	7.5	8.6	11.8	14.5	17.9	18.0
	70歳以上	151	7.8	2.7	0.2	3.4	3.4	4.4	4.8	6.0	7.6	8.7	10.8	12.3	18.8	20.1
	(再掲)20-39歳	92	7.6	2.2	0.3	2.3	2.4	4.5	5.0	6.2	7.2	8.9	10.2	10.6	17.0	17.0
	(再掲)40-64歳	184	7.6	2.3	0.2	2.7	2.7	4.1	4.6	6.2	7.4	9.1	10.2	11.3	15.4	18.0
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	7.8	2.8	0.2	3.4	3.4	4.2	4.9	6.1	7.4	8.7	11.0	13.4	18.9	20.1
	(再掲)20歳以上※1	495	7.7	2.5	0.2	2.3	2.7	4.3	5.0	6.1	7.4	9.0	10.4	11.7	17.3	20.1
	(再掲)20歳以上※2	495	7.7	2.5	0.2	2.3	2.7	4.3	5.0	6.1	7.3	9.0	10.4	11.7	17.3	20.1
	(再掲)20歳以上※2	495	7.7	2.5	0.2	2.3	2.7	4.3	5.0	6.1	7.3	9.0	10.4	11.7	17.3	20.1

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

銅(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1.18	0.43	0.09	0.30	0.31	0.49	0.65	0.89	1.12	1.36	1.77	2.13	2.16	2.16
	30-39歳	100	1.03	0.39	0.07	0.31	0.34	0.51	0.59	0.76	0.95	1.25	1.64	1.81	2.11	2.11
	40-49歳	132	1.08	0.38	0.05	0.32	0.38	0.56	0.67	0.81	1.06	1.30	1.48	1.85	2.28	2.28
	50-59歳	147	1.15	0.37	0.03	0.30	0.50	0.60	0.74	0.88	1.07	1.40	1.66	1.84	2.38	2.77
	60-69歳	197	1.27	0.40	0.04	0.47	0.49	0.63	0.77	0.98	1.25	1.54	1.75	1.96	2.65	2.77
	70歳以上	275	1.30	0.43	0.04	0.39	0.52	0.73	0.82	0.96	1.23	1.64	1.96	2.02	2.38	2.70
	(再掲)20-39歳	175	1.09	0.41	0.05	0.30	0.34	0.51	0.63	0.82	1.00	1.32	1.64	2.03	2.15	2.16
	(再掲)40-64歳	352	1.15	0.38	0.03	0.30	0.43	0.60	0.71	0.87	1.10	1.40	1.63	1.83	2.28	2.77
	(再掲)65歳以上	399	1.29	0.43	0.03	0.39	0.53	0.71	0.80	0.96	1.22	1.60	1.90	2.02	2.38	2.71
	(再掲)20歳以上※1	926	1.18	0.41	0.03	0.30	0.45	0.60	0.71	0.88	1.10	1.42	1.76	1.97	2.28	2.77
男性	(再掲)20歳以上※2	926	1.18	0.41	0.03	0.30	0.45	0.60	0.71	0.88	1.10	1.43	1.76	1.97	2.28	2.77
	20-29歳	35	1.31	0.49	0.16	0.62	0.62	0.63	0.74	0.92	1.24	1.61	2.13	2.15	2.16	2.16
	30-39歳	48	1.10	0.41	0.09	0.47	0.47	0.51	0.56	0.81	1.02	1.31	1.75	1.88	2.11	2.11
	40-49歳	61	1.20	0.42	0.09	0.52	0.52	0.72	0.73	0.87	1.19	1.39	1.85	2.28	2.28	2.28
	50-59歳	74	1.15	0.34	0.04	0.30	0.34	0.66	0.75	0.92	1.07	1.40	1.68	1.78	1.95	1.95
	60-69歳	89	1.37	0.41	0.04	0.47	0.47	0.74	0.81	1.08	1.38	1.62	1.80	2.09	2.71	2.71
	70歳以上	124	1.40	0.44	0.05	0.40	0.48	0.76	0.87	1.06	1.35	1.74	1.97	2.05	2.58	2.70
	(再掲)20-39歳	83	1.18	0.45	0.06	0.47	0.47	0.54	0.64	0.83	1.05	1.54	1.82	2.13	2.16	2.16
	(再掲)40-64歳	168	1.22	0.39	0.05	0.30	0.52	0.72	0.74	0.91	1.20	1.43	1.69	1.85	2.28	2.69
	(再掲)65歳以上	180	1.38	0.43	0.04	0.40	0.49	0.77	0.86	1.06	1.34	1.70	1.96	2.13	2.70	2.71
女性	(再掲)20歳以上※1	431	1.25	0.43	0.03	0.30	0.49	0.65	0.75	0.91	1.24	1.56	1.82	2.11	2.30	2.71
	(再掲)20歳以上※2	431	1.26	0.43	0.03	0.30	0.49	0.64	0.75	0.92	1.24	1.56	1.83	2.11	2.32	2.71
	20-29歳	40	1.06	0.33	0.07	0.30	0.30	0.44	0.51	0.89	1.09	1.31	1.44	1.64	1.96	1.96
	30-39歳	92	0.98	0.36	0.07	0.31	0.31	0.55	0.61	0.76	0.93	1.04	1.35	1.78	2.07	2.07
	40-49歳	71	0.97	0.29	0.04	0.32	0.32	0.47	0.62	0.71	1.01	1.17	1.35	1.44	1.64	1.64
	50-59歳	73	1.15	0.41	0.06	0.49	0.49	0.58	0.72	0.84	1.09	1.42	1.71	1.89	2.77	2.77
	60-69歳	108	1.19	0.38	0.05	0.49	0.49	0.55	0.69	0.90	1.17	1.43	1.67	1.90	2.15	2.15
	70歳以上	151	1.23	0.41	0.04	0.39	0.50	0.72	0.77	0.89	1.14	1.48	1.88	2.03	2.30	2.38
	(再掲)20-39歳	92	1.01	0.35	0.05	0.30	0.31	0.48	0.60	0.76	0.95	1.24	1.48	1.66	2.07	2.07
	(再掲)40-64歳	184	1.09	0.36	0.04	0.32	0.40	0.55	0.66	0.81	1.06	1.31	1.56	1.68	2.16	2.77
女性	(再掲)65歳以上	219	1.21	0.41	0.03	0.39	0.52	0.68	0.77	0.89	1.14	1.47	1.87	2.02	2.16	2.38
	(再掲)20歳以上※1	495	1.11	0.38	0.03	0.30	0.38	0.57	0.67	0.83	1.05	1.33	1.62	1.89	2.14	2.77
	(再掲)20歳以上※2	495	1.10	0.38	0.03	0.30	0.38	0.57	0.67	0.83	1.04	1.33	1.60	1.89	2.14	2.77

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ヨウ素(μg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1989	6135	1243	0	0	2	3	7	69	176	7781	17019	28841	28841
	30-39歳	100	690	2370	372	0	0	1	5	26	53	180	1488	3436	13949	13949
	40-49歳	132	744	2405	325	1	1	1	3	17	59	178	1724	4792	13895	13896
	50-59歳	147	3011	7756	1175	0	0	2	9	27	127	413	12552	22728	35949	56075
	60-69歳	197	1633	6901	478	0	1	5	11	28	77	261	3588	5991	46585	96018
	70歳以上	275	2138	6496	638	0	1	3	7	29	75	272	6030	12079	36372	48016
	(再掲)20-39歳	175	1220	4353	578	0	0	2	4	22	61	180	1484	13332	24582	28841
	(再掲)40-64歳	352	1850	5931	556	0	1	2	6	27	83	316	4568	13361	28841	56111
	(再掲)65歳以上	399	2031	6766	562	0	1	4	9	28	68	267	5296	12070	39643	96018
	(再掲)20歳以上※1	926	1626	5655	439	0	0	2	5	26	68	237	2967	12077	28841	96018
男性	(再掲)20歳以上※2	926	1676	5763	457	0	0	3	5	26	69	237	3571	12227	29839	96018
	20-29歳	35	355	1555	205	0	0	0	4	20	62	150	777	1240	12112	12112
	30-39歳	48	658	2367	393	0	0	1	4	26	64	197	1512	3328	13949	13949
	40-49歳	61	854	2620	376	1	1	2	3	17	82	176	1729	6936	13896	13896
	50-59歳	74	2828	6940	1216	0	1	2	5	32	202	819	9292	19951	32908	32908
	60-69歳	89	1308	5301	539	0	0	9	12	28	75	342	3825	5947	56111	56111
	70歳以上	124	2762	7503	802	0	1	3	6	33	83	344	12061	13130	40922	48016
	(再掲)20-39歳	83	535	2068	218	0	0	1	4	26	62	176	1115	1783	13949	13949
	(再掲)40-64歳	168	2013	5958	607	0	1	2	4	23	120	581	5322	12581	32337	56111
	(再掲)65歳以上	180	2191	6617	613	0	1	5	10	30	78	316	6206	12110	39455	48016
女性	(再掲)20歳以上※1	431	1477	5066	318	0	0	3	5	26	82	237	3569	10668	31744	56111
	(再掲)20歳以上※2	431	1536	5213	336	0	0	3	5	27	82	242	3847	11796	32982	56111
	20-29歳	40	3314	7937	2096	1	1	2	3	5	96	273	16861	23044	28841	28841
	30-39歳	92	715	2394	382	0	0	2	8	25	49	163	1368	6092	13944	13944
	40-49歳	71	637	2190	342	1	1	1	3	13	41	234	1556	3205	13891	13891
	50-59歳	73	3192	8531	1301	1	1	2	11	27	70	281	16685	24115	56075	56075
	60-69歳	108	1884	7939	800	1	1	4	10	28	77	240	3594	6026	79057	96018
	70歳以上	151	1628	5512	693	0	1	2	7	27	66	236	4658	9666	33004	36041
	(再掲)20-39歳	92	1772	5503	974	0	0	2	3	22	51	214	3126	16542	28841	28841
	(再掲)40-64歳	184	1688	5917	575	0	1	2	6	27	56	234	1836	15123	28329	56075
女性	(再掲)65歳以上	219	1908	6890	576	0	1	4	8	27	66	242	4869	9727	39025	96018
	(再掲)20歳以上※1	495	1778	6193	570	0	1	2	5	25	59	237	2966	13944	30218	96018
	(再掲)20歳以上※2	495	1818	6279	591	0	1	2	5	25	58	237	2970	15627	29883	96018

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンA(μ gRE)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	528	315	50	20	23	119	182	297	499	654	1052	1240	1472	1472
	30-39歳	100	666	1141	114	12	12	63	111	184	407	571	1202	3563	1110	11255
	40-49歳	132	511	551	34	58	62	119	168	262	422	559	860	1160	5025	6335
	50-59歳	147	468	351	35	58	64	93	123	252	399	538	840	1301	1875	1895
	60-69歳	197	592	438	33	20	102	167	211	327	505	705	1071	1186	2421	4700
	70歳以上	275	609	499	43	28	89	169	215	337	507	753	1096	1545	3235	4626
	(再掲)20-39歳	175	610	902	84	12	12	76	133	240	430	595	1152	1468	4092	11255
	(再掲)40-64歳	352	508	434	20	58	70	113	161	282	440	591	908	1218	1856	6335
	(再掲)65歳以上	399	603	499	34	20	90	169	217	332	496	716	1078	1426	2941	4700
	(再掲)20歳以上※1	926	568	636	29	12	31	111	162	289	451	650	1064	1290	3670	11255
	(再掲)20歳以上※2	926	569	644	31	12	29	111	161	287	451	646	1065	1290	3707	11255
男性	20-29歳	35	645	388	88	20	20	37	224	310	569	820	1271	1337	1472	1472
	30-39歳	48	563	1231	149	12	12	13	65	159	406	559	1099	1880	11255	11255
	40-49歳	61	507	261	33	62	62	133	198	346	485	653	863	1148	1590	1590
	50-59歳	74	445	340	42	58	58	92	112	224	360	518	1026	1294	1803	1803
	60-69歳	89	630	564	67	20	81	193	204	309	561	712	1099	1278	4700	4700
	70歳以上	124	597	494	48	28	33	133	204	338	479	688	1075	1565	3786	4626
	(再掲)20-39歳	83	596	975	86	12	12	21	78	235	437	632	1154	1321	11255	11255
	(再掲)40-64歳	168	494	310	25	58	61	108	146	302	423	653	908	1193	1553	1803
	(再掲)65歳以上	180	613	547	42	20	39	164	217	337	475	708	1096	1565	4627	4700
	(再掲)20歳以上※1	431	564	656	33	12	13	91	148	295	445	659	1150	1290	2506	11255
	(再掲)20歳以上※2	431	565	665	34	12	13	91	147	293	444	658	1150	1291	2510	11255
	20-29歳	40	433	199	49	71	71	136	174	249	421	565	701	813	1001	1001
女性	30-39歳	92	749	1067	208	56	56	111	126	236	416	649	2250	3850	4131	4131
	40-49歳	71	515	733	60	58	63	114	144	234	386	527	862	1273	6335	6335
	50-59歳	73	490	362	55	75	76	100	153	264	456	579	843	1468	1895	1895
	60-69歳	108	563	305	44	103	105	48	249	343	505	685	1065	1156	1979	2942
	70歳以上	151	619	505	50	86	96	181	214	332	510	765	1108	1468	3842	4564
	(再掲)20-39歳	92	621	843	136	56	62	111	139	241	421	587	901	3539	4131	4131
	(再掲)40-64歳	184	521	530	37	58	80	116	158	261	455	582	909	1272	3384	6335
	(再掲)65歳以上	219	596	459	39	86	102	168	216	329	506	731	1074	1415	2873	4564
	(再掲)20歳以上※1	495	573	615	42	56	81	121	173	284	460	634	963	1291	3929	6335
	(再掲)20歳以上※2	495	574	623	46	56	81	121	173	283	460	620	963	1293	3927	6335

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンD(μg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	8.4	9.1	2.5	0.2	0.2	0.6	1.1	1.5	4.4	10.5	24.7	29.7	30.2	30.2
	30-39歳	100	4.2	6.2	0.7	0.0	0.0	0.3	0.6	1.0	2.2	4.3	8.9	19.5	51.2	51.7
	40-49歳	132	7.1	8.9	1.0	0.2	0.2	0.8	1.1	2.0	3.5	8.3	16.1	28.4	42.8	44.1
	50-59歳	147	6.9	7.3	0.6	0.0	0.0	0.5	0.9	1.5	4.7	9.3	18.2	24.3	33.2	33.4
	60-69歳	197	9.0	8.8	1.0	0.4	0.6	1.0	1.4	2.2	6.1	12.7	23.6	29.9	35.2	66.0
	70歳以上	275	7.7	7.4	0.8	0.0	0.2	0.9	1.1	2.3	4.9	11.2	19.2	24.9	30.3	38.1
	(再掲)20-39歳	175	5.9	7.8	0.8	0.0	0.0	0.4	0.7	1.3	2.9	6.4	19.0	24.7	30.1	51.7
	(再掲)40-64歳	352	7.3	8.4	0.8	0.0	0.2	0.7	1.0	1.8	3.8	8.9	20.0	25.2	36.5	66.0
	(再掲)65歳以上	399	8.2	7.6	0.7	0.0	0.3	0.9	1.3	2.4	5.6	11.5	19.5	25.5	33.3	38.1
	(再掲)20歳以上※1	926	7.2	8.1	0.6	0.0	0.1	0.6	1.0	1.8	3.9	9.6	19.3	25.2	33.9	66.0
男性	(再掲)20歳以上※2	926	7.2	8.1	0.5	0.0	0.0	0.6	1.0	1.8	3.9	9.6	19.4	24.9	33.8	66.0
	20-29歳	35	9.1	10.5	3.4	0.2	0.2	0.3	1.1	1.4	4.0	13.1	29.8	30.0	30.2	30.2
	30-39歳	48	3.8	4.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.3	5.5	8.4	16.7	24.0	24.0
	40-49歳	61	8.9	11.0	1.9	0.3	0.3	0.6	1.1	2.5	3.9	12.2	27.2	34.6	44.1	44.1
	50-59歳	74	7.2	7.4	0.8	0.0	0.1	0.5	0.9	1.6	4.3	10.6	19.6	23.5	33.4	33.4
	60-69歳	89	9.7	8.9	1.6	0.4	0.4	0.9	1.1	2.1	6.8	13.9	24.5	28.8	35.8	35.8
	70歳以上	124	8.5	7.6	0.8	0.0	0.6	1.0	1.4	2.4	6.0	12.4	21.7	23.9	35.3	38.1
	(再掲)20-39歳	83	6.0	7.9	1.3	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	3.0	6.5	18.3	29.7	30.2	30.2
	(再掲)40-64歳	168	8.5	9.7	1.3	0.0	0.2	0.5	1.0	1.9	4.0	12.2	24.2	33.1	41.7	44.1
	(再掲)65歳以上	180	8.7	7.4	0.8	0.0	0.6	1.0	1.4	2.5	6.1	12.6	19.6	23.8	32.4	38.1
女性	(再掲)20歳以上※1	431	7.8	8.7	0.8	0.0	0.0	0.5	1.0	1.8	4.0	10.6	20.7	29.5	35.1	44.1
	(再掲)20歳以上※2	431	7.7	8.5	0.8	0.0	0.0	0.5	1.0	1.8	4.0	10.6	20.6	29.2	33.9	44.1
	20-29歳	40	7.8	7.9	2.1	0.3	0.3	1.0	1.1	2.0	4.4	10.2	24.7	24.8	27.6	27.6
	30-39歳	92	4.5	7.4	1.0	0.4	0.4	0.6	0.6	1.1	2.2	4.3	12.5	21.2	51.7	51.7
	40-49歳	71	5.4	5.7	0.6	0.2	0.2	0.8	1.1	1.6	2.9	7.0	13.6	19.2	34.7	34.7
	50-59歳	73	6.7	7.2	1.1	0.0	0.0	0.2	0.8	1.4	4.7	8.7	17.9	24.4	33.1	33.1
	60-69歳	108	8.4	8.8	1.0	0.6	0.6	1.0	1.5	2.4	6.0	10.6	21.8	30.4	56.1	66.0
	70歳以上	151	7.1	7.2	1.0	0.2	0.2	0.8	1.0	2.1	4.4	10.1	18.3	25.7	29.8	34.3
	(再掲)20-39歳	92	5.9	7.7	0.7	0.3	0.4	0.6	0.7	1.4	2.8	6.5	21.0	24.7	51.7	51.7
	(再掲)40-64歳	184	6.1	6.8	0.5	0.0	0.0	0.8	1.0	1.8	3.4	7.3	15.4	23.9	30.7	66.0
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	7.8	7.8	0.8	0.2	0.2	0.9	1.2	2.3	4.9	10.3	19.2	26.6	34.7	35.2
	(再掲)20歳以上※1	495	6.7	7.5	0.4	0.0	0.2	0.7	1.0	1.8	3.5	8.7	17.6	24.8	33.3	66.0
	(再掲)20歳以上※2	495	6.6	7.5	0.4	0.0	0.2	0.6	1.0	1.8	3.4	8.7	17.8	24.8	33.4	66.0
	(再掲)20歳以上※2	495	6.6	7.5	0.4	0.0	0.2	0.6	1.0	1.8	3.4	8.7	17.8	24.8	33.4	66.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンE(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	7.2	3.2	0.6	1.4	1.5	2.5	3.5	4.3	7.2	9.2	11.6	12.8	16.4	16.4
	30-39歳	100	6.0	4.4	0.6	0.5	0.5	1.4	2.0	3.8	5.1	6.7	9.3	16.5	30.2	30.3
	40-49歳	132	6.3	2.7	0.3	1.3	1.4	2.5	3.2	4.3	5.9	8.0	9.5	11.8	16.4	19.2
	50-59歳	147	7.0	3.3	0.5	1.9	1.9	2.4	3.2	4.7	6.4	8.7	12.8	14.1	16.2	20.4
	60-69歳	197	8.1	3.5	0.3	1.3	1.9	2.7	3.8	5.8	7.3	10.4	13.3	14.8	17.9	16.9
	70歳以上	275	7.8	3.5	0.3	1.2	2.0	3.3	4.1	5.2	7.4	9.4	12.7	15.5	18.2	19.4
	(再掲)20-39歳	175	6.5	4.0	0.4	0.5	0.6	1.9	2.5	4.1	5.5	8.1	11.0	13.7	23.3	30.3
	(再掲)40-64歳	352	7.0	3.3	0.3	1.3	1.9	2.5	3.3	4.6	6.5	8.7	11.7	13.9	16.4	19.2
	(再掲)65歳以上	399	7.8	3.4	0.2	1.2	2.1	3.3	4.0	5.3	7.3	9.6	12.7	14.8	17.9	20.9
	(再掲)20歳以上※1	926	7.1	3.6	0.2	0.5	1.3	2.4	3.3	4.5	6.6	8.8	11.9	14.1	17.8	30.3
男性	(再掲)20歳以上※2	926	7.1	3.6	0.3	0.5	1.3	2.4	3.2	4.5	6.6	8.8	11.9	14.1	17.8	30.3
	20-29歳	35	7.9	3.5	0.9	1.4	1.4	3.1	3.7	5.1	8.0	10.1	12.1	15.1	16.4	16.4
	30-39歳	48	6.4	5.4	0.9	0.5	0.5	0.7	2.0	3.8	4.9	7.7	9.9	17.9	30.3	30.3
	40-49歳	61	6.8	2.5	0.5	1.4	2.2	3.5	3.9	4.7	6.8	8.3	10.8	11.9	12.2	12.2
	50-59歳	74	6.8	2.8	0.4	1.9	1.9	2.1	3.6	5.1	6.4	7.9	10.5	12.3	14.8	14.8
	60-69歳	89	8.4	3.6	0.4	1.3	1.8	2.7	3.5	6.0	8.0	10.5	13.9	14.9	17.9	17.9
	70歳以上	124	8.0	3.5	0.3	1.2	2.1	3.3	4.1	5.9	7.4	9.9	12.7	15.9	17.4	17.8
	(再掲)20-39歳	83	7.0	4.7	0.5	0.5	0.5	1.0	2.9	4.1	5.9	8.6	11.8	15.7	30.3	30.3
	(再掲)40-64歳	168	7.2	3.1	0.4	1.4	1.9	2.6	3.9	5.1	6.8	8.9	11.8	14.5	17.5	17.9
	(再掲)65歳以上	180	8.0	3.4	0.3	1.2	2.1	3.3	4.1	5.6	7.3	9.9	12.7	15.4	17.0	17.8
女性	(再掲)20歳以上※1	431	7.4	3.8	0.3	0.5	0.7	2.6	3.5	4.9	6.8	9.1	12.1	14.7	18.0	30.3
	(再掲)20歳以上※2	431	7.4	3.8	0.3	0.5	0.7	2.6	3.4	4.9	6.8	9.2	12.1	14.8	18.0	30.3
	20-29歳	40	6.6	3.0	0.7	1.5	1.6	2.2	2.9	4.0	6.4	9.0	10.3	11.8	14.8	14.8
	30-39歳	92	5.6	3.3	0.5	1.2	1.2	1.7	1.9	4.0	5.2	6.4	9.1	16.6	17.1	17.1
	40-49歳	71	5.7	2.8	0.3	1.3	1.3	2.3	2.8	3.6	5.2	6.8	9.4	10.9	19.2	19.2
	50-59歳	73	7.2	3.8	0.8	2.1	2.1	2.4	2.9	4.0	6.4	8.7	13.3	14.6	16.4	16.4
	60-69歳	108	7.8	3.3	0.4	2.2	2.2	2.7	3.8	5.7	7.0	10.3	12.6	14.2	20.0	20.9
	70歳以上	151	7.7	3.4	0.4	1.2	1.9	3.4	4.0	4.9	7.3	9.2	12.7	14.9	18.9	19.4
	(再掲)20-39歳	92	6.0	3.2	0.4	1.2	1.5	1.8	2.1	4.1	5.2	7.3	9.7	13.2	17.1	17.1
	(再掲)40-64歳	184	6.7	3.4	0.4	1.3	1.5	2.3	2.9	4.0	6.2	8.6	12.0	13.9	16.4	19.2
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	7.7	3.4	0.3	1.2	2.1	3.4	4.0	5.2	7.3	9.3	12.7	14.7	18.6	20.9
	(再掲)20歳以上※1	495	6.8	3.4	0.3	1.2	1.6	2.3	3.0	4.4	6.3	8.6	11.4	13.9	16.9	20.9
	(再掲)20歳以上※2	495	6.8	3.4	0.3	1.2	1.6	2.2	3.0	4.3	6.2	8.6	11.4	13.9	16.9	20.9
	(再掲)20歳以上※2	495	6.8	3.4	0.3	1.2	1.6	2.2	3.0	4.3	6.2	8.6	11.4	13.9	16.9	20.9

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンK(μg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	252	155	32	9	11	47	68	130	231	323	450	594	656	656
	30-39歳	100	211	160	28	9	9	34	59	114	149	265	440	547	946	949
	40-49歳	132	206	140	17	19	19	30	61	101	168	282	433	512	622	709
	50-59歳	147	246	167	13	15	27	55	62	118	208	329	498	604	805	864
	60-69歳	197	312	208	18	2	12	60	81	135	266	458	550	649	1041	1247
	70歳以上	275	305	204	20	22	26	51	83	145	253	427	598	654	1004	1358
	(再掲)20-39歳	175	227	159	14	9	9	35	66	122	169	309	447	565	724	949
	(再掲)40-64歳	352	245	171	12	15	17	48	63	116	206	341	473	547	814	1123
	(再掲)65歳以上	399	305	205	15	2	34	54	82	144	252	447	585	653	1001	1358
	(再掲)20歳以上※1	926	258	183	10	2	16	47	68	121	210	362	512	608	817	1358
男性	(再掲)20歳以上※2	926	258	182	10	2	16	47	68	122	211	363	512	606	817	1358
	20-29歳	35	287	188	54	9	9	51	70	132	230	441	568	609	656	656
	30-39歳	48	201	179	43	9	9	14	35	80	135	263	437	575	949	949
	40-49歳	61	238	160	24	30	30	30	71	121	197	340	498	598	709	709
	50-59歳	74	249	184	21	15	25	54	60	105	195	345	539	616	819	819
	60-69歳	89	319	215	23	2	26	67	82	130	326	437	550	802	1247	1247
	70歳以上	124	294	196	20	25	25	43	79	145	244	433	588	645	1181	1358
	(再掲)20-39歳	83	236	186	21	9	9	21	51	113	166	338	518	610	949	949
	(再掲)40-64歳	168	266	184	16	15	19	51	70	123	211	394	513	613	818	1021
	(再掲)65歳以上	180	292	201	16	2	25	47	80	140	241	437	568	645	1092	1358
女性	(再掲)20歳以上※1	431	263	190	10	2	12	43	69	121	210	398	529	614	826	1358
	(再掲)20歳以上※2	431	264	192	10	2	11	43	68	121	211	400	533	614	837	1358
	20-29歳	40	223	118	21	12	12	19	66	130	232	313	392	440	575	575
	30-39歳	92	218	145	24	36	36	44	83	117	168	270	489	548	665	665
	40-49歳	71	174	109	22	19	19	41	55	85	133	247	334	404	511	511
	50-59歳	73	244	150	19	34	34	50	62	126	221	323	434	570	864	864
	60-69歳	108	307	203	23	17	17	57	78	142	254	462	551	630	1106	1123
	70歳以上	151	315	210	23	22	25	55	76	145	283	426	597	721	1043	1103
	(再掲)20-39歳	92	220	134	14	12	13	43	82	129	177	304	427	533	665	665
	(再掲)40-64歳	184	225	155	20	17	17	43	62	110	192	313	435	497	868	1123
女性	(再掲)65歳以上	219	314	207	18	22	32	57	83	145	278	455	591	720	1015	1103
	(再掲)20歳以上※1	495	254	175	13	12	16	49	66	121	211	345	493	584	859	1123
	(再掲)20歳以上※2	495	252	173	13	12	16	49	67	124	210	343	488	568	834	1123

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンB1(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.99	0.45	0.09	0.27	0.28	0.42	0.49	0.68	0.90	1.16	1.86	2.00	2.65	2.65
	30-39歳	100	0.84	0.33	0.03	0.08	0.15	0.28	0.45	0.60	0.86	0.98	1.26	1.39	2.05	2.05
	40-49歳	132	0.91	0.50	0.07	0.29	0.29	0.39	0.42	0.57	0.74	1.09	1.59	1.96	2.60	2.65
	50-59歳	147	0.95	0.46	0.04	0.27	0.30	0.42	0.52	0.68	0.87	1.11	1.39	1.73	2.88	2.91
	60-69歳	197	0.98	0.41	0.04	0.23	0.31	0.46	0.53	0.81	0.91	1.21	1.43	1.78	2.42	2.49
	70歳以上	275	0.96	0.38	0.04	0.27	0.37	0.49	0.56	0.69	0.87	1.11	1.45	1.72	2.24	2.59
	(再掲)20-39歳	175	0.90	0.39	0.04	0.08	0.20	0.39	0.47	0.66	0.86	1.11	1.35	1.87	2.22	2.65
	(再掲)40-64歳	352	0.93	0.46	0.04	0.27	0.30	0.42	0.49	0.64	0.82	1.10	1.39	1.95	2.75	2.91
	(再掲)65歳以上	399	0.97	0.40	0.03	0.23	0.32	0.48	0.56	0.69	0.88	1.15	1.46	1.83	2.34	2.59
	(再掲)20歳以上※1	926	0.94	0.43	0.03	0.08	0.25	0.42	0.49	0.66	0.87	1.12	1.40	1.90	2.61	2.91
男性	(再掲)20歳以上※2	926	0.94	0.43	0.02	0.08	0.25	0.42	0.49	0.66	0.87	1.12	1.40	1.88	2.60	2.91
	20-29歳	35	1.14	0.55	0.16	0.37	0.37	0.41	0.53	0.72	0.94	1.50	2.00	2.08	2.65	2.65
	30-39歳	48	0.92	0.39	0.05	0.18	0.18	0.24	0.34	0.72	0.91	1.18	1.36	1.64	2.05	2.05
	40-49歳	61	1.01	0.58	0.06	0.30	0.33	0.42	0.42	0.57	0.80	1.27	1.67	2.30	2.65	2.65
	50-59歳	74	1.00	0.53	0.07	0.28	0.29	0.40	0.55	0.74	0.91	1.11	1.41	2.37	2.91	2.91
	60-69歳	89	1.08	0.44	0.06	0.23	0.23	0.46	0.53	0.79	0.99	1.32	1.45	2.02	2.49	2.49
	70歳以上	124	0.98	0.38	0.04	0.27	0.35	0.52	0.57	0.70	0.89	1.10	1.42	1.78	2.45	2.54
	(再掲)20-39歳	83	1.01	0.47	0.07	0.18	0.19	0.27	0.42	0.72	0.93	1.21	1.90	2.05	2.65	2.65
	(再掲)40-64歳	168	1.01	0.52	0.05	0.28	0.30	0.42	0.50	0.71	0.92	1.24	1.45	2.22	2.87	2.91
	(再掲)65歳以上	180	1.01	0.41	0.04	0.23	0.26	0.47	0.57	0.73	0.91	1.18	1.48	2.00	2.49	2.54
女性	(再掲)20歳以上※1	431	1.01	0.48	0.03	0.18	0.24	0.41	0.49	0.72	0.92	1.21	1.58	2.05	2.67	2.91
	(再掲)20歳以上※2	431	1.01	0.47	0.03	0.18	0.24	0.41	0.49	0.72	0.92	1.21	1.55	2.05	2.68	2.91
	20-29歳	40	0.86	0.31	0.06	0.27	0.27	0.42	0.48	0.63	0.80	1.11	1.25	1.33	2.22	2.22
	30-39歳	92	0.77	0.27	0.03	0.08	0.08	0.42	0.47	0.59	0.81	0.92	1.06	1.39	2.02	2.02
	40-49歳	71	0.81	0.40	0.09	0.29	0.29	0.37	0.41	0.57	0.69	0.98	1.20	1.75	1.99	1.99
	50-59歳	73	0.91	0.37	0.04	0.27	0.28	0.42	0.52	0.66	0.82	1.14	1.35	1.66	2.23	2.23
	60-69歳	108	0.91	0.36	0.05	0.29	0.32	0.45	0.50	0.66	0.86	1.06	1.40	1.49	2.24	2.26
	70歳以上	151	0.94	0.39	0.04	0.32	0.36	0.47	0.54	0.65	0.85	1.14	1.48	1.76	2.35	2.59
	(再掲)20-39歳	92	0.81	0.29	0.03	0.08	0.26	0.42	0.47	0.60	0.81	0.93	1.20	1.33	2.22	2.22
	(再掲)40-64歳	184	0.86	0.37	0.04	0.27	0.28	0.38	0.46	0.63	0.79	1.02	1.34	1.65	2.12	2.23
女性	(再掲)65歳以上	219	0.94	0.39	0.04	0.32	0.34	0.48	0.54	0.66	0.85	1.14	1.46	1.71	2.25	2.59
	(再掲)20歳以上※1	495	0.87	0.36	0.02	0.08	0.29	0.42	0.48	0.63	0.81	1.05	1.35	1.53	2.22	2.59
	(再掲)20歳以上※2	495	0.87	0.36	0.02	0.08	0.29	0.42	0.48	0.63	0.81	1.05	1.34	1.50	2.22	2.59

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンB2(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1.35	0.65	0.11	0.17	0.17	0.39	0.71	0.87	1.18	1.72	2.55	2.82	2.88	2.88
	30-39歳	100	1.10	0.53	0.05	0.29	0.31	0.36	0.59	0.77	1.06	1.28	1.60	1.94	3.65	3.65
	40-49歳	132	1.14	0.50	0.06	0.43	0.44	0.49	0.58	0.78	1.01	1.43	1.86	2.25	2.57	3.05
	50-59歳	147	1.19	0.50	0.04	0.29	0.31	0.48	0.68	0.85	1.13	1.39	1.80	2.24	2.79	2.82
	60-69歳	197	1.24	0.46	0.04	0.33	0.34	0.60	0.67	0.94	1.15	1.53	1.80	2.12	2.66	3.27
	70歳以上	275	1.42	0.57	0.06	0.32	0.40	0.73	0.83	0.99	1.29	1.69	2.14	2.45	3.57	3.98
	(再掲)20-39歳	175	1.20	0.60	0.03	0.17	0.22	0.36	0.59	0.80	1.11	1.43	1.93	2.55	3.42	3.65
	(再掲)40-64歳	352	1.17	0.48	0.02	0.29	0.40	0.50	0.64	0.82	1.12	1.41	1.82	2.19	2.73	3.05
	(再掲)65歳以上	399	1.38	0.56	0.05	0.32	0.40	0.65	0.80	0.97	1.28	1.67	2.10	2.41	3.30	3.98
	(再掲)20歳以上※1	926	1.25	0.55	0.02	0.17	0.33	0.51	0.67	0.87	1.15	1.51	1.95	2.27	2.88	3.98
男性	(再掲)20歳以上※2	926	1.24	0.55	0.02	0.17	0.33	0.51	0.67	0.87	1.15	1.50	1.95	2.27	2.88	3.98
	20-29歳	35	1.48	0.76	0.23	0.25	0.25	0.46	0.67	0.81	1.36	1.85	2.74	2.83	2.88	2.88
	30-39歳	48	1.09	0.49	0.08	0.29	0.29	0.35	0.36	0.73	1.10	1.32	1.89	1.96	3.13	3.13
	40-49歳	61	1.23	0.55	0.07	0.43	0.43	0.58	0.58	0.81	1.07	1.64	1.93	2.35	2.65	2.65
	50-59歳	74	1.21	0.56	0.07	0.30	0.31	0.50	0.64	0.84	1.13	1.36	2.05	2.73	2.82	2.82
	60-69歳	89	1.31	0.46	0.06	0.33	0.33	0.65	0.74	1.06	1.20	1.56	1.84	2.08	3.27	3.27
	70歳以上	124	1.42	0.54	0.06	0.48	0.56	0.81	0.84	0.94	1.31	1.66	2.23	2.49	3.12	3.29
	(再掲)20-39歳	83	1.25	0.64	0.08	0.25	0.25	0.36	0.52	0.76	1.13	1.61	2.07	2.73	3.13	3.13
	(再掲)40-64歳	168	1.22	0.52	0.04	0.30	0.37	0.58	0.64	0.83	1.14	1.47	1.88	2.37	2.78	2.82
	(再掲)65歳以上	180	1.41	0.53	0.05	0.33	0.42	0.75	0.84	0.98	1.30	1.66	2.22	2.48	3.18	3.29
女性	(再掲)20歳以上※1	431	1.28	0.57	0.04	0.25	0.31	0.50	0.69	0.88	1.18	1.59	1.99	2.48	2.87	3.29
	(再掲)20歳以上※2	431	1.29	0.57	0.04	0.25	0.31	0.50	0.69	0.91	1.18	1.58	1.99	2.49	2.87	3.29
	20-29歳	40	1.23	0.54	0.11	0.17	0.17	0.35	0.77	0.88	1.16	1.47	2.05	2.38	2.79	2.79
	30-39歳	92	1.10	0.57	0.09	0.31	0.31	0.55	0.59	0.78	1.04	1.25	1.55	2.09	3.65	3.65
	40-49歳	71	1.06	0.45	0.07	0.46	0.46	0.48	0.60	0.76	0.96	1.40	1.74	2.06	3.05	3.05
	50-59歳	73	1.17	0.43	0.04	0.29	0.36	0.48	0.70	0.85	1.13	1.41	1.82	2.18	2.46	2.46
	60-69歳	108	1.18	0.46	0.06	0.34	0.34	0.59	0.66	0.88	1.08	1.42	1.84	2.18	2.51	2.52
	70歳以上	151	1.41	0.59	0.07	0.32	0.36	0.59	0.76	1.04	1.28	1.69	2.07	2.35	3.86	3.98
	(再掲)20-39歳	92	1.16	0.56	0.07	0.17	0.19	0.44	0.59	0.81	1.09	1.29	1.85	2.15	3.65	3.65
	(再掲)40-64歳	184	1.12	0.43	0.03	0.29	0.35	0.48	0.65	0.80	1.06	1.41	1.66	2.04	2.46	3.05
女性	(再掲)65歳以上	219	1.35	0.57	0.06	0.32	0.38	0.60	0.74	0.95	1.24	1.67	2.07	2.29	3.71	3.98
	(再掲)20歳以上※1	495	1.21	0.53	0.03	0.17	0.34	0.51	0.66	0.85	1.12	1.44	1.88	2.16	3.46	3.98
	(再掲)20歳以上※2	495	1.20	0.52	0.03	0.17	0.34	0.51	0.66	0.85	1.12	1.43	1.88	2.16	3.50	3.98
	(再掲)20歳以上※2	495	1.20	0.52	0.03	0.17	0.34	0.51	0.66	0.85	1.12	1.43	1.88	2.16	3.50	3.98

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ナイン(mgNE)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	16.1	7.1	1.2	3.9	4.5	6.3	8.5	10.8	13.9	19.7	26.0	26.3	39.1	39.1
	30-39歳	100	13.8	7.2	0.9	3.3	3.3	5.6	6.9	10.3	11.8	16.2	22.5	34.2	36.3	36.3
	40-49歳	132	16.5	7.4	0.7	4.5	4.5	7.2	8.6	10.9	14.3	21.5	27.2	31.3	35.3	35.6
	50-59歳	147	15.6	7.1	0.7	4.0	5.5	6.5	7.6	10.3	14.8	19.3	25.8	28.4	40.7	41.4
	60-69歳	197	17.8	8.2	0.7	3.3	6.3	9.5	10.4	12.3	16.0	21.5	26.8	33.1	52.3	68.2
	70歳以上	275	16.1	6.7	0.7	3.1	5.3	7.3	8.8	11.0	15.4	19.7	25.1	26.9	34.5	59.3
	(再掲)20-39歳	175	14.7	7.2	0.8	3.3	3.3	5.6	7.0	10.5	12.6	18.7	24.4	31.7	37.2	39.1
	(再掲)40-64歳	352	16.1	6.9	0.4	4.0	4.8	6.6	8.4	11.1	14.9	20.5	25.7	29.0	38.2	41.4
	(再掲)65歳以上	399	16.8	7.6	0.7	3.1	5.3	7.7	8.9	11.5	15.5	20.6	26.1	29.2	43.6	68.2
	(再掲)20歳以上※1	926	16.1	7.5	0.5	3.1	4.0	6.8	8.4	11.0	14.6	20.0	26.2	30.6	39.1	68.2
男性	(再掲)20歳以上※2	926	16.1	7.5	0.5	3.1	4.0	6.7	8.4	11.0	14.6	19.8	26.1	30.5	39.1	68.2
	20-29歳	35	17.5	8.9	2.5	5.0	5.0	5.4	7.5	10.8	13.7	24.7	27.2	37.2	39.1	39.1
	30-39歳	48	16.2	9.5	2.1	3.3	3.3	3.5	5.6	10.0	14.3	20.6	34.4	35.6	36.3	36.3
	40-49歳	61	19.1	8.4	1.1	6.4	6.4	7.5	9.0	12.0	17.5	25.9	31.4	33.7	35.6	35.6
	50-59歳	74	17.1	7.6	1.1	4.0	4.8	7.6	8.4	11.8	15.2	22.0	27.6	29.5	41.4	41.4
	60-69歳	89	20.7	9.8	1.3	3.3	3.3	9.7	11.2	14.6	18.5	24.0	31.9	37.4	68.2	68.2
	70歳以上	124	17.2	6.6	0.8	3.1	5.8	7.2	9.1	13.4	16.9	20.5	25.3	28.5	50.2	56.7
	(再掲)20-39歳	83	16.7	9.2	1.8	3.3	3.3	3.8	6.3	10.3	13.7	23.5	34.1	35.9	39.1	39.1
	(再掲)40-64歳	168	18.0	7.5	0.7	4.0	6.4	8.4	9.2	12.1	16.6	22.4	28.4	31.9	39.7	41.4
	(再掲)65歳以上	180	18.5	8.5	0.8	3.1	5.4	7.3	9.1	13.8	17.0	22.3	27.6	32.8	60.0	68.2
女性	(再掲)20歳以上※1	431	18.0	8.6	0.7	3.1	3.4	6.9	8.6	11.8	16.6	23.0	29.2	34.2	41.1	68.2
	(再掲)20歳以上※2	431	17.9	8.6	0.7	3.1	3.3	6.8	8.4	11.8	16.6	22.9	28.9	34.1	41.1	68.2
	20-29歳	40	14.9	5.0	0.9	3.9	4.1	6.6	9.1	10.7	14.4	18.9	21.4	24.0	26.0	26.0
	30-39歳	92	11.8	3.5	0.4	5.2	5.2	6.7	6.8	10.4	11.8	13.4	15.7	18.6	31.2	31.2
	40-49歳	71	13.9	5.1	0.9	4.5	4.5	5.1	7.3	10.3	13.4	17.6	21.6	22.6	24.8	24.8
	50-59歳	73	14.1	6.4	0.8	4.7	5.2	5.9	6.5	9.3	13.5	17.7	20.6	27.5	38.3	38.3
	60-69歳	108	15.6	5.9	0.8	6.6	6.8	9.2	9.9	11.3	14.7	18.1	22.1	27.4	39.2	39.5
	70歳以上	151	15.2	6.6	0.9	3.3	4.9	7.4	8.6	9.7	14.1	19.5	24.8	26.7	37.9	59.3
	(再掲)20-39歳	92	13.1	4.4	0.5	3.9	4.9	6.7	7.2	10.6	12.6	15.1	19.1	21.4	31.2	31.2
	(再掲)40-64歳	184	14.1	5.6	0.5	4.5	4.5	6.3	7.2	10.0	13.5	17.5	21.5	23.9	32.3	38.3
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	219	15.4	6.6	0.7	3.3	5.1	7.9	8.8	10.4	14.2	19.3	24.8	26.7	38.3	59.3
	(再掲)20歳以上※1	495	14.3	5.7	0.4	3.3	4.8	6.6	7.9	10.4	13.4	17.5	21.7	24.8	32.6	59.3
	(再掲)20歳以上※2	495	14.3	5.7	0.4	3.3	4.9	6.6	7.8	10.4	13.4	17.4	21.5	24.8	32.8	59.3
	(再掲)20歳以上※2	495	14.3	5.7	0.4	3.3	4.9	6.6	7.8	10.4	13.4	17.4	21.5	24.8	32.8	59.3

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンB6(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1.28	0.60	0.14	0.32	0.32	0.43	0.55	0.85	1.23	1.73	1.91	2.57	2.79	2.79
	30-39歳	100	1.00	0.40	0.06	0.35	0.35	0.48	0.56	0.68	0.93	1.16	1.63	1.79	2.45	2.46
	40-49歳	132	1.20	0.64	0.07	0.27	0.27	0.49	0.57	0.82	1.12	1.46	1.81	2.01	4.31	4.42
	50-59歳	147	1.17	0.40	0.04	0.31	0.41	0.54	0.65	0.90	1.11	1.35	1.80	1.91	2.36	2.37
	60-69歳	197	1.33	0.52	0.05	0.26	0.38	0.64	0.71	0.96	1.30	1.60	2.07	2.27	2.97	3.00
	70歳以上	275	1.33	0.49	0.06	0.31	0.48	0.62	0.76	0.95	1.26	1.67	2.09	2.29	2.39	2.50
	(再掲)20-39歳	175	1.11	0.51	0.06	0.32	0.35	0.44	0.55	0.74	0.99	1.39	1.78	1.98	2.68	2.79
	(再掲)40-64歳	352	1.21	0.52	0.04	0.27	0.37	0.54	0.64	0.88	1.16	1.45	1.80	1.93	3.18	4.42
	(再掲)65歳以上	399	1.34	0.51	0.05	0.26	0.44	0.62	0.74	0.95	1.28	1.66	2.10	2.30	2.73	3.00
	(再掲)20歳以上※1	926	1.23	0.53	0.03	0.26	0.36	0.53	0.61	0.86	1.15	1.52	1.88	2.23	2.80	4.42
男性	(再掲)20歳以上※2	926	1.23	0.53	0.03	0.26	0.36	0.53	0.61	0.86	1.15	1.52	1.88	2.23	2.79	4.42
	20-29歳	35	1.42	0.69	0.22	0.40	0.40	0.43	0.61	0.93	1.37	1.74	2.58	2.68	2.79	2.79
	30-39歳	48	1.12	0.48	0.09	0.35	0.35	0.39	0.49	0.86	1.00	1.49	1.77	2.01	2.46	2.46
	40-49歳	61	1.37	0.79	0.12	0.57	0.57	0.57	0.63	0.85	1.15	1.71	1.99	3.58	4.42	4.42
	50-59歳	74	1.18	0.37	0.04	0.31	0.34	0.50	0.76	0.98	1.15	1.39	1.79	1.87	2.37	2.37
	60-69歳	89	1.46	0.56	0.08	0.26	0.26	0.62	0.71	1.07	1.38	1.76	2.26	2.32	2.91	2.91
	70歳以上	124	1.42	0.48	0.09	0.31	0.42	0.73	0.79	1.07	1.36	1.76	2.11	2.31	2.47	2.50
	(再掲)20-39歳	83	1.24	0.59	0.06	0.35	0.35	0.41	0.56	0.86	1.14	1.63	2.01	2.55	2.79	2.79
	(再掲)40-64歳	168	1.30	0.59	0.06	0.31	0.44	0.57	0.70	0.94	1.19	1.56	1.85	2.21	4.19	4.42
	(再掲)65歳以上	180	1.43	0.52	0.06	0.26	0.36	0.62	0.77	1.07	1.39	1.77	2.23	2.33	2.74	2.91
女性	(再掲)20歳以上※1	431	1.32	0.59	0.04	0.26	0.36	0.56	0.65	0.91	1.20	1.64	2.06	2.38	2.91	4.42
	(再掲)20歳以上※2	431	1.32	0.58	0.04	0.26	0.36	0.55	0.66	0.91	1.20	1.63	2.06	2.37	2.89	4.42
	20-29歳	40	1.17	0.49	0.13	0.32	0.32	0.43	0.46	0.79	1.18	1.60	1.81	1.87	1.99	1.99
	30-39歳	92	0.90	0.30	0.06	0.43	0.43	0.49	0.60	0.61	0.86	1.06	1.36	1.40	1.85	1.85
	40-49歳	71	1.04	0.40	0.05	0.27	0.27	0.38	0.49	0.74	1.07	1.28	1.57	1.69	2.12	2.12
	50-59歳	73	1.15	0.43	0.06	0.41	0.41	0.54	0.62	0.88	1.10	1.34	1.88	1.94	2.35	2.35
	60-69歳	108	1.24	0.46	0.06	0.36	0.42	0.66	0.71	0.88	1.19	1.50	1.81	1.91	2.98	3.00
	70歳以上	151	1.27	0.49	0.07	0.41	0.48	0.62	0.74	0.89	1.17	1.60	2.08	2.25	2.38	2.46
	(再掲)20-39歳	92	1.01	0.41	0.06	0.32	0.36	0.45	0.55	0.62	0.94	1.27	1.75	1.80	1.99	1.99
	(再掲)40-64歳	184	1.12	0.41	0.04	0.27	0.27	0.48	0.60	0.80	1.10	1.33	1.68	1.92	2.23	2.35
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	1.27	0.49	0.06	0.41	0.46	0.62	0.73	0.88	1.17	1.57	1.97	2.24	2.76	3.00
	(再掲)20歳以上※1	495	1.14	0.45	0.04	0.27	0.37	0.52	0.61	0.81	1.09	1.40	1.78	1.93	2.37	3.00
	(再掲)20歳以上※2	495	1.13	0.45	0.04	0.27	0.38	0.52	0.60	0.81	1.07	1.40	1.78	1.92	2.37	3.00
	(再掲)20歳以上※2	495	1.13	0.45	0.04	0.27	0.38	0.52	0.60	0.81	1.07	1.40	1.78	1.92	2.37	3.00

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンB12(μg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	5.3	3.9	0.7	0.5	0.6	0.9	1.2	2.0	7.6	10.4	11.8	24.0	24.0
	30-39歳	100	5.3	6.4	0.7	0.3	0.4	1.0	1.3	1.8	5.5	13.5	16.7	60.7	61.5
	40-49歳	132	6.8	7.4	1.0	0.2	0.3	0.9	1.2	2.0	7.9	18.4	24.0	33.4	34.5
	50-59歳	147	5.0	3.7	0.3	0.3	0.3	1.0	1.4	2.3	6.2	10.5	13.3	17.9	18.7
	60-69歳	197	6.7	5.7	0.6	0.3	0.7	1.0	1.5	2.4	9.0	15.5	16.9	28.0	32.9
	70歳以上	275	7.1	6.1	0.6	0.1	0.5	1.0	1.5	2.7	8.9	16.5	18.8	31.5	37.5
	(再掲)20-39歳	175	5.3	5.5	0.5	0.3	0.5	1.0	1.3	1.9	6.9	12.1	16.5	23.4	61.5
	(再掲)40-64歳	352	5.8	5.5	0.5	0.2	0.3	1.0	1.3	2.1	7.1	12.5	17.5	32.7	34.5
	(再掲)65歳以上	399	7.2	6.2	0.5	0.1	0.6	1.0	1.5	2.7	9.5	16.6	18.8	28.2	37.5
	(再掲)20歳以上※1	926	6.2	5.9	0.4	0.1	0.5	1.0	1.3	2.2	7.9	13.9	17.9	28.8	61.5
男性	(再掲)20歳以上※2	926	6.1	5.9	0.4	0.1	0.5	1.0	1.3	2.2	7.8	13.9	17.5	27.1	61.5
	20-29歳	35	5.3	4.5	1.2	0.8	0.8	1.0	1.0	2.1	7.2	9.8	13.2	24.0	24.0
	30-39歳	48	6.0	7.7	0.9	0.5	0.5	1.0	1.0	1.8	6.8	12.7	19.2	61.5	61.5
	40-49歳	61	8.6	8.7	1.8	0.2	0.2	0.9	1.5	2.3	12.3	21.9	30.6	33.4	33.4
	50-59歳	74	5.4	4.0	0.5	0.4	0.4	1.0	1.2	2.4	7.7	12.0	13.9	17.0	17.0
	60-69歳	89	6.7	5.9	0.8	0.3	0.4	1.2	1.4	2.1	8.7	14.6	20.5	32.9	32.9
	70歳以上	124	8.3	6.9	0.8	0.1	0.8	1.5	1.8	3.0	13.7	17.9	20.2	36.7	37.5
	(再掲)20-39歳	83	5.7	6.5	0.8	0.5	0.5	1.0	1.0	1.9	7.0	12.2	15.0	61.5	61.5
	(再掲)40-64歳	168	6.6	6.3	0.8	0.2	0.3	1.0	1.3	2.3	8.3	14.6	19.0	32.5	33.4
	(再掲)65歳以上	180	8.1	6.9	0.6	0.1	0.6	1.3	1.8	3.0	13.6	17.8	20.7	35.9	37.5
女性	(再掲)20歳以上※1	431	6.8	6.7	0.6	0.1	0.4	1.0	1.3	2.4	8.9	15.4	19.3	33.2	61.5
	(再掲)20歳以上※2	431	6.8	6.6	0.6	0.1	0.4	1.0	1.3	2.4	8.8	15.3	19.0	33.1	61.5
	20-29歳	40	5.2	3.5	0.6	0.5	0.5	0.9	1.3	2.0	7.6	10.6	12.1	12.8	12.8
	30-39歳	92	4.8	5.1	0.7	0.3	0.3	1.3	1.3	1.7	4.8	16.5	16.7	19.3	19.3
	40-49歳	71	5.1	5.4	0.6	0.5	0.5	0.9	1.1	1.9	5.7	11.2	18.0	34.5	34.5
	50-59歳	73	4.6	3.3	0.4	0.3	0.4	1.0	1.5	2.0	5.4	9.5	11.1	18.7	18.7
	60-69歳	108	6.6	5.5	0.6	0.6	0.7	0.9	1.5	2.6	9.1	15.8	16.8	30.3	30.9
	70歳以上	151	6.1	5.2	0.6	0.4	0.4	0.9	1.3	2.2	7.9	14.6	18.6	23.4	24.9
	(再掲)20-39歳	92	5.0	4.5	0.4	0.3	0.5	1.3	1.3	1.7	6.8	11.3	16.6	19.3	19.3
	(再掲)40-64歳	184	4.9	4.5	0.4	0.3	0.4	0.9	1.3	2.0	5.8	10.3	14.0	26.2	34.5
女性	(再掲)65歳以上	219	6.5	5.4	0.5	0.4	0.5	0.9	1.4	2.3	8.7	15.8	18.4	24.8	30.9
	(再掲)20歳以上※1	495	5.5	4.9	0.3	0.3	0.5	1.0	1.3	2.1	7.1	12.5	16.7	21.9	34.5
	(再掲)20歳以上※2	495	5.5	4.9	0.3	0.3	0.5	1.0	1.3	2.0	7.0	12.3	16.7	21.1	34.5
	(再掲)20歳以上※2	495	5.5	4.9	0.3	0.3	0.5	1.0	1.3	2.0	7.0	12.3	16.7	21.1	34.5

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

葉酸(μg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	295	124	28	50	52	110	149	201	292	406	465	510	534	534
	30-39歳	100	254	159	24	38	40	51	107	167	223	309	454	517	1564	1582
	40-49歳	132	276	147	18	74	77	83	116	174	240	336	458	649	676	998
	50-59歳	147	311	126	16	61	100	123	160	213	293	390	493	531	662	672
	60-69歳	197	361	128	13	112	116	171	212	269	356	425	511	593	786	976
	70歳以上	275	396	176	20	85	109	180	214	281	362	469	623	729	1096	1235
	(再掲)20-39歳	175	271	147	21	38	41	86	132	185	234	338	449	523	691	1582
	(再掲)40-64歳	352	304	134	13	61	82	115	150	205	291	382	489	552	671	998
	(再掲)65歳以上	399	389	167	15	85	113	179	212	278	362	453	596	680	1015	1235
	(再掲)20歳以上※1	926	320	157	12	38	50	115	155	211	298	405	513	602	804	1582
	(再掲)20歳以上※2	926	320	156	12	38	49	115	153	211	298	405	512	597	800	1582
男性	20-29歳	35	319	138	43	75	75	88	160	204	314	443	513	527	534	534
	30-39歳	48	254	192	30	38	38	43	52	167	223	307	437	498	1582	1582
	40-49歳	61	297	163	20	83	83	83	145	187	239	380	610	650	650	650
	50-59歳	74	297	129	20	85	98	108	134	205	284	386	445	525	672	672
	60-69歳	89	363	130	16	112	112	158	192	294	362	420	524	614	875	875
	70歳以上	124	399	164	19	108	108	183	214	287	371	454	653	726	852	856
	(再掲)20-39歳	83	280	174	25	38	39	48	95	183	234	340	486	520	1582	1582
	(再掲)40-64歳	168	308	141	13	83	83	109	139	208	292	391	495	645	671	875
	(再掲)65歳以上	180	391	159	16	108	109	170	213	282	368	453	640	706	843	856
	(再掲)20歳以上※1	431	322	163	12	38	43	107	155	213	298	411	534	650	808	1582
	(再掲)20歳以上※2	431	324	163	13	38	43	107	158	216	306	412	527	650	812	1582
	20-29歳	40	275	109	28	50	50	110	147	199	257	389	422	432	469	469
女性	30-39歳	92	255	129	26	41	41	87	124	175	222	315	472	528	604	604
	40-49歳	71	255	126	23	74	74	99	112	163	236	334	381	449	998	998
	50-59歳	73	324	123	25	61	95	154	165	228	299	408	502	532	621	621
	60-69歳	108	360	126	15	117	140	82	212	260	344	425	511	645	903	976
	70歳以上	151	394	187	22	85	109	168	212	273	359	478	594	724	1194	1235
	(再掲)20-39歳	92	263	121	24	41	44	103	131	184	234	338	428	492	604	604
	(再掲)40-64歳	184	300	127	19	61	76	116	156	205	289	381	464	518	686	998
	(再掲)65歳以上	219	387	173	16	85	118	183	212	266	357	453	589	666	1144	1235
	(再掲)20歳以上※1	495	318	151	14	41	79	123	154	209	293	404	503	576	796	1235
	(再掲)20歳以上※2	495	316	149	14	41	79	127	152	208	292	403	503	574	776	1235

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

パントテン酸(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	6.36	2.83	0.51	1.51	1.57	2.42	3.60	4.16	5.81	7.44	10.35	12.32	14.09	14.09
	30-39歳	100	5.30	1.90	0.28	1.82	1.83	2.14	2.91	3.82	5.39	6.24	7.49	8.11	13.01	13.01
	40-49歳	132	5.51	2.06	0.19	1.93	1.93	2.83	3.32	3.95	5.16	6.17	8.47	9.22	12.51	13.17
	50-59歳	147	5.45	1.80	0.14	1.76	2.15	2.94	3.38	3.98	5.31	6.54	7.69	8.79	10.63	11.26
	60-69歳	197	5.92	1.78	0.12	1.99	2.20	3.38	4.12	4.74	5.94	6.64	8.47	9.58	10.90	13.72
	70歳以上	275	6.18	1.91	0.20	1.41	2.62	3.65	3.94	4.78	5.83	7.74	8.53	9.55	10.82	13.57
	(再掲)20-39歳	175	5.73	2.38	0.23	1.51	1.81	2.18	3.26	4.04	5.68	6.82	8.18	10.34	13.62	14.09
	(再掲)40-64歳	352	5.56	1.86	0.09	1.76	2.16	2.95	3.43	4.26	5.38	6.49	7.78	8.95	12.05	13.72
	(再掲)65歳以上	399	6.11	1.91	0.16	1.41	2.29	3.63	4.00	4.71	5.75	7.45	8.71	9.71	10.80	13.57
	(再掲)20歳以上※1	926	5.82	2.10	0.11	1.41	1.92	2.88	3.51	4.35	5.63	6.88	8.44	9.62	13.28	14.09
男性	(再掲)20歳以上※2	926	5.81	2.09	0.11	1.41	1.91	2.88	3.50	4.34	5.63	6.87	8.38	9.56	13.27	14.09
	20-29歳	35	7.33	3.28	0.99	2.48	2.48	2.74	3.75	4.84	6.76	8.71	12.26	13.63	14.09	14.09
	30-39歳	48	5.36	2.30	0.48	1.87	1.87	2.02	2.22	3.74	5.55	6.90	7.77	9.25	13.01	13.01
	40-49歳	61	6.08	2.33	0.33	2.56	2.61	3.18	3.36	4.44	5.77	7.61	9.00	11.35	12.61	12.61
	50-59歳	74	5.56	1.70	0.20	1.76	1.85	3.33	3.82	4.42	5.31	7.08	7.68	8.71	11.26	11.26
	60-69歳	89	6.50	2.01	0.23	1.99	1.99	3.33	4.03	5.28	6.43	7.37	9.60	10.42	13.72	13.72
	70歳以上	124	6.38	1.94	0.20	1.41	3.39	3.97	4.10	4.92	6.06	7.67	9.15	10.48	11.88	13.57
	(再掲)20-39歳	83	6.17	2.89	0.37	1.87	1.87	2.17	2.80	4.01	5.84	7.34	9.65	13.28	14.09	14.09
	(再掲)40-64歳	168	5.90	1.96	0.18	1.76	2.56	3.33	3.66	4.55	5.69	6.93	8.55	9.07	12.47	13.72
	(再掲)65歳以上	180	6.44	2.03	0.20	1.41	2.13	3.71	4.10	4.92	6.12	7.71	9.59	10.56	11.09	13.57
女性	(再掲)20歳以上※1	431	6.16	2.35	0.14	1.41	1.99	2.83	3.88	4.49	5.94	7.34	9.06	10.67	13.49	14.09
	(再掲)20歳以上※2	431	6.15	2.33	0.14	1.41	1.98	2.83	3.69	4.52	5.94	7.34	9.06	10.62	13.48	14.09
	20-29歳	40	5.58	2.13	0.54	1.51	1.52	1.88	3.53	4.09	5.40	6.66	8.90	10.42	10.71	10.71
	30-39歳	92	5.25	1.53	0.20	1.82	1.82	2.98	3.23	3.98	5.25	6.03	7.19	8.02	9.30	9.30
	40-49歳	71	4.96	1.59	0.20	1.93	1.93	2.81	3.14	3.72	4.84	5.65	6.63	8.37	13.17	13.17
	50-59歳	73	5.34	1.89	0.23	2.09	2.12	2.19	3.14	3.76	5.28	6.37	7.91	8.82	10.53	10.53
	60-69歳	108	5.47	1.42	0.13	2.18	2.30	3.28	4.13	4.53	5.31	6.31	6.83	9.11	9.68	9.73
	70歳以上	151	6.03	1.87	0.23	1.54	2.43	3.57	3.77	4.59	5.70	7.75	8.47	9.03	10.52	10.59
	(再掲)20-39歳	92	5.38	1.80	0.26	1.51	1.60	2.65	3.32	4.06	5.38	6.22	7.40	8.88	10.71	10.71
	(再掲)40-64歳	184	5.22	1.69	0.17	1.93	1.93	2.80	3.18	3.92	5.10	6.14	7.36	8.38	10.50	13.17
女性	(再掲)65歳以上	219	5.86	1.78	0.17	1.54	2.44	3.59	3.82	4.49	5.62	7.13	8.45	9.05	10.44	10.59
	(再掲)20歳以上※1	495	5.47	1.76	0.13	1.51	1.90	2.94	3.48	4.22	5.32	6.47	8.04	8.76	10.56	13.17
	(再掲)20歳以上※2	495	5.46	1.76	0.13	1.51	1.88	2.94	3.43	4.20	5.33	6.41	7.96	8.75	10.56	13.17

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンC(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	107	70	17	17	17	20	35	45	88	148	226	236	275	275
	30-39歳	100	62	44	6	3	3	9	17	30	55	81	119	140	236	236
	40-49歳	132	79	63	9	10	10	14	22	36	58	114	185	235	259	263
	50-59歳	147	106	70	9	6	10	26	37	52	85	152	196	225	397	448
	60-69歳	197	144	87	9	9	20	34	43	75	130	190	263	336	403	512
	70歳以上	275	162	90	11	10	16	40	52	92	150	224	287	322	409	503
	(再掲)20-39歳	175	81	60	8	3	3	16	22	38	63	108	178	231	243	275
	(再掲)40-64歳	352	100	73	7	6	9	21	27	49	76	141	197	236	394	448
	(再掲)65歳以上	399	159	89	8	9	19	39	52	89	147	216	285	323	408	512
	(再掲)20歳以上※1	926	112	82	5	3	9	20	28	50	88	158	232	269	364	512
男性	(再掲)20歳以上※2	926	112	81	5	3	8	21	29	50	88	158	232	268	364	512
	20-29歳	35	110	78	23	17	17	18	28	42	88	177	224	244	275	275
	30-39歳	48	65	55	10	3	3	4	14	30	54	81	137	224	236	236
	40-49歳	61	81	68	13	10	10	10	20	28	58	114	225	247	263	263
	50-59歳	74	96	65	12	9	10	25	34	45	78	119	195	231	300	300
	60-69歳	89	128	79	10	9	11	29	34	72	104	178	229	315	351	351
	70歳以上	124	152	83	10	13	31	40	48	74	148	205	262	303	377	383
	(再掲)20-39歳	83	83	68	10	3	3	8	18	39	62	118	218	238	275	275
	(再掲)40-64歳	168	93	67	7	9	9	20	26	40	72	131	194	238	294	315
	(再掲)65歳以上	180	148	84	8	9	27	38	48	74	137	202	267	310	372	383
女性	(再掲)20歳以上※1	431	105	77	6	3	5	17	27	43	82	154	228	250	337	383
	(再掲)20歳以上※2	431	107	78	6	3	5	18	27	44	83	161	228	250	338	383
	20-29歳	40	105	64	18	21	21	29	36	46	107	142	216	227	232	232
	30-39歳	92	60	34	6	3	3	16	24	30	55	78	106	123	182	182
	40-49歳	71	78	58	10	13	13	15	22	40	52	114	187	208	244	244
	50-59歳	73	115	74	12	6	10	28	37	57	106	156	189	219	448	448
	60-69歳	108	156	90	12	19	25	41	56	88	140	203	282	363	488	512
	70歳以上	151	171	95	12	10	16	38	53	100	150	241	298	331	469	503
	(再掲)20-39歳	92	78	53	8	3	5	21	26	37	64	107	144	212	232	232
	(再掲)40-64歳	184	107	78	9	6	14	22	32	51	83	151	205	232	420	448
女性	(再掲)65歳以上	219	167	92	9	10	16	39	53	99	148	232	289	331	446	512
	(再掲)20歳以上※1	495	119	85	7	3	14	25	31	52	103	159	235	285	408	512
	(再掲)20歳以上※2	495	117	84	7	3	14	24	30	52	102	158	232	281	408	512

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

飽和脂肪酸(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	18.62	11.08	4.01	5.19	7.72	8.52	10.17	14.92	23.73	39.79	42.73	53.83	53.83
	30-39歳	100	17.27	7.48	2.44	3.46	5.64	8.28	12.46	17.09	20.80	24.19	30.94	49.41	49.54
	40-49歳	132	17.49	10.00	2.55	2.84	6.20	7.04	11.17	14.80	22.40	30.94	36.34	62.33	65.31
	50-59歳	147	15.47	7.88	0.76	3.69	5.83	7.24	10.07	18.68	26.74	33.59	33.59	44.89	49.89
	60-69歳	197	15.25	6.65	0.51	3.93	5.62	7.01	10.56	15.01	19.15	24.17	26.96	37.28	40.67
	70歳以上	275	14.44	6.10	0.61	3.54	5.28	7.85	10.38	13.24	18.21	23.11	24.93	32.81	48.05
	(再掲)20-39歳	175	17.82	9.12	0.73	4.17	5.99	8.45	11.13	16.58	21.36	30.61	40.19	48.02	53.83
	(再掲)40-64歳	352	16.37	8.69	0.53	3.84	5.85	6.99	10.60	15.02	19.69	29.07	31.96	43.16	65.31
	(再掲)65歳以上	399	14.53	6.15	0.50	3.55	5.49	7.62	10.38	13.47	18.40	22.98	25.12	33.71	48.05
	(再掲)20歳以上※1	926	16.38	8.31	0.41	3.77	5.86	7.55	10.85	15.11	19.73	27.00	31.96	42.82	65.31
男性	(再掲)20歳以上※2	926	16.35	8.23	0.41	3.83	5.86	7.62	10.83	15.14	19.71	26.63	31.95	42.85	65.31
	20-29歳	35	21.53	11.87	3.22	5.04	6.93	9.11	10.04	19.87	29.57	40.20	42.02	42.87	42.87
	30-39歳	48	17.77	7.12	0.89	2.49	4.17	9.95	14.29	17.47	20.81	24.03	30.82	49.54	49.54
	40-49歳	61	17.60	9.75	0.95	4.77	6.51	6.95	0.43	15.08	22.58	32.60	39.00	42.12	42.12
	50-59歳	74	16.07	7.59	0.59	4.37	6.03	7.55	10.66	15.58	19.11	25.22	30.78	49.89	49.89
	60-69歳	89	16.95	6.60	0.64	3.92	5.56	8.08	12.97	15.97	20.75	25.23	28.45	36.58	36.58
	70歳以上	124	14.69	5.48	0.75	3.81	7.21	9.02	10.58	13.27	18.22	23.23	25.09	28.97	39.01
	(再掲)20-39歳	83	19.30	9.47	1.45	2.66	6.23	9.13	13.19	17.51	21.53	33.58	40.21	49.54	49.54
	(再掲)40-64歳	168	16.69	8.18	0.49	4.58	6.35	7.26	10.79	15.50	20.78	27.51	35.02	41.95	49.89
	(再掲)65歳以上	180	15.37	6.07	0.70	3.84	6.96	9.02	10.64	14.38	19.11	23.61	25.90	34.04	39.01
女性	(再掲)20歳以上※1	431	17.28	8.34	0.57	4.03	6.38	8.11	11.61	15.99	20.97	28.08	36.47	42.36	49.89
	(再掲)20歳以上※2	431	17.19	8.20	0.55	4.00	6.37	8.19	11.61	15.96	20.92	27.32	34.85	42.36	49.89
	20-29歳	40	16.27	9.93	2.17	4.28	7.45	8.23	10.18	13.03	20.15	30.63	43.20	53.83	53.83
	30-39歳	92	16.88	7.79	1.39	4.30	5.65	7.83	10.97	16.99	20.35	28.90	33.73	40.93	40.93
	40-49歳	71	17.39	10.31	1.55	2.55	4.26	7.55	11.41	14.75	20.73	31.34	31.82	65.31	65.31
	50-59歳	73	14.89	8.16	1.29	3.05	4.88	6.51	9.38	13.38	17.62	28.80	33.93	44.13	44.13
	60-69歳	108	13.93	6.42	0.72	3.78	5.42	6.61	9.47	12.55	18.40	22.00	25.81	40.27	40.67
	70歳以上	151	14.24	6.58	0.65	3.66	4.54	6.70	10.18	13.02	17.81	23.52	24.64	39.42	48.05
	(再掲)20-39歳	92	16.63	8.68	1.25	4.36	5.75	8.22	10.74	15.38	19.74	27.17	38.83	53.83	53.83
	(再掲)40-64歳	184	16.04	9.17	0.96	2.96	5.07	6.62	10.08	13.96	19.45	29.83	31.95	58.18	65.31
女性	(再掲)65歳以上	219	13.89	6.14	0.48	3.50	4.72	6.95	10.09	12.58	17.18	21.82	24.33	33.50	48.05
	(再掲)20歳以上※1	495	15.47	8.18	0.62	3.63	5.61	7.17	10.46	13.52	18.88	25.36	31.92	44.26	65.31
	(再掲)20歳以上※2	495	15.48	8.18	0.66	3.64	5.62	7.21	10.46	13.53	18.89	25.24	31.93	44.25	65.31

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

一価不飽和脂肪酸(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	22.95	11.11	5.11	5.22	8.08	10.20	14.74	21.55	28.13	38.23	46.98	63.93	63.93
	30-39歳	100	21.49	9.72	3.21	5.36	6.55	12.23	14.79	19.72	25.58	33.70	40.33	66.00	66.26
	40-49歳	132	22.00	10.14	3.20	4.57	8.85	11.23	15.68	19.95	28.51	36.19	39.13	59.07	62.67
	50-59歳	147	19.53	9.06	2.98	3.18	8.68	9.63	13.07	18.44	24.38	31.33	37.58	53.63	60.20
	60-69歳	197	19.86	8.08	1.67	5.26	7.19	10.66	14.03	18.89	25.15	31.88	35.46	41.52	46.63
	70歳以上	275	17.98	7.40	0.56	4.71	7.69	9.13	12.11	17.63	22.37	27.29	29.66	41.43	55.86
	(再掲)20-39歳	175	22.08	10.30	3.21	5.40	7.40	12.22	14.79	20.38	26.51	35.49	39.69	62.69	66.26
	(再掲)40-64歳	352	20.69	9.48	0.71	3.91	8.84	9.98	13.58	19.28	25.64	33.59	38.15	51.28	62.67
	(再掲)65歳以上	399	18.36	7.50	0.51	4.72	7.64	9.79	12.43	17.68	22.57	28.40	31.10	41.28	55.86
	(再掲)20歳以上※1	926	20.67	9.43	0.57	5.14	8.23	10.53	14.03	19.14	25.50	33.13	38.43	53.25	66.26
	(再掲)20歳以上※2	926	20.63	9.38	0.59	5.15	8.16	10.47	14.02	19.16	25.49	33.11	38.42	52.94	66.26
男性	20-29歳	35	26.70	12.73	2.84	10.49	12.83	13.01	15.88	25.32	33.96	49.57	55.16	63.93	63.93
	30-39歳	48	23.76	10.49	1.66	3.61	5.49	12.36	18.35	22.39	31.09	36.88	41.32	66.26	66.26
	40-49歳	61	23.97	11.29	1.38	6.94	9.35	12.59	5.77	20.14	32.81	38.28	45.60	62.67	62.67
	50-59歳	74	20.86	8.01	0.97	6.57	10.64	12.07	14.53	19.65	25.34	33.48	35.78	46.28	46.28
	60-69歳	89	22.99	8.42	0.76	5.12	9.62	11.20	17.40	22.59	27.30	34.51	37.02	46.63	46.63
	70歳以上	124	19.24	7.66	1.00	5.18	7.92	10.04	13.00	19.44	24.06	28.71	32.41	43.55	45.03
	(再掲)20-39歳	83	24.96	11.48	1.52	4.92	10.33	13.04	18.02	23.80	31.97	38.66	49.83	66.26	66.26
	(再掲)40-64歳	168	22.50	9.54	0.73	5.09	8.17	12.34	15.70	20.44	27.98	36.10	38.78	54.04	62.67
	(再掲)65歳以上	180	20.10	7.99	0.93	5.24	8.17	10.56	13.50	19.63	24.60	29.97	34.54	42.86	46.63
	(再掲)20歳以上※1	431	22.79	10.05	0.64	5.41	9.70	11.85	15.78	20.81	27.71	36.17	39.36	55.17	66.26
	(再掲)20歳以上※2	431	22.65	9.94	0.65	5.40	9.70	11.75	15.77	20.80	27.30	35.83	39.33	55.16	66.26
	20-29歳	40	19.90	8.60	2.14	5.14	5.64	8.14	13.93	18.66	25.30	33.21	35.50	38.11	38.11
女性	30-39歳	92	19.66	8.73	1.42	5.88	6.55	12.23	3.91	19.15	22.62	29.32	42.74	49.22	49.22
	40-49歳	71	20.08	8.53	1.16	3.20	7.24	9.55	14.38	19.35	25.58	29.77	33.25	52.87	52.87
	50-59歳	73	18.21	9.86	1.67	2.98	7.42	9.19	12.09	16.12	21.32	30.20	38.83	60.20	60.20
	60-69歳	108	17.44	6.93	0.74	5.18	6.76	10.08	2.66	16.78	21.07	27.18	29.44	42.75	42.94
	70歳以上	151	16.95	7.04	0.58	4.67	7.56	8.94	1.61	15.93	21.46	25.75	29.29	48.84	55.86
	(再掲)20-39歳	92	19.76	8.63	1.28	5.28	6.55	8.41	13.94	18.85	24.47	29.92	36.08	49.22	49.22
	(再掲)40-64歳	184	18.89	9.08	1.08	3.15	6.92	9.32	2.44	17.39	23.45	29.19	38.02	54.51	60.20
	(再掲)65歳以上	219	17.02	6.82	0.39	4.68	7.56	8.99	1.76	16.45	21.21	25.76	28.04	42.69	55.86
	(再掲)20歳以上※1	495	18.53	8.23	0.68	4.65	7.10	9.17	12.77	17.32	22.78	28.60	32.55	48.65	60.20
	(再掲)20歳以上※2	495	18.57	8.29	0.72	4.65	7.08	9.18	12.82	17.33	22.79	28.61	32.67	48.61	60.20

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

多価不飽和脂肪酸(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	13.65	6.82	1.23	2.12	2.74	4.34	6.50	8.60	13.11	17.14	24.56	26.40	42.12	42.12
	30-39歳	100	11.22	6.08	0.94	2.14	2.15	2.67	4.82	6.46	10.12	13.71	19.39	23.70	32.43	32.46
	40-49歳	132	12.31	4.89	0.32	1.95	2.06	4.22	5.63	9.19	11.93	14.82	18.99	21.53	27.72	30.70
	50-59歳	147	12.47	5.10	0.59	3.05	3.49	5.78	6.09	8.73	11.75	15.22	19.66	20.29	31.29	35.26
	60-69歳	197	13.13	5.53	0.46	3.19	3.19	5.15	5.70	9.01	12.61	16.13	21.35	24.22	28.62	29.61
	70歳以上	275	12.00	5.25	0.44	1.78	4.03	4.86	5.93	8.68	10.97	14.62	20.15	22.93	27.02	30.88
	(再掲)20-39歳	175	12.21	6.49	0.73	2.12	2.16	4.25	5.34	7.78	10.75	15.58	20.92	24.87	33.19	42.12
	(再掲)40-64歳	352	12.73	5.27	0.37	1.95	2.61	4.66	6.03	9.15	12.90	15.32	19.61	21.77	28.26	35.26
	(再掲)65歳以上	399	12.13	5.19	0.30	1.78	4.04	5.11	5.93	8.76	11.20	14.63	20.17	22.58	26.94	30.88
	(再掲)20歳以上※1	926	12.50	5.71	0.34	1.78	2.53	4.53	5.76	8.69	11.73	15.32	19.90	23.63	29.80	42.12
男性	(再掲)20歳以上※2	926	12.50	5.72	0.36	1.78	2.53	4.60	5.76	8.67	11.71	15.32	19.95	23.69	29.88	42.12
	20-29歳	35	16.49	7.89	2.01	5.74	5.80	7.55	7.92	9.62	14.64	24.46	26.82	32.71	42.12	42.12
	30-39歳	48	11.97	6.99	1.52	2.14	2.14	2.21	2.62	6.40	10.81	17.38	21.81	25.75	32.46	32.46
	40-49歳	61	13.48	4.56	0.59	2.53	2.53	7.35	9.18	9.84	13.11	16.45	20.03	22.14	24.55	24.55
	50-59歳	74	12.86	4.60	0.40	3.58	3.62	5.63	6.31	9.17	13.12	15.33	19.49	20.24	25.51	25.51
	60-69歳	89	15.00	5.58	0.69	4.04	4.44	5.49	7.40	11.82	14.02	18.71	22.63	26.31	29.61	29.61
	70歳以上	124	12.86	5.60	0.64	1.78	3.45	5.11	6.71	8.92	11.67	15.43	22.16	24.67	29.36	30.88
	(再掲)20-39歳	83	13.82	7.66	1.13	2.14	2.14	2.54	5.80	8.69	11.82	18.29	24.66	29.49	42.12	42.12
	(再掲)40-64歳	168	13.78	4.99	0.33	2.53	2.53	5.74	7.90	10.11	13.75	16.65	19.85	22.15	28.35	29.61
	(再掲)65歳以上	180	13.11	5.50	0.55	1.78	3.87	5.41	6.79	9.16	12.54	15.75	22.25	24.55	26.42	30.88
女性	(再掲)20歳以上※1	431	13.65	6.08	0.43	1.78	2.31	4.90	6.42	9.27	12.95	16.88	22.29	24.75	31.32	42.12
	(再掲)20歳以上※2	431	13.62	6.10	0.44	1.78	2.30	4.87	6.40	9.24	12.92	16.88	22.30	24.77	31.29	42.12
	20-29歳	40	11.35	4.77	0.92	2.12	2.28	3.82	4.64	8.20	10.12	15.55	17.46	18.39	23.62	23.62
	30-39歳	92	10.62	5.23	0.93	3.96	4.00	4.31	5.28	6.45	10.09	12.92	18.10	22.88	30.31	30.31
	40-49歳	71	11.17	4.96	0.51	1.95	1.95	3.27	4.73	8.08	11.07	13.54	18.63	21.69	30.70	30.70
	50-59歳	73	12.09	5.56	1.00	3.05	3.05	5.78	5.90	7.97	11.19	15.17	19.21	21.05	35.26	35.26
	60-69歳	108	11.67	5.06	0.54	3.19	3.19	4.64	5.41	8.10	11.33	14.23	19.24	21.52	27.52	27.53
	70歳以上	151	11.29	4.85	0.48	1.83	4.03	4.52	5.60	8.07	10.65	13.35	17.42	20.76	27.11	28.72
	(再掲)20-39歳	92	10.91	5.03	0.68	2.12	3.11	4.27	5.10	6.84	10.09	13.70	17.46	20.14	30.31	30.31
	(再掲)40-64歳	184	11.68	5.35	0.60	1.95	2.51	4.31	5.60	7.96	11.18	14.55	18.72	20.84	31.72	35.26
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	11.38	4.81	0.32	1.83	4.04	4.66	5.62	8.16	10.66	13.34	17.90	21.36	27.09	28.72
	(再掲)20歳以上※1	495	11.35	5.05	0.36	1.83	3.03	4.51	5.40	7.91	10.77	13.90	17.78	20.83	26.93	35.26
	(再掲)20歳以上※2	495	11.35	5.07	0.38	1.83	3.05	4.51	5.41	7.85	10.76	13.90	17.85	20.83	26.92	35.26
	(再掲)20歳以上※2	495	11.35	5.07	0.38	1.83	3.05	4.51	5.41	7.85	10.76	13.90	17.85	20.83	26.92	35.26

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

コレステロール(mg)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	371	197	32	33	39	66	116	265	364	486	606	730	1489	1489
	30-39歳	100	309	133	16	3	25	102	128	209	303	386	505	522	719	721
	40-49歳	132	317	138	12	14	37	117	139	206	322	399	486	529	824	899
	50-59歳	147	254	158	18	9	13	65	70	127	211	367	468	575	706	1082
	60-69歳	197	305	164	14	7	45	99	119	195	268	401	522	621	834	1098
	70歳以上	275	286	130	8	2	55	91	129	202	280	369	451	518	675	810
	(再掲)20-39歳	175	334	165	17	3	36	84	128	220	332	410	524	615	902	1489
	(再掲)40-64歳	352	286	151	10	9	37	66	103	174	276	385	477	533	750	1082
	(再掲)65歳以上	399	293	142	7	2	50	94	130	199	279	369	486	571	781	1098
	(再掲)20歳以上※1	926	307	157	9	2	49	82	118	195	296	386	504	595	789	1489
男性	(再掲)20歳以上※2	926	306	157	9	2	48	81	117	194	286	386	504	595	793	1489
	20-29歳	35	409	226	62	51	51	60	90	268	340	588	719	794	902	902
	30-39歳	48	323	145	27	3	6	63	123	211	336	409	508	617	644	644
	40-49歳	61	337	139	18	14	32	88	124	257	328	448	497	525	768	768
	50-59歳	74	285	165	27	37	39	90	110	154	253	370	513	604	1082	1082
	60-69歳	89	344	192	25	7	20	100	114	208	284	469	614	682	1098	1098
	70歳以上	124	303	127	13	23	69	109	155	208	296	374	454	535	794	810
	(再掲)20-39歳	83	358	186	30	3	18	66	118	250	341	474	614	698	902	902
	(再掲)40-64歳	168	305	151	15	14	48	92	116	190	306	401	494	540	756	1082
	(再掲)65歳以上	180	323	156	13	7	50	110	159	211	298	381	570	650	832	1098
女性	(再掲)20歳以上※1	431	331	168	16	3	50	90	124	211	317	431	572	648	815	1098
	(再掲)20歳以上※2	431	329	168	16	3	50	90	124	207	312	417	572	647	816	1098
	20-29歳	40	340	168	21	33	37	66	160	244	367	402	487	493	1489	1489
	30-39歳	92	298	122	16	34	34	120	134	204	300	364	505	515	721	721
	40-49歳	71	297	135	18	27	27	128	154	190	293	377	480	546	899	899
	50-59歳	73	223	145	20	9	9	57	66	101	197	359	426	476	632	632
	60-69歳	108	275	131	12	25	38	94	119	170	261	344	458	492	823	830
	70歳以上	151	272	131	11	2	44	78	100	175	263	368	447	520	631	756
	(再掲)20-39歳	92	315	143	13	33	34	111	149	214	307	394	488	507	1489	1489
	(再掲)40-64歳	184	266	149	13	9	24	66	79	156	255	374	469	520	776	899
女性	(再掲)65歳以上	219	269	126	8	2	50	85	104	173	260	349	433	500	581	830
	(再掲)20歳以上※1	495	282	140	7	2	34	71	105	183	270	374	469	505	698	1489
	(再掲)20歳以上※2	495	282	140	7	2	34	68	104	183	270	374	469	505	699	1489

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

総食物繊維(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	14.4	5.8	1.2	3.4	3.5	5.6	7.5	10.3	12.9	18.8	22.2	23.2	30.1	30.1
	30-39歳	100	12.4	6.1	0.9	1.5	1.8	5.0	6.7	8.7	11.3	15.3	19.6	21.7	41.6	41.7
	40-49歳	132	13.1	5.1	0.7	2.9	2.9	5.1	7.1	9.6	12.5	16.2	18.8	22.6	30.5	30.5
	50-59歳	147	14.6	6.0	0.5	3.2	3.6	5.9	7.5	10.5	13.9	17.6	21.5	26.5	36.5	37.9
	60-69歳	197	17.8	7.0	0.8	3.5	5.2	8.6	10.3	12.5	16.9	22.2	26.4	28.9	40.9	44.7
	70歳以上	275	18.4	7.4	0.8	4.0	4.9	8.9	10.4	13.3	17.0	21.2	28.2	34.3	39.6	47.5
	(再掲)20-39歳	175	13.2	6.1	0.7	1.5	2.2	5.2	6.7	9.4	11.8	16.7	21.1	23.0	36.8	41.7
	(再掲)40-64歳	352	14.5	5.9	0.4	2.9	2.9	5.9	7.7	10.8	13.9	17.6	21.5	25.6	32.4	44.7
	(再掲)65歳以上	399	18.3	7.4	0.6	3.5	5.0	8.7	10.3	13.0	16.9	21.8	28.1	34.1	40.7	47.5
	(再掲)20歳以上※1	926	15.3	6.8	0.4	1.5	2.8	6.0	7.8	10.7	14.5	18.7	23.4	28.2	39.0	47.5
男性	(再掲)20歳以上※2	926	15.3	6.8	0.4	1.5	2.8	6.0	7.8	10.7	14.5	18.9	23.4	28.1	39.2	47.5
	20-29歳	35	14.9	5.3	1.5	4.5	4.5	7.4	7.7	10.9	14.4	18.9	21.2	22.9	29.6	29.6
	30-39歳	48	12.8	7.5	1.3	2.0	2.0	2.6	5.1	8.5	12.6	15.3	19.4	30.8	41.7	41.7
	40-49歳	61	13.9	5.6	1.1	2.9	2.9	2.9	7.1	11.3	14.1	16.5	19.1	23.2	30.5	30.5
	50-59歳	74	14.0	5.7	0.9	3.2	3.4	5.3	7.4	10.2	13.8	17.0	21.4	24.0	32.3	32.3
	60-69歳	89	18.1	8.2	1.0	3.5	4.1	8.3	8.7	11.9	17.0	23.4	26.7	40.7	44.7	44.7
	70歳以上	124	18.7	7.5	0.9	4.0	4.5	7.8	10.8	13.2	18.1	21.8	28.0	36.7	39.8	39.9
	(再掲)20-39歳	83	13.6	6.7	0.8	2.0	2.1	4.6	5.3	8.6	12.6	17.2	21.0	22.8	41.7	41.7
	(再掲)40-64歳	168	14.7	6.1	0.6	2.9	2.9	5.1	7.6	11.3	14.3	17.5	22.7	25.7	31.8	44.7
	(再掲)65歳以上	180	18.6	7.9	0.7	3.5	4.6	8.0	10.3	12.2	17.4	22.0	28.0	38.1	40.9	41.0
女性	(再掲)20歳以上※1	431	15.4	7.1	0.5	2.0	2.6	5.2	7.6	11.0	14.5	18.6	23.5	28.5	40.8	44.7
	(再掲)20歳以上※2	431	15.5	7.2	0.5	2.0	2.6	5.2	7.7	11.0	14.6	18.9	23.7	28.6	40.8	44.7
	20-29歳	40	14.0	6.2	1.7	3.4	3.4	5.3	5.7	8.8	12.1	18.5	23.1	24.7	30.1	30.1
	30-39歳	92	12.1	4.8	0.7	1.5	1.5	6.1	6.7	9.6	10.7	15.1	20.5	21.7	26.4	26.4
	40-49歳	71	12.2	4.5	0.8	5.0	5.0	6.4	6.9	8.6	11.4	14.9	18.1	19.3	30.2	30.2
	50-59歳	73	15.2	6.3	0.6	4.0	4.7	6.4	7.6	11.3	15.5	18.1	22.3	30.2	37.9	37.9
	60-69歳	108	17.6	5.9	0.8	5.4	6.2	9.5	10.6	12.7	16.4	21.6	25.5	28.5	35.0	35.1
	70歳以上	151	18.2	7.3	0.7	4.3	4.9	9.0	10.2	13.5	16.6	21.1	28.0	34.2	40.6	47.5
	(再掲)20-39歳	92	12.9	5.5	0.8	1.5	3.3	5.7	6.6	9.6	11.3	15.9	21.1	23.2	30.1	30.1
	(再掲)40-64歳	184	14.4	5.7	0.6	4.0	4.7	6.5	7.7	10.3	13.1	17.6	20.9	24.5	35.5	37.9
総数	(再掲)65歳以上	219	18.1	7.0	0.6	4.3	5.1	9.1	10.4	13.4	16.5	21.3	28.3	34.1	38.2	47.5
	(再掲)20歳以上※1	495	15.2	6.5	0.5	1.5	4.9	6.7	8.0	10.5	14.6	18.9	23.3	27.7	36.5	47.5
	(再掲)20歳以上※2	495	15.1	6.4	0.5	1.5	4.9	6.7	8.0	10.4	14.4	18.8	23.2	27.1	36.2	47.5
	(再掲)20歳以上※2	495	15.1	6.4	0.5	1.5	4.9	6.7	8.0	10.4	14.4	18.8	23.2	27.1	36.2	47.5

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

水溶性食物繊維(g)

年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20-29歳	75	3.6	1.8	0.4	0.5	0.5	1.3	1.6	2.1	3.2	4.6	6.1	7.0	8.1	8.1
30-39歳	100	2.8	1.3	0.2	0.2	0.2	0.3	1.2	2.0	2.7	3.4	4.4	5.2	7.5	7.5
40-49歳	132	2.9	1.3	0.2	0.7	0.7	1.2	1.5	2.1	2.7	3.6	4.7	5.3	7.5	7.7
50-59歳	147	3.3	1.6	0.1	0.1	0.5	1.3	1.6	2.2	3.0	3.9	5.6	6.7	8.7	8.8
60-69歳	197	4.2	1.7	0.2	0.3	0.8	1.8	2.2	2.8	3.9	5.3	6.5	7.3	9.4	10.1
70歳以上	275	4.3	1.8	0.2	0.5	1.3	1.9	2.3	3.2	4.0	5.3	6.2	7.9	10.0	11.1
(再掲)20-39歳	175	3.1	1.6	0.2	0.2	0.3	0.9	1.4	2.0	2.8	3.9	5.6	6.6	7.7	8.1
(再掲)40-64歳	352	3.3	1.5	0.1	0.1	0.7	1.3	1.6	2.2	2.9	4.0	5.4	6.4	8.2	8.9
(再掲)65歳以上	399	4.3	1.8	0.1	0.3	1.3	1.8	2.2	3.1	4.0	5.3	6.4	7.9	10.0	11.1
(再掲)20歳以上※1	926	3.5	1.7	0.1	0.1	0.3	1.3	1.6	2.4	3.3	4.4	6.0	6.8	8.8	11.1
(再掲)20歳以上※2	926	3.5	1.7	0.1	0.1	0.3	1.3	1.6	2.3	3.3	4.4	6.0	6.9	8.8	11.1
20-29歳	35	3.7	1.4	0.4	0.5	0.5	1.4	1.6	2.8	3.3	4.6	5.7	5.8	6.8	6.8
30-39歳	48	2.7	1.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.6	2.8	3.2	4.4	6.8	7.5	7.5
40-49歳	61	3.2	1.4	0.3	0.7	0.7	0.7	1.5	2.3	2.8	4.1	5.1	6.2	7.2	7.2
50-59歳	74	3.0	1.4	0.2	0.1	0.3	1.1	1.4	2.1	2.8	3.7	4.9	6.8	7.0	7.0
60-69歳	89	4.2	2.0	0.2	0.3	0.5	1.4	2.2	2.7	3.9	5.5	7.1	8.2	10.1	10.1
70歳以上	124	4.3	1.8	0.2	0.6	1.3	1.7	2.3	3.2	4.1	5.3	6.7	7.4	10.0	10.0
(再掲)20-39歳	83	3.1	1.6	0.2	0.3	0.3	0.3	1.3	2.3	3.0	3.8	5.6	5.8	7.5	7.5
(再掲)40-64歳	168	3.3	1.5	0.2	0.1	0.6	1.0	1.6	2.3	2.9	4.0	5.3	6.7	7.8	8.9
(再掲)65歳以上	180	4.3	1.9	0.2	0.3	1.2	1.6	2.2	3.0	4.1	5.4	6.7	8.4	10.0	10.1
(再掲)20歳以上※1	431	3.5	1.7	0.1	0.1	0.3	1.0	1.6	2.4	3.2	4.4	5.8	6.9	9.1	10.1
(再掲)20歳以上※2	431	3.5	1.7	0.1	0.1	0.3	1.1	1.6	2.4	3.2	4.4	5.9	6.9	9.3	10.1
20-29歳	40	3.6	2.1	0.6	0.5	0.5	1.1	1.7	1.9	2.9	5.1	6.7	7.3	8.1	8.1
30-39歳	92	2.8	1.1	0.2	0.2	0.2	1.1	1.2	2.1	2.5	3.5	4.4	5.2	6.2	6.2
40-49歳	71	2.7	1.1	0.2	1.1	1.1	1.3	1.5	1.8	2.7	3.1	4.1	5.1	7.7	7.7
50-59歳	73	3.5	1.7	0.3	0.7	0.8	1.3	1.8	2.5	3.4	4.2	6.0	6.9	8.8	8.8
60-69歳	108	4.1	1.5	0.2	0.9	1.3	1.9	2.3	3.0	3.8	5.1	6.4	6.9	9.2	9.5
70歳以上	151	4.3	1.8	0.2	0.5	1.2	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.2	8.2	10.6	11.1
(再掲)20-39歳	92	3.1	1.6	0.2	0.2	0.3	1.1	1.5	2.0	2.7	3.9	5.7	6.5	8.1	8.1
(再掲)40-64歳	184	3.3	1.5	0.2	0.7	1.0	1.3	1.6	2.2	3.0	4.0	5.6	6.2	8.6	8.8
(再掲)65歳以上	219	4.3	1.7	0.1	0.5	1.4	2.0	2.3	3.2	3.9	5.1	6.4	7.9	10.1	11.1
(再掲)20歳以上※1	495	3.6	1.7	0.1	0.2	0.9	1.3	1.8	2.3	3.3	4.3	6.0	7.0	8.8	11.1
(再掲)20歳以上※2	495	3.5	1.7	0.1	0.2	0.9	1.3	1.8	2.3	3.3	4.3	6.0	6.8	8.7	11.1

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

不溶性食物繊維(g)

年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20-29歳	75	10.3	4.4	0.9	2.7	2.7	3.9	5.7	6.5	9.5	13.2	16.3	16.9	22.4	22.4
30-39歳	100	9.2	4.8	0.7	0.9	1.1	3.5	4.7	6.7	8.0	11.5	14.6	16.3	34.1	34.2
40-49歳	132	9.7	3.8	0.5	2.2	2.2	3.8	5.1	7.1	9.6	11.9	13.9	15.4	22.8	22.9
50-59歳	147	10.5	4.6	0.4	1.8	2.5	4.5	5.7	7.3	10.0	15.7	15.7	20.2	27.4	29.1
60-69歳	197	13.1	5.3	0.6	3.2	4.0	6.3	7.5	9.0	12.5	16.1	19.0	21.6	31.3	32.2
70歳以上	275	13.6	5.6	0.6	3.1	3.3	6.5	7.4	9.7	12.9	15.9	21.4	25.6	30.7	36.5
(再掲)20-39歳	175	9.7	4.7	0.5	0.9	1.3	3.8	5.0	6.6	8.2	12.1	15.3	16.7	29.0	34.2
(再掲)40-64歳	352	10.6	4.4	0.3	1.8	2.0	4.3	5.8	7.5	10.2	13.0	15.8	18.7	23.6	29.4
(再掲)65歳以上	399	13.5	5.7	0.4	3.1	3.4	6.4	7.4	9.5	12.7	16.1	21.2	24.6	31.9	36.5
(再掲)20歳以上※1	926	11.2	5.2	0.3	0.9	2.1	4.4	5.8	7.6	10.8	13.7	17.2	21.4	29.3	36.5
(再掲)20歳以上※2	926	11.2	5.2	0.3	0.9	2.1	4.4	5.8	7.6	10.8	13.7	17.2	21.4	29.4	36.5
20-29歳	35	10.9	4.1	1.1	3.3	3.3	5.8	6.0	7.4	10.6	13.5	16.0	18.0	22.4	22.4
30-39歳	48	9.4	5.9	1.1	0.9	0.9	1.8	3.7	6.4	7.9	11.5	14.5	23.6	34.2	34.2
40-49歳	61	10.3	4.2	0.7	2.2	2.2	2.2	5.0	8.0	10.3	12.7	13.9	17.9	22.9	22.9
50-59歳	74	10.2	4.5	0.7	2.4	2.5	3.7	5.1	7.3	9.7	13.0	15.6	17.8	25.6	25.6
60-69歳	89	13.4	6.1	0.8	3.2	3.3	4.5	6.7	8.8	12.2	17.2	19.6	28.7	32.2	32.2
70歳以上	124	13.8	5.9	0.7	3.1	3.2	6.0	7.8	9.6	13.3	16.3	20.8	27.9	31.6	31.9
(再掲)20-39歳	83	10.0	5.3	0.6	0.9	1.0	3.3	4.8	6.7	9.0	12.6	15.5	17.8	34.2	34.2
(再掲)40-64歳	168	10.7	4.5	0.4	2.2	2.2	3.7	5.2	7.6	10.3	13.0	16.9	18.9	24.9	29.4
(再掲)65歳以上	180	13.8	6.2	0.6	3.1	3.3	5.9	7.3	9.2	13.1	16.6	20.8	29.1	32.1	32.2
(再掲)20歳以上※1	431	11.4	5.5	0.4	0.9	1.9	4.0	5.6	7.7	10.6	13.7	17.5	21.8	32.0	34.2
(再掲)20歳以上※2	431	11.4	5.6	0.4	0.9	1.8	4.0	5.7	7.8	10.7	13.7	18.0	22.4	32.0	34.2
20-29歳	40	9.8	4.6	1.3	2.7	2.7	3.5	4.4	6.2	9.4	12.5	16.6	18.0	21.8	21.8
30-39歳	92	9.1	3.7	0.5	1.3	1.3	4.7	5.3	6.8	8.1	11.5	14.6	16.3	21.9	21.9
40-49歳	71	9.1	3.4	0.6	3.4	3.4	4.7	5.1	6.6	8.5	11.1	13.7	14.7	22.6	22.6
50-59歳	73	10.9	4.8	0.5	1.8	1.9	4.8	6.0	7.4	10.5	13.1	16.9	21.2	29.1	29.1
60-69歳	108	13.0	4.5	0.6	4.1	4.7	7.2	7.7	8.9	12.7	15.7	18.5	21.3	28.6	29.0
70歳以上	151	13.4	5.4	0.5	3.1	3.7	6.5	7.4	9.9	12.2	15.8	21.5	23.6	30.3	36.5
(再掲)20-39歳	92	9.4	4.1	0.7	1.3	1.9	4.0	4.9	6.4	8.1	11.8	15.8	16.9	21.9	21.9
(再掲)40-64歳	184	10.5	4.3	0.5	1.8	3.1	4.9	5.9	7.4	9.9	12.9	15.4	18.3	25.5	29.1
(再掲)65歳以上	219	13.3	5.3	0.4	3.1	4.0	6.5	7.4	9.6	12.4	15.8	21.4	23.5	28.7	36.5
(再掲)20歳以上※1	495	11.1	4.8	0.4	1.3	3.2	4.8	5.9	7.5	10.8	13.8	17.0	21.3	28.2	36.5
(再掲)20歳以上※2	495	11.1	4.8	0.4	1.3	3.1	4.7	5.9	7.4	10.8	13.6	16.9	21.3	27.7	36.5

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

n-3系脂肪酸(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	2.38	1.38	0.21	0.31	0.34	0.59	0.78	1.14	2.29	3.47	4.20	5.26	5.77	5.77
	30-39歳	100	1.67	1.19	0.19	0.08	0.08	0.19	0.47	0.77	1.48	2.35	3.24	4.22	7.19	7.22
	40-49歳	132	2.30	1.65	0.20	0.25	0.25	0.48	0.63	1.15	2.02	2.94	3.94	5.37	9.38	9.83
	50-59歳	147	2.20	1.23	0.11	0.27	0.27	0.40	0.73	1.29	2.07	2.72	3.89	5.15	5.82	5.85
	60-69歳	197	2.40	1.47	0.15	0.34	0.43	0.60	0.93	1.29	2.12	3.06	4.20	4.74	8.11	12.72
	70歳以上	275	2.46	1.57	0.16	0.09	0.38	0.60	0.85	1.28	2.12	3.36	4.62	5.39	7.81	10.05
	(再掲)20-39歳	175	1.96	1.31	0.14	0.08	0.08	0.40	0.50	0.95	1.62	2.70	3.95	4.35	6.07	7.22
	(再掲)40-64歳	352	2.26	1.38	0.11	0.25	0.27	0.48	0.73	1.24	2.07	2.93	3.93	4.57	6.55	9.83
	(再掲)65歳以上	399	2.46	1.59	0.15	0.09	0.42	0.60	0.90	1.29	2.11	3.27	4.62	5.37	8.02	12.72
	(再掲)20歳以上※1	926	2.25	1.47	0.10	0.08	0.16	0.49	0.69	1.18	1.98	3.00	4.11	4.91	7.68	12.72
男性	(再掲)20歳以上※2	926	2.24	1.45	0.10	0.08	0.15	0.49	0.68	1.18	1.98	3.00	4.11	4.88	7.57	12.72
	20-29歳	35	2.86	1.55	0.42	0.31	0.31	0.77	0.97	1.45	3.05	4.05	5.43	5.73	5.77	5.77
	30-39歳	48	1.73	1.33	0.29	0.08	0.08	0.08	0.15	0.76	1.60	2.33	3.25	4.37	7.22	7.22
	40-49歳	61	2.80	1.90	0.35	0.26	0.26	0.52	0.82	1.68	2.51	3.66	4.53	6.37	9.83	9.83
	50-59歳	74	2.26	1.21	0.14	0.27	0.27	0.31	0.75	1.50	2.32	2.68	4.14	5.20	5.85	5.85
	60-69歳	89	2.60	1.36	0.17	0.34	0.36	0.65	1.12	1.70	2.50	3.18	4.36	4.55	12.72	12.72
	70歳以上	124	2.68	1.61	0.19	0.09	0.36	0.70	1.01	1.46	2.23	3.78	4.62	5.38	8.95	10.05
	(再掲)20-39歳	83	2.19	1.52	0.23	0.08	0.08	0.09	0.50	1.10	1.80	3.22	4.21	5.66	7.22	7.22
	(再掲)40-64歳	168	2.54	1.50	0.17	0.26	0.26	0.54	0.89	1.73	2.40	3.11	4.21	5.37	8.76	9.83
	(再掲)65歳以上	180	2.65	1.60	0.17	0.09	0.40	0.69	1.01	1.46	2.31	3.76	4.53	5.31	8.06	12.72
女性	(再掲)20歳以上※1	431	2.47	1.56	0.14	0.08	0.08	0.43	0.77	1.42	2.24	3.25	4.30	5.45	7.89	12.72
	(再掲)20歳以上※2	431	2.46	1.54	0.14	0.08	0.08	0.43	0.77	1.42	2.24	3.24	4.30	5.43	7.65	12.72
	20-29歳	40	2.00	1.11	0.21	0.35	0.36	0.49	0.71	1.03	1.90	2.77	3.58	4.11	4.40	4.40
	30-39歳	92	1.63	1.07	0.20	0.26	0.26	0.47	0.48	0.86	1.38	2.30	3.38	3.98	4.55	4.55
	40-49歳	71	1.82	1.18	0.15	0.25	0.25	0.31	0.48	0.99	1.67	2.39	3.26	4.07	6.56	6.56
	50-59歳	73	2.14	1.24	0.15	0.33	0.33	0.41	0.73	1.16	1.90	2.91	3.88	5.22	5.35	5.35
	60-69歳	108	2.24	1.54	0.20	0.50	0.50	0.52	0.92	1.14	1.98	2.63	4.15	4.80	9.47	9.91
	70歳以上	151	2.27	1.52	0.18	0.24	0.39	0.51	0.78	1.21	1.87	2.84	4.65	5.29	8.35	9.34
	(再掲)20-39歳	92	1.78	1.10	0.15	0.26	0.26	0.47	0.50	0.89	1.48	2.57	3.47	4.10	4.55	4.55
	(再掲)40-64歳	184	1.98	1.19	0.10	0.25	0.25	0.47	0.62	1.08	1.85	2.57	3.74	4.14	5.98	6.56
女性	(再掲)65歳以上	219	2.31	1.57	0.16	0.24	0.42	0.51	0.82	1.22	1.90	2.85	4.52	5.29	8.17	9.91
	(再掲)20歳以上※1	495	2.03	1.34	0.09	0.24	0.26	0.49	0.62	1.10	1.83	2.60	3.82	4.40	7.57	9.91
	(再掲)20歳以上※2	495	2.03	1.33	0.09	0.24	0.26	0.49	0.62	1.10	1.80	2.59	3.82	4.40	7.43	9.91
	(再掲)20歳以上※2	495	2.03	1.33	0.09	0.24	0.26	0.49	0.62	1.10	1.80	2.59	3.82	4.40	7.43	9.91

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

n-6系脂肪酸(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	11.15	5.83	1.08	1.76	2.15	3.69	5.38	7.15	10.28	14.16	20.35	22.50	36.44
	30-39歳	100	9.46	5.23	0.76	1.62	1.93	2.45	3.76	5.40	8.67	11.73	16.58	20.17	36.44
	40-49歳	132	9.66	4.13	0.36	1.61	1.72	3.24	4.37	6.79	9.10	12.08	15.42	16.85	27.35
	50-59歳	147	10.13	4.34	0.55	2.61	2.92	4.77	5.15	6.59	9.47	12.72	16.56	17.53	27.35
	60-69歳	197	10.62	4.77	0.43	1.41	2.19	4.01	4.83	7.17	10.03	13.68	16.89	19.60	26.69
	70歳以上	275	9.38	4.37	0.33	1.47	2.33	3.58	4.31	6.26	8.78	11.42	15.37	18.40	29.86
	(再掲)20-39歳	175	10.15	5.53	0.62	1.62	1.93	3.29	4.39	6.30	8.83	12.63	17.60	21.31	25.19
	(再掲)40-64歳	352	10.25	4.51	0.28	1.61	2.18	3.75	5.14	6.80	9.70	12.73	16.20	17.86	36.44
	(再掲)65歳以上	399	9.53	4.35	0.22	1.41	2.77	3.64	4.50	6.35	8.84	11.76	16.27	18.52	24.07
	(再掲)20歳以上※1	926	10.08	4.86	0.28	1.41	2.13	3.62	4.79	6.64	9.24	12.49	16.60	19.66	26.50
男性	(再掲)20歳以上※2	926	10.09	4.88	0.30	1.41	2.12	3.63	4.79	6.63	9.25	12.50	16.60	19.68	36.44
	20-29歳	35	13.50	6.85	1.70	5.00	5.04	6.27	6.70	7.89	11.53	17.87	22.84	27.92	36.44
	30-39歳	48	10.11	5.96	1.25	1.94	1.94	2.16	2.49	5.39	8.88	15.93	18.41	21.42	26.86
	40-49歳	61	10.25	4.05	0.74	2.17	2.17	3.97	5.37	7.11	9.79	12.58	15.69	19.62	21.19
	50-59歳	74	10.40	3.97	0.35	2.97	3.14	4.18	5.16	7.55	10.20	12.74	16.03	17.63	20.97
	60-69歳	89	12.28	4.89	0.64	1.41	2.96	4.96	6.01	8.67	11.95	15.59	19.08	22.25	25.19
	70歳以上	124	10.02	4.73	0.53	1.53	1.86	3.81	4.33	6.82	9.29	12.35	17.74	19.42	26.50
	(再掲)20-39歳	83	11.49	6.52	0.96	1.94	1.94	2.42	4.16	7.33	10.21	15.96	20.37	24.66	36.44
	(再掲)40-64歳	168	10.96	4.40	0.30	2.17	2.17	4.29	5.76	7.81	10.73	13.71	16.71	19.54	25.19
	(再掲)65歳以上	180	10.31	4.69	0.46	1.41	2.22	3.92	4.69	7.25	9.54	12.41	17.76	19.63	22.15
女性	(再掲)20歳以上※1	431	10.98	5.25	0.34	1.41	1.97	3.64	5.23	7.39	10.01	13.98	18.42	20.44	26.89
	(再掲)20歳以上※2	431	10.97	5.26	0.36	1.41	1.95	3.63	5.19	7.39	10.01	13.99	18.42	20.45	36.44
	20-29歳	40	9.24	4.00	0.76	1.76	1.86	2.98	3.76	5.99	8.21	12.51	14.44	15.46	20.23
	30-39歳	92	8.95	4.56	0.74	1.62	1.62	3.52	4.51	5.28	8.46	10.34	15.00	19.46	27.35
	40-49歳	71	9.08	4.15	0.42	1.61	1.61	2.97	3.74	6.64	8.69	11.53	15.19	16.60	26.69
	50-59歳	73	9.86	4.69	0.90	2.61	2.61	4.78	5.08	6.37	9.37	12.60	16.61	17.60	29.86
	60-69歳	108	9.33	4.27	0.47	2.18	2.19	3.07	4.47	6.40	8.72	11.78	15.05	18.79	23.08
	70歳以上	151	8.85	3.99	0.34	1.47	2.40	3.58	4.31	5.62	8.39	10.63	13.46	17.01	23.09
	(再掲)20-39歳	92	9.07	4.32	0.55	1.62	1.76	3.69	4.39	5.55	8.39	11.25	14.56	16.58	27.35
	(再掲)40-64歳	184	9.54	4.51	0.52	1.61	2.19	3.46	4.55	6.40	9.11	12.28	15.56	16.67	29.86
女性	(再掲)65歳以上	219	8.93	3.98	0.23	1.47	2.74	3.58	4.49	5.95	8.43	10.59	14.50	16.87	23.04
	(再掲)20歳以上※1	495	9.18	4.26	0.30	1.47	2.19	3.58	4.47	6.03	8.74	11.37	14.65	16.65	29.86
	(再掲)20歳以上※2	495	9.20	4.28	0.32	1.47	2.19	3.60	4.49	6.03	8.75	11.38	14.65	16.65	29.86

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

食塩相当量(g)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	9.4	3.0	0.5	2.4	2.5	4.5	5.0	7.3	9.5	11.3	12.6	14.2	25.0	25.0
	30-39歳	100	9.7	3.1	0.4	3.0	3.7	5.2	5.9	7.1	10.0	11.9	14.3	14.6	20.4	20.4
	40-49歳	132	9.8	4.0	0.3	2.7	2.7	3.7	4.4	7.3	9.3	11.5	15.9	17.4	20.5	20.6
	50-59歳	147	10.4	3.4	0.3	1.7	1.9	5.2	6.2	8.4	10.1	12.1	14.8	15.9	22.9	28.1
	60-69歳	197	10.5	3.9	0.4	4.1	4.1	5.1	6.1	7.9	9.9	12.2	16.4	19.4	21.4	21.8
	70歳以上	275	10.7	3.8	0.3	3.3	4.7	5.6	6.1	7.6	9.9	13.3	16.8	17.6	19.8	23.2
	(再掲)20-39歳	175	9.6	3.1	0.3	2.4	2.7	4.9	5.7	7.1	9.9	11.5	13.5	14.6	19.6	25.0
	(再掲)40-64歳	352	10.2	3.7	0.2	1.7	2.7	4.1	5.8	7.8	10.0	12.1	14.9	16.8	21.0	28.1
	(再掲)65歳以上	399	10.6	3.9	0.2	3.3	4.6	5.5	6.1	7.6	9.9	13.2	16.8	17.7	20.5	23.2
	(再掲)20歳以上※1	926	10.2	3.6	0.2	1.7	2.9	5.0	5.9	7.6	10.0	12.2	15.1	17.1	20.5	28.1
男性	(再掲)20歳以上※2	926	10.2	3.6	0.2	1.7	3.0	5.1	6.0	7.6	10.0	12.2	15.1	17.0	20.5	28.1
	20-29歳	35	10.3	3.2	0.9	2.6	2.6	3.1	6.1	8.4	10.2	12.5	14.2	15.7	17.8	17.8
	30-39歳	48	10.3	3.2	0.7	3.0	3.0	4.9	5.5	7.8	10.8	12.7	14.1	14.9	20.2	20.2
	40-49歳	61	10.7	4.4	0.8	2.7	2.7	3.7	4.3	7.6	10.2	13.9	17.0	17.9	20.6	20.6
	50-59歳	74	11.5	3.1	0.5	1.7	2.5	5.4	7.5	9.9	11.5	13.8	15.5	16.2	17.1	17.1
	60-69歳	89	11.6	4.0	0.6	5.0	5.1	5.7	7.6	9.1	10.7	13.3	18.0	20.6	21.8	21.8
	70歳以上	124	11.5	3.8	0.4	5.0	5.2	6.6	7.4	8.1	10.9	14.4	17.2	17.8	22.2	23.2
	(再掲)20-39歳	83	10.3	3.2	0.5	2.6	2.6	4.7	5.5	8.0	10.6	12.7	13.6	15.1	20.2	20.2
	(再掲)40-64歳	168	11.2	3.7	0.4	1.7	2.9	4.4	6.1	8.6	11.0	13.5	16.2	17.2	21.3	21.6
	(再掲)65歳以上	180	11.5	3.9	0.3	5.0	5.1	5.7	7.3	8.3	10.6	14.5	17.4	18.5	22.0	23.2
女性	(再掲)20歳以上※1	431	11.0	3.7	0.2	1.7	2.7	5.1	6.5	8.5	10.9	13.2	16.2	17.5	20.7	23.2
	(再掲)20歳以上※2	431	11.0	3.7	0.2	1.7	2.8	5.1	6.5	8.5	10.9	13.2	16.2	17.5	20.7	23.2
	20-29歳	40	8.6	2.7	0.5	2.4	2.7	4.3	4.9	6.6	8.7	10.1	11.6	12.0	25.0	25.0
	30-39歳	92	9.3	3.0	0.3	4.1	4.1	5.6	5.9	7.0	8.3	10.6	14.0	14.6	20.4	20.4
	40-49歳	71	9.0	3.3	0.5	2.9	2.9	3.0	5.1	7.2	8.5	10.4	13.9	16.0	20.0	20.0
	50-59歳	73	9.3	3.4	0.4	2.0	2.0	4.8	5.8	7.5	9.3	10.8	12.2	13.9	28.1	28.1
	60-69歳	108	9.6	3.6	0.5	4.1	4.1	4.5	5.6	7.2	8.8	11.1	14.3	18.3	20.4	20.5
	70歳以上	151	10.0	3.7	0.3	3.3	3.7	5.3	6.0	7.1	9.4	12.7	15.9	17.2	18.1	21.7
	(再掲)20-39歳	92	9.0	2.9	0.3	2.4	3.8	4.9	5.8	6.9	8.6	10.4	13.0	14.3	25.0	25.0
	(再掲)40-64歳	184	9.2	3.3	0.3	2.0	2.2	4.0	5.4	7.3	9.0	10.8	12.9	14.4	21.8	28.1
女性	(再掲)65歳以上	219	9.9	3.7	0.2	3.3	4.2	5.3	6.0	7.1	9.3	12.0	15.9	17.6	19.7	21.7
	(再掲)20歳以上※1	495	9.4	3.4	0.2	2.0	3.0	4.9	5.8	7.1	8.9	11.0	14.3	15.7	19.8	28.1
	(再掲)20歳以上※2	495	9.4	3.4	0.2	2.0	3.0	4.9	5.8	7.1	8.9	11.0	14.3	15.7	19.8	28.1
	(再掲)20歳以上※2	495	9.4	3.4	0.2	2.0	3.0	4.9	5.8	7.1	8.9	10.9	14.2	15.5	19.9	28.1

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

食塩相当量(g/1000kcal)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	4.9	1.5	0.3	2.1	2.1	2.6	3.2	3.8	4.7	5.8	7.5	8.5	9.2	9.2
	30-39歳	100	5.5	1.8	0.3	2.0	2.2	2.8	3.2	4.6	5.2	6.3	8.5	9.1	11.7	11.7
	40-49歳	132	5.1	1.4	0.1	1.7	1.8	2.3	3.4	4.2	5.2	6.1	6.8	7.4	10.4	10.8
	50-59歳	147	5.7	1.8	0.2	1.6	1.6	3.1	3.8	4.5	5.3	6.7	8.2	8.8	10.7	11.7
	60-69歳	197	5.5	1.7	0.2	2.3	2.8	3.2	3.8	4.4	5.3	6.1	7.7	9.3	11.4	11.7
	70歳以上	275	5.7	1.7	0.1	1.7	2.8	3.4	3.5	4.4	5.3	6.8	8.0	8.9	11.1	15.4
	(再掲)20-39歳	175	5.3	1.7	0.2	2.0	2.1	2.8	3.2	4.1	5.1	5.9	7.7	8.6	11.1	11.7
	(再掲)40-64歳	352	5.4	1.6	0.1	1.6	2.2	2.9	3.5	4.4	5.3	6.3	7.5	8.5	10.3	11.7
	(再掲)65歳以上	399	5.7	1.8	0.1	1.7	2.8	3.3	3.6	4.4	5.2	6.7	8.0	9.0	11.1	15.4
	(再掲)20歳以上※1	926	5.4	1.7	0.1	1.6	2.2	3.0	3.5	4.4	5.2	6.2	7.7	8.6	10.5	15.4
男性	(再掲)20歳以上※2	926	5.4	1.7	0.1	1.6	2.2	3.0	3.5	4.4	5.2	6.2	7.7	8.6	10.5	15.4
	20-29歳	35	4.5	1.2	0.3	2.1	2.1	2.4	3.2	3.7	4.2	5.0	6.1	7.5	8.4	8.4
	30-39歳	48	5.3	1.8	0.3	2.0	2.0	2.7	3.2	4.5	5.2	6.0	7.4	9.0	11.7	11.7
	40-49歳	61	5.1	1.4	0.2	1.7	1.7	2.0	3.4	4.2	5.1	5.9	6.6	6.8	10.8	10.8
	50-59歳	74	5.7	1.8	0.3	2.1	2.2	3.1	3.6	4.5	5.4	6.6	8.1	10.1	11.7	11.7
	60-69歳	89	5.4	1.5	0.2	2.3	2.6	3.2	3.8	4.5	5.4	5.8	7.4	8.5	10.0	10.0
	70歳以上	124	5.6	1.8	0.2	2.6	2.7	3.4	3.5	4.4	5.0	6.7	8.2	8.9	11.0	11.3
	(再掲)20-39歳	83	5.0	1.6	0.2	2.0	2.0	2.8	3.2	3.8	5.0	5.7	7.4	7.6	11.7	11.7
	(再掲)40-64歳	168	5.4	1.6	0.1	1.7	2.1	2.7	3.5	4.5	5.4	6.2	7.2	8.4	10.7	11.7
	(再掲)65歳以上	180	5.5	1.7	0.1	2.6	2.8	3.3	3.5	4.4	5.1	6.6	8.1	8.6	10.5	11.3
女性	(再掲)20歳以上※1	431	5.3	1.6	0.1	1.7	2.1	3.0	3.5	4.3	5.1	6.1	7.4	8.2	10.5	11.7
	(再掲)20歳以上※2	431	5.3	1.7	0.1	1.7	2.1	3.0	3.5	4.3	5.1	6.1	7.5	8.4	10.6	11.7
	20-29歳	40	5.3	1.7	0.4	2.2	2.4	2.5	3.3	4.0	5.2	5.9	8.3	8.6	9.2	9.2
	30-39歳	92	5.7	1.8	0.3	2.7	2.7	2.9	3.4	4.6	5.2	6.9	8.7	9.2	9.2	9.2
	40-49歳	71	5.2	1.5	0.2	2.3	2.3	2.7	3.2	4.2	5.3	6.3	7.1	8.0	10.5	10.5
	50-59歳	73	5.6	1.7	0.3	1.6	1.6	3.1	3.9	4.6	5.3	6.8	8.4	8.8	9.4	9.4
	60-69歳	108	5.6	1.9	0.2	2.3	2.6	3.2	3.6	4.4	5.2	6.4	8.0	9.9	11.6	11.7
	70歳以上	151	5.7	1.7	0.1	1.7	2.6	3.4	3.5	4.6	5.4	6.8	7.7	9.2	10.9	15.4
	(再掲)20-39歳	92	5.5	1.8	0.3	2.2	2.4	2.8	3.4	4.4	5.2	6.5	8.6	8.8	9.2	9.2
	(再掲)40-64歳	184	5.4	1.6	0.2	1.6	1.8	3.0	3.5	4.3	5.2	6.3	7.6	8.6	9.4	10.5
女性	(再掲)65歳以上	219	5.7	1.8	0.1	1.7	2.8	3.4	3.8	4.5	5.4	6.8	7.7	9.3	11.4	15.4
	(再掲)20歳以上※1	495	5.5	1.7	0.1	1.6	2.3	3.0	3.5	4.4	5.2	6.6	7.9	8.8	11.0	15.4
	(再掲)20歳以上※2	495	5.5	1.7	0.1	1.6	2.3	3.0	3.5	4.4	5.2	6.6	8.0	8.8	10.9	15.4
	(再掲)20歳以上※2	495	5.5	1.7	0.1	1.6	2.3	3.0	3.5	4.4	5.2	6.6	8.0	8.8	10.9	15.4

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

たんぱく質エネルギー比率(%)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	15.8	2.8	0.6	8.8	8.8	11.4	12.3	14.0	15.3	18.7	19.4	20.0	23.5	23.5
	30-39歳	100	14.7	3.2	0.3	7.9	7.9	10.0	10.7	12.6	14.2	17.2	18.6	20.7	27.5	27.6
	40-49歳	132	14.9	3.2	0.4	6.3	9.0	11.2	11.7	12.8	14.6	16.5	18.3	19.6	28.5	29.7
	50-59歳	147	15.0	3.1	0.3	8.2	8.3	10.1	11.4	13.1	14.6	16.5	19.6	21.9	23.7	24.1
	60-69歳	197	15.7	2.6	0.3	9.6	9.8	11.6	12.4	14.0	15.3	17.1	19.4	20.7	22.9	23.0
	70歳以上	275	15.3	2.5	0.2	8.6	9.7	11.6	12.3	13.5	15.1	17.0	18.6	19.6	23.6	24.5
	(再掲)20-39歳	175	15.2	3.1	0.3	7.9	7.9	10.3	11.4	13.2	15.0	17.5	19.4	20.2	22.9	27.6
	(再掲)40-64歳	352	15.0	3.0	0.3	6.3	8.7	11.1	11.8	13.2	14.6	16.5	18.7	20.4	23.9	29.7
	(再掲)65歳以上	399	15.5	2.6	0.2	8.6	9.7	11.6	12.3	13.7	15.3	17.1	18.8	20.0	22.9	24.5
	(再掲)20歳以上※1	926	15.2	3.0	0.2	6.3	8.6	10.8	11.8	13.3	14.9	16.9	19.1	20.2	23.0	29.7
男性	(再掲)20歳以上※2	926	15.2	2.9	0.2	6.3	8.6	10.8	11.8	13.3	14.9	16.9	19.1	20.2	22.9	29.7
	20-29歳	35	15.2	3.2	0.8	8.8	8.8	9.8	11.4	12.9	15.0	18.1	19.3	20.2	23.5	23.5
	30-39歳	48	14.5	3.8	0.8	7.9	7.9	7.9	9.7	11.7	14.3	17.5	18.7	20.5	27.6	27.6
	40-49歳	61	15.0	3.9	0.6	6.3	6.3	10.4	11.6	12.9	14.4	16.5	19.1	21.6	29.7	29.7
	50-59歳	74	14.3	2.8	0.3	8.2	8.2	10.0	11.3	12.2	14.2	16.1	18.1	19.4	24.1	24.1
	60-69歳	89	15.4	2.4	0.4	9.6	10.0	11.6	12.5	13.9	15.3	17.0	18.5	20.8	21.6	21.6
	70歳以上	124	14.9	2.4	0.3	8.6	9.7	11.6	12.2	13.3	14.8	16.2	18.3	19.5	22.8	23.8
	(再掲)20-39歳	83	14.8	3.5	0.6	7.9	7.9	8.4	10.2	12.3	14.7	17.5	19.0	20.2	27.6	27.6
	(再掲)40-64歳	168	14.8	3.2	0.3	6.3	7.9	10.4	11.4	12.9	14.3	16.5	18.6	19.6	27.9	29.7
	(再掲)65歳以上	180	15.1	2.4	0.2	8.6	10.0	11.6	12.2	13.3	14.9	16.6	18.5	19.6	21.9	23.8
女性	(再掲)20歳以上※1	431	14.9	3.1	0.3	6.3	7.9	10.2	11.4	13.0	14.6	16.7	18.7	19.7	24.5	29.7
	(再掲)20歳以上※2	431	14.9	3.1	0.3	6.3	7.9	10.2	11.4	13.1	14.6	16.7	18.7	19.7	24.0	29.7
	20-29歳	40	16.3	2.4	0.5	10.2	10.5	12.4	13.7	14.6	15.7	18.9	19.4	19.8	21.3	21.3
	30-39歳	92	14.9	2.7	0.5	10.4	10.4	10.6	11.9	12.9	14.2	17.0	18.5	20.8	22.4	22.4
	40-49歳	71	14.8	2.4	0.4	9.6	10.7	11.2	11.7	12.8	14.7	16.4	18.3	18.6	20.4	20.4
	50-59歳	73	15.7	3.3	0.5	8.7	8.7	10.3	12.5	13.6	15.0	17.5	21.3	22.2	23.3	23.3
	60-69歳	108	15.8	2.7	0.3	9.7	9.7	11.6	12.3	14.3	15.5	17.1	19.6	21.6	22.9	23.0
	70歳以上	151	15.7	2.6	0.3	9.6	9.6	11.6	12.2	14.0	15.7	17.5	18.6	19.9	24.0	24.5
	(再掲)20-39歳	92	15.5	2.7	0.3	10.2	10.2	11.8	12.4	13.7	15.1	17.5	19.4	20.6	22.4	22.4
	(再掲)40-64歳	184	15.2	2.8	0.4	8.7	9.7	11.5	12.3	13.4	14.7	16.6	19.5	21.0	23.0	23.3
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	15.8	2.7	0.3	9.6	9.6	11.5	12.2	14.2	15.7	17.5	19.2	20.2	23.5	24.5
	(再掲)20歳以上※1	495	15.5	2.7	0.2	8.7	9.8	11.6	12.3	13.7	15.2	17.2	19.4	20.4	22.9	24.5
	(再掲)20歳以上※2	495	15.5	2.8	0.2	8.7	9.8	11.6	12.3	13.7	15.2	17.2	19.4	20.5	22.9	24.5

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

脂肪エネルギー比率(%)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	29.3	6.5	1.2	16.3	16.7	18.1	20.0	23.9	30.5	33.9	36.5	41.8	46.5	46.5
	30-39歳	100	28.9	7.1	0.9	9.9	12.1	16.3	21.2	23.9	29.3	33.2	39.4	41.0	50.1	50.2
	40-49歳	132	29.0	8.3	0.8	9.7	12.4	16.7	17.8	22.9	29.4	33.5	40.5	43.6	49.7	58.3
	50-59歳	147	27.6	7.2	1.0	10.1	10.4	16.6	18.8	22.7	27.0	31.8	37.7	39.4	49.0	50.3
	60-69歳	197	27.2	6.8	0.6	8.9	11.3	14.6	17.3	23.3	27.5	31.3	36.5	38.3	41.6	47.4
	70歳以上	275	25.6	6.5	0.6	10.0	11.7	15.7	17.5	20.7	25.4	29.7	34.2	36.5	43.1	50.3
	(再掲)20-39歳	175	29.1	6.9	0.8	9.9	13.3	17.6	21.1	23.9	29.4	33.6	38.1	41.1	47.3	50.2
	(再掲)40-64歳	352	28.3	7.7	0.8	9.7	10.9	16.6	18.1	22.8	28.0	32.7	38.6	41.1	48.2	58.3
	(再掲)65歳以上	399	25.9	6.5	0.5	8.9	11.8	15.7	17.5	20.9	25.6	30.3	34.6	37.3	41.8	50.3
	(再掲)20歳以上※1	926	27.7	7.2	0.5	8.9	11.8	16.5	18.4	22.8	27.6	32.4	37.3	40.2	46.1	58.3
男性	(再掲)20歳以上※2	926	27.7	7.2	0.5	8.9	11.7	16.5	18.4	22.8	27.6	32.3	37.1	40.2	45.4	58.3
	20-29歳	35	28.5	5.8	1.1	17.9	17.9	18.1	18.9	23.7	30.6	32.7	34.2	37.0	44.3	44.3
	30-39歳	48	28.1	8.1	1.3	9.9	10.2	13.4	18.5	21.7	28.3	34.8	39.4	40.7	50.2	50.2
	40-49歳	61	27.8	7.8	0.9	13.2	15.9	16.6	17.0	21.9	27.0	31.9	38.9	41.8	49.7	49.7
	50-59歳	74	26.1	7.3	0.8	11.0	11.0	16.3	16.8	21.4	25.5	30.8	37.0	38.5	50.3	50.3
	60-69歳	89	27.5	6.4	0.8	8.9	9.6	16.4	17.4	23.8	28.1	31.1	35.4	37.5	47.4	47.4
	70歳以上	124	24.4	6.1	0.7	10.0	10.4	15.1	16.7	19.5	23.8	29.0	32.0	34.5	42.5	43.3
	(再掲)20-39歳	83	28.3	7.2	1.0	9.9	11.0	15.9	18.9	23.0	28.6	33.3	37.1	39.4	50.2	50.2
	(再掲)40-64歳	168	27.2	7.4	0.6	11.0	11.0	16.5	17.1	22.0	27.4	31.8	37.6	39.6	49.8	50.3
	(再掲)65歳以上	180	25.0	6.2	0.6	8.9	10.0	15.6	16.9	19.9	25.2	29.6	32.3	35.0	40.9	43.3
女性	(再掲)20歳以上※1	431	27.0	7.1	0.5	8.9	11.2	16.4	17.7	21.6	26.9	31.8	35.6	39.3	47.5	50.3
	(再掲)20歳以上※2	431	26.9	7.1	0.5	8.9	11.2	16.3	17.7	21.5	26.8	31.8	35.4	39.2	46.6	50.3
	20-29歳	40	29.9	7.0	1.7	16.3	16.4	17.9	21.8	24.0	29.2	34.5	41.1	43.3	46.5	46.5
	30-39歳	92	29.5	6.3	1.0	13.2	13.5	17.7	21.9	24.3	29.6	32.3	40.5	41.3	44.0	44.0
	40-49歳	71	30.2	8.8	1.2	9.7	9.7	16.8	18.2	24.1	30.3	36.6	41.5	43.7	58.3	58.3
	50-59歳	73	29.0	6.9	1.3	10.1	10.1	17.7	21.4	24.3	29.3	33.7	38.4	41.1	48.3	48.3
	60-69歳	108	27.0	7.1	0.7	11.7	13.1	14.3	17.1	22.9	25.9	32.3	37.3	39.1	41.9	41.9
	70歳以上	151	26.6	6.7	0.7	10.3	13.0	15.6	18.6	21.8	26.2	30.4	35.0	38.9	47.5	50.3
	(再掲)20-39歳	92	29.7	6.6	0.9	13.2	16.4	18.0	22.0	24.2	29.7	33.6	40.5	41.6	46.5	46.5
	(再掲)40-64歳	184	29.3	7.9	1.0	9.7	10.0	16.5	19.2	24.1	29.7	35.1	39.4	41.9	48.2	58.3
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	26.6	6.6	0.6	10.3	13.3	15.7	18.2	22.2	26.0	30.7	35.7	38.8	44.0	50.3
	(再掲)20歳以上※1	495	28.5	7.3	0.6	9.7	13.2	17.1	19.4	23.8	28.0	33.2	38.3	41.2	46.8	58.3
	(再掲)20歳以上※2	495	28.5	7.2	0.6	9.7	13.2	17.1	19.4	23.8	28.2	33.2	38.2	41.2	46.6	58.3
	(再掲)20歳以上※2	495	28.5	7.2	0.6	9.7	13.2	17.1	19.4	23.8	28.2	33.2	38.2	41.2	46.6	58.3

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

炭水化物エネルギー比率(%)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	54.9	7.1	1.3	36.9	37.9	41.9	46.5	50.2	53.5	60.4	64.1	67.0	73.5	73.5
	30-39歳	100	56.4	8.2	1.0	28.4	29.3	41.7	46.2	50.7	57.0	62.2	65.3	69.2	78.7	78.8
	40-49歳	132	56.1	9.0	1.0	23.5	36.3	40.2	40.6	50.8	56.3	62.4	68.1	69.7	74.8	75.3
	50-59歳	147	57.4	8.3	1.1	33.4	36.4	44.7	46.3	51.2	57.6	63.6	67.4	70.3	76.7	78.1
	60-69歳	197	57.1	7.3	0.6	37.1	41.7	46.8	48.2	52.1	56.7	61.1	67.9	71.0	76.0	79.3
	70歳以上	275	59.1	7.2	0.7	32.0	40.8	47.0	48.5	54.6	59.7	64.0	68.0	70.2	73.5	75.7
	(再掲)20-39歳	175	55.8	7.8	0.8	28.4	35.2	41.8	46.5	50.4	56.1	61.2	65.0	67.2	74.7	78.8
	(再掲)40-64歳	352	56.8	8.5	0.9	23.5	36.6	40.6	45.7	50.9	57.0	62.8	68.0	69.8	75.2	78.1
	(再掲)65歳以上	399	58.6	7.1	0.6	32.0	41.7	47.3	48.6	53.8	58.8	63.5	67.9	70.1	73.4	79.3
	(再掲)20歳以上※1	926	57.1	8.0	0.5	23.5	37.1	43.0	46.9	51.6	57.5	62.6	67.2	69.8	74.4	79.3
男性	(再掲)20歳以上※2	926	57.1	8.0	0.5	23.5	37.2	43.2	46.9	51.6	57.5	62.6	67.2	69.8	74.4	79.3
	20-29歳	35	56.3	6.7	1.5	41.7	41.7	47.6	47.9	50.9	56.3	60.7	67.0	68.8	69.5	69.5
	30-39歳	48	57.4	9.8	1.8	28.4	28.4	38.6	43.8	50.6	59.4	62.9	69.5	74.2	78.8	78.8
	40-49歳	61	57.2	8.7	1.0	36.2	36.2	38.4	43.8	51.6	57.6	62.6	69.4	69.7	74.5	74.5
	50-59歳	74	59.6	8.0	0.9	33.4	33.5	45.2	47.4	54.3	60.8	65.1	69.1	71.7	78.1	78.1
	60-69歳	89	57.1	7.0	0.8	37.1	42.7	47.5	49.0	52.6	55.5	60.3	66.8	68.7	79.3	79.3
	70歳以上	124	60.7	6.8	0.8	39.8	42.7	48.9	51.2	55.9	60.6	66.2	69.6	71.3	75.3	75.7
	(再掲)20-39歳	83	57.0	8.6	1.3	28.4	28.4	42.6	47.5	50.8	57.4	62.7	67.3	72.7	78.8	78.8
	(再掲)40-64歳	168	58.0	8.2	0.8	33.4	36.4	43.9	46.7	53.3	58.7	64.3	68.9	69.9	75.9	78.1
	(再掲)65歳以上	180	60.0	6.9	0.7	39.8	44.1	48.7	50.6	54.9	59.9	66.0	68.6	71.0	75.5	79.3
女性	(再掲)20歳以上※1	431	58.1	8.1	0.6	28.4	36.4	44.9	48.3	53.1	58.7	63.4	68.4	70.4	75.1	79.3
	(再掲)20歳以上※2	431	58.2	8.0	0.6	28.4	36.7	45.2	48.3	53.2	58.8	63.7	68.3	70.7	75.2	79.3
	20-29歳	40	53.7	7.3	1.6	36.9	36.9	39.4	45.8	48.4	52.6	59.6	63.8	64.3	73.5	73.5
	30-39歳	92	55.6	6.7	1.1	40.5	40.6	41.7	46.2	50.8	55.6	60.7	65.0	65.6	74.3	74.3
	40-49歳	71	55.0	9.3	1.3	23.5	26.3	38.7	40.6	49.2	55.2	62.2	66.4	69.1	75.3	75.3
	50-59歳	73	55.2	8.0	1.5	36.3	36.4	41.9	45.2	48.3	55.6	60.6	64.4	68.3	77.3	77.3
	60-69歳	108	57.2	7.5	0.7	37.6	41.3	46.6	47.5	51.3	57.9	61.3	68.1	71.3	73.5	73.6
	70歳以上	151	57.8	7.3	0.9	32.0	38.3	45.4	47.6	52.8	58.3	62.6	65.3	69.8	72.7	75.0
	(再掲)20-39歳	92	54.8	7.0	0.8	36.9	38.5	41.2	46.2	50.3	54.5	60.4	63.9	65.4	74.3	74.3
	(再掲)40-64歳	184	55.5	8.7	1.1	23.5	36.6	40.6	44.8	48.6	55.5	61.8	66.3	70.2	75.7	77.3
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	219	57.6	7.1	0.7	32.0	40.3	46.6	47.6	52.6	58.0	62.3	66.7	70.0	72.8	75.0
	(再掲)20歳以上※1	495	56.0	7.8	0.5	23.5	37.2	41.6	46.4	50.4	56.4	61.7	65.5	68.2	72.8	77.3
	(再掲)20歳以上※2	495	55.9426	7.74257	0.53825	23.5345	37.3011	41.6861	46.3272	50.3627	56.4224	61.3701	65.4411	67.9844	72.7833	77.266

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

穀類エネルギー比率(%)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	41.6	11.6	2.3	13.3	13.3	22.0	26.5	32.9	42.7	49.2	54.3	61.4	76.9	76.9
	30-39歳	100	43.2	13.4	1.9	5.8	6.0	19.4	25.2	34.2	43.1	54.1	58.9	64.1	79.8	80.0
	40-49歳	132	39.6	13.4	1.1	0.0	1.3	18.7	23.3	30.8	40.3	48.4	54.5	60.8	70.2	70.6
	50-59歳	147	40.0	11.1	1.8	5.9	15.0	19.7	26.1	32.8	41.2	46.9	54.0	60.4	67.2	81.1
	60-69歳	197	37.5	10.4	0.9	7.3	12.0	22.0	24.8	30.4	37.0	43.2	52.9	55.9	63.8	73.8
	70歳以上	275	36.8	11.6	1.2	4.4	7.8	19.0	21.9	29.4	36.4	46.0	52.5	54.2	63.5	88.0
	(再掲)20-39歳	175	42.6	12.7	1.6	5.8	6.8	20.9	26.4	33.6	42.8	52.6	56.5	64.0	75.8	80.0
	(再掲)40-64歳	352	39.2	12.1	1.1	0.0	1.9	21.2	24.4	31.1	39.5	47.3	54.1	59.1	68.8	81.1
	(再掲)65歳以上	399	37.1	11.2	0.9	4.4	7.8	19.4	23.0	30.0	36.5	45.0	52.4	55.1	63.7	88.0
	(再掲)20歳以上※1	926	39.8	12.2	0.7	0.0	6.9	20.6	24.5	31.7	39.9	47.8	54.3	58.8	70.1	88.0
男性	(再掲)20歳以上※2	926	39.8	12.2	0.7	0.0	7.0	21.0	24.9	31.7	40.0	47.8	54.3	58.9	70.2	88.0
	20-29歳	35	45.8	10.8	2.7	21.3	21.3	30.4	32.5	38.7	45.7	53.2	63.3	67.4	76.9	76.9
	30-39歳	48	44.3	15.1	3.2	7.0	7.0	17.1	26.4	32.2	44.7	54.2	64.0	71.8	80.0	80.0
	40-49歳	61	40.1	14.3	1.2	0.0	0.0	6.1	22.9	31.8	41.8	49.7	52.8	62.3	70.6	70.6
	50-59歳	74	43.7	10.3	1.6	20.7	20.7	26.7	30.9	35.9	43.9	50.9	56.0	61.3	81.1	81.1
	60-69歳	89	38.6	10.2	1.2	8.0	8.2	22.1	27.0	30.9	38.0	43.2	55.9	58.8	70.8	70.8
	70歳以上	124	38.8	10.8	1.1	7.8	17.6	22.1	24.9	30.8	38.9	46.8	52.7	56.9	76.6	88.0
	(再掲)20-39歳	83	44.9	13.5	2.2	7.0	7.0	25.4	29.0	33.7	45.3	54.2	64.0	67.8	80.0	80.0
	(再掲)40-64歳	168	41.1	12.1	1.0	0.0	0.6	22.2	24.9	33.9	42.0	48.5	54.3	61.1	70.7	81.1
	(再掲)65歳以上	180	39.0	10.7	0.9	7.8	18.8	22.4	25.0	31.7	38.8	46.6	53.0	57.4	67.0	88.0
女性	(再掲)20歳以上※1	431	41.7	12.4	1.0	0.0	3.8	22.5	26.6	33.3	41.9	50.4	55.5	62.2	75.1	88.0
	(再掲)20歳以上※2	431	41.7	12.4	1.0	0.0	5.8	23.1	26.7	33.3	41.8	50.2	55.5	61.9	75.1	88.0
	20-29歳	40	38.2	11.3	2.8	13.3	13.3	16.0	25.4	28.7	37.8	47.2	51.5	55.2	57.6	57.6
	30-39歳	92	42.3	11.9	1.6	5.8	5.8	18.0	24.1	36.0	41.4	51.9	57.0	60.1	64.6	64.6
	40-49歳	71	39.1	12.5	1.6	1.2	2.6	20.1	24.7	30.5	38.8	47.8	55.9	60.6	69.3	69.3
	50-59歳	73	36.3	10.8	2.2	5.9	6.2	17.7	21.9	29.6	35.3	43.5	48.9	55.0	65.1	65.1
	60-69歳	108	36.7	10.4	1.2	7.3	11.9	22.0	23.4	28.9	35.7	43.1	52.7	54.7	70.1	73.8
	70歳以上	151	35.1	12.0	1.5	4.4	5.1	13.4	19.5	27.2	35.2	44.2	50.9	53.1	63.3	71.2
	(再掲)20-39歳	92	40.6	11.8	1.6	5.8	5.9	19.2	25.0	32.7	41.2	49.2	55.5	59.6	64.6	64.6
	(再掲)40-64歳	184	37.4	11.8	1.5	1.2	6.7	18.4	23.4	29.3	36.3	45.7	53.8	57.4	66.1	73.8
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	35.6	11.3	1.1	4.4	6.9	17.6	21.6	28.2	35.7	43.9	50.8	53.1	62.2	71.2
	(再掲)20歳以上※1	495	37.8	11.7	0.7	1.2	7.1	19.0	23.4	29.8	37.4	46.4	53.7	56.3	63.4	73.8
	(再掲)20歳以上※2	495	37.9	11.7	0.8	1.2	7.2	19.0	23.4	29.9	37.4	46.5	53.7	56.3	63.5	73.8

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

動物性たんぱく質比率(%)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	56.8	12.6	1.4	25.8	25.8	31.9	36.3	49.7	59.2	65.8	70.1	71.4	88.8	88.8
	30-39歳	100	53.3	12.6	1.1	0.4	9.6	29.1	41.0	46.7	52.6	62.4	66.9	73.0	87.4	87.5
	40-49歳	132	56.8	12.6	1.9	6.8	16.2	35.2	38.0	50.6	58.7	64.6	69.5	71.1	85.5	86.4
	50-59歳	147	50.0	13.5	1.1	14.5	15.0	23.7	32.2	43.4	50.4	60.1	67.6	71.0	74.8	77.2
	60-69歳	197	51.3	11.7	1.3	13.5	13.7	32.2	36.7	42.3	53.4	59.7	66.3	70.7	75.2	79.4
	70歳以上	275	51.0	10.8	0.7	0.0	24.5	33.2	37.8	44.5	51.6	58.0	63.9	68.7	75.9	81.2
	(再掲)20-39歳	175	54.7	12.7	1.0	0.4	15.7	31.1	38.9	47.1	54.2	64.4	69.9	72.6	88.2	88.8
	(再掲)40-64歳	352	52.5	13.4	1.0	6.8	16.2	26.1	35.3	44.6	54.2	62.2	68.5	71.1	80.1	86.4
	(再掲)65歳以上	399	51.4	10.9	0.8	0.0	23.6	33.3	37.2	44.7	52.2	58.8	64.6	68.7	74.7	81.2
	(再掲)20歳以上※1	926	53.1	12.5	0.7	0.0	17.1	31.7	37.1	45.3	53.8	62.1	67.9	71.0	80.9	88.8
男性	(再掲)20歳以上※2	926	52.9	12.5	0.7	0.0	17.1	31.7	37.1	45.3	53.3	62.1	67.9	71.1	80.9	88.8
	20-29歳	35	54.5	13.9	2.7	25.8	25.8	26.6	31.1	44.3	57.4	65.6	69.4	70.3	78.8	78.8
	30-39歳	48	55.3	13.7	2.1	0.4	4.3	29.6	40.1	43.9	57.3	66.0	72.3	74.9	87.5	87.5
	40-49歳	61	57.6	13.9	2.8	6.8	14.2	25.9	37.8	53.0	59.3	67.6	69.7	79.8	86.4	86.4
	50-59歳	74	51.9	12.0	1.3	19.8	21.4	25.8	37.0	44.9	51.2	60.3	68.4	69.9	77.2	77.2
	60-69歳	89	51.7	11.7	1.6	13.6	13.7	32.7	36.7	43.4	53.0	60.5	66.2	68.6	79.4	79.4
	70歳以上	124	51.4	10.2	0.8	0.0	27.0	33.6	38.5	45.0	51.7	57.8	63.1	68.9	73.8	75.3
	(再掲)20-39歳	83	54.9	13.7	1.8	0.4	8.5	29.3	36.9	44.1	57.3	65.9	69.7	72.4	87.5	87.5
	(再掲)40-64歳	168	53.5	13.1	1.5	6.8	15.7	26.1	38.0	45.3	54.6	63.0	69.3	70.0	84.4	86.4
	(再掲)65歳以上	180	52.0	10.5	0.7	0.0	27.3	35.1	38.3	45.2	53.0	59.1	65.3	68.7	73.3	75.3
女性	(再掲)20歳以上※1	431	53.7	12.7	1.2	0.0	17.7	31.6	38.0	45.3	54.6	63.6	68.7	70.4	81.2	87.5
	(再掲)20歳以上※2	431	53.5	12.6	1.1	0.0	19.4	31.6	38.1	45.2	54.3	63.5	68.4	70.4	80.7	87.5
	20-29歳	40	58.7	11.4	2.1	36.0	36.0	36.0	46.2	50.3	59.8	63.4	70.5	81.2	88.8	88.8
	30-39歳	92	51.7	11.6	2.3	13.5	13.5	23.4	41.2	47.1	50.8	59.2	64.6	73.7	82.6	82.6
	40-49歳	71	56.0	11.3	1.4	17.5	19.2	34.8	39.0	49.6	57.7	64.4	67.7	70.9	80.8	80.8
	50-59歳	73	48.1	14.7	2.0	14.5	14.5	17.6	27.5	37.1	47.8	59.8	67.0	71.2	73.9	73.9
	60-69歳	108	51.0	11.8	1.5	13.5	18.9	31.4	36.0	41.6	52.8	59.3	66.5	71.2	76.8	77.2
	70歳以上	151	50.6	11.2	1.3	1.6	19.0	33.2	36.1	43.3	51.2	58.1	64.4	68.3	80.3	81.2
	(再掲)20-39歳	92	54.5	11.9	1.8	13.5	13.6	33.9	42.0	47.7	53.0	62.1	70.0	73.9	88.8	88.8
	(再掲)40-64歳	184	51.5	13.5	1.1	14.5	15.3	24.0	32.4	43.0	52.9	62.1	67.5	71.2	75.5	80.8
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	50.9	11.3	1.2	1.6	20.9	33.1	36.7	43.6	51.7	58.3	64.6	68.8	78.4	81.2
	(再掲)20歳以上※1	495	52.4	12.3	0.9	1.6	17.1	32.0	36.6	45.7	52.8	60.7	67.6	71.2	80.9	88.8
	(再掲)20歳以上※2	495	52.3	12.4	0.9	1.6	17.1	31.7	36.6	45.8	52.7	60.7	67.6	71.2	81.0	88.8
	(再掲)20歳以上※2	495	52.3	12.4	0.9	1.6	17.1	31.7	36.6	45.8	52.7	60.7	67.6	71.2	81.0	88.8

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

飽和脂肪酸エネルギー比率(%)

	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	8.1	3.3	0.4	3.7	3.8	4.6	5.0	5.6	7.1	9.7	11.1	14.1	21.4	21.4
	30-39歳	100	8.5	2.7	0.3	1.5	2.1	3.9	4.9	6.8	8.5	10.2	12.4	13.1	16.6	16.6
	40-49歳	132	8.2	3.9	0.5	2.0	2.4	3.4	4.3	5.7	7.3	10.1	13.4	16.5	22.6	23.8
	50-59歳	147	7.3	2.7	0.3	2.1	2.1	3.4	4.1	5.7	7.0	8.2	10.4	13.2	16.3	16.9
	60-69歳	197	7.1	2.4	0.2	1.5	2.7	3.4	4.1	5.4	6.9	8.7	10.7	11.3	13.4	16.0
	70歳以上	275	6.9	2.5	0.3	1.8	2.6	3.6	3.9	5.0	6.4	8.5	10.0	11.8	14.1	15.1
	(再掲)20-39歳	175	8.3	3.0	0.2	1.5	2.8	4.2	5.0	6.3	8.2	10.0	12.2	13.2	19.6	21.4
	(再掲)40-64歳	352	7.7	3.2	0.3	2.0	2.2	3.4	4.1	5.7	7.1	9.1	11.8	13.8	17.4	23.8
	(再掲)65歳以上	399	6.9	2.4	0.2	1.5	2.7	3.6	4.0	5.1	6.5	8.5	10.0	11.2	13.9	16.0
	(再掲)20歳以上※1	926	7.6	3.0	0.2	1.5	2.6	3.7	4.3	5.6	7.2	9.2	11.1	13.0	16.7	23.8
男性	(再掲)20歳以上※2	926	7.6	2.9	0.2	1.5	2.6	3.7	4.3	5.6	7.2	9.1	11.0	13.0	16.7	23.8
	20-29歳	35	7.8	2.8	0.6	3.7	3.7	4.0	4.5	5.2	7.5	10.3	11.0	13.0	13.6	13.6
	30-39歳	48	8.0	2.5	0.3	1.5	1.5	3.8	4.2	6.8	8.2	9.5	10.3	12.7	14.4	14.4
	40-49歳	61	7.4	3.2	0.4	3.1	3.1	3.3	3.4	5.5	7.0	8.7	11.8	14.9	16.4	16.4
	50-59歳	74	7.0	2.7	0.2	2.1	2.1	2.9	3.5	5.5	6.7	8.0	10.0	13.3	15.9	15.9
	60-69歳	89	7.1	2.3	0.3	1.5	2.0	3.4	3.8	5.5	7.0	8.5	10.1	10.7	16.0	16.0
	70歳以上	124	6.4	2.1	0.3	1.8	2.1	3.5	4.0	4.7	6.1	8.1	9.1	9.8	13.9	15.1
	(再掲)20-39歳	83	7.9	2.6	0.4	1.5	1.7	4.0	4.4	6.0	8.0	9.6	10.9	12.5	14.4	14.4
	(再掲)40-64歳	168	7.2	2.9	0.2	2.1	2.1	3.3	3.6	5.5	6.7	8.2	10.2	13.3	16.4	16.4
	(再掲)65歳以上	180	6.5	2.2	0.3	1.5	2.1	3.6	3.8	4.8	6.3	8.2	9.2	10.0	13.7	16.0
女性	(再掲)20歳以上※1	431	7.3	2.6	0.2	1.5	2.2	3.5	4.0	5.4	6.9	8.9	10.3	11.9	16.2	16.4
	(再掲)20歳以上※2	431	7.2	2.6	0.2	1.5	2.1	3.5	4.0	5.4	6.9	8.9	10.3	11.8	16.1	16.4
	20-29歳	40	8.4	3.6	0.9	5.0	5.0	5.1	5.5	6.2	7.0	9.7	13.8	19.0	21.4	21.4
	30-39歳	92	8.8	2.9	0.5	2.6	2.7	4.6	5.0	6.7	8.5	10.4	12.7	13.1	16.6	16.6
	40-49歳	71	9.0	4.4	0.7	2.0	2.1	3.7	4.4	5.8	8.3	11.1	15.0	17.4	23.8	23.8
	50-59歳	73	7.6	2.6	0.4	2.1	2.1	4.1	4.6	6.0	7.4	8.9	10.6	13.8	16.9	16.9
	60-69歳	108	7.1	2.6	0.3	2.8	2.9	3.4	4.3	5.4	6.8	8.7	11.2	12.3	13.4	13.4
	70歳以上	151	7.3	2.8	0.4	2.6	2.7	2.9	3.8	5.2	6.9	9.1	11.2	13.0	14.5	14.9
	(再掲)20-39歳	92	8.7	3.2	0.5	2.6	2.8	5.0	5.4	6.5	8.4	10.2	12.6	15.9	21.4	21.4
	(再掲)40-64歳	184	8.2	3.5	0.4	2.0	2.2	3.9	4.5	5.9	7.4	10.1	12.7	15.2	21.1	23.8
女性	(再掲)65歳以上	219	7.2	2.6	0.3	2.6	2.8	3.3	4.1	5.3	6.8	8.7	10.8	12.1	14.1	14.9
	(再掲)20歳以上※1	495	8.0	3.2	0.3	2.0	2.8	3.7	4.5	5.7	7.4	9.7	11.9	13.4	18.8	23.8
	(再掲)20歳以上※2	495	8.0	3.2	0.3	2.0	2.8	3.8	4.6	5.8	7.4	9.7	11.9	13.4	18.6	23.8

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

穀類(g)	性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数		20-29歳	75	457.5	178.5	20.6	88.8	91.4	144.8	219.2	344.7	449.4	572.3	677.9	796.7	1053.0	1053.0
		30-39歳	100	446.6	183.6	25.8	26.5	30.2	150.0	230.0	320.1	429.4	576.2	699.8	758.9	1026.0	1026.1
		40-49歳	132	417.9	179.4	18.0	0.0	4.3	149.9	228.7	273.7	407.0	533.4	651.3	757.9	870.6	902.2
		50-59歳	147	412.4	165.5	21.0	50.0	99.7	149.4	206.6	290.0	400.0	551.9	638.6	679.5	790.3	810.0
		60-69歳	197	394.3	143.9	11.1	100.0	105.5	163.6	203.8	300.0	380.0	476.6	579.3	632.0	818.3	900.0
		70歳以上	275	376.5	139.2	14.4	40.0	54.4	161.3	182.7	279.3	379.1	469.2	573.6	611.7	692.4	900.0
		(再掲)20-39歳	175	451.0	181.1	19.8	26.5	59.6	150.0	230.0	327.7	433.0	575.3	687.5	779.4	1028.8	1053.0
		(再掲)40-64歳	352	411.1	166.0	12.9	0.0	18.0	150.0	220.0	280.0	400.0	526.1	637.4	703.5	788.8	902.2
		(再掲)65歳以上	399	381.4	141.9	11.8	40.0	95.4	161.7	184.7	290.0	377.3	464.9	578.5	613.3	758.1	900.0
		(再掲)20歳以上*1	926	420.3	169.4	8.8	0.0	51.6	157.3	220.0	300.0	408.9	522.8	643.1	737.3	810.0	1053.0
		(再掲)20歳以上*2	926	420.8	168.1	8.9	0.0	59.3	157.4	220.0	302.7	409.6	520.0	639.2	730.0	810.0	1053.0
男性		20-29歳	35	588.4	157.4	30.0	275.0	292.5	350.6	410.8	472.1	600.0	646.0	799.2	1024.5	1053.0	1053.0
		30-39歳	48	498.6	215.6	39.0	66.0	66.0	149.1	229.0	321.5	501.5	645.4	739.9	969.9	1026.1	1026.1
		40-49歳	61	461.5	202.5	31.9	0.0	0.0	66.9	225.2	292.4	444.9	585.8	758.5	771.9	902.2	902.2
		50-59歳	74	501.9	150.9	22.4	125.0	125.0	228.5	306.4	400.4	483.8	626.6	677.3	741.9	810.0	810.0
		60-69歳	89	462.3	142.1	16.5	104.7	105.0	259.1	288.8	366.5	458.2	552.8	600.0	745.5	900.0	900.0
		70歳以上	124	428.6	121.5	16.7	40.6	143.0	203.9	276.4	350.4	414.8	502.1	610.4	623.4	715.8	740.0
		(再掲)20-39歳	83	535.3	197.9	25.6	66.0	66.0	185.1	317.9	387.9	550.8	645.9	773.9	809.1	1053.0	1053.0
		(再掲)40-64歳	168	475.2	169.0	16.6	0.0	6.2	220.5	260.0	359.2	471.2	588.6	680.4	760.9	820.3	902.2
		(再掲)65歳以上	180	440.5	131.9	14.1	40.6	132.7	224.7	296.4	355.9	433.6	513.0	612.1	648.3	821.9	900.0
		(再掲)20歳以上*1	431	485.7	175.0	12.9	0.0	47.7	226.3	274.5	364.7	473.2	600.0	714.2	772.4	1021.4	1053.0
		(再掲)20歳以上*2	431	484.9	173.1	13.2	0.0	58.1	226.5	277.9	364.8	471.9	600.0	709.5	769.6	1021.4	1053.0
女性		20-29歳	40	351.4	112.0	22.4	88.8	88.8	112.6	164.2	296.4	387.8	433.0	450.7	471.8	600.0	600.0
		30-39歳	52	404.7	141.6	17.3	26.5	26.5	158.8	219.7	316.4	404.8	470.9	585.4	680.4	800.0	800.0
		40-49歳	71	375.3	142.9	19.7	3.0	12.5	149.9	225.9	272.5	372.9	482.7	598.6	636.9	722.8	722.8
		50-59歳	73	323.9	127.9	22.3	50.0	51.3	126.8	145.4	250.8	300.4	397.6	514.4	554.7	780.7	780.7
		60-69歳	108	341.4	121.7	14.0	100.0	101.0	145.8	176.4	264.8	341.0	410.8	518.6	577.7	682.9	690.7
		70歳以上	151	333.9	138.6	14.8	40.0	41.0	147.4	162.4	240.1	306.3	427.8	540.8	586.5	693.6	900.0
		(再掲)20-39歳	92	383.0	132.4	14.1	26.5	29.0	136.1	201.6	315.1	401.1	455.3	523.0	600.0	800.0	800.0
		(再掲)40-64歳	184	347.5	136.4	15.2	3.0	41.8	149.9	174.9	260.0	339.5	430.0	527.5	617.3	735.8	780.7
		(再掲)65歳以上	219	335.8	132.4	12.0	40.0	43.5	146.6	167.5	250.0	320.6	420.0	530.0	580.0	692.8	900.0
		(再掲)20歳以上*1	495	354.4	134.6	6.9	3.0	47.0	146.7	174.2	266.8	357.0	436.1	523.0	592.8	696.4	900.0
		(再掲)20歳以上*2	495	355.1	134.3	7.0	3.0	48.4	144.1	174.4	267.4	357.2	435.6	522.9	592.8	697.3	900.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

いも類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	63.3	69.5	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	45.0	84.3	184.6	199.5	231.2	231.2
	30-39歳	100	38.0	56.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	58.0	89.4	165.9	275.7	275.9
	40-49歳	132	56.6	89.2	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	92.9	121.3	188.5	513.5	530.8
	50-59歳	147	52.2	69.1	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	76.0	141.8	230.0	303.3	350.9
	60-69歳	197	55.9	60.5	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	95.6	130.0	174.4	276.1	309.9
	70歳以上	275	61.4	77.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	90.0	152.3	222.3	408.3	408.3
	(再掲)20-39歳	175	48.3	63.4	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	63.5	149.9	194.8	262.5	275.9
	(再掲)40-64歳	352	55.5	76.4	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	90.4	126.6	199.0	399.9	530.8
	(再掲)65歳以上	399	59.1	73.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	90.0	145.1	214.7	370.5	408.3
	(再掲)20歳以上*1	926	55.0	72.4	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	85.2	147.0	201.6	301.6	530.8
	(再掲)20歳以上*2	926	54.5	71.3	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	84.0	146.2	201.6	297.8	530.8
男性	20-29歳	35	83.4	81.5	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	51.0	149.9	200.6	220.9	231.2	231.2
	30-39歳	48	37.9	55.8	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.0	57.9	91.8	201.3	275.9	275.9
	40-49歳	61	75.8	116.2	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	101.6	183.7	413.3	530.8	530.8
	50-59歳	74	49.6	62.7	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	69.1	128.0	208.0	249.9	249.9
	60-69歳	89	62.9	67.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	45.5	101.1	157.0	214.2	309.9	309.9
	70歳以上	124	63.4	75.0	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	100.0	139.3	219.5	389.7	408.3
	(再掲)20-39歳	83	56.5	70.7	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	27.3	77.5	188.5	209.6	275.9	275.9
	(再掲)40-64歳	168	62.6	87.7	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	97.9	135.0	224.7	494.4	530.8
	(再掲)65歳以上	180	62.8	73.9	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	95.9	150.4	220.8	372.8	408.3
	(再掲)20歳以上*1	431	61.3	79.9	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	35.2	94.7	155.5	224.8	406.9	530.8
	(再掲)20歳以上*2	431	60.5	77.9	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	35.6	93.7	154.9	222.2	405.7	530.8
女性	20-29歳	40	47.0	53.8	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	66.8	144.1	174.8	184.7	184.7
	30-39歳	52	38.0	58.2	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	51.5	97.7	189.3	262.9	262.9
	40-49歳	71	37.8	44.4	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	66.0	101.4	116.1	197.4	197.4
	50-59歳	73	54.7	75.3	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	86.4	150.7	230.2	350.9	350.9
	60-69歳	108	50.6	54.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	84.7	172.0	157.6	297.2	309.3
	70歳以上	151	59.7	79.7	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	90.0	173.0	267.8	381.1	408.3
	(再掲)20-39歳	92	41.7	56.3	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	62.5	120.3	171.1	262.9	262.9
	(再掲)40-64歳	184	48.5	62.8	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	80.7	123.1	192.0	318.7	350.9
	(再掲)65歳以上	219	56.2	72.6	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	90.0	144.1	194.2	347.7	408.3
	(再掲)20歳以上*1	495	48.6	63.6	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	67.5	123.4	179.9	274.8	408.3
	(再掲)20歳以上*2	495	48.4	63.4	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	67.5	123.8	179.9	274.3	408.3

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

砂糖・甘味料類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	5.6	7.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	9.3	14.3	23.3	44.4	44.4
	30-39歳	100	5.8	7.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.1	16.4	21.2	51.2	51.5
	40-49歳	132	6.1	7.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.0	8.9	12.1	21.3	42.0	42.8
	50-59歳	147	7.0	8.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.2	20.1	26.2	38.4	40.5
	60-69歳	197	6.7	7.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.9	9.9	14.9	19.7	34.4	60.0
	70歳以上	275	9.3	10.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.0	13.0	19.3	25.8	46.8	102.0
	(再掲)20-39歳	175	5.7	7.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.5	15.9	22.8	42.8	51.5
	(再掲)40-64歳	352	6.7	8.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.9	9.5	16.6	24.4	40.0	60.0
	(再掲)65歳以上	399	8.5	9.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.0	11.7	18.0	25.3	41.0	102.0
	(再掲)20歳以上*1	926	6.9	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.9	9.9	17.0	23.3	39.0	102.0
	(再掲)20歳以上*2	926	6.9	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.8	9.9	17.2	23.3	38.9	102.0
男性	20-29歳	35	3.4	5.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	11.0	17.1	26.4	26.4
	30-39歳	48	7.5	8.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.9	10.1	18.3	23.9	51.5	51.5
	40-49歳	61	6.3	7.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.0	8.9	12.6	25.4	39.5	39.5
	50-59歳	74	6.6	8.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.6	18.7	27.0	36.0	36.0
	60-69歳	89	7.1	8.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.6	10.1	16.6	24.3	60.0	60.0
	70歳以上	124	9.0	11.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.0	12.5	18.2	23.3	90.7	102.0
	(再掲)20-39歳	83	5.9	7.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	8.2	15.9	21.7	51.5	51.5
	(再掲)40-64歳	168	6.6	8.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.0	9.0	16.0	25.9	39.3	60.0
	(再掲)65歳以上	180	8.4	10.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.0	12.0	17.8	23.0	68.7	102.0
	(再掲)20歳以上*1	431	6.8	8.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.9	9.7	16.2	22.7	38.7	102.0
	(再掲)20歳以上*2	431	6.9	8.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.9	9.8	16.2	23.0	38.8	102.0
女性	20-29歳	40	7.3	9.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	10.2	23.0	28.2	44.4	44.4
	30-39歳	52	4.5	6.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.5	14.6	19.6	28.5	28.5
	40-49歳	71	5.9	7.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.9	8.8	11.4	22.8	42.8	42.8
	50-59歳	73	7.5	8.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.7	21.5	25.1	40.5	40.5
	60-69歳	108	6.4	6.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.2	9.9	14.6	18.1	36.3	37.0
	70歳以上	151	9.5	9.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.0	14.3	20.7	29.8	46.6	49.4
	(再掲)20-39歳	92	5.6	7.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.1	17.7	23.3	44.4	44.4
	(再掲)40-64歳	184	6.8	8.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.8	17.3	24.0	41.5	42.8
	(再掲)65歳以上	219	8.5	8.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.3	11.5	18.4	28.8	41.2	49.4
	(再掲)20歳以上*1	495	7.0	8.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.6	10.0	17.9	23.3	40.0	49.4
	(再掲)20歳以上*2	495	6.9	8.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.5	10.0	17.8	23.3	39.3	49.4

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

豆類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	76.7	83.9	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.4	89.3	225.0	265.3	300.0	300.0
	30-39歳	100	52.9	81.2	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	70.0	161.7	245.0	369.7	370.0
	40-49歳	132	32.0	59.7	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	81.5	151.2	338.9	461.0
	50-59歳	147	102.8	155.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.7	118.0	274.0	297.1	771.7	812.3
	60-69歳	197	67.2	78.0	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	50.0	96.4	196.5	240.0	353.5	456.0
	70歳以上	275	76.1	91.1	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	42.5	130.0	200.0	222.6	375.0	607.0
	(再掲)20-39歳	175	62.6	82.9	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	85.4	181.8	249.1	348.0	370.0
	(再掲)40-64歳	352	72.1	118.9	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	85.0	210.0	281.1	618.0	812.3
	(再掲)65歳以上	399	71.1	86.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	40.8	102.0	190.0	225.5	375.0	607.0
	(再掲)20歳以上*1	926	66.7	95.9	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	88.7	195.7	250.0	375.0	812.3
	(再掲)20歳以上*2	926	68.1	97.7	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	90.0	200.0	252.1	375.0	812.3
男性	20-29歳	35	73.0	96.4	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	88.1	250.3	278.4	300.0	300.0
	30-39歳	48	52.3	72.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	120.0	169.7	194.4	245.0	245.0
	40-49歳	61	34.5	59.3	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	48.3	100.0	174.6	340.0	340.0
	50-59歳	74	69.9	83.5	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	89.5	203.7	220.0	439.0	439.0
	60-69歳	89	76.3	79.8	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	51.8	100.0	222.6	240.0	363.0	363.0
	70歳以上	124	79.5	91.7	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	138.4	212.4	256.3	374.7	375.0
	(再掲)20-39歳	83	60.7	83.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	100.0	189.8	258.8	300.0	300.0
	(再掲)40-64歳	168	61.4	79.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	80.0	206.9	228.2	343.1	439.0
	(再掲)65歳以上	180	74.9	87.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	40.0	121.1	209.6	244.3	374.2	375.0
	(再掲)20歳以上*1	431	63.7	81.8	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	90.0	200.0	240.0	310.8	439.0
	(再掲)20歳以上*2	431	65.0	82.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	91.4	200.1	240.0	325.6	439.0
女性	20-29歳	40	79.7	73.2	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	71.8	103.1	181.5	236.4	250.0	250.0
	30-39歳	52	53.4	88.6	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	62.1	180.1	317.3	370.0	370.0
	40-49歳	71	29.6	60.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	79.9	157.1	461.0	461.0
	50-59歳	73	135.3	197.7	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	59.7	173.0	292.8	551.2	812.3	812.3
	60-69歳	108	60.0	76.2	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	37.3	93.1	138.2	261.0	439.2	456.0
	70歳以上	151	73.4	90.8	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	48.6	125.3	174.5	203.1	513.8	607.0
	(再掲)20-39歳	92	64.1	83.2	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	82.5	180.8	248.2	370.0	370.0
	(再掲)40-64歳	184	82.7	147.7	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	87.7	269.5	300.0	749.5	812.3
	(再掲)65歳以上	219	68.1	85.8	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	41.0	97.2	170.5	203.7	399.1	607.0
	(再掲)20歳以上*1	495	69.8	108.3	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	86.8	181.8	281.6	614.9	812.3
	(再掲)20歳以上*2	495	71.3	111.2	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	87.6	186.1	282.8	637.0	812.3

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

種実類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1.5	5.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.0	7.1	65.9	65.9
	30-39歳	100	1.5	4.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	10.9	32.8	33.0
	40-49歳	132	2.1	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.8	12.0	14.8	65.9
	50-59歳	147	3.2	8.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	14.3	41.9	120.0
	60-69歳	197	3.9	8.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	13.5	17.4	40.2	120.0
	70歳以上	275	4.1	9.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.0	26.7	51.4	125.4
	(再掲)20-39歳	175	1.5	4.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	10.0	32.7	65.9
	(再掲)40-64歳	352	3.1	7.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.8	13.7	39.6	120.0
	(再掲)65歳以上	399	3.9	9.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	19.8	51.1	125.4
	(再掲)20歳以上*1	926	2.8	7.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.0	13.5	40.1	125.4
	(再掲)20歳以上*2	926	2.8	7.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.0	13.5	40.2	125.4
男性	20-29歳	35	2.2	7.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	5.9	9.0	65.9	65.9
	30-39歳	48	1.0	4.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.3	33.0	33.0
	40-49歳	61	1.5	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.5	8.1	9.5	9.5
	50-59歳	74	2.1	5.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.0	12.8	65.9	65.9
	60-69歳	89	4.6	10.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	14.0	19.5	120.0	120.0
	70歳以上	124	4.3	11.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.4	29.8	52.1	125.4
	(再掲)20-39歳	83	1.5	6.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.6	65.9	65.9
	(再掲)40-64歳	168	2.5	7.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	9.2	14.0	36.5	120.0
	(再掲)65歳以上	180	4.2	10.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	11.3	20.0	49.9	125.4
	(再掲)20歳以上*1	431	2.6	7.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.9	13.4	40.3	125.4
	(再掲)20歳以上*2	431	2.7	7.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.0	13.8	40.4	125.4
女性	20-29歳	40	1.0	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.0	6.2	7.5	7.5
	30-39歳	52	1.8	4.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	10.0	13.8	15.0	15.0
	40-49歳	71	2.7	5.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	11.9	12.0	65.9	65.9
	50-59歳	73	4.2	10.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	10.4	25.2	120.0	120.0
	60-69歳	108	3.4	7.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	13.1	15.0	57.9	61.0
	70歳以上	151	3.9	8.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.9	26.6	48.9	51.0
	(再掲)20-39歳	92	1.5	3.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	7.3	10.0	15.0	15.0
	(再掲)40-64歳	184	3.6	8.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.0	13.9	40.1	120.0
	(再掲)65歳以上	219	3.6	8.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.0	20.0	48.4	61.0
	(再掲)20歳以上*1	495	3.0	7.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.0	13.5	40.0	120.0
	(再掲)20歳以上*2	495	2.9	7.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.0	13.5	40.0	120.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

野菜類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	311.0	161.3	36.0	22.0	64.2	95.0	106.4	178.0	281.6	434.1	546.2	615.0	749.3	749.3
	30-39歳	100	235.1	166.1	21.9	0.0	1.2	13.1	61.5	142.9	214.6	300.3	395.5	552.2	959.2	959.6
	40-49歳	132	271.5	155.4	14.9	6.0	6.0	58.2	89.7	156.1	264.1	349.8	482.2	543.8	824.4	866.2
	50-59歳	147	296.0	153.4	14.1	11.5	30.6	85.0	119.7	195.2	262.0	400.1	511.7	569.5	716.4	867.8
	60-69歳	197	369.8	205.6	19.7	2.0	50.8	91.5	115.5	210.6	345.5	500.6	595.9	725.3	998.0	1510.6
	70歳以上	275	349.3	185.7	21.0	20.0	44.5	97.8	122.0	221.7	326.7	445.2	590.2	635.7	1042.9	1042.9
	(再掲)20-39歳	175	266.0	167.9	18.9	0.0	7.3	47.5	85.6	155.2	226.0	351.2	485.5	591.6	934.3	999.6
	(再掲)40-64歳	352	298.7	167.0	9.2	2.0	4.8	83.4	106.9	181.4	266.4	400.7	513.5	570.7	766.5	1510.6
	(再掲)65歳以上	399	355.7	191.8	16.0	20.0	44.7	90.9	119.2	221.2	333.1	461.9	591.5	700.1	1042.9	1050.0
	(再掲)20歳以上*1	926	308.4	182.1	9.4	0.0	11.8	69.9	104.0	185.1	272.8	416.5	537.5	630.2	921.8	1510.6
	(再掲)20歳以上*2	926	308.2	182.3	9.5	0.0	12.1	69.9	104.3	185.0	272.2	416.5	536.8	629.3	923.0	1510.6
男性	20-29歳	35	355.8	179.1	47.0	22.0	22.0	98.2	114.8	213.3	310.6	512.4	617.5	631.5	749.3	749.3
	30-39歳	48	247.2	218.5	42.5	0.0	0.0	11.4	23.7	120.0	213.5	304.6	447.2	928.8	999.6	999.6
	40-49歳	61	294.5	157.6	20.6	6.0	6.0	60.0	74.6	182.2	294.9	393.9	506.3	560.3	758.7	758.7
	50-59歳	74	283.1	156.8	18.7	15.0	32.5	78.2	111.7	176.9	262.0	357.6	499.6	580.8	867.8	867.8
	60-69歳	89	380.8	244.9	30.1	2.0	45.2	85.4	94.2	203.9	339.5	524.5	689.5	876.5	1510.6	1510.6
	70歳以上	124	354.2	186.7	22.8	48.0	48.0	75.4	114.4	221.9	343.7	468.6	592.0	625.0	1007.9	1042.9
	(再掲)20-39歳	83	291.6	209.1	25.6	0.0	1.8	22.5	61.7	142.9	236.1	393.4	603.5	727.7	959.6	959.6
	(再掲)40-64歳	168	306.1	178.9	10.7	2.0	3.3	61.6	109.3	186.7	276.3	421.7	529.2	572.3	839.6	1510.6
	(再掲)65歳以上	180	360.1	203.2	18.6	44.0	45.3	74.3	112.5	218.7	339.7	475.1	604.8	726.8	1042.9	1050.0
	(再掲)20歳以上*1	431	317.6	198.9	12.4	0.0	5.5	50.9	93.6	184.2	279.0	425.5	570.9	635.7	947.9	1510.6
	(再掲)20歳以上*2	431	318.6	200.3	12.5	0.0	5.5	52.7	93.9	184.5	278.1	425.9	571.6	648.0	952.3	1510.6
女性	20-29歳	40	274.6	136.9	33.4	63.3	64.9	92.2	97.5	154.0	258.7	416.5	483.9	488.3	490.5	490.5
	30-39歳	52	225.4	108.3	17.6	0.0	2.2	44.9	86.9	175.3	218.7	297.4	356.9	441.3	560.7	560.7
	40-49歳	71	248.9	151.1	20.7	57.2	57.4	75.6	92.3	124.9	218.2	313.1	461.9	488.7	866.2	866.2
	50-59歳	73	308.8	149.8	22.6	11.5	12.3	106.1	129.7	203.1	261.9	422.3	512.0	574.2	762.6	762.6
	60-69歳	108	361.3	199.6	21.2	27.1	79.8	109.2	167.4	232.6	352.3	474.0	581.0	666.4	810.3	825.8
	70歳以上	151	345.3	185.3	22.0	20.0	44.2	92.3	145.3	218.8	318.3	436.0	550.0	686.6	1002.4	1042.9
	(再掲)20-39歳	92	245.4	122.5	19.7	0.0	5.2	72.0	96.0	161.5	223.4	305.7	441.2	485.8	560.7	560.7
	(再掲)40-64歳	184	291.4	154.4	15.8	11.5	33.5	89.6	105.6	173.9	261.2	394.9	503.0	565.5	795.3	866.2
	(再掲)65歳以上	219	352.3	182.9	16.9	20.0	44.3	91.4	153.2	220.9	318.7	446.4	580.6	687.6	952.7	1042.9
	(再掲)20歳以上*1	495	299.2	163.0	10.4	0.0	27.8	89.3	107.1	186.3	268.0	411.1	505.1	580.9	817.5	1042.9
	(再掲)20歳以上*2	495	297.4	161.2	10.5	0.0	13.2	89.3	107.1	186.0	265.8	410.9	503.1	579.4	802.1	1042.9

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

果実類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	86.9	107.8	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	117.0	254.2	313.9	437.3	437.3
	30-39歳	100	48.2	80.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.6	143.2	160.5	620.8	625.0
	40-49歳	132	70.2	102.9	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	119.0	200.0	224.9	556.3	585.0
	50-59歳	147	83.3	113.3	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	117.0	194.6	298.0	692.7	697.5
	60-69歳	197	157.8	149.2	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	46.4	127.1	218.1	369.3	443.5	653.0	713.3
	70歳以上	275	201.0	145.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.6	195.3	294.3	367.5	462.8	600.0	923.0
	(再掲)20-39歳	175	64.0	94.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	95.7	159.3	263.1	435.9	625.0
	(再掲)40-64歳	352	87.0	117.1	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	127.5	205.4	304.3	602.9	697.5
	(再掲)65歳以上	399	193.2	147.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.0	187.0	285.5	368.0	461.0	624.3	923.0
	(再掲)20歳以上*1	926	111.5	132.2	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	167.9	295.5	365.8	580.6	923.0
	(再掲)20歳以上*2	926	111.2	131.8	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	163.4	295.2	365.3	581.3	923.0
男性	20-29歳	35	55.2	86.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	81.3	112.4	342.1	418.4	418.4
	30-39歳	48	47.8	67.8	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.7	121.1	171.2	321.0	321.0
	40-49歳	61	62.6	124.1	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.2	201.5	390.0	585.0	585.0
	50-59歳	74	59.9	78.6	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	101.4	156.7	259.3	299.5	299.5
	60-69歳	89	122.1	126.4	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	110.6	198.9	253.7	406.2	630.0	630.0
	70歳以上	124	194.8	143.4	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	91.0	193.5	293.9	361.5	456.6	690.5	779.5
	(再掲)20-39歳	83	50.8	75.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	85.2	120.0	222.9	418.4	418.4
	(再掲)40-64歳	168	68.4	102.1	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	117.0	200.0	257.5	549.2	585.0
	(再掲)65歳以上	180	180.8	145.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5	182.5	265.2	359.8	453.5	616.1	779.5
	(再掲)20歳以上*1	431	92.8	121.6	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	136.8	264.0	339.5	562.3	779.5
	(再掲)20歳以上*2	431	95.8	122.5	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.5	141.1	264.0	340.7	558.5	779.5
女性	20-29歳	40	112.6	117.5	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.0	214.2	279.2	339.9	437.3	437.3
	30-39歳	52	48.5	89.3	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.7	149.5	170.5	625.0	625.0
	40-49歳	71	77.6	77.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.2	122.0	185.9	217.6	271.8	271.8
	50-59歳	73	106.3	136.1	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	77.5	150.7	262.5	371.6	697.5	697.5
	60-69歳	108	185.6	159.8	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4	142.5	281.6	419.4	534.5	708.4	713.3
	70歳以上	151	206.0	146.5	13.5	0.0	0.0	0.0	19.7	88.3	193.6	290.6	377.6	466.5	675.3	923.0
	(再掲)20-39歳	92	74.5	106.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	128.3	241.0	290.4	625.0	625.0
	(再掲)40-64歳	184	105.4	128.0	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	148.6	222.8	374.0	689.6	697.5
	(再掲)65歳以上	219	202.8	148.2	12.5	0.0	0.0	0.0	6.4	88.2	188.6	290.8	381.2	464.4	676.3	923.0
	(再掲)20歳以上*1	495	130.3	139.7	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.6	193.3	320.2	411.0	626.8	923.0
	(再掲)20歳以上*2	495	127.0	139.1	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	190.0	319.1	407.5	628.1	923.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

果実類(ジャム、果汁・果汁飲料を除く)摂取量の区分

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	100g未満	人数	75	100	132	147	197	275	175	352	399	926	926
		割合	72.5	78.2	67.0	71.1	41.8	27.4	75.9	66.1	29.7	58.1	58.4
		標準誤差	9.2	4.2	5.9	5.8	4.3	3.9	5.0	4.9	3.5	2.7	2.7
男性	100g以上	人数	27.5	21.8	33.0	28.9	58.2	72.6	24.1	33.9	70.3	41.9	41.6
		割合	9.2	4.2	5.9	5.8	4.3	3.9	5.0	4.9	3.5	2.7	2.7
		標準誤差	3.5	4.8	6.1	7.4	8.9	12.4	8.3	16.8	18.0	4.31	4.31
女性	100g未満	人数	90.2	76.0	79.4	75.4	50.0	27.3	81.8	73.1	32.0	65.0	63.9
		割合	5.3	4.7	6.4	7.5	5.4	5.0	3.7	5.5	4.7	2.9	2.9
		標準誤差	9.8	24.0	20.6	24.6	50.0	72.7	18.2	26.9	68.0	35.0	36.1
女性	100g以上	人数	5.3	4.7	6.4	7.5	5.4	5.0	3.7	5.5	4.7	2.9	2.9
		割合	40	52	71	73	108	151	92	184	219	495	495
		標準誤差	58.2	79.9	54.8	67.0	35.4	27.6	71.1	59.2	27.9	51.2	52.8
女性	100g以上	人数	14.4	6.0	7.1	8.2	4.8	4.9	7.7	5.6	4.5	3.7	3.8
		割合	41.8	20.1	45.2	33.0	64.6	72.4	28.9	40.8	72.1	48.8	47.2
		標準誤差	14.4	6.0	7.1	8.2	4.8	4.9	7.7	5.6	4.5	3.7	3.8

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

きのこ類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	12.6	24.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	50.0	55.6	207.2	207.2
	30-39歳	100	17.1	28.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	50.0	63.4	190.3	191.4
	40-49歳	132	17.3	25.8	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	50.8	73.2	126.8	130.0
	50-59歳	147	16.5	42.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	49.4	74.6	320.0	320.0
	60-69歳	197	21.8	31.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	57.0	100.0	153.4	162.0
	70歳以上	275	20.3	26.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	51.9	68.2	118.2	160.0
	(再掲)20-39歳	175	15.3	26.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	50.0	60.0	165.2	207.2
	(再掲)40-64歳	352	17.3	33.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	50.6	71.8	152.4	320.0
	(再掲)65歳以上	399	21.1	29.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	56.3	78.9	140.6	162.0
	(再掲)20歳以上*1	926	18.0	30.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	50.0	68.2	150.1	320.0
	(再掲)20歳以上*2	926	18.1	31.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	50.0	68.2	154.3	320.0
男性	20-29歳	35	12.3	30.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	48.4	50.0	207.2	207.2
	30-39歳	48	18.2	34.1	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	46.7	87.0	191.4	191.4
	40-49歳	61	17.0	27.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	50.8	72.7	130.0	130.0
	50-59歳	74	18.9	48.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	54.5	135.1	320.0	320.0
	60-69歳	89	23.8	35.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	59.6	98.9	162.0	162.0
	70歳以上	124	23.0	31.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	67.8	84.9	149.9	160.0
	(再掲)20-39歳	83	15.8	32.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	46.8	50.0	207.2	207.2
	(再掲)40-64歳	168	17.9	36.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	50.8	72.5	216.0	320.0
	(再掲)65歳以上	180	24.3	34.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	68.0	100.0	161.3	162.0
	(再掲)20歳以上*1	431	19.1	34.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	50.6	73.7	169.2	320.0
	(再掲)20歳以上*2	431	19.3	35.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	50.6	77.3	170.3	320.0
女性	20-29歳	40	12.9	19.7	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	50.4	60.0	60.0	60.0
	30-39歳	52	16.1	23.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	57.0	63.5	90.0	90.0
	40-49歳	71	17.6	23.8	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	50.9	70.7	101.7	101.7
	50-59歳	73	14.1	35.8	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	44.2	66.4	320.0	320.0
	60-69歳	108	20.2	28.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	57.0	100.0	132.0	137.5
	70歳以上	151	18.1	22.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	50.0	56.9	106.0	120.0
	(再掲)20-39歳	92	14.8	21.7	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	55.1	61.5	90.0	90.0
	(再掲)40-64歳	184	16.7	29.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	50.0	69.3	132.2	320.0
	(再掲)65歳以上	219	18.6	25.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	50.0	67.5	108.8	120.0
	(再掲)20歳以上*1	495	16.9	25.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	50.0	64.6	100.0	320.0
	(再掲)20歳以上*2	495	16.8	26.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	50.0	64.5	100.0	320.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

海藻類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	6.1	10.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	22.5	28.2	84.0	84.0
	30-39歳	100	5.2	8.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	17.0	19.4	50.2	50.2
	40-49歳	132	8.5	15.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	26.2	47.0	76.0	79.0
	50-59歳	147	14.6	18.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	22.6	47.5	54.8	61.1	70.0
	60-69歳	197	13.8	31.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	18.0	40.0	52.1	220.8	233.0
	70歳以上	275	10.1	17.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.3	40.0	50.0	82.9	110.0
	(再掲)20-39歳	175	5.6	9.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.5	17.6	24.6	49.1	84.0
	(再掲)40-64歳	352	11.5	16.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	16.9	36.4	54.0	66.8	79.0
	(再掲)65歳以上	399	11.6	24.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.5	40.0	51.8	104.5	233.0
	(再掲)20歳以上*1	926	9.8	19.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	13.0	30.2	46.5	70.0	233.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	9.9	19.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	13.0	30.5	47.1	69.7	233.0
	20-29歳	35	5.2	11.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	18.3	27.6	84.0	84.0
	30-39歳	48	6.6	9.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	11.5	16.3	22.2	50.2	50.2
	40-49歳	61	9.7	16.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	13.5	30.0	59.4	79.0	79.0
	50-59歳	74	16.5	18.6	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	26.8	48.4	56.2	59.7	59.7
	60-69歳	89	15.0	36.9	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	19.7	36.8	67.9	283.0	283.0
	70歳以上	124	10.4	16.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.2	42.3	51.9	68.6	110.0
	(再掲)20-39歳	83	6.0	10.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	16.4	25.4	84.0	84.0
	(再掲)40-64歳	168	12.9	17.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	20.0	39.6	55.3	74.5	79.0
	(再掲)65歳以上	180	12.2	27.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	11.3	40.5	52.8	148.4	283.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	10.5	20.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	13.5	30.2	49.2	79.0	233.0
	(再掲)20歳以上*2	431	10.6	20.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	13.5	31.6	50.0	79.2	233.0
	20-29歳	40	6.9	10.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	23.6	31.5	36.0	36.0
	30-39歳	52	4.1	8.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	17.6	19.7	49.1	49.1
	40-49歳	71	7.3	13.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	23.4	47.1	60.0	60.0
	50-59歳	73	12.8	18.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	21.3	44.6	54.6	70.0	70.0
	60-69歳	108	12.9	25.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	16.1	41.1	51.0	201.1	207.8
	70歳以上	151	9.8	17.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	11.1	35.1	46.2	102.2	105.0
	(再掲)20-39歳	92	5.2	9.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	6.6	19.3	24.5	49.1	49.1
	(再掲)40-64歳	184	10.1	16.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	15.5	35.6	52.5	60.0	70.0
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	11.1	21.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.5	39.0	50.1	110.3	207.8
	(再掲)20歳以上*1	495	9.1	17.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.1	30.2	45.0	63.5	207.8
	(再掲)20歳以上*2	495	9.1	17.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	30.2	45.0	62.5	207.8
	(再掲)20歳以上*2	495	9.1	17.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	30.2	45.0	62.5	207.8

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	61.5	68.7	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	89.9	175.0	191.6	258.0	258.0
	30-39歳	100	48.2	58.9	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	79.1	149.0	199.7	200.0	200.0
	40-49歳	132	67.1	71.1	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	47.5	100.7	181.7	214.8	295.5	298.4
	50-59歳	147	67.0	62.3	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	55.1	100.0	170.0	210.2	217.7	218.0
	60-69歳	197	93.2	72.5	8.7	0.0	0.0	0.0	1.5	33.7	85.6	130.9	192.0	209.8	337.4	371.2
	70歳以上	275	85.7	65.5	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8	80.0	131.9	171.7	187.5	311.2	367.5
	(再掲)20-39歳	175	53.6	63.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	83.6	150.0	193.2	257.9	258.0
	(再掲)40-64歳	352	69.4	66.2	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	54.4	101.0	167.4	210.4	291.4	298.4
	(再掲)65歳以上	399	89.7	68.7	6.5	0.0	0.0	0.0	1.0	38.7	80.0	132.0	177.1	202.3	339.8	371.2
	(再掲)20歳以上*1	926	72.0	68.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	55.0	113.7	175.0	200.2	285.7	371.2
男性	(再掲)20歳以上*2	926	71.9	68.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	55.0	113.5	175.0	200.0	268.0	371.2
	20-29歳	35	67.9	80.0	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	118.9	190.7	257.9	258.0	258.0
	30-39歳	48	58.1	74.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	101.2	200.0	200.0	200.0	200.0
	40-49歳	61	80.6	83.4	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	50.9	134.0	213.8	236.5	298.4	298.4
	50-59歳	74	73.7	71.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.0	121.8	210.1	216.2	218.0	218.0
	60-69歳	89	91.1	73.2	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	90.7	131.2	198.4	211.6	371.2	371.2
	70歳以上	124	100.8	68.0	8.2	0.0	0.0	0.0	20.0	47.5	94.7	140.8	182.8	229.6	349.8	367.5
	(再掲)20-39歳	83	62.1	76.3	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	112.5	198.1	200.0	258.0	258.0
	(再掲)40-64歳	168	78.3	75.6	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	54.2	122.2	210.1	218.0	296.6	298.4
	(再掲)65歳以上	180	99.6	69.7	7.7	0.0	0.0	0.0	12.4	44.0	90.0	148.4	185.5	228.5	335.5	371.2
女性	(再掲)20歳以上*1	431	79.1	75.9	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	55.0	132.9	200.0	217.6	293.7	371.2
	(再掲)20歳以上*2	431	79.5	75.5	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	56.3	133.3	200.0	216.9	292.9	371.2
	20-29歳	40	56.3	58.4	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	60.9	89.5	160.2	189.3	192.0	192.0
	30-39歳	52	40.2	41.8	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	24.7	64.5	118.0	132.0	160.0	150.0
	40-49歳	71	53.9	54.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	40.2	93.3	130.0	162.2	277.5	277.5
	50-59歳	73	60.4	52.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	62.0	83.7	133.5	175.7	211.3	211.3
	60-69歳	108	94.8	72.3	9.2	0.0	0.0	0.0	2.4	36.3	82.7	128.8	177.2	217.7	347.3	349.0
	70歳以上	151	73.5	60.8	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	64.8	117.8	152.6	171.5	301.5	338.0
	(再掲)20-39歳	92	46.7	49.6	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	25.0	80.3	121.5	149.3	192.0	192.0
	(再掲)40-64歳	184	60.5	54.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	54.7	94.8	138.6	167.5	233.0	277.5
女性	(再掲)65歳以上	219	82.1	67.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	80.0	121.6	167.2	200.0	342.8	349.0
	(再掲)20歳以上*1	495	64.8	60.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	55.0	98.0	144.0	176.5	277.5	349.0
	(再掲)20歳以上*2	495	64.2	60.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	54.3	95.0	142.7	176.6	272.7	349.0
	(再掲)20歳以上*2	495	64.2	60.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	54.3	95.0	142.7	176.6	272.7	349.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

肉類(g)	性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数		20-29歳	75	131.6	100.1	11.6	0.0	0.0	0.0	36.0	75.0	118.9	175.1	224.8	342.4	563.0	563.0
		30-39歳	100	118.3	73.7	7.6	0.0	0.0	0.4	30.0	60.0	100.8	167.9	225.3	253.1	346.7	347.7
		40-49歳	132	116.7	90.6	8.7	0.0	0.0	0.0	18.5	51.4	89.0	169.8	238.3	316.1	392.1	394.0
		50-59歳	147	92.7	67.6	5.5	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	89.8	122.3	179.2	209.1	350.8	404.1
		60-69歳	197	83.5	68.8	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	73.9	122.0	165.1	215.1	389.9	500.0
		70歳以上	275	73.3	54.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	70.0	110.9	144.0	156.2	229.7	382.0
		(再掲)20-39歳	175	123.7	85.5	5.9	0.0	0.0	0.0	29.9	62.7	106.5	169.1	225.1	281.1	542.4	563.0
		(再掲)40-64歳	352	99.1	77.1	4.6	0.0	0.0	0.0	12.5	43.4	87.4	138.5	198.9	260.0	381.6	404.1
		(再掲)65歳以上	399	77.1	60.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	70.0	116.2	145.3	196.4	287.8	500.0
		(再掲)20歳以上*1	926	102.1	79.4	3.9	0.0	0.0	0.0	10.7	50.0	89.8	142.3	202.1	242.6	370.7	563.0
		(再掲)20歳以上*2	926	101.7	78.6	3.8	0.0	0.0	0.0	10.6	50.0	90.0	142.1	200.0	238.4	359.7	563.0
男性		20-29歳	35	148.6	119.4	18.0	0.0	0.0	24.4	37.7	75.3	120.0	174.5	322.7	520.9	563.0	563.0
		30-39歳	48	139.7	76.1	9.0	0.0	0.0	37.0	60.0	74.3	124.8	212.4	225.2	290.6	347.7	347.7
		40-49歳	61	136.5	108.9	15.4	0.0	0.0	0.0	25.3	50.3	100.0	201.6	313.0	374.1	394.0	394.0
		50-59歳	74	108.0	68.6	8.9	0.0	0.0	9.2	19.1	59.8	102.0	149.7	186.4	219.8	404.1	404.1
		60-69歳	89	107.4	79.5	8.7	0.0	0.0	0.0	15.2	46.8	98.6	142.1	218.5	287.6	500.0	500.0
		70歳以上	124	76.6	55.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	70.0	114.2	144.0	164.3	280.7	382.0
		(再掲)20-39歳	83	143.4	95.6	8.1	0.0	0.0	34.0	60.0	75.1	121.9	191.5	262.0	325.2	563.0	563.0
		(再掲)40-64歳	168	115.8	86.7	8.0	0.0	0.0	0.0	16.3	52.2	100.0	159.0	230.1	291.7	393.2	404.1
		(再掲)65歳以上	180	87.0	67.5	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	80.0	120.0	164.3	217.6	289.9	500.0
		(再掲)20歳以上*1	431	118.5	89.0	4.9	0.0	0.0	0.0	18.4	60.0	100.0	162.1	225.9	287.4	404.0	563.0
		(再掲)20歳以上*2	431	116.8	87.4	4.7	0.0	0.0	0.0	18.0	60.0	100.0	156.4	225.4	285.9	401.9	563.0
女性		20-29歳	40	117.8	80.0	13.8	0.0	0.0	0.0	4.9	60.0	109.3	178.5	199.3	207.9	540.0	540.0
		30-39歳	52	101.1	67.7	12.6	0.0	0.0	0.0	6.5	60.0	97.8	137.0	189.3	235.6	299.9	299.9
		40-49歳	71	97.3	63.2	10.2	0.0	0.0	0.0	17.8	53.9	80.8	138.2	205.5	213.1	314.0	314.0
		50-59歳	73	77.7	63.5	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	72.0	106.9	170.1	226.9	280.0	280.0
		60-69歳	108	65.0	52.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	55.6	95.9	129.7	165.1	285.0	302.5
		70歳以上	151	70.6	53.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	69.1	107.2	137.0	155.5	225.6	250.0
		(再掲)20-39歳	92	107.9	73.0	8.6	0.0	0.0	0.0	6.5	60.0	100.2	147.1	198.1	225.4	540.0	540.0
		(再掲)40-64歳	184	82.5	62.2	4.7	0.0	0.0	0.0	4.4	35.5	77.0	115.0	160.0	211.2	277.5	314.0
		(再掲)65歳以上	219	69.5	53.3	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	60.0	103.7	142.1	165.0	217.4	250.0
		(再掲)20歳以上*1	495	85.5	64.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	80.0	121.9	165.1	208.2	283.1	540.0
		(再掲)20歳以上*2	495	86.1	64.9	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	80.0	121.9	167.5	208.3	285.2	540.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

卵類(♀)		性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数			20-29歳	75	40.9	28.2	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	43.0	60.8	80.0	87.0	136.6	136.6
			30-39歳	100	31.8	24.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	33.8	49.9	56.5	74.5	128.7	129.2
			40-49歳	132	29.9	24.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	28.7	50.0	62.4	70.7	90.7	120.0
			50-59歳	147	25.7	29.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	46.3	66.1	83.4	124.8	125.0
			60-69歳	197	31.3	31.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	27.5	44.6	79.7	90.1	109.9	172.0
			70歳以上	275	30.3	27.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	24.5	50.0	57.6	86.7	112.7	159.2
			(再掲)20-39歳	175	35.5	26.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	39.3	51.0	68.4	82.6	116.8	136.6
			(再掲)40-64歳	352	28.8	28.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	48.9	64.2	79.0	106.7	125.0
			(再掲)65歳以上	399	30.2	28.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	23.6	49.0	59.8	88.0	110.0	172.0
			(再掲)20歳以上*1	926	31.5	27.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	30.0	50.0	64.4	85.3	108.0	172.0
		(再掲)20歳以上*2	926	31.5	28.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	30.0	50.0	64.5	86.0	108.0	172.0	
男性			20-29歳	35	39.3	32.1	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	43.0	60.4	85.4	99.2	136.6	136.6
			30-39歳	48	34.5	23.2	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	40.9	50.2	56.5	78.8	88.8	88.8
			40-49歳	61	29.0	24.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	30.2	51.0	60.6	64.8	70.0	70.0
			50-59歳	74	28.0	30.4	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	48.8	75.8	88.8	124.6	124.6
			60-69歳	89	36.3	35.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	34.8	57.4	87.8	105.2	172.0	172.0
			70歳以上	124	30.8	28.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	24.2	50.0	57.0	88.4	149.1	159.2
			(再掲)20-39歳	83	36.5	27.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	43.0	50.6	68.3	88.0	136.6	136.6
			(再掲)40-64歳	168	29.0	28.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	24.1	50.0	65.0	76.0	107.0	124.6
			(再掲)65歳以上	180	33.1	31.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	30.0	50.0	86.3	90.0	159.3	172.0
			(再掲)20歳以上*1	431	32.8	29.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	32.0	50.1	69.4	88.0	110.0	172.0
		(再掲)20歳以上*2	431	32.9	29.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	32.0	50.0	69.4	88.0	110.0	172.0	
女性			20-29歳	40	42.2	25.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	44.0	60.7	77.2	84.7	100.0	100.0
			30-39歳	52	29.5	26.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	29.0	48.4	55.8	76.1	129.2	129.2
			40-49歳	71	30.7	24.6	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	28.7	43.0	67.7	79.7	120.0	120.0
			50-59歳	73	23.4	28.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	43.5	61.9	70.5	125.0	125.0
			60-69歳	108	27.5	27.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	21.4	43.0	59.2	87.8	102.8	103.4
			70歳以上	151	29.8	27.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	50.0	58.2	72.7	109.9	130.7
			(再掲)20-39歳	92	34.7	26.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	37.8	50.5	65.4	80.0	129.2	129.2
			(再掲)40-64歳	184	28.7	28.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	44.0	63.2	87.1	121.5	125.0
			(再掲)65歳以上	219	27.9	26.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	21.6	46.0	57.0	71.3	105.3	130.7
			(再掲)20歳以上*1	495	30.1	26.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	28.7	46.5	62.5	79.6	103.6	130.7
		(再掲)20歳以上*2	495	30.0	26.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	28.7	46.4	62.5	79.6	103.7	130.7	

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1 同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

乳類(g)	性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数		20-29歳	75	218.5	349.6	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	50.7	298.0	827.0	992.5	1532.6	1532.6
		30-39歳	100	111.3	136.8	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	212.0	286.2	404.0	526.5	526.7
		40-49歳	132	142.5	189.7	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	86.4	204.2	409.2	603.5	743.0	1338.9
		50-59歳	147	134.2	194.6	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	110.2	189.0	309.6	375.8	898.8	1134.0
		60-69歳	197	114.5	127.2	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	100.0	186.1	267.6	332.9	658.3	735.6
		70歳以上	275	157.5	156.7	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	122.6	240.0	350.1	447.5	742.8	942.2
		(再掲)20-39歳	175	155.0	251.6	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	50.3	219.7	371.0	645.4	1308.5	1532.6
		(再掲)40-64歳	352	135.4	182.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	91.6	200.0	309.9	418.7	752.6	1338.9
		(再掲)65歳以上	399	144.6	152.7	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	104.5	227.0	338.7	430.3	735.7	942.2
		(再掲)20歳以上*1	926	144.3	194.1	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	87.7	208.1	340.5	501.0	977.3	1532.6
		(再掲)20歳以上*2	926	143.3	192.9	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	87.4	208.0	338.9	478.5	976.9	1532.6
男性		20-29歳	35	284.0	372.3	108.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.1	365.1	929.0	1004.1	1037.5	1037.5
		30-39歳	48	91.5	114.8	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	14.9	206.4	274.9	300.2	412.0	412.0
		40-49歳	61	156.9	226.9	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.2	192.5	596.1	701.8	745.0	745.0
		50-59歳	74	109.6	141.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	70.9	153.8	296.3	317.6	1134.0	1134.0
		60-69歳	89	112.4	147.4	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	51.9	160.8	264.8	476.5	735.6	735.6
		70歳以上	124	150.9	138.1	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	100.0	235.1	353.2	459.5	762.5	942.2
		(再掲)20-39歳	83	170.2	289.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	54.3	223.2	431.1	899.7	1037.5	1037.5
		(再掲)40-64歳	168	127.8	176.7	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	75.0	182.6	329.8	602.0	742.3	1134.0
		(再掲)65歳以上	180	142.0	160.3	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	100.0	227.5	341.4	478.3	735.7	942.2
		(再掲)20歳以上*1	431	146.1	210.3	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	77.1	206.0	371.6	648.8	1002.0	1134.0
		(再掲)20歳以上*2	431	144.4	206.3	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	77.3	206.0	366.3	630.0	1000.9	1134.0
女性		20-29歳	40	165.5	324.8	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	49.1	187.2	438.1	931.1	1532.6	1532.6
		30-39歳	52	127.3	151.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	230.3	333.2	488.1	526.7	526.7
		40-49歳	71	128.4	145.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	87.3	212.9	300.3	400.7	1338.9	1338.9
		50-59歳	73	158.4	164.4	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	137.3	206.0	346.9	529.7	863.2	863.2
		60-69歳	108	116.1	109.6	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	103.5	200.0	267.1	301.8	558.7	633.0
		70歳以上	151	162.9	155.9	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	147.6	255.3	351.3	445.0	718.1	761.0
		(再掲)20-39歳	92	142.8	237.0	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	50.2	208.8	348.7	516.4	1532.6	1532.6
		(再掲)40-64歳	184	142.9	147.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	110.3	206.3	309.1	381.3	778.7	1338.9
		(再掲)65歳以上	219	146.7	146.8	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	120.0	226.2	333.3	419.1	688.2	761.0
		(再掲)20歳以上*1	495	142.4	176.5	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	100.0	221.0	321.5	428.6	789.4	1532.6
		(再掲)20歳以上*2	495	142.2	178.3	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	100.0	219.1	321.4	431.4	804.4	1532.6

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

油脂類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	14.7	11.1	2.4	0.0	0.0	1.4	2.2	6.1	12.0	23.1	27.9	38.0	54.7	54.7
	30-39歳	100	11.1	9.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.4	3.5	10.1	16.3	19.5	24.4	72.2	72.5
	40-49歳	132	10.8	9.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.9	16.8	22.8	27.8	52.6	59.4
	50-59歳	147	11.4	10.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	15.0	23.6	31.4	53.9	57.0
	60-69歳	197	12.2	10.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	10.0	17.8	25.9	37.0	40.6	44.0
	70歳以上	275	9.6	8.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.0	15.0	19.0	24.6	33.9	40.5
	(再掲)20-39歳	175	12.5	10.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.9	5.5	11.3	18.0	25.4	29.5	54.6	72.5
	(再掲)40-64歳	352	11.7	10.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	16.7	25.7	31.4	47.0	59.4
	(再掲)65歳以上	399	10.0	8.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	8.0	15.6	20.7	24.9	40.0	44.0
	(再掲)20歳以上*1	926	11.6	10.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	10.0	16.6	24.3	30.0	43.1	72.5
	(再掲)20歳以上*2	926	11.6	10.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	10.0	16.6	24.4	30.1	43.1	72.5
男性	20-29歳	35	17.8	13.2	3.0	0.0	0.0	0.4	5.0	7.2	12.0	25.4	39.0	46.7	54.7	54.7
	30-39歳	48	13.5	12.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.1	6.0	12.8	19.3	23.0	37.1	72.5	72.5
	40-49歳	61	11.7	10.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	11.1	17.1	23.0	28.3	59.4	59.4
	50-59歳	74	11.7	8.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	11.4	14.0	24.0	29.6	32.0	32.0
	60-69歳	89	15.5	12.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.8	4.9	12.6	23.1	38.1	38.5	43.0	43.0
	70歳以上	124	10.9	8.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.4	17.0	24.0	25.1	39.1	40.5
	(再掲)20-39歳	83	15.3	12.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.8	6.2	12.0	19.8	29.6	40.9	72.5	72.5
	(再掲)40-64歳	168	13.1	10.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.5	4.7	12.0	19.0	28.2	33.5	46.7	59.4
	(再掲)65歳以上	180	11.4	9.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.4	17.4	24.6	29.0	40.6	40.7
	(再掲)20歳以上*1	431	13.4	11.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	5.0	12.0	19.3	26.6	33.8	54.0	72.5
	(再掲)20歳以上*2	431	13.3	11.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.0	12.0	19.2	26.6	33.9	53.9	72.5
	(再掲)20歳以上*2	431	13.3	11.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.0	12.0	19.2	26.6	33.9	53.9	72.5
女性	20-29歳	40	12.1	8.3	2.2	0.0	0.0	1.8	2.2	5.2	9.9	16.1	25.2	26.8	28.7	28.7
	30-39歳	52	9.1	7.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	8.0	15.2	18.1	18.2	35.1	35.1
	40-49歳	71	9.9	8.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	14.7	25.3	27.9	41.0	41.0
	50-59歳	73	11.1	11.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	8.6	15.1	24.3	38.5	57.0	57.0
	60-69歳	108	9.7	7.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	9.3	18.4	23.2	23.2	43.3	44.0
	70歳以上	151	8.4	7.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.3	13.0	17.5	19.2	33.9	34.1
	(再掲)20-39歳	92	10.3	7.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	9.5	15.9	19.8	25.1	35.1	35.1
	(再掲)40-64歳	184	10.3	9.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	8.4	14.9	23.4	29.4	51.9	57.0
	(再掲)65歳以上	219	8.9	7.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.3	14.0	17.9	19.4	33.8	44.0
	(再掲)20歳以上*1	495	9.8	8.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	3.7	8.1	15.0	18.2	25.5	37.1	57.0
	(再掲)20歳以上*2	495	9.9	8.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	3.7	8.4	15.1	18.3	25.5	37.8	57.0
	(再掲)20歳以上*2	495	9.9	8.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	3.7	8.4	15.1	18.3	25.5	37.8	57.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

菓子類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	21.3	52.8	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	62.5	152.4	420.0	420.0
	30-39歳	100	25.1	52.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	74.1	166.9	246.7	247.0
	40-49歳	132	25.8	54.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	79.2	112.9	316.6	600.0
	50-59歳	147	19.8	36.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	61.0	108.0	207.4	250.0
	60-69歳	197	25.8	50.2	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	100.0	142.1	264.3	270.0
	70歳以上	275	31.4	52.1	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	41.0	95.6	126.0	258.8	270.0
	(再掲)20-39歳	175	23.6	52.3	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	71.0	154.1	239.9	420.0
	(再掲)40-64歳	352	24.2	48.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	80.0	113.5	246.6	600.0
	(再掲)65歳以上	399	29.1	50.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	90.6	126.0	263.0	270.0
	(再掲)20歳以上*1	926	24.8	49.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	80.0	126.0	245.0	600.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	24.6	49.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	80.0	126.0	244.7	600.0
	20-29歳	35	25.9	57.2	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.3	165.7	178.7	178.7
	30-39歳	48	5.3	26.2	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.1	192.0	192.0
	40-49歳	61	16.6	34.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	57.5	71.4	220.0	220.0
	50-59歳	74	16.3	36.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	60.0	106.3	250.0	250.0
	60-69歳	89	20.8	37.7	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	78.2	100.0	172.6	172.6
	70歳以上	124	23.7	42.6	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	76.3	108.7	250.3	270.0
	(再掲)20-39歳	83	13.7	42.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	152.0	192.0	192.0
	(再掲)40-64歳	168	18.6	37.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	63.0	100.0	216.2	250.0
	(再掲)65歳以上	180	21.7	39.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	70.0	98.1	225.6	270.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	17.7	39.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	60.4	105.0	185.4	270.0
	(再掲)20歳以上*2	431	17.8	39.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	60.0	105.0	185.5	270.0
	20-29歳	40	17.6	49.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	44.8	63.6	420.0	420.0
	30-39歳	52	41.0	61.7	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	61.5	138.1	191.6	247.0	247.0
	40-49歳	71	34.9	67.8	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	39.8	101.4	162.3	600.0	600.0
	50-59歳	73	23.2	37.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	79.3	108.7	179.3	179.3
	60-69歳	108	29.7	38.1	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	100.3	164.9	289.5	270.0
	70歳以上	151	37.8	58.1	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	60.0	120.0	168.1	253.6	260.0
	(再掲)20-39歳	92	31.5	57.9	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	42.1	76.7	168.7	420.0	420.0
	(再掲)40-64歳	184	29.7	56.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	50.0	99.1	140.5	289.4	600.0
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	34.9	56.8	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.7	159.9	263.0	270.0
	(再掲)20歳以上*1	495	31.9	57.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	42.0	100.0	143.2	260.0	600.0
	(再掲)20歳以上*2	495	31.6	56.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	41.0	100.0	142.5	259.8	600.0
	(再掲)20歳以上*2	495	31.6	56.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	41.0	100.0	142.5	259.8	600.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

嗜好飲料類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	524.0	412.2	54.3	0.0	0.0	0.0	35.1	200.0	446.0	730.4	1110.9	1346.7	1928.6	1928.6
	30-39歳	100	784.0	597.1	87.3	0.0	0.0	31.7	200.0	349.3	600.0	1081.1	1463.7	2148.7	3133.8	3139.7
	40-49歳	132	845.4	591.5	81.0	0.0	0.0	83.5	183.8	369.1	799.1	1159.6	1496.6	1823.0	3196.2	3253.6
	50-59歳	147	844.4	493.3	68.4	0.0	0.0	151.8	250.0	504.3	744.0	1173.2	1528.8	1755.4	2130.5	2253.9
	60-69歳	197	915.9	532.0	56.4	0.0	2.7	148.2	321.4	569.6	773.4	1198.9	1676.2	2039.2	2436.5	2452.0
	70歳以上	275	993.7	732.8	92.9	101.0	151.0	203.1	345.3	553.3	825.7	1264.0	1801.6	2045.6	3904.6	6100.0
	(再掲)20-39歳	175	678.0	543.5	60.0	0.0	0.0	6.8	98.1	301.0	551.9	902.3	1391.9	1816.6	2711.6	3139.7
	(再掲)40-64歳	352	846.5	533.9	57.9	0.0	0.0	148.8	200.4	450.0	756.7	1160.0	1528.5	1814.1	2842.4	3253.6
	(再掲)65歳以上	399	982.3	687.4	80.0	0.0	86.1	191.9	331.8	559.1	829.9	1232.9	1793.3	2034.7	3368.3	6100.0
	(再掲)20歳以上*1	926	842.0	602.2	59.8	0.0	0.0	97.7	199.2	431.9	732.0	1160.0	1600.4	1889.2	2868.6	6100.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	840.7	597.1	59.3	0.0	0.0	99.2	200.0	432.0	721.8	1160.0	1599.4	1893.0	2668.8	6100.0
	20-29歳	35	574.3	518.3	108.4	0.0	0.0	0.0	16.1	180.7	531.6	900.0	1332.5	1897.7	1928.6	1928.6
	30-39歳	48	829.9	653.5	130.8	0.0	1.1	110.0	200.0	348.2	578.9	1206.1	1621.4	2541.7	3139.7	3139.7
	40-49歳	61	908.1	694.8	130.5	1.9	1.9	43.7	144.1	299.1	858.0	1223.6	1705.5	2134.8	3253.6	3253.6
	50-59歳	74	973.4	534.2	86.0	0.0	0.0	158.5	200.0	569.1	1007.2	1354.5	1702.7	2010.5	2053.0	2053.0
	60-69歳	89	1027.6	564.2	73.8	5.7	5.8	148.2	334.0	682.8	862.3	1482.8	1732.0	2078.5	2452.0	2452.0
	70歳以上	124	1041.0	655.6	96.7	150.0	156.0	194.7	355.4	596.4	860.8	1298.4	1868.4	2476.4	3482.4	3594.0
	(再掲)20-39歳	83	725.4	611.7	93.9	0.0	0.0	13.1	60.4	288.5	558.3	1026.8	1477.9	1924.0	3139.7	3139.7
	(再掲)40-64歳	168	941.0	586.4	81.9	0.0	0.0	148.5	200.0	498.1	868.3	1289.9	1696.0	1959.4	3132.5	3253.6
	(再掲)65歳以上	180	1054.2	647.8	88.3	5.7	89.9	191.9	337.3	638.5	896.6	1333.3	1862.9	2427.1	3342.6	3594.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	902.6	627.7	78.2	0.0	0.0	66.0	183.8	402.0	800.0	1237.1	1710.2	1961.4	3109.9	3554.0
	(再掲)20歳以上*2	431	907.9	625.5	77.8	0.0	0.0	69.9	190.0	408.4	800.0	1255.8	1711.7	1964.5	3097.7	3554.0
	20-29歳	40	483.2	301.0	42.1	0.0	0.0	0.0	132.4	249.7	439.4	582.0	930.3	1111.0	1475.0	1475.0
	30-39歳	52	747.0	550.7	72.5	0.0	0.0	5.3	102.5	345.8	609.3	1011.0	1429.2	2146.0	2403.5	2403.5
	40-49歳	71	784.2	467.1	67.2	0.0	0.0	133.0	223.1	371.6	747.2	1100.1	1383.6	1454.2	2850.0	2850.0
	50-59歳	73	717.0	414.8	52.8	0.0	0.0	129.5	285.5	425.7	623.0	927.3	1294.0	1598.5	2253.9	2253.9
	60-69歳	108	829.1	490.8	60.0	0.0	0.0	140.8	290.0	500.4	709.0	1105.3	1452.9	2005.7	2346.7	2411.5
	70歳以上	151	955.0	790.4	97.9	101.0	150.6	206.2	304.0	513.9	758.5	1207.7	1657.9	1890.1	5326.5	6100.0
	(再掲)20-39歳	92	639.7	481.3	47.5	0.0	0.0	0.0	140.8	307.4	551.3	806.0	1279.8	1487.3	2403.5	2403.5
	(再掲)40-64歳	184	752.7	458.9	49.5	0.0	0.0	150.2	266.7	426.5	654.8	1066.9	1381.9	1605.0	2274.6	2850.0
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	926.7	713.0	80.2	0.0	38.0	183.8	304.3	517.0	759.1	1158.2	1635.8	1887.6	4375.6	6100.0
	(再掲)20歳以上*1	495	780.9	569.5	49.7	0.0	0.0	129.9	228.7	440.1	662.4	1062.4	1433.2	1683.7	2402.8	6100.0
	(再掲)20歳以上*2	495	771.9	559.0	48.1	0.0	0.0	122.1	220.0	435.5	656.0	1050.0	1424.9	1679.1	2402.3	6100.0
	(再掲)20歳以上*2	495	771.9	559.0	48.1	0.0	0.0	122.1	220.0	435.5	656.0	1050.0	1424.9	1679.1	2402.3	6100.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

調味料・香辛料類(g)																
性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	106.8	77.2	15.4	8.2	8.2	18.3	33.1	47.8	74.2	201.4	223.6	252.8	265.4	265.4
	30-39歳	100	97.5	81.5	9.6	10.3	12.3	25.1	28.2	40.8	72.3	129.3	214.3	241.6	526.0	528.7
	40-49歳	132	122.0	107.9	13.0	0.0	21.9	29.9	29.9	42.5	77.1	192.9	254.3	308.8	582.7	612.0
	50-59歳	147	115.4	109.5	11.5	0.0	0.3	23.6	30.2	46.3	68.8	145.0	253.6	351.6	520.3	524.5
	60-69歳	197	118.0	111.7	11.5	16.6	18.9	23.0	33.0	48.8	72.2	139.6	274.8	315.5	563.3	678.0
	70歳以上	275	103.1	108.3	9.8	1.0	11.5	18.4	25.4	39.0	69.6	106.2	259.6	344.6	558.2	734.3
	(再掲)20-39歳	175	101.3	79.7	10.0	8.2	9.5	24.3	31.3	43.0	73.7	136.0	222.7	251.7	333.1	528.7
	(再掲)40-64歳	352	115.1	103.6	8.3	0.0	0.8	22.0	30.3	46.5	74.4	150.5	251.9	314.0	515.2	612.0
	(再掲)65歳以上	399	109.9	114.0	9.1	1.0	11.6	18.8	27.3	41.1	69.6	114.9	276.4	347.6	605.8	734.3
	(再掲)20歳以上*1	926	110.7	101.5	5.8	0.0	10.3	22.0	30.1	43.8	72.6	137.5	253.3	305.5	508.2	734.3
	(再掲)20歳以上*2	926	110.4	101.3	6.0	0.0	10.2	22.1	30.2	43.9	72.6	136.0	251.8	305.5	508.0	734.3
男性	20-29歳	35	123.1	82.8	18.9	8.2	8.2	19.2	36.1	56.8	77.5	208.1	251.7	256.7	265.4	265.4
	30-39歳	48	92.2	82.2	11.3	14.1	14.1	20.5	27.0	42.1	81.2	110.6	186.9	247.5	528.7	528.7
	40-49歳	61	143.1	125.8	26.4	22.3	22.3	22.3	31.9	42.1	92.2	229.2	306.2	371.9	612.0	612.0
	50-59歳	74	136.1	107.8	12.6	9.2	9.2	27.1	36.7	55.7	85.4	234.0	313.0	352.3	503.3	503.3
	60-69歳	89	120.8	98.6	13.7	16.6	17.4	28.3	39.5	54.3	79.9	166.7	273.2	344.7	435.0	435.0
	70歳以上	124	116.9	121.9	15.4	1.0	11.7	22.8	29.0	46.0	79.6	108.8	286.1	379.0	689.2	734.3
	(再掲)20-39歳	83	104.8	83.3	10.9	8.2	8.2	22.4	31.7	49.0	81.3	136.0	209.5	253.6	528.7	528.7
	(再掲)40-64歳	168	135.4	111.1	14.0	9.2	20.3	23.5	35.7	53.5	85.7	218.8	300.0	350.8	557.8	612.0
	(再掲)65歳以上	180	118.4	118.6	11.3	1.0	13.1	23.8	30.1	48.8	78.4	129.7	278.2	387.3	601.4	734.3
	(再掲)20歳以上*1	431	121.2	106.0	7.4	1.0	12.5	25.0	32.1	49.7	81.9	170.5	263.8	326.5	517.8	734.3
	(再掲)20歳以上*2	431	120.3	105.5	7.3	1.0	12.4	25.0	32.1	49.8	81.7	167.1	262.6	332.8	514.7	734.3
女性	20-29歳	40	93.6	70.7	18.7	15.3	15.3	17.4	32.3	43.1	71.8	120.8	211.9	249.4	258.5	258.5
	30-39歳	52	101.8	81.5	12.9	10.3	10.3	27.0	28.3	40.2	70.6	173.0	235.2	252.3	311.1	311.1
	40-49歳	71	101.4	83.0	11.2	0.0	0.0	18.6	25.7	47.0	66.5	130.9	238.2	246.5	488.3	488.3
	50-59歳	73	94.9	107.9	16.0	0.0	0.0	15.0	26.3	40.4	60.1	101.4	209.3	413.6	524.5	524.5
	60-69歳	108	115.9	121.3	14.0	19.6	19.6	21.0	29.9	44.3	61.6	135.9	280.3	312.6	666.1	678.0
	70歳以上	151	91.9	94.7	9.0	10.5	11.1	16.5	18.9	36.7	63.5	100.5	209.4	311.4	484.4	575.3
	(再掲)20-39歳	92	98.5	77.0	12.1	10.3	11.2	22.6	28.6	40.3	70.8	131.9	223.1	247.9	311.1	311.1
	(再掲)40-64歳	184	94.9	91.5	8.2	0.0	0.0	20.6	25.8	41.7	62.0	112.2	227.6	249.5	512.6	524.5
	(再掲)65歳以上	219	103.5	110.1	8.7	10.5	11.5	18.4	25.0	38.8	63.5	112.2	276.5	321.0	606.1	678.0
	(再掲)20歳以上*1	495	100.1	95.8	6.0	0.0	5.3	19.8	27.1	40.7	65.9	122.0	236.9	292.2	498.1	678.0
	(再掲)20歳以上*2	495	100.3	95.9	6.3	0.0	5.0	20.1	27.8	41.0	65.9	121.9	236.5	287.3	500.2	678.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

米・加工品(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	348.4	170.4	22.2	0.0	7.9	100.0	141.0	200.0	331.9	448.7	601.5	616.5	800.0	800.0
	30-39歳	100	317.4	203.7	32.3	0.0	0.0	0.0	100.0	150.0	309.4	407.6	600.0	708.6	1013.7	1015.0
	40-49歳	132	315.0	181.7	16.3	0.0	0.0	0.0	102.3	183.6	302.2	439.8	562.5	623.5	715.5	720.0
	50-59歳	147	297.1	160.4	15.8	0.0	0.0	38.5	100.0	200.0	297.8	400.0	550.0	599.5	667.3	750.0
	60-69歳	197	244.3	152.2	16.3	0.0	0.0	0.0	79.6	131.3	200.0	350.0	485.2	530.0	603.6	900.0
	70歳以上	275	257.5	140.9	11.6	0.0	0.0	65.9	100.0	150.0	230.0	350.0	450.0	510.0	655.1	900.0
	(再掲)20-39歳	175	330.0	190.9	21.0	0.0	0.0	65.2	115.0	189.0	330.0	441.0	600.0	660.8	919.5	1015.0
	(再掲)40-64歳	352	298.4	167.5	10.3	0.0	0.0	41.6	100.0	177.0	295.0	413.9	537.7	600.0	703.2	750.0
	(再掲)65歳以上	399	250.7	144.6	11.4	0.0	0.0	44.0	92.8	150.0	225.0	350.0	440.0	527.7	647.0	900.0
	(再掲)20歳以上*1	926	298.0	174.7	9.9	0.0	0.0	46.9	100.0	188.1	290.0	400.0	550.0	600.1	797.6	1015.0
	(再掲)20歳以上*2	926	297.5	173.9	10.2	0.0	0.0	48.3	100.0	188.1	290.0	400.0	546.1	600.0	798.4	1015.0
男性	20-29歳	35	442.4	171.4	36.7	80.0	86.5	148.8	200.0	321.1	408.0	600.0	630.9	793.1	800.0	800.0
	30-39歳	48	383.6	222.3	45.8	0.0	0.0	0.0	130.8	200.5	334.7	473.1	672.4	838.8	1015.0	1015.0
	40-49歳	61	364.5	200.0	24.6	0.0	0.0	0.0	103.0	200.0	350.0	538.4	622.0	703.1	720.0	720.0
	50-59歳	74	379.1	157.4	18.3	0.0	0.0	100.0	200.0	294.2	376.6	465.9	599.5	609.3	750.0	750.0
	60-69歳	89	288.8	170.8	26.8	0.0	0.0	0.0	100.0	162.9	260.0	406.2	530.0	575.6	900.0	900.0
	70歳以上	124	293.5	138.4	15.1	0.0	17.7	100.0	128.9	194.8	300.0	371.5	493.3	558.4	710.6	730.0
	(再掲)20-39歳	83	407.6	204.0	24.2	0.0	0.0	80.0	167.9	279.9	395.4	600.0	650.0	799.9	1015.0	1015.0
	(再掲)40-64歳	168	357.2	176.5	11.3	0.0	0.0	100.0	110.0	200.0	360.0	504.9	599.4	634.4	713.5	750.0
	(再掲)65歳以上	180	292.1	150.2	16.1	0.0	0.0	74.2	114.0	180.0	300.0	390.3	499.9	578.7	713.0	900.0
	(再掲)20歳以上*1	431	355.1	186.1	14.0	0.0	0.0	94.9	120.0	200.0	335.2	479.9	600.0	650.0	800.0	1015.0
	(再掲)20歳以上*2	431	353.0	184.9	14.5	0.0	0.0	94.3	122.3	200.0	335.0	470.0	600.0	650.0	800.0	1015.0
女性	20-29歳	40	272.1	121.2	30.0	0.0	0.0	100.0	115.5	167.9	276.1	388.2	441.9	450.0	450.0	450.0
	30-39歳	52	264.1	171.5	27.6	0.0	0.0	0.0	99.4	120.5	262.5	397.3	467.2	591.9	800.0	800.0
	40-49歳	71	266.6	148.0	18.8	0.0	0.0	0.0	99.5	151.1	255.7	391.0	487.4	509.5	700.0	700.0
	50-59歳	73	216.1	116.7	22.1	0.0	0.0	0.0	52.4	148.0	200.0	300.0	369.7	480.0	530.0	530.0
	60-69歳	108	209.8	126.5	13.4	0.0	0.0	0.0	60.0	118.3	200.0	300.0	380.0	473.9	547.1	550.0
	70歳以上	151	228.1	136.4	13.3	0.0	0.0	56.6	78.7	136.4	200.0	300.0	409.5	475.1	649.9	900.0
	(再掲)20-39歳	92	267.4	154.3	22.3	0.0	0.0	9.8	100.0	146.6	265.1	396.4	444.1	505.4	800.0	800.0
	(再掲)40-64歳	184	240.0	135.2	14.8	0.0	0.0	0.0	80.0	150.0	200.0	310.0	444.2	501.8	535.4	700.0
	(再掲)65歳以上	219	218.9	131.9	11.7	0.0	0.0	40.9	70.0	130.0	200.0	300.0	404.4	473.1	634.2	900.0
	(再掲)20歳以上*1	495	240.5	140.9	9.5	0.0	0.0	0.0	87.3	147.7	200.0	331.4	430.4	480.9	637.5	900.0
	(再掲)20歳以上*2	495	240.6	141.1	10.0	0.0	0.0	0.0	87.7	147.7	200.0	338.0	430.0	480.7	646.3	900.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

小麦・加工品(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	88.9	102.5	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	53.6	151.4	261.5	297.9	472.8	472.8
	30-39歳	100	117.1	104.6	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	85.0	209.8	283.1	290.1	393.9	396.8
	40-49歳	132	89.6	97.5	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	60.0	120.0	252.4	311.8	399.5	400.0
	50-59歳	147	100.6	98.3	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	75.0	170.5	249.6	281.5	429.4	448.7
	60-69歳	197	131.7	119.9	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	100.0	234.6	300.6	340.8	460.6	504.0
	70歳以上	275	109.7	91.4	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	90.1	148.8	257.4	305.3	383.5	415.0
	(再掲)20-39歳	175	105.6	104.4	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	64.4	198.6	277.2	290.2	361.7	472.8
	(再掲)40-64歳	352	97.5	99.7	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	63.0	157.0	260.2	299.4	402.0	448.7
	(再掲)65歳以上	399	119.3	102.5	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	100.0	174.4	276.5	313.6	435.9	504.0
	(再掲)20歳以上*1	926	107.8	104.1	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	75.0	175.2	272.9	301.6	403.4	504.0
	(再掲)20歳以上*2	926	108.8	104.4	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	76.0	177.8	273.1	301.5	408.8	504.0
男性	20-29歳	35	122.9	113.5	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	93.4	211.2	288.7	339.8	472.8	472.8
	30-39歳	48	95.5	105.5	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	57.7	151.5	290.1	290.3	396.8	396.8
	40-49歳	61	87.1	103.7	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	58.4	120.0	260.6	329.4	400.0	400.0
	50-59歳	74	105.8	103.9	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	76.9	180.0	264.1	289.0	390.0	390.0
	60-69歳	89	150.8	143.4	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	100.0	279.6	351.2	439.6	504.0	504.0
	70歳以上	124	127.3	97.4	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	113.0	179.0	273.5	305.6	410.5	415.0
	(再掲)20-39歳	83	106.7	109.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	69.3	173.3	290.1	302.1	472.8	472.8
	(再掲)40-64歳	168	101.1	108.8	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	62.4	167.6	285.8	306.5	412.4	439.2
	(再掲)65歳以上	180	138.5	114.0	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	49.5	113.7	204.1	298.8	362.0	464.5	504.0
	(再掲)20歳以上*1	431	114.3	113.2	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	80.0	180.0	290.1	314.0	439.5	504.0
	(再掲)20歳以上*2	431	115.5	113.2	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	84.0	180.0	290.2	313.9	439.6	504.0
	20-29歳	40	61.4	84.3	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	95.6	209.4	265.3	325.0	325.0
	30-39歳	52	134.5	101.5	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	93.5	229.5	280.8	285.7	337.1	337.1
女性	40-49歳	71	92.1	91.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	60.0	111.8	250.6	282.2	329.1	329.1
	50-59歳	73	95.4	92.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	71.8	161.0	211.3	249.6	448.7	448.7
	60-69歳	108	116.9	96.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	110.0	187.1	263.1	294.4	344.0	350.0
	70歳以上	151	95.3	83.8	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	74.0	125.0	229.0	306.4	344.9	374.9
	(再掲)20-39歳	92	104.8	101.1	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	62.5	200.5	264.4	283.7	337.1	337.1
	(再掲)40-64歳	184	93.9	89.9	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	63.0	141.3	230.1	273.6	417.0	448.7
	(再掲)65歳以上	219	104.5	90.1	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	83.9	140.0	260.1	303.6	338.7	374.9
	(再掲)20歳以上*1	495	101.2	93.7	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	72.8	150.0	250.1	284.9	337.4	448.7
	(再掲)20歳以上*2	495	101.8	94.2	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	73.0	158.9	250.8	284.9	337.3	448.7

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の穀類・加工品(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	20.2	61.1	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	42.3	100.9	400.0	400.0
	30-39歳	100	12.1	41.6	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	66.7	200.0	200.0
	40-49歳	132	13.3	58.6	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	60.1	390.0	390.0
	50-59歳	147	14.7	48.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	150.7	255.9	390.0
	60-69歳	197	18.3	62.1	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	200.0	390.0	390.0
	70歳以上	275	9.3	34.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	47.6	200.0	260.0
	(再掲)20-39歳	175	15.4	50.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	94.1	284.2	400.0
	(再掲)40-64歳	352	15.2	55.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	65.4	367.4	390.0
	(再掲)65歳以上	399	11.4	43.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	65.0	208.1	390.0
	(再掲)20歳以上*1	926	14.5	52.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	110.7	260.0	400.0
	(再掲)20歳以上*2	926	14.5	51.9	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	111.2	260.0	400.0
男性	20-29歳	35	23.1	81.9	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	26.0	288.7	400.0	400.0
	30-39歳	48	19.6	57.8	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.7	146.3	200.0	200.0
	40-49歳	61	9.8	36.9	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	20.9	390.0	390.0
	50-59歳	74	17.0	50.4	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	200.0	236.0	236.0
	60-69歳	89	22.8	75.2	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	252.1	390.0	390.0
	70歳以上	124	7.9	32.6	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	42.9	236.7	260.0
	(再掲)20-39歳	83	21.0	68.2	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	145.8	400.0	400.0
	(再掲)40-64歳	168	16.9	60.2	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	194.3	366.0	390.0
	(再掲)65歳以上	180	10.0	44.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	44.2	352.7	390.0
	(再掲)20歳以上*1	431	16.3	60.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	168.6	389.8	400.0
	(再掲)20歳以上*2	431	16.4	59.5	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	174.5	387.5	400.0
女性	20-29歳	40	17.8	37.4	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	65.0	101.4	120.0	120.0
	30-39歳	52	6.1	19.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	46.8	200.0	200.0
	40-49歳	71	16.7	60.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	71.4	390.0	390.0
	50-59歳	73	12.4	45.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	40.0	360.0	360.0
	60-69歳	108	14.8	49.7	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	191.0	339.4	390.0
	70歳以上	151	10.5	35.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	65.7	200.0	200.0
	(再掲)20-39歳	92	10.9	28.6	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	68.0	200.0	200.0
	(再掲)40-64歳	184	13.5	50.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	60.9	373.0	390.0
	(再掲)65歳以上	219	12.4	42.1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	136.9	206.2	390.0
	(再掲)20歳以上*1	495	12.7	43.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	65.6	206.9	390.0
	(再掲)20歳以上*2	495	12.6	42.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	65.5	206.8	390.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

いも・加工品(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	62.0	69.8	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	83.3	184.6	198.2	231.2	231.2
	30-39歳	100	35.7	56.6	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	55.5	88.5	161.2	275.7	275.9
	40-49歳	132	54.0	89.2	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	86.0	118.9	187.7	513.5	530.8
	50-59歳	147	50.4	69.2	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	75.9	141.8	230.0	303.3	350.9
	60-69歳	197	54.3	60.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	89.5	129.4	174.4	275.6	309.9
	70歳以上	275	58.5	74.6	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	90.0	152.3	201.6	408.3	408.3
	(再掲)20-39歳	175	46.4	63.5	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	62.3	149.9	197.7	262.4	275.9
	(再掲)40-64歳	352	53.5	76.5	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	85.9	125.0	198.2	399.9	530.8
	(再掲)65歳以上	399	56.5	70.8	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	90.0	143.7	188.2	370.5	408.3
	(再掲)20歳以上*1	926	52.8	71.9	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	81.0	147.0	200.0	301.6	530.8
	(再掲)20歳以上*2	926	52.4	70.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	80.0	146.6	200.0	297.8	530.8
男性	20-29歳	35	81.5	82.2	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	50.0	149.9	199.3	220.3	231.2	231.2
	30-39歳	48	35.0	56.2	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	89.7	192.4	275.9	275.9
	40-49歳	61	71.7	116.6	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	100.4	180.1	413.3	530.8	530.8
	50-59歳	74	47.0	62.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	67.5	122.6	208.0	249.9	249.9
	60-69歳	89	61.2	67.4	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	100.0	156.3	211.0	309.9	309.9
	70歳以上	124	60.3	72.4	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	95.6	141.0	177.9	389.7	408.3
	(再掲)20-39歳	83	54.0	71.4	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	77.5	195.8	206.8	275.9	275.9
	(再掲)40-64歳	168	59.6	87.7	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	97.5	135.0	224.7	494.4	530.8
	(再掲)65歳以上	180	60.1	71.7	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	100.0	148.9	179.7	372.8	408.3
	(再掲)20歳以上*1	431	58.6	79.6	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	90.0	155.5	213.0	406.9	530.8
	(再掲)20歳以上*2	431	57.8	77.5	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	90.0	152.2	202.2	405.7	530.8
女性	20-29歳	40	46.2	53.8	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	63.7	144.1	174.5	184.7	184.7
	30-39歳	52	36.2	57.5	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	44.0	93.7	182.1	262.9	262.9
	40-49歳	71	36.7	44.6	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	66.0	102.0	111.9	197.4	197.4
	50-59歳	73	53.7	75.7	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	83.2	150.7	230.2	350.9	350.9
	60-69歳	108	48.9	54.4	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	83.0	171.1	157.6	295.6	307.5
	70歳以上	151	57.0	76.5	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	90.0	164.8	228.0	381.1	408.3
	(再掲)20-39歳	92	40.3	55.9	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	58.8	113.2	169.4	262.9	262.9
	(再掲)40-64歳	184	47.4	63.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	76.6	122.2	190.2	372.8	350.9
	(再掲)65歳以上	219	53.7	70.2	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	89.3	143.0	194.2	317.3	408.3
	(再掲)20歳以上*1	495	47.0	62.7	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	67.5	123.3	179.9	265.8	408.3
	(再掲)20歳以上*2	495	46.8	62.6	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	67.0	123.7	179.9	264.3	408.3

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

でんぷん・加工品(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1.3	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.5	5.0	31.5	31.5
	30-39歳	100	2.3	6.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.8	9.4	85.8	87.2
	40-49歳	132	2.6	9.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	15.1	44.0	109.0
	50-59歳	147	1.8	5.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	8.8	8.8	29.9	30.0
	60-69歳	197	1.7	7.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.9	38.0	114.0
	70歳以上	275	2.9	9.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	21.8	46.1	50.0
	(再掲)20-39歳	175	1.9	5.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.0	7.9	30.2	87.2
	(再掲)40-64歳	352	2.1	7.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.0	38.1	114.0
	(再掲)65歳以上	399	2.6	8.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	10.9	46.4	50.0
	(再掲)20歳以上*1	926	2.2	7.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.0	44.2	114.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	2.2	7.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.0	44.2	114.0
	20-29歳	35	1.8	5.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.7	14.9	31.5	31.5
	30-39歳	48	2.9	5.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.9	10.8	47.7	47.7
	40-49歳	61	4.1	13.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	30.6	109.0	109.0
	50-59歳	74	2.6	6.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	8.1	21.9	30.0	30.0
	60-69歳	89	1.7	3.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.4	7.4	21.2	21.2
	70歳以上	124	3.1	9.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.9	28.8	46.0	46.4
	(再掲)20-39歳	83	2.5	5.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.8	8.7	47.7	47.7
	(再掲)40-64歳	168	3.1	9.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.1	24.0	42.9	109.0
	(再掲)65歳以上	180	2.7	8.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	14.8	45.4	46.4
女性	(再掲)20歳以上*1	431	2.7	8.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.3	11.8	44.2	109.0
	(再掲)20歳以上*2	431	2.7	8.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.3	11.5	44.2	109.0
	20-29歳	40	0.8	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	4.1	5.0	5.0
	30-39歳	52	1.8	7.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	13.4	87.2	87.2
	40-49歳	71	1.1	3.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.1	20.9	20.9
	50-59歳	73	1.0	3.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.3	29.4	29.4
	60-69歳	108	1.7	8.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.4	92.4	114.0
	70歳以上	151	2.7	9.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	10.6	47.6	50.0
	(再掲)20-39歳	92	1.4	6.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.8	87.2	87.2
	(再掲)40-64歳	184	1.1	5.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.0	21.1	114.0
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	219	2.5	8.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	9.2	46.9	50.0
	(再掲)20歳以上*1	495	1.6	6.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	7.3	42.0	114.0
	(再掲)20歳以上*2	495	1.6	6.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	7.3	41.3	114.0
	(再掲)20歳以上*2	495	1.6	6.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	7.3	41.3	114.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

砂糖・甘味料類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	5.6	7.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	9.3	14.3	23.3	44.4	44.4
	30-39歳	100	5.8	7.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.1	16.4	21.2	51.2	51.5
	40-49歳	132	6.1	7.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.0	8.9	12.1	21.3	42.0	42.8
	50-59歳	147	7.0	8.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.2	20.1	26.2	38.4	40.5
	60-69歳	197	6.7	7.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.9	9.9	14.9	19.7	34.4	60.0
	70歳以上	275	9.3	10.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.0	13.0	19.3	25.8	46.8	102.0
	(再掲)20-39歳	175	5.7	7.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.5	15.9	22.8	42.8	51.5
	(再掲)40-64歳	352	6.7	8.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.9	9.5	16.6	24.4	40.0	60.0
	(再掲)65歳以上	399	8.5	9.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.0	11.7	18.0	25.3	41.0	102.0
	(再掲)20歳以上*1	926	6.9	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.9	9.9	17.0	23.3	39.0	102.0
	(再掲)20歳以上*2	926	6.9	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.8	9.9	17.2	23.3	38.9	102.0
男性	20-29歳	35	3.4	5.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	11.0	17.1	26.4	26.4
	30-39歳	48	7.5	8.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.9	10.1	18.3	23.9	51.5	51.5
	40-49歳	61	6.3	7.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.0	8.9	12.6	25.4	39.5	39.5
	50-59歳	74	6.6	8.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.6	18.7	27.0	36.0	36.0
	60-69歳	89	7.1	8.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.6	10.1	16.6	24.3	60.0	60.0
	70歳以上	124	9.0	11.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.0	12.5	18.2	23.3	90.7	102.0
	(再掲)20-39歳	83	5.9	7.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	8.2	15.9	21.7	51.5	51.5
	(再掲)40-64歳	168	6.6	8.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.0	9.0	16.0	25.9	39.3	60.0
	(再掲)65歳以上	180	8.4	10.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.0	12.0	17.8	23.0	68.7	102.0
	(再掲)20歳以上*1	431	6.8	8.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.9	9.7	16.2	22.7	38.7	102.0
	(再掲)20歳以上*2	431	6.9	8.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.9	9.8	16.2	23.0	38.8	102.0
	20-29歳	40	7.3	9.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	10.2	23.0	28.2	44.4	44.4
	30-39歳	52	4.5	6.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.5	14.6	19.6	28.5	28.5
	40-49歳	71	5.9	7.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.9	8.8	11.4	22.8	42.8	42.8
女性	50-59歳	73	7.5	8.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.7	21.5	25.1	40.5	40.5
	60-69歳	108	6.4	6.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.2	9.9	14.6	18.1	36.3	37.0
	70歳以上	151	9.5	9.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.0	14.3	20.7	29.8	46.6	49.4
	(再掲)20-39歳	92	5.6	7.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.1	17.7	23.3	44.4	44.4
	(再掲)40-64歳	184	6.8	8.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.8	17.3	24.0	41.5	42.8
	(再掲)65歳以上	219	8.5	8.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.3	11.5	18.4	28.8	41.2	49.4
	(再掲)20歳以上*1	495	7.0	8.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.6	10.0	17.9	23.3	40.0	49.4
	(再掲)20歳以上*2	495	6.9	8.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.5	10.0	17.8	23.3	39.3	49.4

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

大豆・加工品(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	75.9	82.6	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.4	89.3	221.8	253.5	300.0	300.0
	30-39歳	100	52.2	80.6	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	70.0	157.8	245.0	369.7	370.0
	40-49歳	132	31.6	59.7	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	81.5	151.2	338.9	461.0
	50-59歳	147	101.7	155.3	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	118.0	274.0	297.1	771.7	812.3
	60-69歳	197	65.6	78.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	48.3	89.0	195.2	237.5	353.5	456.0
	70歳以上	275	74.8	90.9	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	40.4	128.6	200.0	219.2	375.0	592.0
	(再掲)20-39歳	175	61.8	82.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	85.0	181.4	245.0	346.5	370.0
	(再掲)40-64歳	352	71.2	119.0	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	82.9	210.0	281.1	618.0	812.3
	(再掲)65歳以上	399	69.6	86.3	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	100.0	190.0	229.0	375.0	592.0
	(再掲)20歳以上*1	926	65.7	95.7	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	86.1	194.3	247.0	375.0	812.3
	(再掲)20歳以上*2	926	67.1	97.5	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	87.5	200.0	252.1	375.0	812.3
男性	20-29歳	35	73.0	96.4	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	88.1	250.3	278.4	300.0	300.0
	30-39歳	48	51.4	71.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	120.0	158.6	194.4	245.0	245.0
	40-49歳	61	34.1	59.3	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	48.0	100.0	174.6	340.0	340.0
	50-59歳	74	69.6	83.5	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.5	89.5	203.7	220.0	439.0	439.0
	60-69歳	89	74.4	79.9	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	50.0	100.0	224.0	238.2	363.0	363.0
	70歳以上	124	78.5	92.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	138.4	212.4	256.3	374.7	375.0
	(再掲)20-39歳	83	60.2	82.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	93.7	189.8	258.8	300.0	300.0
	(再掲)40-64歳	168	60.8	78.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	80.0	206.0	224.4	343.1	439.0
	(再掲)65歳以上	180	73.7	87.6	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	120.0	209.6	244.3	374.2	375.0
	(再掲)20歳以上*1	431	62.9	81.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	89.0	200.0	236.6	312.3	439.0
	(再掲)20歳以上*2	431	64.2	82.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	90.1	200.1	237.6	326.1	439.0
	20-29歳	40	78.2	70.6	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	71.8	103.1	181.5	225.5	230.0	230.0
	30-39歳	52	52.8	88.1	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	62.1	170.1	313.8	370.0	370.0
女性	40-49歳	71	29.1	60.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	79.9	157.1	461.0	461.0
	50-59歳	73	133.5	198.3	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	59.3	173.0	292.8	551.2	812.3	812.3
	60-69歳	108	58.8	76.2	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	85.5	138.2	261.0	439.2	456.0
	70歳以上	151	71.7	90.2	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	42.3	126.1	174.5	203.1	504.8	592.0
	(再掲)20-39歳	92	63.2	82.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	82.5	181.4	235.6	370.0	370.0
	(再掲)40-64歳	184	81.6	147.9	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	84.9	269.5	300.0	749.5	812.3
	(再掲)65歳以上	219	66.4	85.3	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	40.3	91.2	170.5	203.7	397.6	592.0
	(再掲)20歳以上*1	495	68.6	108.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	82.5	181.4	281.6	600.4	812.3
	(再掲)20歳以上*2	495	70.1	110.9	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	84.9	181.9	282.8	624.2	812.3

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の豆・加工品(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.8	3.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	20.0	20.0
	30-39歳	100	0.7	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	39.7	40.0
	40-49歳	132	0.5	2.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5
	50-59歳	147	1.1	6.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	64.0
	60-69歳	197	1.5	5.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	15.0	22.5	30.0
	70歳以上	275	1.3	7.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	59.4	100.0
	(再掲)20-39歳	175	0.8	3.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0
	(再掲)40-64歳	352	0.8	4.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	17.4	64.0
	(再掲)65歳以上	399	1.5	7.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	40.9	100.0
	(再掲)20歳以上*1	926	1.0	5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	22.5	100.0
	(再掲)20歳以上*2	926	1.0	5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	22.5	100.0
男性	20-29歳	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	48	0.9	5.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	40.0	40.0
	40-49歳	61	0.4	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5
	50-59歳	74	0.3	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
	60-69歳	89	1.9	5.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	20.0	30.0	30.0
	70歳以上	124	1.0	6.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	51.8	65.0
	(再掲)20-39歳	83	0.6	4.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
	(再掲)40-64歳	168	0.6	2.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	20.0
	(再掲)65歳以上	180	1.3	6.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	37.8	65.0
	(再掲)20歳以上*1	431	0.8	4.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	65.0
	(再掲)20歳以上*2	431	0.8	4.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	65.0
女性	20-29歳	40	1.5	5.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	16.8	20.0	20.0
	30-39歳	52	0.6	2.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	17.9	17.9
	40-49歳	71	0.5	2.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	11.5	11.5
	50-59歳	73	1.8	8.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	64.0	64.0
	60-69歳	108	1.2	4.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	28.5	30.0
	70歳以上	151	1.7	9.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	63.7	100.0
	(再掲)20-39歳	92	0.9	3.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	20.0	20.0
	(再掲)40-64歳	184	1.0	5.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	36.5	64.0
	(再掲)65歳以上	219	1.6	8.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	54.3	100.0
	(再掲)20歳以上*1	495	1.2	6.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	22.5	100.0
	(再掲)20歳以上*2	495	1.2	6.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	22.5	100.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

種実類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1.5	5.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.0	7.1	65.9	65.9
	30-39歳	100	1.5	4.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	10.9	32.8	33.0
	40-49歳	132	2.1	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	7.8	12.0	14.8	65.9
	50-59歳	147	3.2	8.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	14.3	41.9	120.0
	60-69歳	197	3.9	8.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	13.5	17.4	40.2	120.0
	70歳以上	275	4.1	9.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.0	26.7	51.4	125.4
	(再掲)20-39歳	175	1.5	4.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	10.0	32.7	65.9
	(再掲)40-64歳	352	3.1	7.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.8	13.7	39.6	120.0
	(再掲)65歳以上	399	3.9	9.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	19.8	51.1	125.4
	(再掲)20歳以上*1	926	2.8	7.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.0	13.5	40.1	125.4
男性	(再掲)20歳以上*2	926	2.8	7.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.0	13.5	40.2	125.4
	20-29歳	35	2.2	7.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	5.9	9.0	65.9	65.9
	30-39歳	48	1.0	4.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.3	33.0	33.0
	40-49歳	61	1.5	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.5	8.1	9.5	9.5
	50-59歳	74	2.1	5.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.0	12.8	65.9	65.9
	60-69歳	89	4.6	10.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	14.0	19.5	120.0	120.0
	70歳以上	124	4.3	11.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.4	29.8	52.1	125.4
	(再掲)20-39歳	83	1.5	6.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.6	65.9	65.9
	(再掲)40-64歳	168	2.5	7.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	9.2	14.0	36.5	120.0
	(再掲)65歳以上	180	4.2	10.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	11.3	20.0	49.9	125.4
女性	(再掲)20歳以上*1	431	2.6	7.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.9	13.4	40.3	125.4
	(再掲)20歳以上*2	431	2.7	7.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.0	13.8	40.4	125.4
	20-29歳	40	1.0	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.0	6.2	7.5	7.5
	30-39歳	52	1.8	4.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	10.0	13.8	15.0	15.0
	40-49歳	71	2.7	5.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	11.9	12.0	65.9	65.9
	50-59歳	73	4.2	10.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	10.4	25.2	120.0	120.0
	60-69歳	108	3.4	7.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	13.1	15.0	57.9	61.0
	70歳以上	151	3.9	8.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.9	26.6	48.9	51.0
	(再掲)20-39歳	92	1.5	3.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	7.3	10.0	15.0	15.0
	(再掲)40-64歳	184	3.6	8.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.0	13.9	40.1	120.0
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	219	3.6	8.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.0	20.0	48.4	61.0
	(再掲)20歳以上*1	495	3.0	7.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.0	13.5	40.0	120.0
	(再掲)20歳以上*2	495	2.9	7.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.0	13.5	40.0	120.0
	(再掲)20歳以上*2	495	2.9	7.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.0	13.5	40.0	120.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

緑黄色野菜(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	117.3	100.7	26.7	0.0	0.0	0.0	3.5	50.3	81.3	178.7	278.1	317.7	361.3	361.3
	30-39歳	100	67.2	92.4	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	45.5	87.1	114.1	233.8	655.8	657.8
	40-49歳	132	78.6	70.0	8.0	0.0	0.0	0.5	6.8	24.4	58.4	118.4	162.6	192.8	408.7	458.9
	50-59歳	147	108.1	99.6	15.1	0.0	0.0	0.0	9.3	42.8	86.4	139.8	273.2	346.1	438.7	440.1
	60-69歳	197	129.8	93.9	9.9	0.0	0.0	6.2	30.0	52.8	110.0	187.7	269.4	292.4	425.6	539.9
	70歳以上	275	136.7	110.1	11.4	0.0	0.0	10.0	15.0	49.2	119.1	181.6	291.1	372.6	479.4	482.0
	(再掲)20-39歳	175	87.6	98.7	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	65.7	101.0	228.3	293.2	511.3	657.8
	(再掲)40-64歳	352	101.9	92.3	10.7	0.0	0.0	0.5	9.1	33.9	80.3	143.4	234.3	297.6	435.3	539.9
	(再掲)65歳以上	399	133.7	104.7	8.6	0.0	0.0	10.1	16.2	52.0	117.0	180.0	289.6	366.1	479.4	485.0
	(再掲)20歳以上*1	926	107.0	99.8	6.0	0.0	0.0	0.0	9.6	35.0	82.0	145.5	248.6	313.2	438.4	657.8
男性	(再掲)20歳以上*2	926	107.0	100.1	6.1	0.0	0.0	0.0	8.2	35.0	81.7	145.0	250.0	314.0	438.3	657.8
	20-29歳	35	126.1	113.3	35.7	0.0	0.0	0.0	3.3	52.6	83.5	206.1	294.7	340.8	361.3	361.3
	30-39歳	48	75.2	121.7	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	36.8	83.0	142.6	392.0	657.8	657.8
	40-49歳	61	83.3	72.7	9.1	0.0	0.0	0.3	3.8	27.6	70.8	117.8	150.8	229.6	425.1	425.1
	50-59歳	74	96.4	93.3	15.3	0.0	0.0	0.0	8.8	33.2	74.6	130.2	186.6	322.2	440.1	440.1
	60-69歳	89	120.1	95.4	13.7	0.0	0.0	0.5	18.5	45.7	87.3	192.4	281.7	283.5	485.0	485.0
	70歳以上	124	129.1	107.8	11.8	0.0	0.0	4.1	13.9	46.8	112.3	173.6	301.0	345.0	470.1	479.4
	(再掲)20-39歳	83	96.0	120.3	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	66.5	97.9	242.9	342.6	657.8	657.8
	(再掲)40-64歳	168	99.3	91.0	9.5	0.0	0.0	0.1	7.6	33.6	81.3	130.2	231.2	294.7	435.8	440.1
	(再掲)65歳以上	180	123.4	102.4	9.1	0.0	0.0	6.3	14.8	48.5	98.8	163.5	286.6	326.7	465.7	485.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	104.1	103.6	6.6	0.0	0.0	0.0	4.3	34.6	80.3	132.1	242.6	321.0	462.1	657.8
	(再掲)20歳以上*2	431	105.1	104.5	6.7	0.0	0.0	0.0	4.4	34.7	80.7	132.8	248.7	321.8	465.7	657.8
	20-29歳	40	110.1	89.9	23.9	0.0	0.0	0.0	7.6	49.0	80.9	157.9	259.9	293.2	293.2	293.2
	30-39歳	52	60.8	99.7	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	51.1	95.4	107.7	194.7	326.4	326.4
	40-49歳	71	74.0	67.5	11.3	0.0	0.0	0.9	6.9	20.7	51.5	123.9	162.7	177.9	458.9	458.9
	50-59歳	73	119.6	104.8	21.0	0.0	0.0	0.2	5.3	50.0	91.8	150.0	305.1	343.2	433.0	433.0
	60-69歳	108	137.4	92.6	12.1	0.0	0.0	19.7	30.2	76.6	116.9	180.7	250.0	329.9	520.3	539.9
	70歳以上	151	142.9	111.9	12.9	0.0	0.0	12.9	15.8	49.4	129.9	192.0	290.5	373.8	480.9	482.0
	(再掲)20-39歳	92	80.8	77.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	65.5	102.2	190.6	277.0	326.4	326.4
	(再掲)40-64歳	184	104.5	93.8	14.2	0.0	0.0	0.5	11.1	34.1	79.5	144.3	245.3	305.4	434.3	539.9
女性	(再掲)65歳以上	219	141.6	106.0	10.1	0.0	0.0	14.2	19.9	63.9	124.3	182.1	290.0	373.6	479.6	482.0
	(再掲)20歳以上*1	495	109.9	95.9	6.5	0.0	0.0	0.0	12.6	36.7	87.0	159.0	250.0	300.0	416.3	539.9
	(再掲)20歳以上*2	495	108.9	95.4	6.6	0.0	0.0	0.0	10.0	36.9	87.0	158.3	250.0	293.2	412.2	539.9

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の野菜(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	174.3	95.7	14.1	0.0	0.0	21.3	48.0	107.3	164.9	226.1	288.2	345.3	534.6	534.6
	30-39歳	100	156.6	108.6	15.0	0.0	0.0	0.0	37.6	95.2	139.6	221.1	297.2	320.4	800.9	805.1
	40-49歳	132	172.6	102.4	12.1	0.0	0.0	15.8	56.4	102.7	165.0	223.3	281.2	348.6	568.2	581.0
	50-59歳	147	162.2	92.8	8.3	2.1	7.5	36.2	56.8	88.4	152.0	208.4	272.3	325.7	515.1	520.0
	60-69歳	197	209.1	152.8	16.9	0.0	1.2	31.0	50.7	94.0	191.7	260.0	373.5	466.1	796.4	1229.8
	70歳以上	275	190.7	115.3	11.6	0.0	16.5	31.6	49.0	101.1	182.7	261.8	341.7	403.1	563.5	563.5
	(再掲)20-39歳	175	163.8	103.6	11.7	0.0	0.0	8.8	43.3	97.8	144.9	223.5	294.3	323.0	534.0	805.1
	(再掲)40-64歳	352	171.6	107.6	4.4	0.0	0.0	30.0	57.8	91.5	160.2	225.0	288.8	344.4	517.4	1229.8
	(再掲)65歳以上	399	198.2	128.3	8.6	0.0	9.9	32.3	49.0	101.8	186.3	264.1	368.6	426.0	592.5	819.2
	(再掲)20歳以上*1	926	179.4	117.2	5.4	0.0	0.0	29.9	51.0	99.5	165.0	236.7	309.5	381.6	563.5	1229.8
男性	(再掲)20歳以上*2	926	179.1	117.3	5.3	0.0	0.0	30.0	51.0	99.0	164.8	236.0	309.0	379.9	563.5	1229.8
	20-29歳	35	199.8	110.8	21.7	0.0	0.0	4.5	31.8	135.3	194.2	273.9	345.3	380.8	534.6	534.6
	30-39歳	48	160.4	133.4	22.9	0.0	0.0	0.0	10.6	77.7	139.2	220.6	306.3	398.0	805.1	805.1
	40-49歳	61	188.8	113.2	16.3	0.0	0.0	0.0	26.5	122.7	171.8	254.3	333.1	462.9	541.6	541.6
	50-59歳	74	165.0	97.7	13.1	2.1	3.5	31.7	52.4	93.5	146.6	216.7	292.6	351.5	511.9	511.9
	60-69歳	89	212.4	182.2	24.4	2.0	8.0	32.2	51.1	85.5	186.9	250.1	352.8	633.6	1229.8	1229.8
	70歳以上	124	199.5	115.2	14.3	0.0	12.5	34.2	53.6	101.1	197.8	267.6	371.1	403.8	548.9	563.5
	(再掲)20-39歳	83	176.5	125.5	15.7	0.0	0.0	0.0	19.3	98.1	164.7	263.5	316.3	358.0	805.1	805.1
	(再掲)40-64歳	168	179.5	118.3	6.5	0.0	0.0	25.8	63.4	102.0	160.8	238.2	299.2	371.4	532.9	1229.8
	(再掲)65歳以上	180	205.9	138.7	10.3	0.0	8.2	32.7	50.0	100.3	195.7	268.5	377.2	420.8	756.8	819.2
女性	(再掲)20歳以上*1	431	187.2	129.6	7.5	0.0	0.0	15.9	46.4	101.9	173.6	251.5	322.8	400.6	738.6	1229.8
	(再掲)20歳以上*2	431	187.2	130.2	7.4	0.0	0.0	19.3	46.4	100.8	173.7	250.5	322.8	400.3	754.5	1229.8
	20-29歳	40	153.6	76.8	14.8	20.0	20.1	24.1	48.9	97.1	140.2	205.2	242.2	298.8	426.5	426.5
	30-39歳	52	153.5	84.6	21.5	0.0	0.0	24.8	55.4	96.4	139.6	223.3	261.5	300.2	410.1	410.1
	40-49歳	71	156.8	88.6	13.5	0.0	1.1	43.5	57.0	83.8	157.7	192.3	236.8	296.7	581.0	581.0
	50-59歳	73	159.6	88.2	10.0	7.5	7.6	48.2	58.3	86.8	156.8	193.3	259.2	327.6	520.0	520.0
	60-69歳	108	206.5	126.2	15.2	0.0	0.0	30.0	49.2	103.4	200.6	273.5	408.5	463.7	508.1	508.5
	70歳以上	151	183.5	115.3	11.2	0.0	15.2	30.0	44.0	101.0	163.1	249.6	320.6	422.9	551.1	563.5
	(再掲)20-39歳	92	153.6	81.1	15.6	0.0	0.0	24.7	50.5	97.7	140.3	221.3	255.0	299.4	426.5	426.5
	(再掲)40-64歳	184	163.8	95.5	7.3	0.0	0.8	36.1	56.4	85.0	158.5	200.1	275.4	328.7	533.7	581.0
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	192.3	119.6	9.0	0.0	12.4	30.0	48.9	101.9	177.9	260.8	358.5	430.5	535.8	563.5
	(再掲)20歳以上*1	495	171.5	102.7	6.6	0.0	0.0	34.1	52.8	96.6	159.6	223.5	304.0	366.0	509.5	581.0
	(再掲)20歳以上*2	495	170.8	101.9	6.7	0.0	0.0	34.0	53.5	96.6	158.0	223.5	303.2	362.4	508.8	581.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

野菜ジュース(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	16.2	56.5	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	204.2	250.0	250.0
	30-39歳	100	5.6	29.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	205.5	206.0
	40-49歳	132	14.0	54.4	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	200.0	316.9	400.0
	50-59歳	147	18.7	66.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	188.8	375.9	400.0
	60-69歳	197	20.9	86.1	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.7	190.0	388.6	1000.0
	70歳以上	275	6.9	31.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	49.9	205.5	208.0
	(再掲)20-39歳	175	9.9	43.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	100.4	224.5	250.0
	(再掲)40-64歳	352	17.6	60.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	189.6	306.7	400.0
	(再掲)65歳以上	399	10.4	58.1	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	82.5	206.0	1000.0
	(再掲)20歳以上*1	926	13.5	57.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	121.2	229.0	1000.0
	(再掲)20歳以上*2	926	13.7	58.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	122.2	232.6	1000.0
男性	20-29歳	35	24.3	70.2	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	225.5	250.0	250.0
	30-39歳	48	4.8	22.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.7	120.0	120.0
	40-49歳	61	15.1	50.9	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	200.0	206.0	206.0
	50-59歳	74	12.8	50.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	186.9	290.0	290.0
	60-69歳	89	36.8	122.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.1	203.8	1000.0	1000.0
	70歳以上	124	11.4	42.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	98.8	207.3	208.0
	(再掲)20-39歳	83	12.7	48.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	157.0	250.0	250.0
	(再掲)40-64歳	168	17.5	53.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.2	188.7	227.5	290.0
	(再掲)65歳以上	180	18.1	83.7	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	168.9	402.6	1000.0
	(再掲)20歳以上*1	431	17.0	66.8	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	190.0	241.9	1000.0
	(再掲)20歳以上*2	431	16.9	67.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	189.6	242.1	1000.0
女性	20-29歳	40	9.7	42.2	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	109.9	206.0	206.0
	30-39歳	52	6.2	35.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.5	206.0	206.0
	40-49歳	71	12.9	58.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.1	400.0	400.0
	50-59歳	73	24.6	78.8	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.6	206.0	400.0	400.0
	60-69歳	108	8.6	36.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	115.2	200.0	200.0
	70歳以上	151	3.2	16.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	5.3	102.3	103.0
	(再掲)20-39歳	92	7.6	37.9	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	12.1	206.0	206.0
	(再掲)40-64歳	184	17.7	65.7	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	198.9	400.0	400.0
	(再掲)65歳以上	219	4.4	22.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.0	144.0	200.0
	(再掲)20歳以上*1	495	10.0	46.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	79.9	206.0	400.0
	(再掲)20歳以上*2	495	10.4	47.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	90.7	206.0	400.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

漬け物(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	3.2	10.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	11.5	72.0	72.0
	30-39歳	100	5.8	15.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	15.0	20.0	95.0	95.0
	40-49歳	132	6.3	12.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	20.0	38.7	60.5	61.5
	50-59歳	147	7.0	14.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	22.8	36.7	75.3	77.0
	60-69歳	197	9.9	19.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	30.1	57.1	87.0	110.0
	70歳以上	275	15.1	26.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	45.7	72.2	121.1	178.0
	(再掲)20-39歳	175	4.7	13.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	13.2	15.7	95.0	95.0
	(再掲)40-64歳	352	7.6	15.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	25.0	40.0	77.9	110.0
	(再掲)65歳以上	399	13.4	24.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	44.3	60.0	100.0	178.0
	(再掲)20歳以上*1	926	8.5	18.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	25.0	47.2	88.5	178.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	8.4	18.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	25.0	46.5	88.5	178.0
	20-29歳	35	5.6	14.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	12.4	64.6	72.0	72.0
	30-39歳	48	6.9	16.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	10.0	15.0	28.8	95.0	95.0
	40-49歳	61	7.4	14.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	20.0	50.0	61.5	61.5
	50-59歳	74	9.0	14.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	55.0	60.0	60.0
	60-69歳	89	11.4	22.8	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	38.0	78.8	100.0	100.0
	70歳以上	124	14.2	20.4	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	20.5	43.9	60.0	100.0	100.0
	(再掲)20-39歳	83	6.4	15.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	15.0	26.9	95.0	95.0
	(再掲)40-64歳	168	9.8	17.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	57.1	84.0	86.8
	(再掲)65歳以上	180	12.6	20.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	40.5	58.9	100.0	100.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	9.2	17.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	55.0	87.3	100.0
	(再掲)20歳以上*2	431	9.4	17.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	55.0	87.8	100.0
	20-29歳	40	1.2	3.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	30-39歳	52	4.9	15.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	15.0	19.5	95.0	95.0
	40-49歳	71	5.2	10.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	16.9	35.7	55.0	55.0
	50-59歳	73	5.0	13.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	18.8	33.9	77.0	77.0
	60-69歳	108	8.8	16.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	30.0	46.1	98.8	110.0
	70歳以上	151	15.7	30.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	48.5	78.0	161.2	178.0
	(再掲)20-39歳	92	3.4	11.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	15.5	95.0	95.0
	(再掲)40-64歳	184	5.4	12.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	20.0	31.9	75.0	110.0
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	219	14.0	26.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	46.4	73.3	140.4	178.0
	(再掲)20歳以上*1	495	7.7	18.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	23.9	40.0	92.4	178.0
	(再掲)20歳以上*2	495	7.4	18.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	20.0	40.0	91.4	178.0
	(再掲)20歳以上*2	495	7.4	18.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	20.0	40.0	91.4	178.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

生果(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	57.5	61.3	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	85.1	139.5	216.9	231.0	231.0
	30-39歳	100	41.9	68.2	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.7	143.0	159.5	344.3	344.7
	40-49歳	132	68.1	103.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.0	193.9	224.9	556.3	585.0
	50-59歳	147	77.7	110.6	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	117.0	184.0	290.7	689.2	697.5
	60-69歳	197	149.9	142.1	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	42.3	121.6	211.2	360.3	422.0	688.6	698.0
	70歳以上	275	192.9	135.3	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.0	185.2	285.3	360.1	436.2	594.8	600.0
	(再掲)20-39歳	175	48.2	65.8	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.9	140.5	162.5	315.2	344.7
	(再掲)40-64歳	352	81.5	112.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	121.4	200.0	287.7	579.3	697.5
	(再掲)65歳以上	399	185.9	138.7	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	180.5	282.0	362.1	428.3	599.5	698.0
	(再掲)20歳以上*1	926	103.0	123.9	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.6	158.0	276.5	349.5	544.7	698.0
	(再掲)20歳以上*2	926	102.5	123.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.5	157.8	273.0	348.0	541.4	698.0
男性	20-29歳	35	43.8	56.6	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	79.7	101.3	218.0	223.0	223.0
	30-39歳	48	45.6	68.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	121.1	171.2	321.0	321.0
	40-49歳	61	60.8	124.3	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.1	201.5	390.0	585.0	585.0
	50-59歳	74	54.3	76.1	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.0	144.8	241.4	299.5	299.5
	60-69歳	89	118.9	120.2	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.6	200.0	253.7	384.3	515.0	515.0
	70歳以上	124	187.4	136.2	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8	181.5	283.6	349.0	430.4	587.9	600.0
	(再掲)20-39歳	83	44.9	63.2	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	120.0	216.5	321.0	321.0
	(再掲)40-64歳	168	65.0	101.1	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.0	200.0	250.4	547.0	585.0
	(再掲)65歳以上	180	174.2	137.6	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	63.1	175.7	264.0	346.7	410.5	564.2	600.0
	(再掲)20歳以上*1	431	87.8	116.2	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	130.8	252.1	321.7	526.3	600.0
	(再掲)20歳以上*2	431	90.6	116.9	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	138.0	256.5	323.4	523.1	600.0
	(再掲)20歳以上*2	431	90.6	116.9	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	138.0	256.5	323.4	523.1	600.0
女性	20-29歳	40	68.6	63.4	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.4	120.9	143.3	208.1	231.0	231.0
	30-39歳	52	38.9	68.9	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6	148.2	161.6	344.7	344.7
	40-49歳	71	75.2	77.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.6	120.5	184.4	217.6	264.8	264.8
	50-59歳	73	100.8	133.0	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	149.7	228.8	345.8	697.5	697.5
	60-69歳	108	173.9	153.2	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	74.3	131.2	245.0	409.6	527.0	691.5	698.0
	70歳以上	151	197.4	134.9	12.1	0.0	0.0	0.0	5.3	86.8	185.3	290.6	365.7	438.7	596.7	600.0
	(再掲)20-39歳	92	51.0	67.9	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	88.5	144.0	174.8	344.7	344.7
	(再掲)40-64歳	184	97.8	120.9	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.7	141.1	207.8	345.0	633.9	697.5
	(再掲)65歳以上	219	195.0	139.2	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	87.9	182.0	287.1	368.0	437.3	617.3	698.0
	(再掲)20歳以上*1	495	118.2	129.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.0	182.0	299.0	367.0	598.8	698.0
	(再掲)20歳以上*2	495	114.6	128.6	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	176.1	295.6	364.2	604.4	698.0
	(再掲)20歳以上*2	495	114.6	128.6	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	176.1	295.6	364.2	604.4	698.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ジャム(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.7	3.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	21.0	21.0
	30-39歳	100	0.3	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	20.0
	40-49歳	132	0.8	4.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	29.1	40.0
	50-59歳	147	1.3	6.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.0	43.2	63.0
	60-69歳	197	1.8	5.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	11.3	30.4	42.0
	70歳以上	275	1.8	5.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	10.3	28.4	58.0
	(再掲)20-39歳	175	0.5	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	21.0
	(再掲)40-64歳	352	1.2	5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	24.8	63.0
	(再掲)65歳以上	399	1.8	5.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	10.1	24.4	58.0
	(再掲)20歳以上*1	926	1.2	4.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	21.0	63.0
	(再掲)20歳以上*2	926	1.2	4.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	10.0	21.0	63.0
男性	20-29歳	35	0.9	4.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	13.7	21.0	21.0
	30-39歳	48	0.6	3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	20.0	20.0
	40-49歳	61	0.9	4.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	30.0	30.0
	50-59歳	74	0.6	2.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	21.0	21.0
	60-69歳	89	1.2	4.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	10.0	42.0	42.0
	70歳以上	124	2.2	6.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	11.1	50.1	58.0
	(再掲)20-39歳	83	0.7	3.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	21.0	21.0
	(再掲)40-64歳	168	0.8	4.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	28.9	42.0
	(再掲)65歳以上	180	1.9	5.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	11.0	28.0	58.0
	(再掲)20歳以上*1	431	1.1	4.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	21.0	58.0
	(再掲)20歳以上*2	431	1.1	4.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	7.0	21.0	58.0
女性	20-29歳	40	0.6	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	10.0	10.0
	30-39歳	52	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
	40-49歳	71	0.7	3.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	40.0	40.0
	50-59歳	73	2.1	8.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	63.0	63.0
	60-69歳	108	2.2	5.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	15.3	38.9	42.0
	70歳以上	151	1.5	4.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	10.0	27.3	40.0
	(再掲)20-39歳	92	0.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
	(再掲)40-64歳	184	1.6	6.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.0	45.2	63.0
	(再掲)65歳以上	219	1.7	4.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	10.0	30.0	42.0
	(再掲)20歳以上*1	495	1.2	4.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.0	21.0	63.0
	(再掲)20歳以上*2	495	1.2	4.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.0	21.0	63.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

果汁・果汁飲料(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	28.7	73.9	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	204.4	330.0	330.0
	30-39歳	100	6.0	40.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	589.3	600.0
	40-49歳	132	1.3	12.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	150.0	200.0
	50-59歳	147	4.3	22.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	184.3	200.0
	60-69歳	197	6.2	41.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	233.3	540.0
	70歳以上	275	6.2	42.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.0	193.9	720.0
	(再掲)20-39歳	175	15.2	57.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.8	302.3	600.0
	(再掲)40-64歳	352	4.3	30.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.2	175.8	540.0
	(再掲)65歳以上	399	5.5	39.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.5	200.0	720.0
	(再掲)20歳以上*1	926	7.4	41.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	7.5	200.0	720.0
	(再掲)20歳以上*2	926	7.6	41.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	7.5	200.0	720.0
男性	20-29歳	35	10.6	52.6	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.7	330.0	330.0
	30-39歳	48	1.6	12.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	105.0
	40-49歳	61	1.0	9.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.3	190.0	150.0
	50-59歳	74	5.1	23.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	41.5	200.0	200.0
	60-69歳	89	2.0	21.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	250.0
	70歳以上	124	5.3	49.2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.5	462.1	720.0
	(再掲)20-39歳	83	5.2	35.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.0	330.0
	(再掲)40-64歳	168	2.6	16.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.2	117.2	200.0
	(再掲)65歳以上	180	4.8	44.9	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	6.9	226.8	720.0
	(再掲)20歳以上*1	431	4.0	32.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	200.0	720.0
	(再掲)20歳以上*2	431	4.0	32.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	200.0	720.0
女性	20-29歳	40	43.4	85.3	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.7	247.1	250.0	250.0
	30-39歳	52	9.6	52.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	71.9	600.0	600.0
	40-49歳	71	1.7	14.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	200.0	200.0
	50-59歳	73	3.5	22.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.1	200.0	200.0
	60-69歳	108	9.5	52.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	22.7	493.0	540.0
	70歳以上	151	7.1	37.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	15.4	241.7	412.0
	(再掲)20-39歳	92	23.3	69.5	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.4	189.3	600.0	600.0
	(再掲)40-64歳	184	6.0	39.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.1	210.8	540.0
	(再掲)65歳以上	219	6.1	33.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	10.0	200.0	412.0
	(再掲)20歳以上*1	495	10.8	48.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	87.6	241.1	600.0
	(再掲)20歳以上*2	495	11.2	49.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	93.7	243.8	600.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

きのこ類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	12.6	24.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	50.0	55.6	207.2	207.2
	30-39歳	100	17.1	28.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	50.0	63.4	190.3	191.4
	40-49歳	132	17.3	25.8	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	30.5	50.8	73.2	126.8	130.0
	50-59歳	147	16.5	42.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	49.4	74.6	320.0	320.0
	60-69歳	197	21.8	31.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	33.4	57.0	100.0	153.4	162.0
	70歳以上	275	20.3	26.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	51.9	68.2	118.2	160.0
	(再掲)20-39歳	175	15.3	26.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	50.0	60.0	165.2	207.2
	(再掲)40-64歳	352	17.3	33.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	23.1	50.6	71.8	152.4	320.0
	(再掲)65歳以上	399	21.1	29.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	33.3	56.3	78.9	140.6	162.0
	(再掲)20歳以上*1	926	18.0	30.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	30.0	50.0	68.2	150.1	320.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	18.1	31.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	30.0	50.0	68.2	154.3	320.0
	20-29歳	35	12.3	30.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	48.4	50.0	207.2	207.2
	30-39歳	48	18.2	34.1	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	46.7	87.0	191.4	191.4
	40-49歳	61	17.0	27.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	21.9	50.8	72.7	130.0	130.0
	50-59歳	74	18.9	48.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	54.5	135.1	320.0	320.0
	60-69歳	89	23.8	35.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	39.9	59.6	98.9	162.0	162.0
	70歳以上	124	23.0	31.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	40.2	67.8	84.9	149.9	160.0
	(再掲)20-39歳	83	15.8	32.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	46.8	50.0	207.2	207.2
	(再掲)40-64歳	168	17.9	36.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	19.5	50.8	72.5	216.0	320.0
	(再掲)65歳以上	180	24.3	34.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	41.0	68.0	100.0	161.3	162.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	19.1	34.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	50.6	73.7	169.2	320.0
	(再掲)20歳以上*2	431	19.3	35.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	50.6	77.3	170.3	320.0
	20-29歳	40	12.9	19.7	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	50.4	60.0	60.0	60.0
	30-39歳	52	16.1	23.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	57.0	63.5	90.0	90.0
	40-49歳	71	17.6	23.8	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	31.7	50.9	70.7	101.7	101.7
	50-59歳	73	14.1	35.8	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	44.2	66.4	320.0	320.0
	60-69歳	108	20.2	28.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	30.2	57.0	100.0	132.0	137.5
	70歳以上	151	18.1	22.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	32.2	50.0	56.9	106.0	120.0
	(再掲)20-39歳	92	14.8	21.7	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	55.1	61.5	90.0	90.0
	(再掲)40-64歳	184	16.7	29.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	25.8	50.0	69.3	132.2	320.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

海藻類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	6.1	10.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	22.5	28.2	84.0	84.0
	30-39歳	100	5.2	8.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	17.0	19.4	50.2	50.2
	40-49歳	132	8.5	15.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	26.2	47.0	76.0	79.0
	50-59歳	147	14.6	18.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	22.6	47.5	54.8	61.1	70.0
	60-69歳	197	13.8	31.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	18.0	40.0	52.1	220.8	233.0
	70歳以上	275	10.1	17.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.3	40.0	50.0	82.9	110.0
	(再掲)20-39歳	175	5.6	9.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.5	17.6	24.6	49.1	84.0
	(再掲)40-64歳	352	11.5	16.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	16.9	36.4	54.0	66.8	79.0
	(再掲)65歳以上	399	11.6	24.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.5	40.0	51.8	104.5	233.0
	(再掲)20歳以上*1	926	9.8	19.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	13.0	30.2	46.5	70.0	233.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	9.9	19.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	13.0	30.5	47.1	69.7	233.0
	20-29歳	35	5.2	11.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	18.3	27.6	84.0	84.0
	30-39歳	48	6.6	9.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	11.5	16.3	22.2	50.2	50.2
	40-49歳	61	9.7	16.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	13.5	30.0	59.4	79.0	79.0
	50-59歳	74	16.5	18.6	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	26.8	48.4	56.2	59.7	59.7
	60-69歳	89	15.0	36.9	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	19.7	36.8	67.9	283.0	283.0
	70歳以上	124	10.4	16.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.2	42.3	51.9	68.6	110.0
	(再掲)20-39歳	83	6.0	10.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	16.4	25.4	84.0	84.0
	(再掲)40-64歳	168	12.9	17.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	20.0	39.6	55.3	74.5	79.0
	(再掲)65歳以上	180	12.2	27.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	11.3	40.5	52.8	148.4	283.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	10.5	20.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	13.5	30.2	49.2	79.0	233.0
	(再掲)20歳以上*2	431	10.6	20.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	13.5	31.6	50.0	79.2	233.0
	20-29歳	40	6.9	10.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	23.6	31.5	36.0	36.0
	30-39歳	52	4.1	8.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	17.6	19.7	49.1	49.1
	40-49歳	71	7.3	13.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	23.4	47.1	60.0	60.0
	50-59歳	73	12.8	18.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	21.3	44.6	54.6	70.0	70.0
	60-69歳	108	12.9	25.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	16.1	41.1	51.0	201.1	207.8
	70歳以上	151	9.8	17.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	11.1	35.1	46.2	102.2	105.0
	(再掲)20-39歳	92	5.2	9.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	6.6	19.3	24.5	49.1	49.1
	(再掲)40-64歳	184	10.1	16.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	15.5	35.6	52.5	60.0	70.0
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	11.1	21.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.5	39.0	50.1	110.3	207.8
	(再掲)20歳以上*1	495	9.1	17.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.1	30.2	45.0	63.5	207.8
	(再掲)20歳以上*2	495	9.1	17.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	30.2	45.0	62.5	207.8
	(再掲)20歳以上*2	495	9.1	17.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	30.2	45.0	62.5	207.8

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

生魚介類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	38.0	56.6	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	106.2	144.0	255.5	255.5
	30-39歳	100	34.4	54.9	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.1	116.0	199.0	200.0	200.0
	40-49歳	132	43.5	66.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	140.2	180.1	287.8	298.4
	50-59歳	147	41.4	51.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5	100.0	127.5	218.0	218.0
	60-69歳	197	58.5	64.3	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	98.9	140.0	154.9	301.8	334.0
	70歳以上	275	50.0	58.3	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	90.0	130.0	160.4	212.2	357.5
	(再掲)20-39歳	175	35.9	55.5	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	113.9	156.3	230.4	255.5
	(再掲)40-64歳	352	42.6	57.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	80.0	121.8	147.6	248.1	298.4
	(再掲)65歳以上	399	54.6	62.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	98.8	139.1	160.2	252.2	357.5
	(再掲)20歳以上*1	926	45.5	60.3	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	80.0	135.0	160.5	251.0	357.5
	(再掲)20歳以上*2	926	45.5	59.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	80.0	132.2	160.1	250.0	357.5
男性	20-29歳	35	53.4	73.1	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	100.0	150.5	210.9	255.5	255.5
	30-39歳	48	46.5	69.7	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.1	200.0	200.0	200.0	200.0
	40-49歳	61	51.2	80.8	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.3	176.8	226.5	298.4	298.4
	50-59歳	74	45.3	59.2	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	78.6	124.3	180.5	218.0	218.0
	60-69歳	89	50.8	56.6	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	80.0	137.3	156.7	250.0	250.0
	70歳以上	124	62.9	66.8	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6	115.9	160.2	175.2	321.8	357.5
	(再掲)20-39歳	83	49.3	70.8	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.4	169.1	200.0	255.5	255.5
	(再掲)40-64歳	168	48.3	67.1	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	80.0	139.2	188.7	284.4	298.4
	(再掲)65歳以上	180	60.2	65.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	108.3	157.1	172.5	252.2	357.5
	(再掲)20歳以上*1	431	51.8	68.1	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	92.7	157.3	199.6	255.6	357.5
	(再掲)20歳以上*2	431	52.0	67.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	94.4	156.5	196.3	254.6	357.5
	(再掲)20歳以上*2	431	52.0	67.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	94.4	156.5	196.3	254.6	357.5
女性	20-29歳	40	25.5	34.6	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	80.0	87.4	90.7	90.7
	30-39歳	52	24.7	37.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	87.0	117.6	141.0	141.0
	40-49歳	71	36.1	48.3	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	121.6	136.9	170.0	170.0
	50-59歳	73	37.5	41.4	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	79.2	100.0	100.8	130.3	130.3
	60-69歳	108	64.5	69.4	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	119.4	144.1	154.1	328.0	334.0
	70歳以上	151	39.5	48.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	70.0	115.3	130.0	211.3	250.0
	(再掲)20-39歳	92	25.0	35.9	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	80.0	100.0	141.0	141.0
	(再掲)40-64歳	184	36.9	44.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	77.6	100.0	123.8	149.8	170.0
	(再掲)65歳以上	219	50.3	59.4	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	90.0	130.0	145.1	286.2	334.0
	(再掲)20歳以上*1	495	39.2	50.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	79.6	117.0	135.0	166.2	334.0
	(再掲)20歳以上*2	495	38.8	50.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	78.1	115.0	134.6	165.9	334.0
	(再掲)20歳以上*2	495	38.8	50.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	78.1	115.0	134.6	165.9	334.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介加工品(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	23.5	41.1	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	35.3	88.7	108.6	186.7	186.7
	30-39歳	100	13.7	26.6	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	50.3	79.5	145.6	146.0
	40-49歳	132	23.6	38.6	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	38.4	55.3	94.8	225.7	232.0
	50-59歳	147	25.6	38.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	43.0	82.5	112.0	171.3	176.7
	60-69歳	197	34.7	42.9	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	20.4	50.0	90.0	129.0	190.9	268.3
	70歳以上	275	35.7	48.4	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	52.4	99.7	136.1	230.4	320.0
	(再掲)20-39歳	175	17.7	33.5	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	72.4	89.7	168.3	186.7
	(再掲)40-64歳	352	26.8	39.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	40.5	80.0	112.0	176.6	232.0
	(再掲)65歳以上	399	35.1	47.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	51.8	94.0	131.1	227.3	320.0
	(再掲)20歳以上*1	926	26.5	40.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	40.0	80.0	111.2	183.8	320.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	26.4	40.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	40.0	80.0	111.7	181.0	320.0
	20-29歳	35	14.5	25.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	15.0	58.7	86.9	104.9	104.9
	30-39歳	48	11.6	23.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	40.8	81.0	105.7	105.7
	40-49歳	61	29.4	47.2	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	45.1	64.2	146.2	232.0	232.0
	50-59歳	74	28.5	37.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	48.7	98.2	111.7	156.7	156.7
	60-69歳	89	40.3	49.2	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	21.1	55.6	114.0	144.6	268.3	268.3
	70歳以上	124	37.8	45.6	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	55.0	99.3	149.6	221.8	245.0
	(再掲)20-39歳	83	12.8	24.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	48.8	81.2	105.7	105.7
	(再掲)40-64歳	168	30.0	42.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	50.0	91.7	119.7	208.1	232.0
	(再掲)65歳以上	180	39.4	47.4	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	21.8	60.0	99.9	144.9	245.1	268.3
女性	(再掲)20歳以上*1	431	27.3	41.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	43.2	81.0	110.7	200.3	268.3
	(再掲)20歳以上*2	431	27.5	40.9	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	43.9	83.0	111.0	194.2	268.3
	20-29歳	40	30.7	49.3	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	64.8	99.4	140.7	186.7	186.7
	30-39歳	52	15.5	29.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	59.9	79.9	146.0	146.0
	40-49歳	71	17.8	27.1	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	25.3	45.7	82.5	190.0	190.0
	50-59歳	73	22.8	40.3	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	32.2	74.2	118.8	176.7	176.7
	60-69歳	108	30.3	36.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	42.1	82.1	102.8	169.5	170.0
	70歳以上	151	34.0	50.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	51.5	98.9	126.5	270.4	320.0
	(再掲)20-39歳	92	21.7	39.1	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	29.6	79.6	108.6	186.7	186.7
	(再掲)40-64歳	184	23.6	36.5	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	34.8	80.0	106.1	174.6	190.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

畜肉(g)	性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数		20-29歳	75	87.9	80.7	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	85.3	121.2	183.9	209.9	514.3	514.3
		30-39歳	100	78.1	58.6	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	74.7	120.0	145.9	178.7	269.5	270.0
		40-49歳	132	78.4	74.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	55.3	127.2	201.4	227.0	283.0	317.0
		50-59歳	147	75.7	62.3	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	70.0	110.0	155.1	194.4	296.3	404.1
		60-69歳	197	59.1	52.1	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	49.6	94.9	129.2	159.8	218.8	257.5
		70歳以上	275	51.5	47.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	48.4	80.0	113.9	137.0	188.6	382.0
		(再掲)20-39歳	175	82.1	68.4	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.7	121.5	150.5	193.3	376.2	514.3
		(再掲)40-64歳	352	73.6	65.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	60.0	108.9	168.7	206.5	260.0	404.1
		(再掲)65歳以上	399	53.6	49.3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	48.2	82.9	120.0	149.9	195.0	382.0
		(再掲)20歳以上*1	926	71.3	64.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	60.0	109.0	150.0	191.1	260.0	514.3
		(再掲)20歳以上*2	926	71.2	63.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	60.0	109.0	150.0	189.3	260.0	514.3
男性		20-29歳	35	99.4	88.4	14.3	0.0	0.0	0.0	8.2	37.3	86.0	125.1	169.8	332.2	514.3	514.3
		30-39歳	48	97.9	64.5	5.5	0.0	0.0	0.0	8.6	50.0	93.3	144.0	80.5	237.0	270.0	270.0
		40-49歳	61	86.0	83.8	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	54.2	160.0	218.4	248.5	317.0	317.0
		50-59歳	74	90.9	64.9	8.0	0.0	0.0	0.0	7.1	43.8	93.1	120.4	169.8	192.8	404.1	404.1
		60-69歳	89	74.4	57.4	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	73.3	113.8	153.2	186.2	220.1	220.1
		70歳以上	124	53.4	48.4	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.0	82.6	118.5	136.9	206.9	382.0
		(再掲)20-39歳	83	98.5	74.7	6.8	0.0	0.0	0.0	9.5	49.4	96.8	143.2	177.0	238.7	514.3	514.3
		(再掲)40-64歳	168	84.0	70.8	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	70.0	120.0	180.0	230.0	302.3	404.1
		(再掲)65歳以上	180	60.4	53.4	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	54.6	94.2	135.7	165.0	218.7	382.0
		(再掲)20歳以上*1	431	82.8	69.3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	70.0	121.2	170.0	207.7	296.3	514.3
		(再掲)20歳以上*2	431	82.1	68.8	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	70.0	120.3	169.6	202.0	292.1	514.3
女性		20-29歳	40	78.6	73.6	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	82.4	115.7	188.0	203.9	373.3	373.3
		30-39歳	52	62.2	48.3	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	60.0	100.5	129.4	141.1	167.1	167.1
		40-49歳	71	70.9	63.8	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	54.2	111.6	190.5	210.4	235.0	235.0
		50-59歳	73	60.7	56.2	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	52.1	90.0	107.7	197.3	280.0	280.0
		60-69歳	108	47.2	44.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	40.0	75.0	110.7	128.6	241.5	257.5
		70歳以上	151	49.9	46.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	44.3	80.0	109.9	141.6	195.2	200.0
		(再掲)20-39歳	92	68.9	60.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	60.0	110.0	134.7	184.2	373.3	373.3
		(再掲)40-64歳	184	63.3	57.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	50.9	90.0	130.9	206.0	262.5	280.0
		(再掲)65歳以上	219	48.4	45.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	40.0	75.0	111.0	136.0	189.8	200.0
		(再掲)20歳以上*1	495	59.8	55.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	50.0	94.7	129.6	164.7	219.0	373.3
		(再掲)20歳以上*2	495	60.0	55.3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	50.0	94.9	129.3	163.2	220.9	373.3

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	38.6	57.3	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	62.3	126.4	156.2	253.0	253.0
	30-39歳	100	36.0	59.9	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.8	90.0	195.3	299.5	299.9
	40-49歳	132	35.2	66.6	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	103.0	204.5	300.0	349.9
	50-59歳	147	16.4	36.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	59.5	100.0	190.1	250.1
	60-69歳	197	22.2	42.6	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	85.9	119.3	207.4	285.9
	70歳以上	275	21.1	40.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	91.2	120.0	136.8	200.0
	(再掲)20-39歳	175	37.1	58.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	100.5	159.8	278.7	299.9
	(再掲)40-64歳	352	24.0	51.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	99.5	120.0	299.9	349.9
	(再掲)65歳以上	399	22.0	40.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	87.7	120.0	142.5	250.1
	(再掲)20歳以上*1	926	28.2	52.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	99.5	120.0	251.1	349.9
	(再掲)20歳以上*2	926	27.9	51.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	98.9	120.0	250.1	349.9
男性	20-29歳	35	42.6	58.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	60.7	116.7	250.4	253.0	253.0
	30-39歳	48	40.3	53.9	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.5	90.0	196.4	203.5	203.5
	40-49歳	61	48.4	84.8	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.3	205.1	300.0	349.9	349.9
	50-59歳	74	15.8	33.5	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	59.7	100.0	146.0	146.0
	60-69歳	89	28.2	52.7	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	120.0	125.0	285.9	285.9
	70歳以上	124	22.5	40.4	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	100.0	117.3	147.4	150.8
	(再掲)20-39歳	83	41.3	55.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	74.2	102.7	188.3	253.0	253.0
	(再掲)40-64歳	168	30.4	63.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0	149.7	300.0	349.9
	(再掲)65歳以上	180	24.1	43.5	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	100.0	120.0	178.9	250.1
	(再掲)20歳以上*1	431	33.0	57.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	100.0	147.0	285.9	349.9
	(再掲)20歳以上*2	431	32.1	55.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	100.0	145.5	284.1	349.9
女性	20-29歳	40	35.4	57.3	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.6	147.6	169.2	200.0	200.0
	30-39歳	52	32.5	84.6	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.6	103.4	216.3	299.9	299.9
	40-49歳	71	22.3	38.4	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	88.9	110.0	197.0	197.0
	50-59歳	73	17.0	39.9	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	60.4	110.2	250.1	250.1
	60-69歳	108	17.5	32.3	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	80.0	87.2	177.3	200.0
	70歳以上	151	20.0	39.8	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	89.4	119.2	151.5	200.0
	(再掲)20-39歳	92	33.7	61.4	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	111.3	158.7	299.9	299.9
	(再掲)40-64歳	184	17.6	36.5	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	65.8	100.8	198.8	250.1
	(再掲)65歳以上	219	20.4	38.8	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	82.9	116.4	134.2	200.0
	(再掲)20歳以上*1	495	23.4	45.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	88.3	120.0	200.0	299.9
	(再掲)20歳以上*2	495	23.6	46.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	88.8	120.0	201.1	299.9

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

肉類(内臓)(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	5.0	40.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0
	30-39歳	100	4.2	18.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	133.8	135.0
	40-49歳	132	3.1	18.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.2	150.0
	50-59歳	147	0.7	6.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	70.0
	60-69歳	197	2.3	25.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.1	500.0
	70歳以上	275	0.7	7.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	90.0
	(再掲)20-39歳	175	4.5	29.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	171.0	500.0
	(再掲)40-64歳	352	1.5	12.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.5	150.0
	(再掲)65歳以上	399	1.5	17.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6	500.0
	(再掲)20歳以上*1	926	2.5	21.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	500.0
	(再掲)20歳以上*2	926	2.5	21.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	500.0
男性	20-29歳	35	6.6	36.2	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.3	200.0	200.0
	30-39歳	48	1.5	14.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.0	135.0
	40-49歳	61	2.1	14.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	50-59歳	74	1.3	9.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	70.0
	60-69歳	89	4.8	37.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0
	70歳以上	124	0.7	7.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.2	90.0
	(再掲)20-39歳	83	3.6	25.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0
	(再掲)40-64歳	168	1.4	10.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	100.0
	(再掲)65歳以上	180	2.5	25.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.4	500.0
	(再掲)20歳以上*1	431	2.7	22.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.1	500.0
	(再掲)20歳以上*2	431	2.6	22.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.1	500.0
	20-29歳	40	3.8	43.3	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0
	30-39歳	52	6.3	20.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	61.1	78.0	78.0
女性	40-49歳	71	4.1	22.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	150.0	150.0
	50-59歳	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60-69歳	108	0.3	5.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.2	100.0
	70歳以上	151	0.8	7.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	90.0
	(再掲)20-39歳	92	5.3	31.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	500.0	500.0
	(再掲)40-64歳	184	1.6	14.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.6	150.0
	(再掲)65歳以上	219	0.7	7.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	100.0
	(再掲)20歳以上*1	495	2.4	19.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9	500.0
	(再掲)20歳以上*2	495	2.5	20.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.6	500.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の肉類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60-69歳	197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳以上	275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20-39歳	175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)40-64歳	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)65歳以上	399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*1	926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*2	926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
男性	20-29歳	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60-69歳	89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳以上	124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20-39歳	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)40-64歳	168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)65歳以上	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*1	431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*2	431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女性	20-29歳	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60-69歳	108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳以上	151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)40-64歳	184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)65歳以上	219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*1	495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*2	495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

卵類(g)	性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数		20-29歳	75	40.9	28.2	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	43.0	60.8	80.0	87.0	136.6	136.6
		30-39歳	100	31.8	24.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	33.8	49.9	56.5	74.5	128.7	129.2
		40-49歳	132	29.9	24.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	28.7	50.0	62.4	70.7	90.7	120.0
		50-59歳	147	25.7	29.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	46.3	66.1	83.4	124.8	125.0
		60-69歳	197	31.3	31.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	27.5	44.6	79.7	90.1	109.9	120.0
		70歳以上	275	30.3	27.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	24.5	50.0	57.6	86.7	112.7	159.2
		(再掲)20-39歳	175	35.5	26.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	39.3	51.0	68.4	82.6	116.8	136.6
		(再掲)40-64歳	352	28.8	28.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	48.9	64.2	79.0	106.7	125.0
		(再掲)65歳以上	399	30.2	28.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	23.6	49.0	59.8	88.0	110.0	172.0
		(再掲)20歳以上*1	926	31.5	27.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	30.0	50.0	64.4	85.3	108.0	172.0
		(再掲)20歳以上*2	926	31.5	28.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	30.0	50.0	64.5	86.0	108.0	172.0
男性		20-29歳	35	39.3	32.1	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	43.0	60.4	85.4	99.2	136.6	136.6
		30-39歳	48	34.5	23.2	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	40.9	50.2	56.5	78.8	88.8	88.8
		40-49歳	61	29.0	24.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	30.2	51.0	60.6	64.8	70.0	70.0
		50-59歳	74	28.0	30.4	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	48.8	75.8	88.8	124.6	124.6
		60-69歳	89	36.3	35.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	34.8	57.4	87.8	105.2	172.0	172.0
		70歳以上	124	30.8	28.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	24.2	50.0	57.0	88.4	149.1	159.2
		(再掲)20-39歳	83	36.5	27.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	43.0	50.6	68.3	88.0	136.6	136.6
		(再掲)40-64歳	168	29.0	28.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	24.1	50.0	65.0	76.0	107.0	124.6
		(再掲)65歳以上	180	33.1	31.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	30.0	50.0	86.3	90.0	159.3	172.0
		(再掲)20歳以上*1	431	32.8	29.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	32.0	50.1	69.4	88.0	110.0	172.0
		(再掲)20歳以上*2	431	32.9	29.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	32.0	50.0	69.4	88.0	110.0	172.0
女性		20-29歳	40	42.2	25.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	44.0	60.7	77.2	84.7	100.0	100.0
		30-39歳	52	29.5	26.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	29.0	48.4	55.8	76.1	129.2	129.2
		40-49歳	71	30.7	24.6	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	28.7	43.0	67.7	79.7	120.0	120.0
		50-59歳	73	23.4	28.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	43.5	61.9	70.5	125.0	125.0
		60-69歳	108	27.5	27.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	21.4	43.0	59.2	87.8	102.8	103.4
		70歳以上	151	29.8	27.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	50.0	58.2	72.7	109.9	130.7
		(再掲)20-39歳	92	34.7	26.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	37.8	50.5	65.4	80.0	129.2	129.2
		(再掲)40-64歳	184	28.7	28.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	44.0	63.2	87.1	121.5	125.0
		(再掲)65歳以上	219	27.9	26.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	21.6	46.0	57.0	71.3	105.3	130.7
		(再掲)20歳以上*1	495	30.1	26.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	28.7	46.5	62.5	79.6	103.6	130.7
		(再掲)20歳以上*2	495	30.0	26.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	28.7	46.4	62.5	79.6	103.7	130.7

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

牛乳・乳製品(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	218.5	349.6	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	50.7	298.0	827.0	992.5	1532.6	1532.6
	30-39歳	100	111.3	136.8	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	212.0	286.2	404.0	526.5	526.7
	40-49歳	132	142.5	189.7	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	86.4	204.2	409.2	603.5	743.0	1338.9
	50-59歳	147	134.2	194.6	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	110.2	189.0	309.6	375.8	898.8	1134.0
	60-69歳	197	114.5	127.2	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	100.0	186.1	267.6	332.9	658.3	735.6
	70歳以上	275	157.5	156.7	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	122.6	240.0	350.1	447.5	742.8	942.2
	(再掲)20-39歳	175	155.0	251.6	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	50.3	219.7	371.0	645.4	1308.5	1532.6
	(再掲)40-64歳	352	135.4	182.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	91.6	200.0	309.9	418.7	752.6	1338.9
	(再掲)65歳以上	399	144.6	152.7	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	104.5	227.0	338.7	430.3	735.7	942.2
	(再掲)20歳以上*1	926	144.3	194.1	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	87.7	208.1	340.5	501.0	977.3	1532.6
	(再掲)20歳以上*2	926	143.3	192.9	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	87.4	208.0	338.9	478.5	976.9	1532.6
男性	20-29歳	35	284.0	372.3	108.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.1	365.1	929.0	1004.1	1037.5	1037.5
	30-39歳	48	91.5	114.8	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	14.9	206.4	274.9	300.2	412.0	412.0
	40-49歳	61	156.9	226.9	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.2	192.5	596.1	701.8	745.0	745.0
	50-59歳	74	109.6	141.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	70.9	153.8	296.3	317.6	1134.0	1134.0
	60-69歳	89	112.4	147.4	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	51.9	160.8	264.8	476.5	735.6	735.6
	70歳以上	124	150.9	138.1	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	100.0	235.1	353.2	459.5	762.5	942.2
	(再掲)20-39歳	83	170.2	289.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	54.3	223.2	431.1	899.7	1037.5	1037.5
	(再掲)40-64歳	168	127.8	176.7	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	75.0	182.6	329.8	602.0	742.3	1134.0
	(再掲)65歳以上	180	142.0	160.3	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	100.0	227.5	341.4	478.3	735.7	942.2
	(再掲)20歳以上*1	431	146.1	210.3	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	77.1	206.0	371.6	648.8	1002.0	1134.0
	(再掲)20歳以上*2	431	144.4	206.3	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	77.3	206.0	366.3	630.0	1000.9	1134.0
女性	20-29歳	40	165.5	324.8	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	49.1	187.2	438.1	931.1	1532.6	1532.6
	30-39歳	52	127.3	151.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	230.3	333.2	488.1	526.7	526.7
	40-49歳	71	128.4	145.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	87.3	212.9	300.3	400.7	1338.9	1338.9
	50-59歳	73	158.4	164.4	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	137.3	206.0	346.9	529.7	863.2	863.2
	60-69歳	108	116.1	109.6	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	103.5	200.0	267.1	301.8	558.7	633.0
	70歳以上	151	162.9	155.9	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	147.6	255.3	351.3	445.0	718.1	761.0
	(再掲)20-39歳	92	142.8	237.0	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	50.2	208.8	348.7	516.4	1532.6	1532.6
	(再掲)40-64歳	184	142.9	147.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	110.3	206.3	309.1	381.3	778.7	1338.9
	(再掲)65歳以上	219	146.7	146.8	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	120.0	226.2	333.3	419.1	688.2	761.0
	(再掲)20歳以上*1	495	142.4	176.5	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	100.0	221.0	321.5	428.6	789.4	1532.6
	(再掲)20歳以上*2	495	142.2	178.3	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	100.0	219.1	321.4	431.4	804.4	1532.6

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の乳類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60-69歳	197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳以上	275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20-39歳	175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)40-64歳	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)65歳以上	399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*1	926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*2	926	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
男性	20-29歳	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60-69歳	89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳以上	124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20-39歳	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)40-64歳	168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)65歳以上	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*1	431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*2	431	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女性	20-29歳	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60-69歳	108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳以上	151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20-39歳	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)40-64歳	184	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)65歳以上	219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*1	495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)20歳以上*2	495	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

油脂類(g)	性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数		20-29歳	75	14.7	11.1	2.4	0.0	0.0	1.4	2.2	6.1	12.0	23.1	27.9	38.0	54.7	54.7
		30-39歳	100	11.1	9.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.4	3.5	10.1	16.3	19.5	24.4	72.2	72.5
		40-49歳	132	10.8	9.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.9	16.8	22.8	27.8	52.6	59.4
		50-59歳	147	11.4	10.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	15.0	23.6	31.4	53.9	57.0
		60-69歳	197	12.2	10.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	10.0	17.8	25.9	37.0	40.6	44.0
		70歳以上	275	9.6	8.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.0	15.0	19.0	24.6	33.9	40.5
		(再掲)20-39歳	175	12.5	10.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.9	5.5	11.3	18.0	25.4	29.5	54.6	72.5
		(再掲)40-64歳	352	11.7	10.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	16.7	25.7	31.4	47.0	59.4
		(再掲)65歳以上	399	10.0	8.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	8.0	15.6	20.7	24.9	40.0	44.0
		(再掲)20歳以上*1	926	11.6	10.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	10.0	16.6	24.3	30.0	43.1	72.5
		(再掲)20歳以上*2	926	11.6	10.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	10.0	16.6	24.4	30.1	43.1	72.5
男性		20-29歳	35	17.8	13.2	3.0	0.0	0.0	0.4	5.0	7.2	12.0	25.4	39.0	46.7	54.7	54.7
		30-39歳	48	13.5	12.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.1	6.0	12.8	19.3	23.0	37.1	72.5	72.5
		40-49歳	61	11.7	10.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	11.1	17.1	23.0	28.3	59.4	59.4
		50-59歳	74	11.7	8.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	11.4	14.0	24.0	29.6	32.0	32.0
		60-69歳	89	15.5	12.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.8	4.9	12.6	23.1	38.1	38.5	43.0	43.0
		70歳以上	124	10.9	8.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.4	17.0	24.0	25.1	39.1	40.5
		(再掲)20-39歳	83	15.3	12.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.8	6.2	12.0	19.8	29.6	40.9	72.5	72.5
		(再掲)40-64歳	168	13.1	10.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.5	4.7	12.0	19.0	28.2	33.5	46.7	59.4
		(再掲)65歳以上	180	11.4	9.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.4	17.4	24.6	29.0	40.6	40.7
		(再掲)20歳以上*1	431	13.4	11.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	5.0	12.0	19.3	26.6	33.8	54.0	72.5
		(再掲)20歳以上*2	431	13.3	11.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.0	12.0	19.2	26.6	33.9	53.9	72.5
女性		20-29歳	40	12.1	8.3	2.2	0.0	0.0	1.8	2.2	5.2	9.9	16.1	25.2	26.8	28.7	28.7
		30-39歳	52	9.1	7.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	8.0	15.2	18.1	18.2	35.1	35.1
		40-49歳	71	9.9	8.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	14.7	25.3	27.9	41.0	41.0
		50-59歳	73	11.1	11.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	8.6	15.1	24.3	38.5	57.0	57.0
		60-69歳	108	9.7	7.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	9.3	18.4	23.2	23.2	43.3	44.0
		70歳以上	151	8.4	7.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.3	13.0	17.5	19.2	33.9	34.1
		(再掲)20-39歳	92	10.3	7.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	9.5	15.9	19.8	25.1	35.1	35.1
		(再掲)40-64歳	184	10.3	9.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	8.4	14.9	23.4	29.4	51.9	57.0
		(再掲)65歳以上	219	8.9	7.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.3	14.0	17.9	19.4	33.8	44.0
		(再掲)20歳以上*1	495	9.8	8.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	3.7	8.1	15.0	18.2	25.5	37.1	57.0
		(再掲)20歳以上*2	495	9.9	8.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	3.7	8.4	15.1	18.3	25.5	37.8	57.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

菓子類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	21.3	52.8	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	62.5	152.4	420.0	420.0
	30-39歳	100	25.1	52.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	74.1	166.9	246.7	247.0
	40-49歳	132	25.8	54.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	79.2	112.9	316.6	600.0
	50-59歳	147	19.8	36.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	61.0	108.0	207.4	250.0
	60-69歳	197	25.8	50.2	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	100.0	142.1	264.3	270.0
	70歳以上	275	31.4	52.1	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	41.0	95.6	126.0	258.8	270.0
	(再掲)20-39歳	175	23.6	52.3	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	71.0	154.1	239.9	420.0
	(再掲)40-64歳	352	24.2	48.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	80.0	113.5	246.6	600.0
	(再掲)65歳以上	399	29.1	50.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	90.6	126.0	263.0	270.0
	(再掲)20歳以上*1	926	24.8	49.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	80.0	126.0	245.0	600.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	24.6	49.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	80.0	126.0	244.7	600.0
	20-29歳	35	25.9	57.2	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.3	165.7	178.7	178.7
	30-39歳	48	5.3	26.2	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.1	192.0	192.0
	40-49歳	61	16.6	34.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	57.5	71.4	220.0	220.0
	50-59歳	74	16.3	36.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	60.0	106.3	250.0	250.0
	60-69歳	89	20.8	37.7	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	78.2	100.0	172.6	172.6
	70歳以上	124	23.7	42.6	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	76.3	108.7	250.3	270.0
	(再掲)20-39歳	83	13.7	42.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	152.0	192.0	192.0
	(再掲)40-64歳	168	18.6	37.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	63.0	100.0	216.2	250.0
	(再掲)65歳以上	180	21.7	39.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	70.0	98.1	225.6	270.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	17.7	39.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	60.4	105.0	185.4	270.0
	(再掲)20歳以上*2	431	17.8	39.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	60.0	105.0	185.5	270.0
	20-29歳	40	17.6	49.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	44.8	63.6	420.0	420.0
	30-39歳	52	41.0	61.7	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	61.5	138.1	191.6	247.0	247.0
	40-49歳	71	34.9	67.8	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	39.8	101.4	162.3	600.0	600.0
	50-59歳	73	23.2	37.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	79.3	108.7	179.3	179.3
	60-69歳	108	29.7	38.1	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	100.3	164.9	289.5	270.0
	70歳以上	151	37.8	58.1	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	60.0	120.0	168.1	253.6	260.0
	(再掲)20-39歳	92	31.5	57.9	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	42.1	76.7	168.7	420.0	420.0
	(再掲)40-64歳	184	29.7	56.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	99.1	140.5	289.4	600.0
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	34.9	56.8	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.7	159.9	263.0	270.0
	(再掲)20歳以上*1	495	31.9	57.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	42.0	100.0	143.2	260.0	600.0
	(再掲)20歳以上*2	495	31.6	56.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	41.0	100.0	142.5	259.8	600.0
	(再掲)20歳以上*2	495	31.6	56.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	41.0	100.0	142.5	259.8	600.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

アルコール飲料(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	20.7	78.2	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	15.0	354.0	355.7	355.7
	30-39歳	100	115.5	298.3	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	119.2	350.8	378.6	2034.3	2034.7
	40-49歳	132	146.9	322.7	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	145.4	518.8	705.2	1992.6	2211.0
	50-59歳	147	156.0	298.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	292.7	505.0	950.9	1383.3	1500.0
	60-69歳	197	137.0	292.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	99.7	541.4	903.4	1293.3	1352.0
	70歳以上	275	95.9	232.2	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	22.5	359.6	539.1	1280.4	1657.5
	(再掲)20-39歳	175	76.9	239.0	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	9.5	350.0	354.1	2007.5	2034.7
	(再掲)40-64歳	352	140.3	298.2	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	67.6	505.0	712.8	1494.2	2211.0
	(再掲)65歳以上	399	114.3	259.6	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	46.6	370.0	694.7	1289.6	1657.5
	(再掲)20歳以上*1	926	119.8	280.5	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	31.2	373.0	689.4	1392.0	2211.0
	(再掲)20歳以上*2	926	120.7	280.6	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	32.1	374.3	702.6	1371.0	2211.0
男性	20-29歳	35	32.4	99.3	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	236.5	354.0	355.7	355.7
	30-39歳	48	205.5	418.1	58.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	350.0	386.5	1691.3	2034.7	2034.7
	40-49歳	61	226.6	398.1	57.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	354.0	612.8	1090.2	2211.0	2211.0
	50-59歳	74	249.4	321.2	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	414.0	719.0	1020.6	1067.5	1067.5
	60-69歳	89	246.7	379.7	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	367.5	921.2	1095.4	1352.0	1352.0
	70歳以上	124	183.3	310.4	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	354.0	539.4	888.4	1547.2	1657.5
	(再掲)20-39歳	83	134.7	337.3	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	106.2	354.0	499.0	2034.7	2034.7
	(再掲)40-64歳	168	222.8	351.0	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	367.8	708.0	1003.2	1750.8	2211.0
	(再掲)65歳以上	180	215.5	341.6	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	354.5	645.0	1060.7	1388.1	1657.5
	(再掲)20歳以上*1	431	195.1	349.9	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	350.0	556.2	971.7	1868.1	2211.0
	(再掲)20歳以上*2	431	195.5	348.4	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	350.9	555.9	980.1	1820.1	2211.0
	(再掲)20歳以上*2	431	195.5	348.4	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	350.9	555.9	980.1	1820.1	2211.0
女性	20-29歳	40	11.2	55.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.2	6.0	19.2	355.0	355.0
	30-39歳	52	43.2	98.3	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	11.4	197.0	297.5	379.5	379.5
	40-49歳	71	69.1	200.9	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.7	347.8	637.8	1065.1	1065.1
	50-59歳	73	63.8	243.3	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	142.4	355.3	1500.0	1500.0
	60-69歳	108	51.8	154.8	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	10.7	172.0	359.8	825.8	836.0
	70歳以上	151	24.4	90.5	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	42.9	120.2	574.4	710.5
	(再掲)20-39歳	92	30.2	84.6	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.9	185.7	249.1	379.5	379.5
	(再掲)40-64歳	184	58.4	204.7	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.5	145.1	354.0	1307.5	1500.0
	(再掲)65歳以上	219	36.2	124.8	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	45.0	323.7	764.6	836.0
	(再掲)20歳以上*1	495	43.8	152.6	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	99.8	352.5	809.9	1500.0
	(再掲)20歳以上*2	495	44.0	153.5	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	100.0	352.3	809.8	1500.0
	(再掲)20歳以上*2	495	44.0	153.5	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	100.0	352.3	809.8	1500.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の嗜好飲料(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	503.3	396.7	51.7	0.0	0.0	0.0	30.9	200.0	433.5	677.2	1030.1	1298.6	1925.0	1925.0
	30-39歳	100	668.4	544.8	91.1	0.0	0.0	0.2	39.2	299.4	563.4	885.3	1403.1	1923.4	2597.3	2600.0
	40-49歳	132	698.5	546.7	76.7	0.0	0.0	0.0	119.0	271.5	640.0	1100.0	1393.4	1578.2	3155.2	3250.0
	50-59歳	147	688.4	442.0	59.9	0.0	0.0	111.8	172.4	336.0	609.5	950.6	1251.7	1486.6	2124.1	2250.0
	60-69歳	197	778.9	460.4	55.4	0.0	0.0	114.5	199.7	470.4	707.7	1100.0	1421.1	1663.9	2136.5	2250.0
	70歳以上	275	897.8	695.7	90.1	101.0	150.0	192.5	300.0	470.0	742.7	1148.5	1638.7	1871.9	3473.5	6000.0
	(再掲)20-39歳	175	601.1	495.3	63.9	0.0	0.0	0.0	53.9	253.6	542.7	816.6	1266.6	1538.4	2399.4	2600.0
	(再掲)40-64歳	352	706.2	485.7	53.6	0.0	0.0	100.0	151.7	349.3	650.0	975.2	1315.7	1540.9	2112.2	3250.0
	(再掲)65歳以上	399	868.0	644.2	75.2	0.0	0.0	163.3	244.4	470.0	740.8	1130.9	1600.9	1842.5	2886.9	6000.0
	(再掲)20歳以上*1	926	722.2	551.0	59.9	0.0	0.0	50.0	151.7	337.9	610.0	983.1	1400.0	1675.8	2531.8	6000.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	720.1	543.5	59.1	0.0	0.0	50.0	161.0	342.0	610.0	980.0	1400.0	1667.7	2483.7	6000.0
	20-29歳	35	541.9	499.5	104.2	0.0	0.0	0.0	10.8	155.9	500.0	900.0	1274.7	1651.1	1925.0	1925.0
	30-39歳	48	624.4	557.2	122.7	0.0	0.0	0.2	0.7	200.0	531.0	889.4	1381.3	1810.7	2600.0	2600.0
	40-49歳	61	681.5	634.3	103.2	0.0	0.0	0.0	94.5	182.5	514.0	1125.9	1529.4	1682.0	3250.0	3250.0
	50-59歳	74	724.0	477.0	85.9	0.0	0.0	110.2	161.6	328.3	665.9	982.8	1276.1	1969.1	2050.0	2050.0
	60-69歳	89	780.9	413.1	58.4	0.0	0.0	3.5	194.6	540.0	750.0	1099.4	1400.0	1488.5	1756.0	1756.0
	70歳以上	124	857.7	560.7	89.1	140.0	149.3	193.0	301.4	450.8	744.9	1079.5	1496.7	1869.1	2948.9	3000.0
	(再掲)20-39歳	83	590.7	532.8	95.6	0.0	0.0	0.0	0.9	200.0	491.3	889.7	1336.6	1687.8	2600.0	2600.0
	(再掲)40-64歳	168	718.2	521.5	67.6	0.0	0.0	100.0	150.0	300.0	681.7	1001.3	1397.3	1615.3	2651.0	3250.0
	(再掲)65歳以上	180	838.7	539.0	75.0	0.0	0.0	179.8	243.3	450.0	750.0	1120.1	1483.7	1795.2	2849.2	3000.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	707.5	538.2	71.6	0.0	0.0	0.6	100.0	287.5	650.0	1000.0	1401.9	1688.5	2594.7	3250.0
	(再掲)20歳以上*2	431	712.4	534.7	71.2	0.0	0.0	0.7	120.0	300.0	650.0	1000.0	1401.8	1690.8	2592.5	3250.0
	20-29歳	40	472.1	290.9	37.7	0.0	0.0	0.0	113.4	249.7	433.6	582.0	913.3	1110.0	1475.0	1475.0
	30-39歳	52	703.8	537.0	74.9	0.0	0.0	0.9	102.5	328.9	593.1	849.6	1391.2	2145.5	2401.0	2401.0
	40-49歳	71	715.1	449.6	66.4	0.0	0.0	113.6	200.0	318.0	659.8	1092.3	1316.8	1426.5	2850.0	2850.0
	50-59歳	73	653.3	404.7	48.1	0.0	0.0	105.4	167.8	387.8	585.7	857.8	1146.0	1397.3	2250.0	2250.0
	60-69歳	108	777.4	495.8	66.5	0.0	0.0	126.2	200.0	450.0	680.7	1101.0	1443.7	1979.8	2249.1	2250.0
	70歳以上	151	930.6	789.5	93.1	101.0	113.2	159.2	274.6	497.9	741.1	1198.5	1657.4	1867.2	5252.1	6000.0
	(再掲)20-39歳	92	609.5	465.4	47.0	0.0	0.0	0.0	124.9	300.6	542.9	747.0	1250.7	1479.2	2401.0	2401.0
	(再掲)40-64歳	184	694.3	448.7	51.4	0.0	0.0	114.9	187.8	390.5	600.0	938.6	1306.1	1447.2	2137.7	2850.0
女性	(再掲)65歳以上	219	890.5	715.3	78.7	0.0	34.8	155.3	243.8	483.5	731.3	1151.4	1628.2	1867.2	4332.6	6000.0
	(再掲)20歳以上*1	495	737.0	563.8	51.6	0.0	0.0	100.5	200.0	400.0	600.0	950.0	1399.8	1676.9	2373.8	6000.0
	(再掲)20歳以上*2	495	727.9	552.8	50.2	0.0	0.0	100.0	200.0	400.0	600.0	931.4	1381.1	1668.9	2363.5	6000.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

調味料(g)	性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数		20-29歳	75	106.4	77.4	15.4	7.6	7.6	18.3	33.1	47.6	74.2	201.4	223.5	252.8	265.4	265.4
		30-39歳	100	97.1	81.6	9.6	10.3	11.8	25.0	27.6	40.8	72.3	129.3	214.3	241.6	526.0	528.7
		40-49歳	132	121.5	108.1	13.0	0.0	0.0	21.8	26.7	42.1	77.3	192.8	254.3	308.7	582.4	612.0
		50-59歳	147	114.9	109.4	11.4	0.0	0.0	23.6	29.7	45.7	68.8	138.2	251.4	351.6	519.3	524.5
		60-69歳	197	117.5	111.8	11.6	16.6	18.5	22.9	33.1	47.7	72.0	139.6	273.3	315.0	563.3	678.0
		70歳以上	275	102.8	108.4	9.9	1.0	11.5	17.5	25.4	38.6	69.0	106.0	259.3	344.4	558.2	734.3
		(再掲)20-39歳	175	100.9	79.8	10.1	7.6	9.3	24.3	31.3	41.6	73.7	136.0	222.6	251.7	333.1	528.7
		(再掲)40-64歳	352	114.6	103.7	8.2	0.0	0.8	22.0	29.6	45.9	74.2	150.0	250.9	313.7	513.1	612.0
		(再掲)65歳以上	399	109.6	114.0	9.1	1.0	11.6	18.8	27.0	41.1	69.0	114.1	276.3	347.6	605.8	734.3
		(再掲)20歳以上*1	926	110.3	101.6	5.8	0.0	10.3	22.0	29.2	43.4	72.5	136.1	251.5	305.5	504.3	734.3
		(再掲)20歳以上*2	926	110.0	101.4	5.9	0.0	10.2	22.1	29.5	43.6	72.5	136.0	250.9	305.5	504.1	734.3
男性		20-29歳	35	122.8	83.0	18.9	7.6	7.6	18.9	36.1	56.2	77.5	208.1	251.7	256.7	265.4	265.4
		30-39歳	48	91.5	82.1	11.4	13.1	13.1	20.5	27.0	41.4	81.3	106.9	186.7	247.2	528.7	528.7
		40-49歳	61	142.6	125.9	26.3	22.3	22.3	22.3	31.9	42.0	88.9	227.8	306.1	370.9	612.0	612.0
		50-59歳	74	135.4	107.8	12.6	9.2	9.2	26.7	35.6	54.7	84.0	234.0	312.1	352.3	498.3	498.3
		60-69歳	89	120.3	98.6	13.6	16.6	17.4	28.3	38.9	54.1	79.0	166.4	271.1	344.7	435.0	435.0
		70歳以上	124	116.5	122.0	15.4	1.0	11.7	22.8	29.0	45.7	77.8	107.4	286.0	379.0	692.7	734.3
		(再掲)20-39歳	83	104.3	83.4	11.0	7.6	7.6	22.4	31.7	47.5	80.9	136.0	209.5	253.6	528.7	528.7
		(再掲)40-64歳	168	134.9	111.2	13.9	9.2	20.3	23.0	35.5	51.9	84.5	218.6	300.0	350.7	555.3	612.0
		(再掲)65歳以上	180	117.9	118.6	11.3	1.0	13.1	23.8	30.1	46.1	77.4	129.7	278.1	387.3	601.4	734.3
		(再掲)20歳以上*1	431	120.7	106.0	7.4	1.0	12.1	25.0	32.1	48.0	81.0	170.5	263.8	324.6	515.6	734.3
		(再掲)20歳以上*2	431	119.8	105.6	7.3	1.0	12.1	25.0	32.0	48.3	80.9	166.5	262.6	332.3	512.0	734.3
女性		20-29歳	40	93.1	70.7	18.6	15.3	15.3	17.4	32.3	43.1	71.6	117.2	211.9	249.4	258.5	258.5
		30-39歳	52	101.6	81.6	12.9	10.3	10.3	26.1	27.6	40.2	70.6	173.0	235.2	252.3	311.1	311.1
		40-49歳	71	100.9	83.1	11.2	0.0	0.0	18.5	24.9	43.0	66.5	130.8	237.5	246.5	487.1	487.1
		50-59歳	73	94.6	108.0	16.0	0.0	0.0	15.0	25.1	37.4	60.1	101.4	209.3	413.6	524.5	524.5
		60-69歳	108	115.3	121.4	14.0	19.0	19.0	20.8	29.9	44.3	61.6	135.9	280.2	312.2	666.1	678.0
		70歳以上	151	91.7	94.8	9.0	10.5	11.5	15.7	18.9	35.7	61.9	100.5	209.0	311.4	484.4	575.3
		(再掲)20-39歳	92	98.2	77.0	12.1	10.3	11.2	22.6	28.4	40.3	70.8	131.1	223.1	247.9	311.1	311.1
		(再掲)40-64歳	184	94.5	91.6	8.2	0.0	0.0	20.3	24.8	41.6	62.0	105.2	227.6	249.5	512.2	524.5
		(再掲)65歳以上	219	103.1	110.2	8.7	10.5	11.5	18.4	25.0	38.2	62.5	112.1	276.4	320.4	606.1	678.0
		(再掲)20歳以上*1	495	99.7	95.9	6.0	0.0	5.3	19.7	26.3	40.2	65.8	119.0	236.9	292.2	497.2	678.0
		(再掲)20歳以上*2	495	99.9	96.0	6.3	0.0	5.0	20.1	26.4	40.2	65.8	119.0	236.5	287.3	499.4	678.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

香辛料・その他(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.4	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	3.0	8.3	8.3
	30-39歳	100	0.4	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.3	12.1	12.2
	40-49歳	132	0.5	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	3.1	11.3	13.0
	50-59歳	147	0.5	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	3.0	11.5	17.0
	60-69歳	197	0.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	2.6	10.4	12.2
	70歳以上	275	0.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.0	5.0	10.7
	(再掲)20-39歳	175	0.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	3.0	9.1	12.2
	(再掲)40-64歳	352	0.5	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.0	11.3	17.0
	(再掲)65歳以上	399	0.4	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.2	5.9	10.7
	(再掲)20歳以上*1	926	0.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.5	7.6	17.0
	(再掲)20歳以上*2	926	0.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.5	7.4	17.0
男性	20-29歳	35	0.3	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.4	8.3	8.3
	30-39歳	48	0.7	2.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	6.4	12.2	12.2
	40-49歳	61	0.4	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	3.4	11.0	11.0
	50-59歳	74	0.7	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	4.9	17.0	17.0
	60-69歳	89	0.5	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	2.6	10.0	10.0
	70歳以上	124	0.4	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.4	7.7	10.7
	(再掲)20-39歳	83	0.6	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	4.1	12.2	12.2
	(再掲)40-64歳	168	0.5	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.0	11.8	17.0
	(再掲)65歳以上	180	0.4	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	2.6	8.4	10.7
	(再掲)20歳以上*1	431	0.5	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	3.0	9.8	17.0
	(再掲)20歳以上*2	431	0.5	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	3.0	10.0	17.0
女性	20-29歳	40	0.5	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	3.0	7.2	7.2
	30-39歳	52	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	3.0	3.0
	40-49歳	71	0.5	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.9	13.0	13.0
	50-59歳	73	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.7	3.7
	60-69歳	108	0.5	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	2.8	11.7	12.2
	70歳以上	151	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.4	6.1	9.3
	(再掲)20-39歳	92	0.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.1	7.2	7.2
	(再掲)40-64歳	184	0.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.7	10.7	13.0
	(再掲)65歳以上	219	0.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.0	5.7	9.3
	(再掲)20歳以上*1	495	0.4	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.0	6.0	13.0
	(再掲)20歳以上*2	495	0.4	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.0	5.8	13.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

パン類(菓子パンを除く)(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	32.0	49.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	104.6	142.0	200.0	200.0
	30-39歳	100	32.8	41.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	90.0	120.0	209.6	210.0
	40-49歳	132	33.1	40.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	80.8	100.0	171.1	180.0
	50-59歳	147	41.5	59.4	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	63.0	120.0	150.0	328.8	444.0
	60-69歳	197	52.0	52.5	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	80.5	120.0	133.3	236.6	350.0
	70歳以上	275	46.8	43.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	72.0	113.2	124.5	150.3	190.0
	(再掲)20-39歳	175	32.5	44.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	95.6	120.0	198.5	210.0
	(再掲)40-64歳	352	38.4	50.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	60.0	90.0	120.0	185.2	444.0
	(再掲)65歳以上	399	49.6	46.6	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.7	77.5	120.0	131.0	174.2	300.0
	(再掲)20歳以上*1	926	40.2	48.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	60.0	105.0	126.0	190.6	444.0
	(再掲)20歳以上*2	926	40.5	48.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	60.0	105.0	126.0	192.4	444.0
男性	20-29歳	35	34.7	46.6	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	125.5	145.7	150.0	150.0
	30-39歳	48	31.8	51.3	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	120.0	135.4	210.0	210.0
	40-49歳	61	30.6	42.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	74.1	133.2	180.0	180.0
	50-59歳	74	30.4	46.3	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	114.8	132.6	180.0	180.0
	60-69歳	89	51.1	56.3	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	90.0	120.4	158.7	300.0	300.0
	70歳以上	124	55.7	46.9	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	90.0	120.0	135.0	179.5	190.0
	(再掲)20-39歳	83	33.0	49.2	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	120.0	142.5	210.0	210.0
	(再掲)40-64歳	168	31.8	44.3	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	90.0	130.5	180.0	180.0
	(再掲)65歳以上	180	57.0	51.1	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	90.0	120.2	139.8	211.5	300.0
	(再掲)20歳以上*1	431	39.4	49.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	120.0	136.8	190.9	300.0
	(再掲)20歳以上*2	431	40.0	49.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	120.0	136.2	191.4	300.0
女性	20-29歳	40	29.8	51.4	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	120.0	152.7	200.0	200.0
	30-39歳	52	33.6	32.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	60.0	78.6	90.0	105.0	105.0
	40-49歳	71	35.5	37.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	60.0	82.5	94.1	180.0	180.0
	50-59歳	73	52.5	68.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	65.5	120.0	177.3	444.0	444.0
	60-69歳	108	52.7	49.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	80.0	120.0	125.6	320.0	350.0
	70歳以上	151	39.5	38.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	60.0	90.0	120.0	153.8	160.0
	(再掲)20-39歳	92	32.0	41.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	90.0	105.0	200.0	200.0
	(再掲)40-64歳	184	45.1	55.4	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	61.1	100.0	120.0	371.1	444.0
	(再掲)65歳以上	219	43.9	42.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	70.5	98.1	123.0	162.9	200.0
	(再掲)20歳以上*1	495	40.9	46.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	60.0	90.2	120.0	200.0	444.0
	(再掲)20歳以上*2	495	41.1	47.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	60.0	90.7	120.0	200.0	444.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

菓子パン類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.4	4.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	52.0
	30-39歳	100	1.8	9.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9	60.0
	40-49歳	132	5.4	24.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	166.9	195.0
	50-59歳	147	3.7	19.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.1	160.0
	60-69歳	197	1.2	9.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	70歳以上	275	3.9	19.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	108.4	220.0
	(再掲)20-39歳	175	1.2	8.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.5	60.0
	(再掲)40-64歳	352	3.7	19.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.3	195.0
	(再掲)65歳以上	399	3.4	17.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	100.0	220.0
	(再掲)20歳以上*1	926	2.9	16.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	220.0
	(再掲)20歳以上*2	926	2.8	16.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	220.0
男性	20-29歳	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	48	0.6	5.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	40-49歳	61	10.1	32.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	74.7	195.0	195.0
	50-59歳	74	4.8	22.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	110.0	110.0
	60-69歳	89	1.9	12.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	70歳以上	124	4.0	20.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	199.1	220.0
	(再掲)20-39歳	83	0.3	4.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	(再掲)40-64歳	168	6.0	25.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	142.1	195.0
	(再掲)65歳以上	180	3.8	19.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	134.6	220.0
	(再掲)20歳以上*1	431	3.7	19.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.4	220.0
	(再掲)20歳以上*2	431	3.5	19.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.1	220.0
女性	20-29歳	40	0.7	6.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	52.0
	30-39歳	52	2.8	12.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	60.0	60.0
	40-49歳	71	0.8	7.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	50-59歳	73	2.5	17.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	160.0
	60-69歳	108	0.7	6.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.0	100.0
	70歳以上	151	3.9	18.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	100.0	100.0
	(再掲)20-39歳	92	1.9	10.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0
	(再掲)40-64歳	184	1.4	12.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.4	160.0
	(再掲)65歳以上	219	3.1	16.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	(再掲)20歳以上*1	495	2.0	12.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7	160.0
	(再掲)20歳以上*2	495	2.0	12.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	160.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

うどん、中華めん類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	17.3	56.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	172.7	345.0	345.0
	30-39歳	100	45.0	85.5	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.9	228.0	269.8	270.0
	40-49歳	132	30.3	77.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	228.9	344.8	400.0
	50-59歳	147	33.1	79.9	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.9	228.2	323.3	390.0
	60-69歳	197	41.4	78.6	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	180.0	201.4	230.0	504.0
	70歳以上	275	36.0	74.4	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.7	217.0	276.4	300.0
	(再掲)20-39歳	175	33.7	76.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	219.3	256.9	345.0
	(再掲)40-64歳	352	31.1	77.1	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	228.0	297.2	400.0
	(再掲)65歳以上	399	39.5	76.7	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	202.0	267.3	504.0
	(再掲)20歳以上*1	926	34.2	76.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	228.0	270.0	504.0
	(再掲)20歳以上*2	926	34.6	76.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	228.0	270.0	504.0
男性	20-29歳	35	34.9	76.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172.7	228.9	345.0	345.0
	30-39歳	48	13.2	53.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.0	230.0	230.0
	40-49歳	61	22.2	74.3	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	228.9	400.0	400.0
	50-59歳	74	42.6	92.1	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.0	230.0	390.0	390.0
	60-69歳	89	42.4	83.1	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	182.5	228.0	504.0	504.0
	70歳以上	124	39.5	79.3	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	194.8	215.4	292.2	300.0
	(再掲)20-39歳	83	22.1	64.3	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	228.0	345.0	345.0
	(再掲)40-64歳	168	33.8	84.1	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.7	230.0	393.2	400.0
	(再掲)65歳以上	180	41.1	80.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	206.9	288.0	504.0
	(再掲)20歳以上*1	431	31.9	77.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	228.0	302.2	504.0
	(再掲)20歳以上*2	431	32.4	77.3	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	228.0	300.0	504.0
	20-29歳	40	3.1	23.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0
	30-39歳	52	70.5	97.8	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.8	213.5	230.0	270.0	270.0
	40-49歳	71	38.2	80.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.0	229.0	230.0	230.0
女性	50-59歳	73	23.8	65.0	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	211.3	288.0	288.0
	60-69歳	108	40.6	75.4	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	200.9	230.0	230.0
	70歳以上	151	33.2	70.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	220.8	265.3	270.0
	(再掲)20-39歳	92	43.1	83.3	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.2	215.0	270.0	270.0
	(再掲)40-64歳	184	28.5	69.5	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.9	228.0	230.0	288.0
	(再掲)65歳以上	219	38.2	74.2	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	209.9	259.6	270.0
	(再掲)20歳以上*1	495	36.6	75.8	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	216.0	259.7	288.0
	(再掲)20歳以上*2	495	36.9	76.2	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	215.4	263.6	288.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

即席中華めん類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	2.0	19.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	220.0
	30-39歳	100	3.7	15.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	101.4	102.0
	40-49歳	132	3.2	18.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.2	180.0
	50-59歳	147	7.1	25.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0	106.5	106.5
	60-69歳	197	2.4	16.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6	158.0
	70歳以上	275	4.8	18.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	100.0	170.0
	(再掲)20-39歳	175	3.0	17.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.3	220.0
	(再掲)40-64歳	352	4.4	20.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.4	180.0
	(再掲)65歳以上	399	4.4	19.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	100.0	170.0
	(再掲)20歳以上*1	926	4.0	19.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	220.0
	(再掲)20歳以上*2	926	4.0	19.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	220.0
男性	20-29歳	35	3.6	28.3	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	220.0
	30-39歳	48	5.6	20.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8	102.0	102.0
	40-49歳	61	6.6	26.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	180.0	180.0
	50-59歳	74	9.5	29.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	99.0	106.5	106.5
	60-69歳	89	1.9	17.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158.0	158.0
	70歳以上	124	6.0	21.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.7	122.7	170.0
	(再掲)20-39歳	83	4.8	24.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.5	220.0	220.0
	(再掲)40-64歳	168	6.6	25.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	112.8	180.0
	(再掲)65歳以上	180	5.4	22.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	132.5	170.0
	(再掲)20歳以上*1	431	5.5	23.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.1	106.5	220.0
	(再掲)20歳以上*2	431	5.5	23.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.8	105.4	220.0
女性	20-29歳	40	0.7	7.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	90.0
	30-39歳	52	2.3	10.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	67.2	67.2
	40-49歳	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	73	4.6	21.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	106.5	106.5
	60-69歳	108	2.7	16.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.0	100.0
	70歳以上	151	3.7	16.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	95.0	100.0
	(再掲)20-39歳	92	1.6	9.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	90.0
	(再掲)40-64歳	184	2.1	14.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.5	106.5
	(再掲)65歳以上	219	3.7	16.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	100.0	100.0
	(再掲)20歳以上*1	495	2.4	13.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	106.5
	(再掲)20歳以上*2	495	2.5	14.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	106.5

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

パスタ(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	28.0	74.5	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	208.0	250.0	250.0	250.0
	30-39歳	100	26.1	73.8	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	195.3	250.0	382.0	388.8
	40-49歳	132	9.1	38.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	45.0	256.4	288.0
	50-59歳	147	7.7	36.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	247.3	250.0
	60-69歳	197	26.9	70.4	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.0	229.4	263.0	384.0
	70歳以上	275	10.4	42.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.5	250.0	250.0
	(再掲)20-39歳	175	26.9	73.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	250.0	250.0	388.8
	(再掲)40-64歳	352	11.5	44.3	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	60.0	250.0	288.0
	(再掲)65歳以上	399	15.0	53.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	159.0	249.9	384.0
	(再掲)20歳以上*1	926	18.2	59.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	216.0	250.0	388.8
	(再掲)20歳以上*2	926	18.6	60.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	219.3	250.0	388.8
男性	20-29歳	35	37.5	87.6	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	244.6	250.0	250.0	250.0
	30-39歳	48	34.6	85.1	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	250.0	388.8	388.8
	40-49歳	61	6.9	33.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	59.1	288.0	288.0
	50-59歳	74	8.6	39.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	50.8	250.0	250.0
	60-69歳	89	40.8	90.5	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.5	246.6	384.0	384.0
	70歳以上	124	14.2	49.4	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	129.1	248.9	250.0
	(再掲)20-39歳	83	35.8	85.6	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.6	250.0	388.8	388.8
	(再掲)40-64歳	168	11.4	47.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	59.8	258.5	288.0
	(再掲)65歳以上	180	23.1	66.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.0	216.0	250.6	384.0
	(再掲)20歳以上*1	431	23.5	69.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.9	247.2	250.0	388.8
	(再掲)20歳以上*2	431	23.8	69.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.1	247.7	250.0	388.8
女性	20-29歳	40	20.3	61.9	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.4	218.0	250.0	250.0
	30-39歳	52	19.2	63.2	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	240.0	250.0	250.0
	40-49歳	71	11.2	43.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	41.5	250.0	250.0
	50-59歳	73	6.7	32.1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5	240.0	240.0
	60-69歳	108	16.2	47.2	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.1	144.0	237.6	240.0
	70歳以上	151	7.2	36.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	247.4	250.0
	(再掲)20-39歳	92	19.7	62.3	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.9	240.0	250.0	250.0
	(再掲)40-64歳	184	11.5	41.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	84.6	245.6	250.0
	(再掲)65歳以上	219	8.7	38.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9	244.3	250.0
	(再掲)20歳以上*1	495	13.0	47.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	135.5	250.0	250.0
	(再掲)20歳以上*2	495	13.2	48.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	144.0	250.0	250.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介(塩蔵、生干し、乾物)(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	12.4	22.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	50.0	73.7	93.0	93.0
	30-39歳	100	6.2	20.7	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	13.9	67.8	145.3	146.0
	40-49歳	132	15.9	35.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	48.8	63.8	212.7	232.0
	50-59歳	147	13.4	22.8	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	50.0	60.2	93.0	109.0
	60-69歳	197	16.0	28.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	16.5	64.8	80.7	127.7	130.0
	70歳以上	275	17.3	33.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	15.0	63.2	86.7	146.8	200.0
	(再掲)20-39歳	175	8.7	21.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	42.0	69.2	98.3	146.0
	(再掲)40-64歳	352	14.0	28.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	50.0	61.3	107.6	232.0
	(再掲)65歳以上	399	17.7	33.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	18.0	70.0	86.5	146.6	200.0
	(再掲)20歳以上*1	926	13.7	28.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	50.2	75.0	130.6	232.0
	(再掲)20歳以上*2	926	13.5	28.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.1	75.0	129.5	232.0
男性	20-29歳	35	11.2	21.7	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	58.7	64.9	75.0	75.0
	30-39歳	48	3.9	12.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.0	33.8	100.0	100.0
	40-49歳	61	21.2	46.2	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	19.8	52.2	103.2	232.0	232.0
	50-59歳	74	17.0	24.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	52.3	60.0	109.0	109.0
	60-69歳	89	16.3	30.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	17.5	63.8	90.0	130.0	130.0
	70歳以上	124	18.5	35.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	17.0	68.2	91.8	185.1	200.0
	(再掲)20-39歳	83	6.9	17.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	32.7	60.0	100.0	100.0
	(再掲)40-64歳	168	17.3	34.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	22.5	52.1	63.3	193.0	232.0
	(再掲)65歳以上	180	19.1	35.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	28.0	68.1	95.0	155.9	200.0
	(再掲)20歳以上*1	431	14.6	31.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	51.0	69.3	148.3	232.0
	(再掲)20歳以上*2	431	14.5	30.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	51.0	69.4	145.4	232.0
女性	20-29歳	40	13.4	24.1	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	22.4	54.7	73.8	93.0	93.0
	30-39歳	52	8.1	25.4	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	78.0	146.0	146.0
	40-49歳	71	10.6	19.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	40.2	61.8	90.0	90.0
	50-59歳	73	10.0	20.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	46.2	66.2	75.0	75.0
	60-69歳	108	15.8	27.7	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	14.7	76.4	80.0	120.0	127.0
	70歳以上	151	16.3	31.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	14.3	63.2	80.4	142.8	164.0
	(再掲)20-39歳	92	10.3	24.9	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	48.2	75.2	146.0	146.0
	(再掲)40-64歳	184	10.7	20.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	42.3	61.6	89.9	92.5
	(再掲)65歳以上	219	16.6	31.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.0	76.4	80.0	137.7	164.0
	(再掲)20歳以上*1	495	12.7	25.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.0	78.1	107.2	164.0
	(再掲)20歳以上*2	495	12.5	25.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	50.0	77.5	104.1	164.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介(缶詰)(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1.6	5.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	17.6	20.0	20.0
	30-39歳	100	1.7	7.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	67.0	67.5
	40-49歳	132	2.1	6.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	20.0	31.6	32.0
	50-59歳	147	0.2	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	20.0
	60-69歳	197	4.8	17.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	42.6	95.0	100.0
	70歳以上	275	3.9	17.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	18.9	106.9	150.0
	(再掲)20-39歳	175	1.7	6.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	34.5	67.5
	(再掲)40-64歳	352	2.0	9.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	51.0	95.0
	(再掲)65歳以上	399	4.0	17.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0	150.0
	(再掲)20歳以上*1	926	2.5	11.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	75.6	150.0
	(再掲)20歳以上*2	926	2.5	12.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	76.4	150.0
男性	20-29歳	35	1.4	4.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	13.9	16.7	16.7
	30-39歳	48	1.6	8.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	67.5	67.5
	40-49歳	61	2.3	7.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	23.6	32.0	32.0
	50-59歳	74	0.4	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
	60-69歳	89	5.1	19.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	59.9	100.0	100.0
	70歳以上	124	5.6	22.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	35.0	143.9	150.0
	(再掲)20-39歳	83	1.5	7.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	67.5	67.5
	(再掲)40-64歳	168	1.3	5.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	31.2	32.0
	(再掲)65歳以上	180	6.1	22.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	39.3	132.0	150.0
	(再掲)20歳以上*1	431	2.8	13.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	87.2	150.0
	(再掲)20歳以上*2	431	2.9	13.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	90.8	150.0
	(再掲)20歳以上*2	431	2.9	13.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	90.8	150.0
女性	20-29歳	40	1.8	5.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	19.1	20.0	20.0
	30-39歳	52	1.8	6.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	27.9	35.6	35.6
	40-49歳	71	2.0	5.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	20.0	25.4	25.4
	50-59歳	73	0.1	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	13.4
	60-69歳	108	4.5	17.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	46.8	93.9	95.0
	70歳以上	151	2.5	11.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	80.6	90.0
	(再掲)20-39歳	92	1.8	6.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	19.0	35.6	35.6
	(再掲)40-64歳	184	2.6	12.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	84.4	95.0
	(再掲)65歳以上	219	2.3	10.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	72.6	90.0
	(再掲)20歳以上*1	495	2.2	10.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	73.2	95.0
	(再掲)20歳以上*2	495	2.2	10.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	72.5	95.0
	(再掲)20歳以上*2	495	2.2	10.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	72.5	95.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介(佃煮)(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	100	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	5.0
	40-49歳	132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	147	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.0
	60-69歳	197	0.2	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	14.0
	70歳以上	275	0.7	4.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	21.4	60.0
	(再掲)20-39歳	175	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0
	(再掲)40-64歳	352	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	10.0
	(再掲)65歳以上	399	0.6	3.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	17.3	60.0
	(再掲)20歳以上*1	926	0.2	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	60.0
	(再掲)20歳以上*2	926	0.2	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	60.0
男性	20-29歳	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	48	0.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
	40-49歳	61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	74	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
	60-69歳	89	0.4	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	14.0	14.0
	70歳以上	124	0.8	5.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	47.4	60.0
	(再掲)20-39歳	83	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
	(再掲)40-64歳	168	0.1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	10.0
	(再掲)65歳以上	180	0.7	4.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	24.2	60.0
	(再掲)20歳以上*1	431	0.2	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	60.0
	(再掲)20歳以上*2	431	0.2	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	60.0
女性	20-29歳	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	73	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
	60-69歳	108	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	5.0
	70歳以上	151	0.7	3.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	24.5	30.0
	(再掲)20-39歳	92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)40-64歳	184	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.0
	(再掲)65歳以上	219	0.5	3.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	30.0
	(再掲)20歳以上*1	495	0.2	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	30.0
	(再掲)20歳以上*2	495	0.2	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	30.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介(練り製品)(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	9.4	30.4	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	82.5	156.7	156.7
	30-39歳	100	5.3	14.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	34.9	104.5	105.0
	40-49歳	132	4.4	16.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	33.3	127.8	150.0
	50-59歳	147	10.9	30.7	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	103.6	153.3	156.7
	60-69歳	197	11.9	26.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	32.3	63.8	133.9	192.0
	70歳以上	275	12.7	31.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	40.0	65.0	146.6	320.0
	(再掲)20-39歳	175	7.0	22.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	37.1	136.4	156.7
	(再掲)40-64歳	352	9.4	26.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	81.6	138.5	156.7
	(再掲)65歳以上	399	11.8	29.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	40.0	60.0	145.1	320.0
	(再掲)20歳以上*1	926	9.1	25.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	57.8	136.6	320.0
	(再掲)20歳以上*2	926	9.2	25.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	60.0	137.5	320.0
男性	20-29歳	35	1.9	6.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	26.4	28.7	28.7
	30-39歳	48	6.0	17.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	53.8	105.0	105.0
	40-49歳	61	4.2	15.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	37.4	190.0	150.0
	50-59歳	74	10.1	26.2	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	39.9	89.2	112.0	112.0
	60-69歳	89	16.0	34.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	53.5	107.1	192.0	192.0
	70歳以上	124	12.0	24.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	43.9	80.0	115.3	160.0
	(再掲)20-39歳	83	4.4	14.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	31.6	105.0	105.0
	(再掲)40-64歳	168	9.7	25.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	31.7	87.0	126.8	150.0
	(再掲)65歳以上	180	12.2	26.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	45.0	70.6	163.8	192.0
	(再掲)20歳以上*1	431	8.5	23.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	54.9	113.8	192.0
	(再掲)20歳以上*2	431	8.8	23.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	60.0	114.2	192.0
女性	20-29歳	40	15.5	39.7	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	70.8	129.1	156.7	156.7
	30-39歳	52	4.7	12.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	30.0	65.0	65.0
	40-49歳	71	4.6	16.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	34.5	130.0	130.0
	50-59歳	73	11.8	34.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	111.3	156.7	156.7
	60-69歳	108	8.7	18.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	40.0	124.5	130.0
	70歳以上	151	13.3	36.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	40.0	60.7	226.4	320.0
	(再掲)20-39歳	92	9.1	27.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	63.6	156.7	156.7
	(再掲)40-64歳	184	9.1	27.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	79.5	151.1	156.7
	(再掲)65歳以上	219	11.5	32.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	40.0	59.8	148.6	320.0
	(再掲)20歳以上*1	495	9.7	28.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	59.1	153.6	320.0
	(再掲)20歳以上*2	495	9.6	28.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	59.3	154.2	320.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚肉ハム、ソーセージ(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	100	0.5	4.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.8
	40-49歳	132	1.1	8.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	65.0
	50-59歳	147	1.0	7.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.9	65.0
	60-69歳	197	1.7	11.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5	150.0
	70歳以上	275	1.0	7.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	75.0
	(再掲)20-39歳	175	0.3	3.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	33.8
	(再掲)40-64歳	352	1.4	9.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5	150.0
	(再掲)65歳以上	399	1.0	8.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	100.0
	(再掲)20歳以上*1	926	1.0	7.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	150.0
	(再掲)20歳以上*2	926	0.9	7.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	150.0
男性	20-29歳	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	61	1.8	10.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0
	50-59歳	74	1.0	7.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0
	60-69歳	89	2.5	12.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	100.0	100.0
	70歳以上	124	0.9	7.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	75.0
	(再掲)20-39歳	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)40-64歳	168	1.5	9.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0
	(再掲)65歳以上	180	1.3	9.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	100.0
	(再掲)20歳以上*1	431	1.0	8.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.2	100.0
	(再掲)20歳以上*2	431	1.0	7.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.8	100.0
女性	20-29歳	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	52	0.0	5.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	33.8
	40-49歳	71	0.5	4.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	54.0
	50-59歳	73	1.0	6.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	60-69歳	108	1.1	11.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.0	150.0
	70歳以上	151	1.1	8.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	75.0
	(再掲)20-39歳	92	0.6	4.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	33.8
	(再掲)40-64歳	184	1.3	10.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	150.0
	(再掲)65歳以上	219	0.8	6.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1	75.0
	(再掲)20歳以上*1	495	0.9	7.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	150.0
	(再掲)20歳以上*2	495	0.9	7.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	150.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ハム、ソーセージ類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	16.8	19.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.5	40.0	58.6	115.0	115.0
	30-39歳	100	14.3	21.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	20.0	49.1	60.0	119.8	120.0
	40-49歳	132	16.4	23.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	54.0	80.0	85.3	93.3
	50-59歳	147	12.7	19.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	20.0	40.0	45.8	80.4	169.3
	60-69歳	197	14.3	24.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	41.9	63.8	135.3	165.0
	70歳以上	275	12.3	21.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	43.7	66.7	79.8	114.9
	(再掲)20-39歳	175	15.3	20.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	20.0	40.0	60.0	114.0	120.0
	(再掲)40-64歳	352	14.2	21.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.1	60.0	80.0	169.3
	(再掲)65歳以上	399	13.0	22.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	44.7	66.7	97.7	165.0
	(再掲)20歳以上*1	926	14.4	21.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	41.4	60.0	90.0	169.3
男性	(再掲)20歳以上*2	926	14.4	21.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.5	60.0	91.1	169.3
	20-29歳	35	19.0	19.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	32.7	40.0	53.7	115.0	115.0
	30-39歳	48	13.3	24.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	35.6	95.0	120.0	120.0
	40-49歳	61	16.8	23.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	53.5	74.9	90.0	90.0
	50-59歳	74	13.0	22.6	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	41.9	60.0	169.3	169.3
	60-69歳	89	19.3	28.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	30.0	58.8	81.1	136.0	136.0
	70歳以上	124	13.3	21.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	49.0	68.6	106.1	114.9
	(再掲)20-39歳	83	15.7	22.5	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	40.0	60.0	120.0	120.0
	(再掲)40-64歳	168	14.4	21.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	43.4	60.0	83.6	169.3
	(再掲)65歳以上	180	16.0	25.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	58.1	70.5	135.0	136.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	15.7	23.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	45.0	60.1	114.9	169.3
	(再掲)20歳以上*2	431	15.5	23.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	44.8	60.4	114.9	169.3
	20-29歳	40	15.0	18.8	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	30.0	40.0	61.3	72.8	72.8
	30-39歳	52	15.1	20.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	20.0	60.0	60.4	71.4	71.4
	40-49歳	71	16.0	23.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	53.3	80.0	93.3	93.3
	50-59歳	73	12.5	15.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	40.0	40.0	58.0	58.0
	60-69歳	108	10.4	19.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	40.0	44.7	153.8	165.0
	70歳以上	151	11.5	20.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	40.0	60.0	80.0	90.0
	(再掲)20-39歳	92	15.1	19.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	20.0	49.5	60.0	72.8	72.8
	(再掲)40-64歳	184	14.0	20.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	20.0	40.0	59.8	80.0	130.0
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	219	10.8	19.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	38.0	57.8	79.3	165.0
	(再掲)20歳以上*1	495	13.2	19.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	165.0
	(再掲)20歳以上*2	495	13.2	19.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	165.0
	(再掲)20歳以上*2	495	13.2	19.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	165.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

チーズ類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	3.6	5.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	14.3	17.9	25.0	25.0
	30-39歳	100	3.3	10.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	17.0	66.4	66.7
	40-49歳	132	4.4	9.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	18.5	20.0	48.2	50.0
	50-59歳	147	3.9	8.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	18.0	21.3	35.9	48.0
	60-69歳	197	3.1	8.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	19.8	56.7	72.0
	70歳以上	275	3.3	8.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	20.7	43.3	50.0
	(再掲)20-39歳	175	3.4	8.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	15.0	17.1	50.1	66.7
	(再掲)40-64歳	352	4.2	9.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	18.0	20.0	48.3	64.0
	(再掲)65歳以上	399	3.0	8.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	18.2	43.3	72.0
	(再掲)20歳以上*1	926	3.6	8.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	20.0	43.3	72.0
	(再掲)20歳以上*2	926	3.5	8.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	20.0	43.3	72.0
男性	20-29歳	35	4.3	7.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	17.5	18.0	25.0	25.0
	30-39歳	48	2.1	5.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	40-49歳	61	2.8	6.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	19.0	20.0	20.0
	50-59歳	74	3.5	9.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	35.0	48.0	48.0
	60-69歳	89	4.9	10.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	17.3	30.3	72.0	72.0
	70歳以上	124	2.8	8.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	20.1	48.4	50.0
	(再掲)20-39歳	83	3.0	6.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	15.0	17.3	25.0	25.0
	(再掲)40-64歳	168	3.6	7.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	15.8	20.0	35.7	48.0
	(再掲)65歳以上	180	3.1	9.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	21.4	50.0	72.0
	(再掲)20歳以上*1	431	3.3	8.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	18.0	38.3	72.0
	(再掲)20歳以上*2	431	3.3	8.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	18.0	39.2	72.0
女性	20-29歳	40	3.0	4.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	13.1	13.7	15.0	15.0
	30-39歳	52	4.2	12.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	28.1	66.7	66.7
	40-49歳	71	5.9	11.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	18.6	37.9	50.0	50.0
	50-59歳	73	4.3	7.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	18.0	19.8	36.0	36.0
	60-69歳	108	1.8	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	14.5	57.7	64.0
	70歳以上	151	3.7	9.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	24.8	42.6	43.3
	(再掲)20-39歳	92	3.7	10.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	17.8	66.7	66.7
	(再掲)40-64歳	184	4.8	9.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	18.0	20.0	41.6	64.0
	(再掲)65歳以上	219	2.9	8.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	18.0	41.6	43.3
	(再掲)20歳以上*1	495	3.8	9.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	20.0	47.4	66.7
	(再掲)20歳以上*2	495	3.8	9.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	20.0	47.9	66.7

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

和菓子類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	3.4	14.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	36.4	145.0	145.0
	30-39歳	100	4.2	19.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	23.2	149.9	150.0
	40-49歳	132	6.2	18.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	61.6	110.1	115.0
	50-59歳	147	9.9	28.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	84.6	161.9	202.0
	60-69歳	197	13.7	38.7	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	50.0	89.4	222.8	270.0
	70歳以上	275	18.5	42.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	60.0	102.2	257.0	270.0
	(再掲)20-39歳	175	3.9	17.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	23.2	144.9	150.0
	(再掲)40-64歳	352	9.0	26.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	65.0	156.5	202.0
	(再掲)65歳以上	399	17.4	42.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	51.6	100.0	263.0	270.0
	(再掲)20歳以上*1	926	9.7	30.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	65.0	152.5	270.0
	(再掲)20歳以上*2	926	9.7	30.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	65.0	152.1	270.0
男性	20-29歳	35	2.6	18.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	145.0	145.0
	30-39歳	48	0.5	3.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0
	40-49歳	61	6.6	18.9	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	63.1	100.0	100.0
	50-59歳	74	6.4	24.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	81.3	202.0	202.0
	60-69歳	89	11.5	32.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.1	86.6	170.0	170.0
	70歳以上	124	16.3	38.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	51.0	97.2	250.3	270.0
	(再掲)20-39歳	83	1.4	12.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.0	145.0
	(再掲)40-64歳	168	8.3	26.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	63.7	154.1	202.0
	(再掲)65歳以上	180	14.3	35.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	47.0	80.0	212.3	270.0
	(再掲)20歳以上*1	431	7.5	25.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	55.2	143.3	270.0
	(再掲)20歳以上*2	431	7.7	26.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	54.8	144.2	270.0
女性	20-29歳	40	4.1	11.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	39.8	45.0	45.0
	30-39歳	52	7.2	25.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	48.4	150.0	150.0
	40-49歳	71	5.8	17.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	30.0	115.0	115.0
	50-59歳	73	13.3	31.8	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	49.3	92.4	179.3	179.3
	60-69歳	108	15.4	43.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	50.0	101.9	264.7	270.0
	70歳以上	151	20.3	46.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	70.0	121.4	244.7	260.0
	(再掲)20-39歳	92	5.9	21.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	37.1	150.0	150.0
	(再掲)40-64歳	184	9.6	25.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	71.1	156.6	179.3
	(再掲)65歳以上	219	19.7	47.2	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	64.8	120.0	263.0	270.0
	(再掲)20歳以上*1	495	12.0	34.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	80.0	190.7	270.0
	(再掲)20歳以上*2	495	11.7	33.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	79.4	178.7	270.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ケーキ・パストリー類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	6.3	28.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	160.0	160.0
	30-39歳	100	4.9	19.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	148.6	150.0
	40-49歳	132	9.8	30.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.1	87.7	188.4	220.0
	50-59歳	147	5.4	18.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	123.0	125.0
	60-69歳	197	7.3	26.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	136.5	153.3
	70歳以上	275	4.3	18.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	104.5	127.5
	(再掲)20-39歳	175	5.5	23.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	156.6	160.0
	(再掲)40-64歳	352	8.5	27.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	70.3	138.3	220.0
	(再掲)65歳以上	399	4.3	18.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	100.0	127.5
	(再掲)20歳以上*1	926	6.3	24.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	131.1	220.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	6.1	23.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	128.9	220.0
	20-29歳	35	12.9	41.9	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	119.8	160.0	160.0
	30-39歳	48	0.6	4.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0
	40-49歳	61	4.4	25.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	220.0	220.0
	50-59歳	74	6.3	19.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	51.3	122.0	122.0
	60-69歳	89	5.2	20.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	120.0	120.0
	70歳以上	124	3.9	17.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	109.3	127.5
	(再掲)20-39歳	83	5.6	27.5	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	160.0	160.0
	(再掲)40-64歳	168	5.9	23.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	126.7	220.0
	(再掲)65歳以上	180	3.8	16.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	96.7	127.5
女性	(再掲)20歳以上*1	431	5.2	23.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	140.5	220.0
	(再掲)20歳以上*2	431	5.1	22.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	138.4	220.0
	20-29歳	40	1.0	5.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	30.0	30.0
	30-39歳	52	8.3	26.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.3	90.4	150.0	150.0
	40-49歳	71	15.1	34.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	101.7	150.0	150.0
	50-59歳	73	4.6	17.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	125.0	125.0
	60-69歳	108	9.0	29.7	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	90.8	151.7	153.3
	70歳以上	151	4.7	18.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	119.9	127.5
	(再掲)20-39歳	92	5.3	20.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	150.0	150.0
	(再掲)40-64歳	184	11.0	30.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	100.0	150.7	153.3
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	(再掲)65歳以上	219	4.7	19.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	112.4	127.5
	(再掲)20歳以上*1	495	7.3	24.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	62.2	126.5	153.3
	(再掲)20歳以上*2	495	7.2	24.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	60.0	126.0	153.3
	(再掲)20歳以上*2	495	7.2	24.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	60.0	126.0	153.3

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビスケット類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	2.2	7.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	20.3	46.2	46.2
	30-39歳	100	2.2	7.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	19.4	41.9	42.0
	40-49歳	132	2.8	9.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	63.5	75.0
	50-59歳	147	0.8	3.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	20.0	30.0
	60-69歳	197	0.5	2.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	30.0
	70歳以上	275	3.2	9.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	20.0	50.0	58.0
	(再掲)20-39歳	175	2.2	7.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	20.0	43.2	46.2
	(再掲)40-64歳	352	1.5	6.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	35.6	75.0
	(再掲)65歳以上	399	2.5	8.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	50.0	58.0
	(再掲)20歳以上*1	926	1.9	7.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	40.3	75.0
	(再掲)20歳以上*2	926	1.9	7.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	40.1	75.0
男性	20-29歳	35	1.5	8.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	46.2	46.2
	30-39歳	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40-49歳	61	3.5	11.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	29.2	75.0	75.0
	50-59歳	74	0.3	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
	60-69歳	89	0.6	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	20.0	20.0
	70歳以上	124	1.5	5.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	15.5	30.0	30.0
	(再掲)20-39歳	83	0.6	5.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	46.2
	(再掲)40-64歳	168	1.5	7.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	38.0	75.0
	(再掲)65歳以上	180	1.4	4.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	20.0	30.0
	(再掲)20歳以上*1	431	1.2	6.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	37.8	75.0
	(再掲)20歳以上*2	431	1.2	5.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	37.0	75.0
女性	20-29歳	40	2.7	6.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	22.5	26.6	26.6
	30-39歳	52	4.0	9.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	31.4	42.0	42.0
	40-49歳	71	2.2	8.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	75.0	75.0
	50-59歳	73	1.4	4.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	10.0	30.0	30.0
	60-69歳	108	0.5	2.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	28.0	30.0
	70歳以上	151	4.5	11.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	29.0	54.8	58.0
	(再掲)20-39歳	92	3.4	8.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	26.2	42.0	42.0
	(再掲)40-64歳	184	1.5	5.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	29.5	75.0
	(再掲)65歳以上	219	3.3	9.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	24.1	50.8	58.0
	(再掲)20歳以上*1	495	2.6	8.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	41.9	75.0
	(再掲)20歳以上*2	495	2.6	8.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	41.6	75.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

キャンデー類(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.3	3.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	30-39歳	100	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	12.0
	40-49歳	132	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0
	50-59歳	147	0.4	3.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	30.0
	60-69歳	197	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	70歳以上	275	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	7.0
	(再掲)20-39歳	175	0.2	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	50.0
	(再掲)40-64歳	352	0.2	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	30.0
	(再掲)65歳以上	399	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	10.0
	(再掲)20歳以上*1	926	0.1	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	50.0
	(再掲)20歳以上*2	926	0.1	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	50.0
男性	20-29歳	35	0.5	4.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	30-39歳	48	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
	40-49歳	61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50-59歳	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60-69歳	89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳以上	124	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.8
	(再掲)20-39歳	83	0.2	3.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	(再掲)40-64歳	168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(再掲)65歳以上	180	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
	(再掲)20歳以上*1	431	0.1	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	(再掲)20歳以上*2	431	0.1	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
女性	20-29歳	40	0.2	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
	30-39歳	52	0.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
	40-49歳	71	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
	50-59歳	73	0.9	5.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0
	60-69歳	108	0.1	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	10.0
	70歳以上	151	0.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	7.0
	(再掲)20-39歳	92	0.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
	(再掲)40-64歳	184	0.4	3.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	30.0
	(再掲)65歳以上	219	0.1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	10.0
	(再掲)20歳以上*1	495	0.2	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	30.0
	(再掲)20歳以上*2	495	0.2	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	30.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

日本酒(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	2.5	4.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.0	15.0	30.0	30.0
	30-39歳	100	9.3	29.8	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	15.0	38.3	149.7	150.0
	40-49歳	132	3.4	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	10.1	16.2	47.4	50.0
	50-59歳	147	13.8	66.1	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	14.5	30.2	46.7	500.0
	60-69歳	197	8.3	32.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	13.0	20.3	197.5	390.0
	70歳以上	275	12.3	43.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	13.5	84.4	213.8	364.5
	(再掲)20-39歳	175	6.6	23.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	13.5	23.9	129.6	150.0
	(再掲)40-64歳	352	8.1	44.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	11.0	15.8	298.7	500.0
	(再掲)65歳以上	399	11.8	42.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	14.6	37.8	200.0	390.0
	(再掲)20歳以上*1	926	8.8	38.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	13.0	22.5	185.7	500.0
	(再掲)20歳以上*2	926	9.2	39.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	13.1	22.9	195.6	500.0
男性	20-29歳	35	2.5	5.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	10.9	15.0	30.0	30.0
	30-39歳	48	16.2	43.1	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	49.4	112.6	150.0	150.0
	40-49歳	61	3.8	10.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	12.1	32.3	90.0	50.0
	50-59歳	74	25.0	92.6	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	15.0	261.9	500.0	500.0
	60-69歳	89	9.1	38.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	14.8	19.5	390.0	390.0
	70歳以上	124	22.0	61.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	92.6	184.5	349.0	364.5
	(再掲)20-39歳	83	10.6	33.8	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	15.0	69.3	150.0	150.0
	(再掲)40-64歳	168	13.1	62.4	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	12.3	30.6	452.9	500.0
	(再掲)65歳以上	180	19.6	58.3	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	27.5	180.0	341.7	390.0
	(再掲)20歳以上*1	431	13.4	51.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	15.0	103.5	311.2	500.0
	(再掲)20歳以上*2	431	14.0	53.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	15.0	133.8	329.3	500.0
女性	20-29歳	40	2.6	3.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.0	5.9	7.1	22.5	22.5
	30-39歳	52	3.9	7.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	14.2	22.8	33.1	33.1
	40-49歳	71	3.1	4.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.2	15.5	19.3	19.3
	50-59歳	73	2.7	6.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	7.9	14.8	31.5	31.5
	60-69歳	108	7.7	27.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	13.0	30.0	193.3	200.0
	70歳以上	151	4.4	12.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	11.2	20.8	84.7	100.0
	(再掲)20-39歳	92	3.3	6.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.8	15.0	33.1	33.1
	(再掲)40-64歳	184	3.1	6.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.7	15.0	31.5	50.0
	(再掲)65歳以上	219	5.8	20.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.3	20.8	130.0	200.0
	(再掲)20歳以上*1	495	4.2	14.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.4	15.5	40.0	200.0
	(再掲)20歳以上*2	495	4.2	14.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	10.3	15.4	38.4	200.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビール(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	18.1	78.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	354.0	354.0
	30-39歳	100	70.0	245.8	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	311.5	354.0	2014.5	2020.0
	40-49歳	132	89.4	262.7	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	505.0	1617.0	1666.0
	50-59歳	147	88.2	218.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	624.2	1062.0	1062.0
	60-69歳	197	68.9	182.5	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	505.0	924.1	1010.0
	70歳以上	275	47.1	160.9	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.1	354.0	936.2	1278.0
	(再掲)20-39歳	175	48.9	196.9	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.9	354.0	1619.4	2020.0
	(再掲)40-64歳	352	81.7	229.7	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	505.0	1062.0	1666.0
	(再掲)65歳以上	399	55.9	168.7	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	354.0	838.3	1278.0
	(再掲)20歳以上*1	926	68.1	210.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	354.0	1020.0	2020.0
男性	(再掲)20歳以上*2	926	68.0	209.4	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	354.0	1010.0	2020.0
	20-29歳	35	29.9	99.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.6	354.0	354.0	354.0
	30-39歳	48	127.8	349.8	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	920.4	2020.0	2020.0
	40-49歳	61	140.3	337.6	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.8	436.2	1069.8	1666.0	1666.0
	50-59歳	74	163.3	284.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.6	598.1	845.9	1062.0	1062.0
	60-69歳	89	137.1	249.9	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	280.7	505.0	732.7	1010.0	1010.0
	70歳以上	124	83.9	213.9	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	505.0	1278.0	1278.0
	(再掲)20-39歳	83	87.8	279.4	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	354.0	2020.0	2020.0
	(再掲)40-64歳	168	141.0	297.6	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.0	505.0	708.0	1562.8	1666.0
	(再掲)65歳以上	180	105.1	227.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	654.4	1209.8	1278.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	115.5	275.7	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	708.0	1506.9	2020.0
	(再掲)20歳以上*2	431	115.1	273.2	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	708.0	1473.0	2020.0
	20-29歳	40	8.6	55.2	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	354.0
	30-39歳	52	23.5	82.3	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	272.4	354.0	354.0
	40-49歳	71	39.7	145.4	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	1010.0	1010.0
	50-59歳	73	14.0	66.2	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	354.0	354.0
	60-69歳	108	15.9	67.4	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.6	354.0	354.0
	70歳以上	151	17.0	88.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	565.7	708.0
	(再掲)20-39歳	92	17.4	72.5	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.8	354.0	354.0
	(再掲)40-64歳	184	22.8	103.1	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	296.4	636.8	1010.0
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	219	17.8	84.8	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.5	390.8	708.0
	(再掲)20歳以上*1	495	20.2	90.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.5	354.0	1010.0
	(再掲)20歳以上*2	495	19.8	88.5	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.5	354.0	1010.0
	(再掲)20歳以上*2	495	19.8	88.5	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.5	354.0	1010.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

洋酒・その他(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	100	36.2	133.2	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	186.6	200.0	1027.4	1028.0
	40-49歳	132	54.1	138.1	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	350.2	639.5	642.8
	50-59歳	147	54.1	202.2	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.0	397.7	1293.7	1500.0
	60-69歳	197	59.8	175.6	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.0	494.0	853.3	906.0
	70歳以上	275	36.5	139.4	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4	258.0	891.8	1281.0
	(再掲)20-39歳	175	21.4	103.8	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	194.4	934.1	1028.0
	(再掲)40-64歳	352	50.5	166.8	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.0	353.5	710.4	1500.0
	(再掲)65歳以上	399	46.6	157.7	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.3	360.0	891.7	1281.0
	(再掲)20歳以上*1	926	42.9	150.4	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.9	350.0	814.2	1500.0
	(再掲)20歳以上*2	926	43.5	152.9	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	350.0	844.7	1500.0
男性	20-29歳	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	48	61.5	188.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	193.8	451.0	1028.0	1028.0
	40-49歳	61	82.6	167.1	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	350.0	507.3	642.8	642.8
	50-59歳	74	61.1	163.0	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	338.8	426.4	734.0	734.0
	60-69歳	89	100.5	213.4	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.3	469.0	695.2	906.0	906.0
	70歳以上	124	77.5	200.2	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	349.2	504.8	1179.2	1281.0
	(再掲)20-39歳	83	36.4	147.5	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.1	197.4	1028.0	1028.0
	(再掲)40-64歳	168	68.7	165.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	475.7	710.1	734.0
	(再掲)65歳以上	180	90.7	210.1	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.2	355.7	551.2	989.2	1281.0
	(再掲)20歳以上*1	431	66.3	176.3	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.6	465.4	902.9	1281.0
	(再掲)20歳以上*2	431	66.4	177.7	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.2	464.3	904.3	1281.0
女性	20-29歳	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	52	15.9	52.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	154.9	200.0	200.0
	40-49歳	71	26.3	95.7	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	350.0	629.0	629.0
	50-59歳	73	47.1	235.5	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	233.8	1500.0	1500.0
	60-69歳	108	28.2	132.1	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.0	818.3	836.0
	70歳以上	151	3.0	15.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	114.9	150.0
	(再掲)20-39歳	92	9.4	41.2	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.9	200.0	200.0
	(再掲)40-64歳	184	32.4	166.5	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	212.6	1114.5	1500.0
	(再掲)65歳以上	219	12.6	86.4	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	557.7	836.0
	(再掲)20歳以上*1	495	19.4	114.2	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.7	508.8	1500.0
	(再掲)20歳以上*2	495	20.0	118.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.6	631.1	1500.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ソース(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	4.0	7.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	16.0	20.0	41.3	41.3
	30-39歳	100	1.2	3.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	15.0	40.1	41.3
	40-49歳	132	2.4	6.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	15.6	38.9	56.3
	50-59歳	147	1.0	3.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.8	28.8	34.0
	60-69歳	197	1.8	4.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	13.9	17.0	17.0
	70歳以上	275	1.8	5.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	17.0	20.5	51.0
	(再掲)20-39歳	175	2.3	5.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	10.0	15.0	37.7	41.3
	(再掲)40-64歳	352	1.8	5.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	13.0	29.6	56.3
	(再掲)65歳以上	399	1.7	5.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	15.0	20.0	51.0
	(再掲)20歳以上*1	926	2.1	5.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	15.0	26.2	56.3
男性	(再掲)20歳以上*2	926	2.0	5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	15.0	26.1	56.3
	20-29歳	35	6.7	8.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	11.0	20.0	24.0	27.0	27.0
	30-39歳	48	2.1	4.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	15.0	15.0	15.0	15.0
	40-49歳	61	3.6	7.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	11.6	23.1	56.3	56.3
	50-59歳	74	0.9	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.0	20.0	20.0
	60-69歳	89	2.0	4.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	8.0	13.8	17.0	17.0
	70歳以上	124	2.5	6.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	17.3	44.0	51.0
	(再掲)20-39歳	83	4.0	6.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	15.0	20.0	27.0	27.0
	(再掲)40-64歳	168	2.3	5.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.5	14.5	31.4	56.3
	(再掲)65歳以上	180	2.2	5.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	17.0	30.2	51.0
女性	(再掲)20歳以上*1	431	2.8	6.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	17.0	26.8	56.3
	(再掲)20歳以上*2	431	2.8	6.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	17.0	26.7	56.3
	20-29歳	40	1.7	6.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	11.8	41.3	41.3
	30-39歳	52	0.5	2.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.6	41.3	41.3
	40-49歳	71	1.2	3.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	7.0	41.3	41.3
	50-59歳	73	1.1	4.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9.8	34.0	34.0
	60-69歳	108	1.6	4.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	17.0	17.0	17.0
	70歳以上	151	1.4	4.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	15.5	20.5	41.3
	(再掲)20-39歳	92	1.0	4.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.7	41.3	41.3
	(再掲)40-64歳	184	1.3	4.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	8.4	28.2	41.3
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	219	1.4	4.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	14.2	17.0	41.3
	(再掲)20歳以上*1	495	1.3	4.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.0	17.0	41.3
	(再掲)20歳以上*2	495	1.2	4.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.0	17.2	41.3
	(再掲)20歳以上*2	495	1.2	4.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.0	17.2	41.3

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

しょうゆ(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	10.1	9.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.7	12.4	24.2	29.5	60.0	60.0
	30-39歳	100	10.5	10.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	9.0	14.9	27.0	29.9	80.3	80.6
	40-49歳	132	11.2	11.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	18.0	26.7	31.9	50.6	53.2
	50-59歳	147	13.3	12.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.1	19.7	29.5	36.8	57.9	61.3
	60-69歳	197	14.1	12.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.7	5.3	10.5	20.0	31.2	38.3	58.1	68.0
	70歳以上	275	11.4	10.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	9.0	16.9	24.0	28.5	51.7	56.1
	(再掲)20-39歳	175	10.3	10.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	8.8	13.7	25.3	29.4	60.0	80.6
	(再掲)40-64歳	352	12.7	11.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.0	19.2	27.9	36.0	50.3	61.3
	(再掲)65歳以上	399	12.1	11.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	9.4	18.0	26.6	34.4	55.4	68.0
	(再掲)20歳以上*1	926	11.9	11.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	9.0	18.0	27.0	34.3	52.2	80.6
	(再掲)20歳以上*2	926	12.0	11.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	9.0	18.0	27.0	34.3	52.2	80.6
男性	20-29歳	35	12.1	10.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.6	19.2	26.9	32.3	60.0	60.0
	30-39歳	48	12.1	11.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.0	15.0	29.9	36.5	70.6	70.6
	40-49歳	61	10.4	11.7	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	18.1	27.0	34.2	53.2	53.2
	50-59歳	74	16.2	13.3	1.8	0.0	0.0	0.0	1.9	4.5	15.0	23.2	36.0	41.7	61.3	61.3
	60-69歳	89	16.5	13.7	2.1	0.0	0.0	0.0	2.0	7.5	13.2	22.8	34.3	43.5	68.0	68.0
	70歳以上	124	12.3	9.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	10.6	18.0	25.9	31.7	47.7	48.6
	(再掲)20-39歳	83	12.1	11.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.0	18.0	28.8	33.7	70.6	70.6
	(再掲)40-64歳	168	14.0	12.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	12.0	20.4	30.0	36.0	56.3	61.3
	(再掲)65歳以上	180	13.4	11.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	10.6	19.0	27.4	35.8	58.5	68.0
	(再掲)20歳以上*1	431	13.2	12.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.7	19.3	28.8	36.0	60.4	70.6
	(再掲)20歳以上*2	431	13.3	12.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.8	19.5	29.0	36.0	60.4	70.6
女性	20-29歳	40	8.4	8.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.5	11.4	22.2	27.9	60.0	60.0
	30-39歳	52	9.2	9.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.9	3.9	23.0	27.1	80.6	80.6
	40-49歳	71	12.0	10.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	12.1	17.9	24.0	31.6	42.0	42.0
	50-59歳	73	10.4	10.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.9	17.7	27.2	30.7	45.0	45.0
	60-69歳	108	12.2	11.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.6	17.6	27.6	38.0	47.4	47.7
	70歳以上	151	10.7	10.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.1	14.0	22.5	28.5	54.8	56.1
	(再掲)20-39歳	92	8.9	9.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.5	12.1	21.9	27.0	80.6	80.6
	(再掲)40-64歳	184	11.5	10.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9.0	17.9	24.0	31.1	45.9	47.7
	(再掲)65歳以上	219	11.0	10.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	8.5	15.0	24.2	33.4	53.2	56.1
	(再掲)20歳以上*1	495	10.6	10.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	8.8	15.9	24.0	29.4	46.5	80.6
	(再掲)20歳以上*2	495	10.6	10.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	8.8	15.9	24.0	29.3	46.2	80.6

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	1.2	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.5	2.5	3.0	5.0	5.0
	30-39歳	100	1.6	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.3	3.4	5.1	10.6	10.7
	40-49歳	132	1.4	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	2.2	3.5	4.1	5.5	6.1
	50-59歳	147	1.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	2.2	3.1	4.0	7.6	8.0
	60-69歳	197	1.3	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.7	2.9	3.8	8.8	9.2
	70歳以上	275	1.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	2.8	3.6	5.9	6.1
	(再掲)20-39歳	175	1.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	7.1	10.7
	(再掲)40-64歳	352	1.4	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	2.2	3.1	3.9	6.1	8.2
	(再掲)65歳以上	399	1.2	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.5	2.9	3.7	5.9	9.2
	(再掲)20歳以上*1	926	1.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.0	3.0	3.9	5.9	10.7
男性	(再掲)20歳以上*2	926	1.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.0	3.0	3.9	5.9	10.7
	20-29歳	35	1.3	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.4	1.5	2.4	3.8	5.0	5.0
	30-39歳	48	1.8	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	2.8	3.4	5.0	10.7	10.7
	40-49歳	61	1.6	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	2.4	4.1	4.3	6.1	6.1
	50-59歳	74	1.7	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	2.6	3.2	4.5	7.4	7.4
	60-69歳	89	1.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.9	3.1	4.6	9.2	9.2
	70歳以上	124	1.3	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.7	2.9	3.7	6.0	6.1
	(再掲)20-39歳	83	1.6	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	2.2	3.4	4.2	10.7	10.7
	(再掲)40-64歳	168	1.6	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	2.3	3.3	4.2	6.5	7.4
	(再掲)65歳以上	180	1.3	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.7	3.2	4.1	7.4	9.2
女性	(再掲)20歳以上*1	431	1.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	2.2	3.4	4.2	6.2	10.7
	(再掲)20歳以上*2	431	1.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	2.2	3.3	4.2	6.4	10.7
	20-29歳	40	1.1	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.8	2.7	3.0	3.5	3.5
	30-39歳	52	1.4	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	2.0	3.0	5.2	7.1	7.1
	40-49歳	71	1.2	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.8	3.1	3.7	3.9	3.9
	50-59歳	73	1.3	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.7	3.1	3.7	8.0	8.0
	60-69歳	108	1.1	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.4	2.6	3.6	8.5	8.6
	70歳以上	151	1.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	2.8	3.5	5.5	5.9
	(再掲)20-39歳	92	1.3	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.9	3.0	3.7	7.1	7.1
	(再掲)40-64歳	184	1.2	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.8	3.0	3.7	7.8	8.2
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	219	1.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	2.7	3.5	5.7	8.6
	(再掲)20歳以上*1	495	1.2	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.7	3.0	3.5	5.8	8.6
	(再掲)20歳以上*2	495	1.2	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.7	3.0	3.5	5.9	8.6
	(再掲)20歳以上*2	495	1.2	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.7	3.0	3.5	5.9	8.6

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

マヨネーズ(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	2.9	5.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	11.6	12.0	26.3	26.3
	30-39歳	100	3.9	6.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	15.0	19.1	34.9	35.0
	40-49歳	132	3.8	7.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	15.0	18.8	34.3	36.0
	50-59歳	147	3.7	6.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	12.0	20.0	24.0	48.0
	60-69歳	197	2.9	5.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.4	14.4	24.5	30.0
	70歳以上	275	3.5	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	12.0	18.0	24.5	66.7
	(再掲)20-39歳	175	3.5	6.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.1	15.0	29.1	35.0
	(再掲)40-64歳	352	3.5	6.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	12.0	18.8	31.0	48.0
	(再掲)65歳以上	399	3.4	6.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.0	18.0	24.0	66.7
	(再掲)20歳以上*1	926	3.5	6.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.0	17.6	26.4	66.7
	(再掲)20歳以上*2	926	3.5	6.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.0	17.5	24.9	66.7
男性	20-29歳	35	2.5	4.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.3	11.5	24.0	24.0
	30-39歳	48	5.2	8.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	16.0	20.0	35.0	35.0
	40-49歳	61	5.4	9.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	18.8	26.3	36.0	36.0
	50-59歳	74	3.3	6.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0	20.3	48.0	48.0
	60-69歳	89	2.7	5.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	11.0	14.9	23.3	23.3
	70歳以上	124	4.0	6.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	16.1	22.0	24.0	33.3
	(再掲)20-39歳	83	4.1	6.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	15.0	18.6	35.0	35.0
	(再掲)40-64歳	168	3.8	7.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	14.8	19.0	33.8	48.0
	(再掲)65歳以上	180	3.8	6.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	14.9	21.8	24.0	33.3
	(再掲)20歳以上*1	431	3.9	7.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	15.0	18.9	33.8	48.0
	(再掲)20歳以上*2	431	3.9	6.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	15.0	18.9	33.7	48.0
女性	20-29歳	40	3.2	5.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	12.0	16.1	26.3	26.3
	30-39歳	52	2.8	5.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	12.9	15.0	21.5	27.5
	40-49歳	71	2.2	4.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.1	12.0	19.2	19.2
	50-59歳	73	4.2	6.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	12.0	24.0	24.0	24.0
	60-69歳	108	3.1	5.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	11.8	12.0	29.1	30.0
	70歳以上	151	3.1	6.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0	17.6	28.3	66.7
	(再掲)20-39歳	92	3.0	5.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	12.0	15.0	27.5	27.5
	(再掲)40-64歳	184	3.1	5.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	12.0	15.0	25.3	30.0
	(再掲)65歳以上	219	3.2	5.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	12.0	15.8	24.9	66.7
	(再掲)20歳以上*1	495	3.1	5.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0	15.0	24.0	66.7
	(再掲)20歳以上*2	495	3.1	5.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0	15.0	24.0	66.7

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

味噌(g)	性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数		20-29歳	75	10.7	9.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	18.0	19.4	28.8	45.0	45.0
		30-39歳	100	11.2	13.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	19.2	28.0	34.8	54.0	54.0
		40-49歳	132	9.2	10.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	15.0	23.1	31.3	49.0	50.0
		50-59歳	147	11.0	12.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	18.0	27.1	34.3	55.8	59.8
		60-69歳	197	9.3	9.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	16.1	24.0	27.7	36.5	45.0
		70歳以上	275	12.0	11.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	16.0	27.0	36.0	39.7	105.0
		(再掲)20-39歳	175	11.0	11.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	18.0	26.7	33.9	53.7	54.0
		(再掲)40-64歳	352	10.1	11.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	17.1	24.9	30.0	49.2	59.8
		(再掲)65歳以上	399	11.1	11.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	16.0	27.0	36.0	39.7	105.0
		(再掲)20歳以上*1	926	10.7	11.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	17.1	26.0	34.8	45.3	105.0
		(再掲)20歳以上*2	926	10.7	11.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	17.1	26.0	34.8	45.0	105.0
男性		20-29歳	35	10.9	8.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	18.0	19.4	21.9	35.0	35.0
		30-39歳	48	12.0	14.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	18.8	33.5	38.7	54.0	54.0
		40-49歳	61	11.7	12.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	14.8	31.4	42.9	50.0	50.0
		50-59歳	74	13.0	13.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	19.5	27.9	35.9	59.8	59.8
		60-69歳	89	10.2	9.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	16.3	22.7	30.0	45.0	45.0
		70歳以上	124	12.7	13.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	16.2	27.0	36.0	93.0	105.0
		(再掲)20-39歳	83	11.5	12.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	18.1	27.2	34.8	54.0	54.0
		(再掲)40-64歳	168	11.9	12.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	18.0	28.0	36.0	56.7	59.8
		(再掲)65歳以上	180	12.1	12.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	16.2	27.0	36.0	69.6	105.0
		(再掲)20歳以上*1	431	11.8	12.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	18.0	27.2	35.0	53.9	105.0
		(再掲)20歳以上*2	431	11.8	12.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	18.0	27.0	35.2	54.0	105.0
女性		20-29歳	40	10.6	10.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	15.8	19.5	34.0	45.0	45.0
		30-39歳	52	10.5	11.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	24.3	27.0	28.3	44.8	44.8
		40-49歳	71	6.8	7.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	13.6	17.6	18.7	26.4	26.4
		50-59歳	73	9.0	10.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	21.1	30.0	39.6	39.6
		60-69歳	108	8.5	10.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	15.3	24.0	28.3	36.0	36.7
		70歳以上	151	11.5	10.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	16.0	26.9	36.0	39.5	39.7
		(再掲)20-39歳	92	10.6	11.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	18.0	27.0	29.0	45.0	45.0
		(再掲)40-64歳	184	8.4	9.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	16.7	21.1	25.8	36.7	39.6
		(再掲)65歳以上	219	10.4	10.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	15.0	27.0	34.9	39.3	39.7
		(再掲)20歳以上*1	495	9.5	10.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	16.2	25.0	27.3	39.0	45.0
		(再掲)20歳以上*2	495	9.6	10.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	16.2	25.0	27.3	39.0	45.0

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の調味料(g)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	75	77.6	75.1	15.5	1.1	1.2	1.9	9.4	21.2	43.0	170.1	195.6	211.8	236.1	236.1
	30-39歳	100	68.8	81.5	8.7	0.0	0.0	2.6	7.5	20.7	30.6	116.7	212.5	221.6	474.8	477.3
	40-49歳	132	93.5	103.8	12.6	0.0	0.0	3.8	7.7	18.5	38.4	149.3	233.8	274.1	520.6	547.4
	50-59歳	147	84.3	101.3	11.0	0.0	0.1	3.9	8.0	19.6	41.3	117.5	217.7	308.8	467.0	479.0
	60-69歳	197	88.3	107.1	10.8	0.0	0.0	6.3	11.4	25.0	43.5	98.7	242.3	272.1	532.5	688.2
	70歳以上	275	72.9	106.1	10.7	0.0	0.0	1.5	3.7	12.5	31.0	82.9	234.0	301.7	493.2	713.2
	(再掲)20-39歳	175	72.4	78.9	9.4	0.0	0.0	2.4	8.9	21.2	35.3	122.9	209.1	218.0	291.2	477.3
	(再掲)40-64歳	352	85.0	98.0	7.9	0.0	0.0	3.9	8.1	20.1	41.0	126.1	221.8	274.7	459.5	547.4
	(再掲)65歳以上	399	80.1	110.8	9.7	0.0	0.0	1.8	4.4	15.0	34.9	90.9	241.9	302.4	554.2	713.2
	(再掲)20歳以上*1	926	80.8	97.9	5.6	0.0	0.0	2.4	7.5	19.0	37.1	114.5	218.1	270.3	447.3	713.2
男性	(再掲)20歳以上*2	926	80.5	97.7	5.7	0.0	0.0	2.4	7.5	19.3	37.2	112.0	215.6	270.3	447.8	713.2
	20-29歳	35	89.2	82.3	17.9	1.8	1.8	1.9	4.7	21.2	37.6	177.5	209.8	218.1	236.1	236.1
	30-39歳	48	58.4	79.5	9.9	0.0	0.0	0.7	7.0	16.9	26.8	67.6	159.5	200.7	477.3	477.3
	40-49歳	61	109.9	119.9	23.5	0.3	0.4	3.4	5.6	15.9	56.8	185.0	267.3	326.6	547.4	547.4
	50-59歳	74	100.2	102.3	12.3	0.6	0.6	6.2	11.2	18.0	49.2	188.2	276.4	309.8	418.6	418.6
	60-69歳	89	87.5	92.8	12.6	0.0	1.6	4.6	9.4	27.4	46.2	118.8	242.3	294.1	381.0	381.0
	70歳以上	124	83.8	120.6	16.2	0.0	0.0	3.2	4.0	12.6	36.4	91.8	259.0	338.7	665.6	713.2
	(再掲)20-39歳	83	71.0	81.6	9.8	0.0	0.0	1.9	7.3	21.2	29.2	124.0	178.9	212.0	477.3	477.3
	(再掲)40-64歳	168	101.2	106.3	13.1	0.3	0.7	6.0	8.1	18.9	54.0	185.7	259.0	299.4	483.1	547.4
	(再掲)65歳以上	180	85.1	115.6	12.0	0.0	0.0	3.3	4.5	18.0	36.7	92.6	245.7	354.1	572.8	713.2
女性	(再掲)20歳以上*1	431	87.4	102.3	7.1	0.0	0.0	3.4	6.8	19.8	37.5	146.2	229.3	278.6	452.1	713.2
	(再掲)20歳以上*2	431	86.5	102.0	7.0	0.0	0.0	3.4	6.8	19.8	37.4	140.2	226.6	278.9	445.1	713.2
	20-29歳	40	68.1	68.3	17.9	1.1	1.1	1.3	11.0	18.8	45.2	80.8	190.9	210.2	236.1	236.1
	30-39歳	52	77.2	82.9	13.1	0.0	0.0	2.6	7.7	21.0	36.4	144.1	216.9	224.3	270.3	270.3
	40-49歳	71	77.5	82.9	11.4	0.0	0.0	1.2	8.6	20.7	36.2	110.0	216.6	230.9	434.5	434.5
	50-59歳	73	68.6	98.5	14.7	0.0	0.0	1.6	5.2	19.9	34.5	62.3	153.7	343.1	479.0	479.0
	60-69歳	108	88.8	117.5	13.4	0.0	0.0	6.1	11.4	23.0	39.5	96.0	242.4	270.7	654.8	688.2
	70歳以上	151	64.1	91.9	9.9	0.0	0.0	1.3	2.1	12.5	29.9	72.9	181.8	289.9	440.5	506.0
	(再掲)20-39歳	92	73.5	77.0	11.9	0.0	1.1	2.5	9.1	20.6	38.1	116.4	212.4	220.1	270.3	270.3
	(再掲)40-64歳	184	69.0	86.3	7.6	0.0	0.0	1.2	7.7	20.1	35.9	74.9	205.4	224.7	464.4	479.0
注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。	(再掲)65歳以上	219	76.2	107.0	9.2	0.0	0.0	1.5	3.7	14.0	32.0	86.6	240.5	292.2	554.6	688.2
	(再掲)20歳以上*1	495	74.1	92.9	5.8	0.0	0.0	1.8	7.6	18.7	36.2	92.3	212.8	246.7	446.5	688.2
	(再掲)20歳以上*2	495	74.3	92.9	6.1	0.0	0.0	1.9	7.7	19.0	36.6	92.3	212.8	244.3	449.1	688.2
	(再掲)20歳以上*2	495	74.3	92.9	6.1	0.0	0.0	1.9	7.7	19.0	36.6	92.3	212.8	244.3	449.1	688.2

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別食塩摂取量(20歳以上・年齢階級別)

食塩相当量(g)(20歳以上、男女計)(n=926)

	平均	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル									
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99	
食塩相当量	10.19	3.63	0.17	2.95	5.02	5.87	7.62	9.95	12.18	15.11	17.07	20.52	
穀類	0.98	1.20	0.07	0.00	0.01	0.01	0.07	0.77	1.34	2.01	3.02	6.76	
漬け物	0.41	0.91	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	1.14	2.40	4.37	
魚介類	0.66	0.86	0.06	0.00	0.00	0.00	0.08	0.34	0.92	1.79	2.33	4.08	
生魚介類	0.14	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.18	0.42	0.54	0.95	
魚介加工品	0.53	0.83	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.78	1.56	2.14	4.04	
肉類	0.39	0.49	0.02	0.00	0.00	0.01	0.05	0.19	0.58	1.07	1.38	2.29	
ハム、ソーセージ類	0.32	0.48	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.02	1.27	2.17	
乳類	0.27	0.36	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.37	0.68	1.14	1.57	
ソース	0.13	0.34	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.95	1.75	
しょうゆ	1.65	1.57	0.10	0.00	0.00	0.00	0.43	1.29	2.47	3.82	4.65	7.52	
塩	1.34	1.35	0.07	0.00	0.00	0.00	0.33	0.99	1.98	3.01	3.84	5.86	
マヨネーズ	0.08	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.29	0.42	0.70	
味噌	1.24	1.34	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	2.01	3.20	3.82	5.23	
その他の調味料	2.40	2.16	0.23	0.00	0.02	0.30	0.85	1.87	3.18	4.95	6.96	9.69	
その他の食品	0.63	0.48	0.02	0.05	0.12	0.17	0.29	0.47	0.80	1.35	1.69	2.21	
海藻類	0.15	0.26	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.18	0.48	0.77	1.08	
菓子類	0.14	0.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.47	0.84	1.65	

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

食品群別食塩摂取量(20歳以上性・年齢階級別)

食塩相当量(g)(20歳以上、男性)(n=431)

	平均	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル									
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99	
食塩相当量	10.99	3.69	0.25	2.73	5.08	6.45	8.47	10.90	13.24	16.17	17.52	20.69	
穀類	1.07	1.39	0.09	0.00	0.01	0.01	0.06	0.77	1.52	2.32	3.37	7.82	
漬け物	0.43	0.84	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.14	2.45	4.17	
魚介類	0.69	0.85	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.39	0.92	1.91	2.41	4.06	
生魚介類	0.15	0.29	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.24	0.45	0.62	1.12	
魚介加工品	0.54	0.81	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.79	1.62	2.12	3.92	
肉類	0.44	0.54	0.02	0.00	0.00	0.02	0.06	0.24	0.65	1.08	1.50	2.35	
ハム、ソーセージ類	0.35	0.53	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.02	1.41	2.30	
乳類	0.27	0.35	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.37	0.70	1.18	1.44	
ソース	0.19	0.40	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.75	0.99	1.81	
しょうゆ	1.83	1.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.55	1.30	2.75	4.08	5.15	8.59	
塩	1.53	1.42	0.08	0.00	0.00	0.00	0.50	1.17	2.22	3.32	4.16	6.17	
マヨネーズ	0.09	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.34	0.44	0.77	
味噌	1.37	1.46	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	2.10	3.36	4.33	5.84	
その他の調味料	2.46	2.23	0.22	0.00	0.00	0.20	0.85	1.89	3.24	5.28	8.09	9.44	
その他の食品	0.63	0.48	0.03	0.03	0.10	0.19	0.30	0.48	0.85	1.36	1.64	2.22	
海草類	0.16	0.28	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.56	0.78	1.06	
菓子類	0.12	0.30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.41	0.61	1.59	

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

食塩相当量(20歳以上、女性)(n=495)

	平均	標準偏差	標準誤差	パーセンタイル									
				1	5	10	25	中央値	75	90	95	99	
食塩相当量	9.37	3.38	0.16	2.98	4.91	5.79	7.14	8.91	10.96	14.26	15.71	19.82	
穀類	0.89	0.96	0.07	0.00	0.01	0.01	0.09	0.77	1.16	1.83	2.25	6.43	
漬け物	0.40	0.97	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.15	2.23	4.95	
魚介類	0.64	0.87	0.06	0.00	0.00	0.00	0.07	0.31	0.87	1.71	2.29	4.05	
生魚介類	0.12	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.16	0.34	0.49	0.89	
魚介加工品	0.52	0.86	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.69	1.52	2.15	4.05	
肉類	0.35	0.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16	0.46	1.05	1.26	1.87	
ハム、ソーセージ類	0.29	0.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	1.02	1.19	1.83	
乳類	0.27	0.36	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.17	0.35	0.65	0.99	1.90	
ソース	0.08	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.53	1.41	
しょうゆ	1.46	1.42	0.08	0.00	0.00	0.00	0.35	1.21	2.17	3.26	4.08	6.66	
塩	1.15	1.25	0.08	0.00	0.00	0.00	0.28	0.77	1.68	2.93	3.49	5.77	
マヨネーズ	0.07	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.27	0.34	0.58	
味噌	1.11	1.18	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.87	3.03	3.44	4.48	
その他の調味料	2.34	2.08	0.25	0.00	0.06	0.36	0.89	1.86	3.17	4.76	5.96	10.93	
その他の食品	0.62	0.49	0.03	0.05	0.14	0.17	0.28	0.46	0.77	1.34	1.72	2.22	
海藻類	0.14	0.25	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.16	0.46	0.75	1.11	
菓子類	0.17	0.36	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.58	0.99	1.83	

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

食品群別食塩摂取量(20歳以上性・年齢階級別)

食塩相当量(g)(20-29歳性別)

	男性 (n=35)					女性 (n=40)						
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	10.32	3.18	0.92	8.44	10.18	12.53	8.59	2.72	0.51	6.60	8.73	10.08
穀類	1.00	1.33	0.21	0.18	0.80	1.22	0.56	0.95	0.16	0.01	0.04	0.88
漬け物	0.21	0.43	0.08	0.00	0.00	0.25	0.08	0.24	0.04	0.00	0.00	0.00
魚介類	0.35	0.48	0.11	0.00	0.23	0.51	0.78	1.22	0.25	0.01	0.15	1.11
生魚介類	0.11	0.15	0.04	0.00	0.02	0.16	0.05	0.08	0.01	0.00	0.00	0.12
魚介加工品	0.25	0.43	0.10	0.00	0.03	0.28	0.73	1.23	0.26	0.00	0.02	1.08
肉類	0.55	0.47	0.11	0.22	0.41	0.83	0.41	0.41	0.10	0.08	0.25	0.78
ハム、ソーセージ類	0.44	0.44	0.11	0.00	0.30	0.77	0.34	0.41	0.10	0.00	0.17	0.76
乳類	0.41	0.46	0.13	0.00	0.23	0.50	0.29	0.44	0.12	0.04	0.17	0.27
ソース	0.46	0.62	0.16	0.00	0.17	0.63	0.09	0.30	0.05	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	1.66	1.56	0.31	0.65	1.17	2.78	1.21	1.27	0.19	0.15	1.20	1.65
塩	1.28	0.93	0.15	0.66	1.39	1.49	1.08	0.98	0.18	0.33	0.67	1.78
マヨネーズ	0.06	0.09	0.02	0.00	0.00	0.11	0.08	0.14	0.03	0.00	0.00	0.20
味噌	1.24	1.01	0.24	0.00	1.29	2.13	1.15	1.06	0.13	0.00	1.22	1.55
その他の調味料	2.56	1.68	0.36	1.11	2.07	4.25	2.34	1.71	0.44	0.85	2.00	3.77
その他の食品	0.53	0.40	0.11	0.23	0.40	0.69	0.62	0.49	0.03	0.28	0.46	0.77
海草類	0.09	0.21	0.05	0.00	0.00	0.04	0.14	0.27	0.07	0.00	0.01	0.14
菓子類	0.09	0.21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14	0.02	0.00	0.00	0.06

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量(30-39歳性別)

	男性 (n=48)					女性 (n=52)						
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	10.34	3.22	0.68	7.79	10.81	12.74	9.27	2.98	0.33	7.00	8.27	10.60
穀類	0.94	1.18	0.16	0.04	0.66	1.48	0.98	0.78	0.12	0.40	0.78	1.34
漬け物	0.38	0.68	0.09	0.00	0.04	0.71	0.26	0.66	0.10	0.00	0.00	0.12
魚介類	0.32	0.48	0.09	0.00	0.12	0.41	0.37	0.59	0.09	0.04	0.16	0.45
生魚介類	0.12	0.18	0.02	0.00	0.00	0.24	0.08	0.10	0.02	0.00	0.00	0.14
魚介加工品	0.20	0.42	0.08	0.00	0.00	0.18	0.29	0.60	0.10	0.00	0.00	0.45
肉類	0.38	0.48	0.07	0.06	0.16	0.57	0.37	0.38	0.07	0.10	0.30	0.39
ハム、ソーセージ類	0.27	0.48	0.07	0.00	0.00	0.38	0.29	0.39	0.07	0.00	0.20	0.37
乳類	0.21	0.27	0.06	0.00	0.12	0.32	0.25	0.44	0.09	0.00	0.12	0.30
ソース	0.13	0.27	0.06	0.00	0.00	0.10	0.03	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	1.67	1.61	0.34	0.47	1.30	2.17	1.23	1.24	0.19	0.15	0.98	1.95
塩	1.79	1.76	0.30	0.46	1.25	2.74	1.37	1.50	0.30	0.30	0.75	2.00
マヨネーズ	0.12	0.18	0.04	0.00	0.00	0.27	0.06	0.13	0.02	0.00	0.00	0.06
味噌	1.39	1.65	0.30	0.00	0.93	2.40	1.26	1.42	0.23	0.00	0.56	2.84
その他の調味料	2.52	2.57	0.39	0.66	1.62	3.12	2.57	2.70	0.56	1.18	1.81	3.13
その他の食品	0.49	0.42	0.07	0.24	0.32	0.64	0.52	0.50	0.09	0.25	0.35	0.62
海草類	0.13	0.25	0.05	0.00	0.04	0.18	0.09	0.23	0.04	0.00	0.01	0.08
菓子類	0.04	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.19	0.37	0.07	0.00	0.04	0.24

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量(40-49歳性別)

	男性 (n=61)					女性 (n=72)						
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	10.67	4.39	0.77	7.57	10.16	13.87	8.95	3.33	0.47	7.17	8.45	10.39
穀類	1.03	1.74	0.25	0.02	0.21	1.23	0.65	0.53	0.07	0.08	0.77	0.96
漬け物	0.47	1.04	0.20	0.00	0.00	0.28	0.34	0.70	0.08	0.00	0.00	0.36
魚介類	0.67	0.85	0.14	0.05	0.42	0.89	0.44	0.56	0.07	0.00	0.22	0.65
生魚介類	0.16	0.29	0.06	0.00	0.00	0.25	0.11	0.17	0.02	0.00	0.00	0.18
魚介加工品	0.51	0.82	0.14	0.00	0.22	0.77	0.33	0.51	0.06	0.00	0.07	0.49
肉類	0.50	0.64	0.08	0.05	0.16	0.82	0.41	0.49	0.04	0.05	0.22	0.59
ハム、ソーセージ類	0.40	0.60	0.08	0.00	0.00	0.68	0.33	0.49	0.05	0.00	0.00	0.41
乳類	0.26	0.38	0.07	0.00	0.11	0.28	0.32	0.41	0.07	0.06	0.18	0.35
ソース	0.22	0.46	0.06	0.00	0.00	0.35	0.08	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	1.44	1.67	0.29	0.00	1.11	2.21	1.70	1.48	0.13	0.27	1.70	2.55
塩	1.61	1.36	0.30	0.87	1.09	2.37	1.17	1.09	0.19	0.30	0.83	1.76
マヨネーズ	0.13	0.21	0.03	0.00	0.00	0.24	0.05	0.10	0.01	0.00	0.00	0.07
味噌	1.38	1.57	0.27	0.00	1.12	1.85	0.85	0.95	0.15	0.00	0.67	1.69
その他の調味料	2.41	2.86	0.38	0.85	2.07	2.95	2.33	2.00	0.35	0.81	1.76	3.45
その他の食品	0.54	0.37	0.05	0.30	0.46	0.69	0.60	0.47	0.06	0.29	0.45	0.78
海草類	0.14	0.22	0.05	0.00	0.01	0.19	0.12	0.24	0.03	0.00	0.00	0.13
菓子類	0.10	0.28	0.04	0.00	0.00	0.13	0.21	0.42	0.06	0.00	0.00	0.17

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量(50-59歳性別)

	男性 (n=73)					女性 (n=72)						
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	11.46	3.12	0.54	9.93	11.30	13.81	9.34	3.37	0.44	7.51	9.28	10.79
穀類	1.13	1.81	0.20	0.02	0.56	1.33	1.12	1.40	0.20	0.07	0.77	1.22
漬け物	0.37	0.69	0.08	0.00	0.07	0.54	0.36	0.96	0.14	0.00	0.00	0.10
魚介類	0.75	0.86	0.13	0.13	0.36	1.09	0.56	0.76	0.09	0.08	0.25	0.78
生魚介類	0.11	0.18	0.02	0.00	0.01	0.21	0.09	0.13	0.02	0.00	0.05	0.12
魚介加工品	0.64	0.85	0.13	0.00	0.29	0.91	0.47	0.78	0.09	0.00	0.01	0.78
肉類	0.36	0.48	0.05	0.06	0.15	0.45	0.35	0.37	0.07	0.06	0.27	0.53
ハム、ソーセージ類	0.28	0.48	0.05	0.00	0.00	0.37	0.30	0.38	0.07	0.00	0.18	0.51
乳類	0.22	0.30	0.04	0.01	0.13	0.27	0.30	0.29	0.04	0.09	0.23	0.40
ソース	0.07	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.07	0.28	0.03	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	2.30	1.89	0.27	0.60	2.17	3.22	1.47	1.47	0.17	0.36	0.96	2.55
塩	1.73	1.40	0.16	0.76	1.59	2.56	1.27	1.27	0.17	0.30	0.99	1.75
マヨネーズ	0.08	0.16	0.02	0.00	0.00	0.11	0.11	0.17	0.02	0.00	0.00	0.18
味噌	1.50	1.58	0.27	0.00	1.25	2.46	0.94	1.13	0.14	0.00	0.00	2.05
その他の調味料	2.17	1.65	0.20	0.85	2.07	2.95	2.11	1.53	0.31	1.00	1.80	2.92
その他の食品	0.79	0.59	0.08	0.34	0.61	1.06	0.70	0.59	0.07	0.24	0.49	1.00
海草類	0.32	0.41	0.05	0.01	0.19	0.59	0.21	0.31	0.05	0.00	0.02	0.33
菓子類	0.12	0.31	0.05	0.00	0.00	0.02	0.17	0.35	0.05	0.00	0.00	0.17

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量 (60-69歳性別)

	男性 (n=90)					女性 (n=108)						
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	11.62	4.01	0.55	9.14	10.69	13.25	9.62	3.62	0.48	7.25	8.77	11.15
穀類	1.08	1.20	0.16	0.06	0.96	1.56	1.10	1.15	0.18	0.36	0.89	1.53
漬け物	0.49	0.99	0.15	0.00	0.00	0.51	0.41	0.88	0.11	0.00	0.00	0.46
魚介類	1.00	1.05	0.15	0.23	0.72	1.38	0.76	0.71	0.06	0.24	0.57	1.09
生魚介類	0.16	0.20	0.03	0.00	0.09	0.27	0.20	0.25	0.03	0.00	0.10	0.31
魚介加工品	0.84	1.01	0.14	0.08	0.58	1.22	0.56	0.69	0.06	0.00	0.35	0.79
肉類	0.52	0.63	0.07	0.06	0.28	0.79	0.28	0.43	0.06	0.02	0.07	0.31
ハム、ソーセージ類	0.44	0.63	0.07	0.00	0.23	0.69	0.23	0.42	0.05	0.00	0.00	0.25
乳類	0.27	0.35	0.05	0.00	0.23	0.69	0.19	0.20	0.02	0.01	0.14	0.28
ソース	0.13	0.28	0.03	0.00	0.00	0.15	0.12	0.30	0.03	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	2.28	1.96	0.30	1.09	1.46	3.13	1.59	1.51	0.15	0.37	1.30	2.23
塩	1.45	1.56	0.20	0.50	0.97	1.80	1.07	1.34	0.14	0.19	0.62	1.42
マヨネーズ	0.07	0.13	0.02	0.00	0.00	0.04	0.07	0.12	0.02	0.00	0.00	0.11
味噌	1.20	1.13	0.14	0.00	1.14	1.94	0.97	1.09	0.12	0.00	0.75	1.77
その他の調味料	2.40	2.02	0.28	0.86	1.93	3.13	2.39	1.88	0.28	1.18	2.00	3.17
その他の食品	0.73	0.53	0.06	0.37	0.54	0.99	0.68	0.52	0.06	0.34	0.51	0.82
海藻類	1.20	1.13	0.14	0.00	1.14	1.94	0.97	1.09	0.12	0.00	0.75	1.77
菓子類	2.40	2.02	0.28	0.86	1.93	3.13	2.39	1.88	0.28	1.18	2.00	3.17

注) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量 (70歳以上性別)

	男性 (n=124)					女性 (n=151)						
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	11.50	3.80	0.41	8.12	10.86	14.40	9.98	3.72	0.32	7.08	9.38	12.73
穀類	1.23	0.98	0.10	0.61	1.18	1.62	0.85	0.75	0.06	0.38	0.75	1.15
漬け物	0.58	0.97	0.10	0.00	0.10	0.76	0.71	1.45	0.14	0.00	0.00	0.80
魚介類	1.00	0.95	0.11	0.19	0.79	1.42	0.84	1.08	0.12	0.12	0.50	1.26
生魚介類	0.25	0.50	0.04	0.00	0.10	0.29	0.13	0.23	0.02	0.00	0.04	0.15
魚介加工品	0.75	0.89	0.10	0.00	0.48	1.02	0.71	1.08	0.12	0.00	0.26	1.01
肉類	0.35	0.50	0.05	0.04	0.11	0.51	0.31	0.47	0.03	0.02	0.09	0.44
ハム、ソーセージ類	0.30	0.50	0.05	0.00	0.00	0.49	0.27	0.47	0.04	0.00	0.00	0.41
乳類	0.25	0.32	0.04	0.02	0.16	0.34	0.30	0.35	0.04	0.04	0.20	0.41
ソース	0.15	0.39	0.04	0.00	0.00	0.00	0.09	0.28	0.02	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	1.70	1.34	0.15	0.70	1.45	2.61	1.48	1.46	0.19	0.57	1.15	2.01
塩	1.26	1.25	0.14	0.32	0.99	1.72	1.00	1.18	0.13	0.00	0.69	1.49
マヨネーズ	0.09	0.16	0.02	0.00	0.00	0.12	0.07	0.15	0.01	0.00	0.00	0.09
味噌	1.51	1.62	0.21	0.00	1.35	1.97	1.37	1.27	0.15	0.00	1.17	1.89
その他の調味料	2.65	2.17	0.22	1.06	2.07	3.63	2.30	2.27	0.21	0.61	1.82	3.11
その他の食品	0.73	0.47	0.05	0.35	0.61	1.02	0.64	0.44	0.04	0.35	0.51	0.85
海藻類	0.14	0.22	0.02	0.00	0.02	0.19	0.14	0.23	0.02	0.00	0.03	0.19
菓子類	0.18	0.33	0.04	0.00	0.00	0.32	0.17	0.33	0.03	0.00	0.00	0.20

注) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食品群別食塩摂取量(20歳以上性・年齢階級別)

食塩相当量(g)(20-39歳)

	男性 (n=83)					女性 (n=92)						
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	10.33	3.19	0.51	8.04	10.55	12.65	8.99	2.88	0.30	6.86	8.63	10.41
穀類	0.96	1.23	0.13	0.10	0.77	1.42	0.81	0.88	0.12	0.02	0.77	1.28
漬け物	0.31	0.59	0.05	0.00	0.00	0.42	0.19	0.53	0.06	0.00	0.00	0.00
魚介類	0.34	0.48	0.07	0.00	0.14	0.42	0.53	0.92	0.13	0.01	0.16	0.53
生魚介類	0.11	0.17	0.02	0.00	0.00	0.23	0.07	0.10	0.02	0.00	0.00	0.12
魚介加工品	0.22	0.43	0.07	0.00	0.00	0.27	0.47	0.93	0.14	0.00	0.00	0.46
肉類	0.45	0.48	0.05	0.08	0.38	0.59	0.38	0.39	0.06	0.09	0.25	0.45
ハム、ソーセージ類	0.34	0.47	0.05	0.00	0.24	0.49	0.31	0.40	0.06	0.00	0.18	0.37
乳類	0.29	0.37	0.06	0.00	0.18	0.42	0.27	0.44	0.07	0.00	0.12	0.29
ソース	0.26	0.47	0.08	0.00	0.00	0.42	0.05	0.22	0.02	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	1.67	1.58	0.26	0.55	1.19	2.51	1.22	1.25	0.15	0.17	1.04	1.70
塩	1.58	1.49	0.17	0.62	1.37	2.21	1.25	1.32	0.17	0.31	0.75	1.89
マヨネーズ	0.09	0.16	0.02	0.00	0.00	0.17	0.07	0.13	0.02	0.00	0.00	0.07
味噌	1.33	1.42	0.20	0.00	1.18	2.24	1.22	1.28	0.15	0.00	1.18	1.95
その他の調味料	2.54	2.24	0.35	1.00	2.04	3.57	2.47	2.34	0.45	1.08	1.84	3.15
その他の食品	0.50	0.41	0.06	0.23	0.36	0.64	0.52	0.45	0.06	0.26	0.36	0.65
海藻類	0.12	0.23	0.03	0.00	0.01	0.14	0.11	0.25	0.04	0.00	0.01	0.13
菓子類	0.06	0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.14	0.31	0.05	0.00	0.00	0.12

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量(40-64歳)

	男性 (n=168)					女性 (n=184)						
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	11.16	3.75	0.40	8.63	11.01	13.54	9.17	3.33	0.31	7.33	8.97	10.79
穀類	1.02	1.64	0.14	0.03	0.52	1.24	0.89	1.03	0.09	0.10	0.77	1.08
漬け物	0.48	0.97	0.14	0.00	0.00	0.41	0.34	0.82	0.06	0.00	0.00	0.22
魚介類	0.73	0.84	0.09	0.12	0.38	1.01	0.54	0.69	0.05	0.08	0.28	0.79
生魚介類	0.11	0.17	0.02	0	0	0.23	0.07	0.10	0.02	0.00	0.00	0.12
魚介加工品	0.60	0.82	0.09	0.00	0.27	0.81	0.47	0.93	0.14	0.00	0.00	0.46
肉類	0.42	0.53	0.04	0.06	0.18	0.72	0.38	0.45	0.04	0.04	0.24	0.54
ハム、ソーセージ類	0.33	0.51	0.03	0.00	0.00	0.51	0.31	0.45	0.04	0.00	0.09	0.41
乳類	0.25	0.32	0.04	0.01	0.14	0.30	0.30	0.34	0.03	0.08	0.21	0.39
ソース	0.15	0.34	0.03	0.00	0.00	0.17	0.08	0.27	0.02	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	1.96	1.78	0.15	0.50	1.52	2.92	1.58	1.47	0.09	0.35	1.26	2.53
塩	1.60	1.30	0.15	0.82	1.29	2.32	1.23	1.25	0.11	0.31	0.93	1.78
マヨネーズ	0.09	0.17	0.01	0.00	0.00	0.11	0.08	0.14	0.01	0.00	0.00	0.11
味噌	1.40	1.48	0.16	0.00	1.18	2.08	0.95	1.09	0.08	0.00	0.67	1.96
その他の調味料	2.35	2.32	0.27	0.73	1.65	2.97	2.14	1.69	0.26	0.91	1.84	2.99
その他の食品	0.70	0.53	0.04	0.35	0.51	0.85	0.67	0.53	0.04	0.30	0.48	0.94
海藻類	0.22	0.34	0.03	0.00	0.09	0.27	0.16	0.27	0.02	0.00	0.00	0.21
菓子類	0.14	0.35	0.03	0.00	0.00	0.07	0.19	0.39	0.04	0.00	0.00	0.17

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量 (65歳以上)

	男性 (n=180)					女性 (n=216)						
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	11.55	3.91	0.33	8.30	10.60	14.50	9.93	3.72	0.23	7.12	9.29	11.95
穀類	1.25	1.09	0.11	0.56	1.15	1.70	0.96	0.95	0.10	0.36	0.77	1.37
漬け物	0.50	0.90	0.08	0.00	0.00	0.61	0.64	1.33	0.10	0.00	0.00	0.66
魚介類	1.03	1.01	0.10	0.19	0.80	1.38	0.82	0.98	0.08	0.15	0.55	1.21
生魚介類	0.23	0.45	0.03	0.00	0.09	0.28	0.16	0.25	0.03	0.00	0.05	0.23
魚介加工品	0.80	0.96	0.10	0.01	0.53	1.08	0.66	0.99	0.08	0.00	0.27	0.96
肉類	0.41	0.58	0.06	0.04	0.12	0.58	0.29	0.44	0.03	0.02	0.09	0.41
ハム、ソーセージ類	0.36	0.58	0.05	0.00	0.00	0.51	0.25	0.44	0.03	0.00	0.00	0.40
乳類	0.25	0.34	0.04	0.01	0.15	0.32	0.26	0.32	0.03	0.02	0.17	0.38
ソース	0.14	0.37	0.03	0.00	0.00	0.00	0.09	0.29	0.02	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	1.84	1.62	0.15	0.67	1.45	2.75	1.52	1.48	0.15	0.51	1.16	2.03
塩	1.33	1.44	0.14	0.33	0.98	1.70	1.00	1.19	0.10	0.00	0.71	1.39
マヨネーズ	0.09	0.16	0.02	0.00	0.00	0.12	0.07	0.14	0.01	0.00	0.00	0.09
味噌	1.43	1.54	0.17	0.00	1.24	1.99	1.22	1.21	0.13	0.00	1.12	1.87
その他の調味料	2.55	2.06	0.17	1.10	2.03	3.40	2.40	2.22	0.19	0.81	1.89	3.18
その他の食品	0.71	0.46	0.05	0.35	0.59	0.97	0.65	0.46	0.03	0.33	0.49	0.83
海藻類	0.14	0.23	0.01	0.00	0.02	0.18	0.14	0.24	0.02	0.00	0.03	0.20
菓子類	0.16	0.31	0.03	0.00	0.00	0.18	0.17	0.37	0.03	0.00	0.00	0.18

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食品群別食塩摂取量(20歳以上性・年齢階級別)

食品群別食塩摂取量(g)(20歳以上) 摂取量区分別(目標量で2区分)

男性	摂取量が目標量(8g)未満の者(n=95)						摂取量が目標量(8g)以上の者(n=336)					
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	6.13	1.50	0.17	5.13	6.55	7.41	12.27	2.96	0.22	10.05	11.51	13.86
穀類	0.76	1.01	0.10	0.76	0.63	1.11	1.15	1.46	0.10	0.08	0.81	1.53
漬け物	0.20	0.44	0.05	0.00	0.00	0.24	0.49	0.91	0.08	0.00	0.00	0.68
魚介類	0.43	0.53	0.08	0.00	0.21	0.79	0.76	0.91	0.09	0.12	0.41	1.09
生魚介類	0.10	0.17	0.03	0.00	0.00	0.12	0.17	0.31	0.02	0.00	0.07	0.25
魚介加工品	0.34	0.50	0.06	0.00	0.07	0.56	0.59	0.87	0.09	0.00	0.19	0.84
肉類	0.23	0.37	0.05	0.02	0.07	0.24	0.49	0.57	0.04	0.07	0.32	0.75
ハム、ソーセージ類	0.16	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.40	0.56	0.03	0.00	0.24	0.56
乳類	0.16	0.28	0.04	0.00	0.01	0.21	0.29	0.36	0.04	0.02	0.17	0.42
ソース	0.06	0.15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.22	0.44	0.03	0.00	0.00	0.23
しょうゆ	1.27	1.41	0.27	0.10	1.04	1.74	1.98	1.73	0.15	0.65	1.43	2.90
塩	0.75	0.86	0.13	0.00	0.50	1.24	1.73	1.47	0.09	0.82	1.45	2.38
マヨネーズ	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	0.11	0.10	0.17	0.01	0.00	0.00	0.12
味噌	0.56	0.76	0.11	0.00	0.00	1.12	1.59	1.53	0.12	0.00	1.38	2.24
その他の調味料	1.19	1.21	0.18	0.15	0.99	1.73	2.79	2.32	0.30	1.09	2.18	3.67
その他の食品	0.45	0.45	0.05	0.17	0.27	0.57	0.68	0.47	0.03	0.35	0.54	0.89
海草類	0.07	0.14	0.02	0.00	0.00	0.08	0.18	0.30	0.02	0.00	0.05	0.22
菓子類	0.12	0.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.12	0.29	0.01	0.00	0.00	0.03

食品群別食塩摂取量(g)(20歳未満の者(n=127))

女性	摂取量が目標量(7g)未満の者(n=127)						摂取量が目標量(7g)以上の者(n=368)					
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	5.60	1.11	0.13	5.05	5.96	6.36	10.51	2.98	0.18	8.29	9.93	11.85
穀類	0.65	0.55	0.06	0.02	0.71	0.85	0.96	1.04	0.10	0.24	0.77	1.31
漬け物	0.17	0.38	0.04	0.00	0.00	0.00	0.47	1.08	0.08	0.00	0.00	0.36
魚介類	0.47	0.68	0.10	0.02	0.26	0.56	0.68	0.91	0.07	0.08	0.32	0.96
生魚介類	0.10	0.18	0.02	0.00	0.00	0.13	0.12	0.19	0.01	0.00	0.04	0.17
魚介加工品	0.37	0.66	0.09	0.00	0.09	0.50	0.56	0.91	0.07	0.00	0.06	0.78
肉類	0.26	0.38	0.04	0.02	0.08	0.33	0.38	0.45	0.03	0.05	0.21	0.54
ハム、ソーセージ類	0.21	0.38	0.04	0.00	0.00	0.29	0.31	0.45	0.03	0.00	0.09	0.41
乳類	0.23	0.38	0.05	0.00	0.11	0.28	0.29	0.36	0.02	0.04	0.18	0.37
ソース	0.06	0.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.08	0.28	0.02	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	0.69	0.75	0.08	0.00	0.43	1.04	1.70	1.49	0.11	0.64	1.41	2.47
塩	0.71	0.80	0.07	0.07	0.50	1.00	1.28	1.32	0.12	0.30	0.91	1.88
マヨネーズ	0.07	0.12	0.01	0.00	0.00	0.11	0.07	0.14	0.01	0.00	0.00	0.09
味噌	0.60	0.83	0.11	0.00	0.00	1.12	1.26	1.23	0.08	0.00	1.16	2.07
その他の調味料	1.28	0.97	0.11	0.55	1.18	1.77	2.66	2.22	0.29	1.21	2.17	3.49
その他の食品	0.41	0.31	0.03	0.21	0.31	0.52	0.68	0.51	0.04	0.32	0.49	0.86
海草類	0.06	0.13	0.01	0.00	0.00	0.08	0.16	0.27	0.02	0.00	0.02	0.21
菓子類	0.10	0.22	0.03	0.00	0.00	0.13	0.19	0.39	0.03	0.00	0.00	0.17

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせたための重み付けをした値。

食品群別食塩摂取量(20歳以上性・年齢階級別)

食品群別食塩摂取量(g)(20歳以上) 摂取量区分別(中央値で2区分)

男性	摂取量が中央値(10.5g)未満の者(n=213)						摂取量が中央値(10.5g)以上の者(n=218)					
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	7.90	1.99	0.28	6.69	8.31	9.59	13.62	2.62	0.23	11.45	12.84	15.12
穀類	0.82	0.96	0.07	0.02	0.66	1.23	1.28	1.64	0.15	0.09	0.90	1.69
漬け物	0.26	0.55	0.05	0.00	0.00	0.25	0.57	1.01	0.12	0.00	0.09	0.76
魚介類	0.56	0.71	0.08	0.00	0.22	0.84	0.81	0.94	0.13	0.20	0.44	1.09
生魚介類	0.15	0.27	0.03	0.00	0.00	0.18	0.16	0.30	0.01	0.00	0.07	0.25
魚介加工品	0.41	0.65	0.06	0.00	0.05	0.69	0.65	0.91	0.13	0.00	0.28	0.86
肉類	0.30	0.41	0.03	0.04	0.10	0.39	0.56	0.61	0.05	0.09	0.39	0.83
ハム、ソーセージ類	0.22	0.38	0.03	0.00	0.00	0.30	0.47	0.60	0.05	0.00	0.37	0.73
乳類	0.19	0.27	0.03	0.00	0.11	0.27	0.33	0.39	0.05	0.02	0.21	0.43
ソース	0.18	0.40	0.06	0.00	0.00	0.17	0.19	0.40	0.04	0.00	0.00	0.17
しょうゆ	1.43	1.39	0.12	0.19	1.12	2.17	2.17	1.85	0.23	0.87	1.74	3.05
塩	1.12	1.04	0.11	0.25	0.98	1.49	1.87	1.61	0.13	0.89	1.49	2.67
マヨネーズ	0.07	0.13	0.01	0.00	0.00	0.09	0.11	0.19	0.01	0.00	0.00	0.19
味噌	0.89	0.95	0.09	0.00	0.75	1.55	1.79	1.68	0.14	0.00	1.66	2.49
その他の調味料	1.56	1.44	0.12	0.33	1.44	2.31	3.23	2.48	0.33	1.22	2.56	4.73
その他の食品	0.54	0.48	0.04	0.22	0.40	0.68	0.71	0.46	0.05	0.35	0.62	0.94
海草類	0.10	0.25	0.03	0.00	0.00	0.09	0.21	0.28	0.03	0.00	0.11	0.24
菓子類	0.13	0.35	0.03	0.00	0.00	0.01	0.11	0.24	0.02	0.00	0.00	0.03

女性

女性	摂取量が中央値(8.9g)未満の者(n=244)					摂取量が中央値(8.9g)以上の者(n=251)						
	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点	平均	標準偏差	標準誤差	25%点	中央値	75%点
食塩相当量	6.84	1.43	0.11	6.04	7.14	7.99	11.90	2.82	0.24	9.97	10.96	13.15
穀類	0.75	0.57	0.04	0.12	0.77	1.09	1.03	1.22	0.13	0.08	0.77	1.34
漬け物	0.21	0.52	0.04	0.00	0.00	0.00	0.58	1.25	0.12	0.00	0.00	0.45
魚介類	0.51	0.77	0.09	0.03	0.20	0.69	0.76	0.94	0.08	0.14	0.44	1.10
生魚介類	0.11	0.18	0.02	0.00	0.00	0.16	0.12	0.19	0.02	0.00	0.04	0.16
魚介加工品	0.40	0.76	0.09	0.00	0.02	0.50	0.63	0.94	0.09	0.00	0.27	0.92
肉類	0.28	0.38	0.03	0.03	0.11	0.38	0.41	0.47	0.04	0.07	0.25	0.60
ハム、ソーセージ類	0.22	0.38	0.03	0.00	0.00	0.30	0.47	0.60	0.05	0.00	0.37	0.73
乳類	0.23	0.33	0.04	0.00	0.12	0.30	0.31	0.39	0.04	0.06	0.21	0.41
ソース	0.08	0.27	0.02	0.00	0.00	0.00	0.08	0.26	0.02	0.00	0.00	0.00
しょうゆ	1.01	0.96	0.07	0.16	0.78	1.52	1.92	1.64	0.14	0.77	1.59	2.63
塩	0.71	0.82	0.07	0.10	0.50	0.99	1.59	1.43	0.15	0.59	1.29	2.21
マヨネーズ	0.07	0.13	0.01	0.00	0.00	0.09	0.08	0.14	0.01	0.00	0.00	0.12
味噌	0.83	0.99	0.18	0.00	0.43	1.34	1.39	1.29	0.10	0.00	1.25	2.24
その他の調味料・香辛料	1.62	1.15	0.10	0.70	1.51	2.32	3.06	2.51	0.47	1.31	2.60	4.24
その他の食品	0.54	0.44	0.03	0.26	0.41	0.65	0.70	0.52	0.04	0.31	0.52	0.91
海草類	0.09	0.18	0.02	0.00	0.01	0.11	0.18	0.30	0.03	0.00	0.02	0.24
菓子類	0.17	0.36	0.03	0.00	0.01	0.15	0.17	0.37	0.03	0.00	0.00	0.18

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

野菜類摂取状況別栄養素等摂取量(男女、20歳以上)

	男性				女性			
	野菜類350g以上 (n=162)		野菜類350g未満 (n=269)		野菜類350g以上 (n=168)		野菜類350g未満 (n=327)	
	平均	標準誤差	平均	標準誤差	平均	標準誤差	平均	標準誤差
エネルギー(kcal)	2285.52	42.55	1979.34	33.35	1886.20	37.34	1632.32	27.89
総たんぱく質(g)	86.90	1.78	71.53	1.40	73.94	1.43	62.14	1.07
動物性たんぱく質(g)	46.93	1.44	39.00	1.13	38.45	1.14	32.77	0.85
総脂質(g)	70.02	1.95	57.33	1.53	61.07	1.82	51.19	1.36
動物性脂質(g)	35.68	1.36	28.72	1.07	29.01	1.18	25.09	0.88
炭水化物(g)	301.93	6.23	267.72	4.88	252.58	5.53	224.29	4.13
食塩相当量(g)	12.09	0.29	10.33	0.23	10.87	0.27	8.62	0.20
カリウム(mg)	3202.27	65.80	2150.44	51.57	3023.73	59.07	2050.00	44.12
カルシウム(mg)	705.82	23.23	462.95	18.20	649.92	21.55	472.71	16.10
マグネシウム(mg)	329.00	7.26	243.20	5.69	296.18	6.35	222.26	4.74
リン(mg)	1267.83	27.23	999.73	21.34	1112.45	22.62	898.77	16.90
鉄(mg)	10.14	0.22	7.47	0.17	9.41	0.22	7.15	0.17
亜鉛(mg)	10.13	0.23	8.33	0.18	8.62	0.19	7.09	0.14
銅(mg)	1.45	0.03	1.15	0.02	1.31	0.03	1.03	0.02
ヨウ素(μg)	1999.44	446.91	1224.27	350.26	2419.60	545.92	976.23	407.77
ビタミンA(μgRE)	804.91	55.24	448.81	43.29	743.02	43.21	452.80	32.28
ビタミンD(μg)	9.07	0.63	7.28	0.49	8.25	0.63	6.36	0.47
ビタミンE(mg)	9.06	0.27	6.29	0.21	8.79	0.25	5.87	0.19
ビタミンK(μg)	385.53	15.14	214.62	11.87	369.68	14.08	225.59	10.51
ビタミンB1(mg)	1.14	0.03	0.89	0.03	1.02	0.03	0.79	0.02
ビタミンB2(mg)	1.47	0.04	1.17	0.03	1.39	0.04	1.12	0.03
ナイアシン(mgNE)	19.87	0.61	16.20	0.48	16.42	0.47	13.03	0.35
ビタミンB6(mg)	1.60	0.04	1.14	0.03	1.40	0.03	1.00	0.02
ビタミンB12(μg)	7.49	0.56	6.92	0.44	6.71	0.43	5.21	0.32
葉酸(μg)	424.13	10.64	274.99	8.34	426.23	9.87	275.76	7.37
パントテン酸(mg)	7.09	0.16	5.51	0.13	6.41	0.14	5.06	0.10
ビタミンC(mg)	153.40	5.12	81.88	4.01	161.86	5.82	100.50	4.35
コレステロール(mg)	343.35	13.59	309.95	10.65	300.38	12.76	280.98	9.53
総食物繊維(g)	20.57	0.47	12.76	0.36	20.03	0.44	13.03	0.33
水溶性食物繊維(g)	4.80	0.12	2.92	0.09	4.87	0.11	2.96	0.08
不溶性食物繊維(g)	15.20	0.36	9.31	0.28	14.61	0.33	9.55	0.25
たんぱく質エネルギー比率(%)	15.32	0.24	14.51	0.19	15.81	0.22	15.42	0.16
脂肪エネルギー比率(%)	27.49	0.59	25.82	0.46	29.03	0.59	27.94	0.44
炭水化物エネルギー比率(%)	57.19	0.66	59.67	0.52	55.16	0.64	56.63	0.47
動物性たんぱく質比率(%)	52.52	1.05	52.78	0.83	50.93	0.99	51.75	0.74

*: P<0.05

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

野菜類摂取状況別食品群別摂取量(男女、20歳以上)										(g)
	男性					女性				
	野菜類350g以上 (n=162)			野菜類350g未満 (n=269)			野菜類350g以上 (n=168)			P値
	平均	標準誤差		平均	標準誤差		平均	標準誤差		
穀類	468.7	13.1		476.3	10.3		347.7	11.1		
米・加工品	337.0	14.3		347.6	11.2		239.8	11.6		
小麦・加工品	114.2	9.3		116.2	7.3		94.2	7.4		
その他の穀類・加工品	17.5	4.7		12.6	3.7		13.6	3.8		
いも類	70.8	5.5		46.0	4.3	*	59.4	4.7		*
砂糖・甘味料類	7.1	0.8		6.9	0.6		6.7	0.7		
豆類	90.0	6.5		56.1	5.1	*	85.8	7.0		*
野菜類	513.7	9.9		204.6	7.8	*	481.4	7.6		*
緑黄色野菜	169.9	6.2		60.0	4.9	*	183.2	6.2		*
その他の野菜	284.7	8.7		126.8	6.8	*	262.9	6.6		*
漬け物	13.5	1.6		10.0	1.2		12.3	1.6		*
果実類	145.3	9.9		86.3	7.8	*	157.9	11.5		*
きのこ類	24.8	2.8		14.7	2.2	*	20.6	2.1		*
海藻類	10.7	1.7		11.2	1.4		10.9	1.5		
魚介類	83.8	5.7		81.2	4.4		76.4	4.9		*
肉類	128.6	6.8		97.9	5.4	*	92.5	5.2		*
卵類	34.9	2.5		31.4	2.0		30.9	2.3		
乳類	152.9	13.8		115.6	10.8	*	155.4	13.0		
油脂類	14.1	0.8		11.1	0.7	*	10.9	0.7		*
菓子類	21.2	3.4		19.7	2.7		25.5	5.0		
嗜好飲料類	1011.5	47.2		920.3	37.0		843.4	44.1		
調味料・香辛料類	114.3	7.7		102.9	6.0		105.2	6.8		*

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

*: P<0.05

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

朝、昼、夕別にみた1日の食事構成(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

朝食の食事構成

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	総数	人数	75	100	132	147	197	275	175	352	399	926	926
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準偏差		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	家庭食	割合	76.5	78.3	87.7	72.3	86.9	88.3	77.6	76.0	87.2	79.1	79.9
		標準偏差	4.1	4.7	5.6	4.7	2.7	2.4	4.6	3.4	1.9	2.6	2.6
	調理済み	割合	6.2	3.7	6.6	13.9	6.1	6.1	4.7	9.2	6.4	7.2	7.2
		標準偏差	5.4	2.3	2.5	5.0	2.0	1.9	2.6	2.4	1.7	1.7	1.7
	外食・給食	割合	0.7	4.0	3.9	0.0	1.5	0.2	2.7	1.5	0.8	1.9	1.8
		標準偏差	0.7	3.2	3.0	0.0	1.4	0.2	2.0	1.2	0.6	1.3	1.2
	菓子・果物などのみ	割合	9.7	7.8	13.6	6.5	4.2	4.0	8.6	8.8	4.1	7.5	7.3
		標準偏差	4.9	4.7	4.2	2.7	1.8	1.3	3.6	2.1	1.2	1.4	1.4
	飲料などビタミン・ミネラルのみ	割合	0.0	2.2	0.2	0.0	0.0	0.2	1.3	0.1	0.2	0.5	0.6
		標準偏差	0.0	2.1	0.2	0.0	0.0	0.2	1.3	0.1	0.2	0.5	0.5
男性	何も口にできなかった	割合	6.8	4.0	8.1	2.4	1.3	1.2	5.1	4.3	1.3	3.8	3.6
		標準偏差	2.1	2.8	1.3	0.7	0.8	0.7	2.3	1.5	0.6	1.2	1.2
	調査不能	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	総数	人数	35	48	61	74	89	124	83	188	180	431	431
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準偏差		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	家庭食	割合	76.8	82.1	86.8	68.8	84.7	87.5	88.1	71.2	86.6	74.4	74.8
		標準偏差	11.2	7.6	5.1	7.4	4.1	4.0	6.0	4.6	3.3	3.4	3.4
	調理済み	割合	12.3	5.7	11.2	18.5	7.9	6.8	8.4	13.2	7.6	10.1	10.0
		標準偏差	10.9	3.7	4.3	7.0	3.5	2.8	5.0	3.5	2.3	2.5	2.5
	外食・給食	割合	1.6	9.0	1.1	0.0	0.5	0.4	6.0	0.4	0.5	2.3	2.3
		標準偏差	1.6	6.9	0.8	0.0	0.5	0.4	4.3	0.3	0.4	1.5	1.5
女性	菓子・果物などのみ	割合	4.0	13.2	16.7	8.0	4.3	4.7	9.4	11.2	4.1	8.7	8.4
		標準偏差	2.9	7.9	5.7	3.4	2.7	1.9	4.8	2.7	1.8	2.0	2.0
	飲料などビタミン・ミネラルのみ	割合	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.9	0.0	0.4	1.0
		標準偏差	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	0.0	0.4	0.9	1.0
	何も口にできなかった	割合	5.3	5.1	4.3	4.7	2.5	0.0	5.2	4.0	0.8	3.6	3.9
		標準偏差	5.3	3.1	2.2	2.5	1.6	0.0	2.6	1.4	0.6	1.3	1.3
	調査不能	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	総数	人数	40	52	71	73	108	151	92	184	219	495	495
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準偏差		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	家庭食	割合	76.3	91.4	88.5	85.6	88.6	88.9	85.2	80.9	87.7	83.9	84.2
		標準偏差	10.4	3.5	7.3	5.3	3.8	2.6	5.5	3.5	1.8	2.1	2.2
女性	調理済み	割合	1.3	2.1	2.1	9.2	4.6	5.5	1.8	5.3	5.5	4.2	4.3
		標準偏差	1.3	1.6	2.0	4.4	2.4	1.9	1.1	2.0	1.6	1.1	1.1
	外食・給食	割合	0.0	0.0	6.6	0.0	2.3	0.0	0.0	2.6	1.0	1.5	1.4
		標準偏差	0.0	0.0	6.5	0.0	2.3	0.0	0.0	2.5	1.0	1.1	1.0
	菓子・果物などのみ	割合	14.3	3.4	10.6	5.1	4.2	3.4	7.9	6.5	4.1	6.3	6.3
		標準偏差	9.0	2.7	4.7	3.0	2.5	1.5	4.1	2.5	1.4	1.4	1.5
	飲料などビタミン・ミネラルのみ	割合	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
		標準偏差	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	何も口にできなかった	割合	8.1	3.1	11.8	0.0	0.3	2.2	5.1	4.6	1.7	4.0	3.8
		標準偏差	5.0	1.9	4.7	0.0	0.3	1.3	2.4	2.1	1.0	1.4	1.3
	調査不能	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けを算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

朝、昼、夕別にみた1日の食事構成(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

朝食の食事構成

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	総数	人数	75	100	132	147	197	275	175	352	399	926	926
	割合		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準偏差		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	家庭食	割合	42.5	45.7	37.3	49.3	62.4	69.3	44.4	45.4	68.8	50.8	51.3
	標準偏差		10.3	5.1	6.5	5.3	5.0	5.3	5.8	3.5	3.9	3.2	3.2
	調理済み	割合	6.7	9.6	10.6	8.2	13.6	16.2	8.4	10.2	15.4	11.2	11.2
	標準偏差		3.6	3.4	3.7	2.3	4.0	3.2	3.0	1.9	3.2	1.7	1.6
	外食・給食	割合	43.3	37.9	43.7	36.0	21.3	12.9	40.1	37.6	14.0	32.6	32.2
	標準偏差		9.6	5.7	5.8	4.1	4.2	3.8	5.9	4.0	2.8	3.6	3.6
	菓子・果物などのみ	割合	0.7	3.8	4.1	3.2	1.6	1.4	2.5	3.7	1.2	2.4	2.4
男性	標準偏差		0.7	1.2	1.9	1.1	1.1	0.9	1.5	1.3	0.6	0.6	0.6
	総数	人数	35	48	61	74	89	124	83	168	180	431	431
	割合		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準偏差		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	家庭食	割合	21.4	26.6	17.4	24.7	50.4	66.7	24.5	24.1	65.1	35.4	36.6
	標準偏差		8.7	9.6	6.6	5.2	6.1	6.5	6.8	4.7	5.2	4.3	4.3
	調理済み	割合	8.6	4.9	8.3	15.0	16.0	18.1	6.4	12.0	18.2	11.8	12.1
	標準偏差		7.1	2.6	4.3	4.3	4.2	3.7	3.6	3.1	3.5	2.3	2.5
	外食・給食	割合	60.2	61.9	61.4	57.4	30.1	14.5	61.2	56.6	15.7	46.8	45.7
	標準偏差		10.1	11.6	7.3	5.7	6.9	4.7	9.4	5.3	4.0	5.5	5.5
女性	菓子・果物などのみ	割合	0.0	1.5	5.5	0.4	2.9	0.9	0.9	3.4	0.8	1.9	1.8
	標準偏差		0.0	1.6	3.5	0.4	2.4	0.8	0.9	1.6	0.6	0.8	0.7
	総数	人数	40	52	71	73	108	151	92	184	219	495	495
	割合		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準偏差		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	家庭食	割合	59.6	61.2	56.8	73.6	71.7	71.5	60.5	66.6	71.7	66.3	66.3
	標準偏差		13.0	4.2	7.0	7.9	5.2	6.2	5.6	4.9	4.2	3.1	3.2
	調理済み	割合	5.2	13.5	12.8	1.6	11.8	14.6	10.1	8.4	13.3	10.7	10.4
	標準偏差		3.3	6.4	4.1	1.1	4.5	3.8	4.0	1.7	3.3	1.7	1.7
	外食・給食	割合	29.6	18.6	26.4	14.9	14.5	11.5	23.0	18.8	12.7	18.3	18.3
女性	標準偏差		10.9	6.6	6.6	4.8	3.8	3.5	4.1	3.7	2.3	2.1	2.1
	菓子・果物などのみ	割合	1.3	5.6	2.8	6.0	0.6	2.0	3.9	4.0	1.4	2.9	3.0
	標準偏差		1.3	3.9	1.8	3.8	0.6	1.4	2.4	1.8	1.0	0.9	1.0
	総数	人数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準偏差		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	家庭食	割合	4.3	1.2	1.3	4.0	1.5	0.3	2.4	2.3	0.9	1.8	1.9
	標準偏差		4.1	1.2	1.3	2.3	1.2	0.3	1.9	1.1	0.5	0.7	0.7
	調理済み	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準偏差		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注:値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

朝、昼、夕別にみた1日の食事構成(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

夕食の食事構成

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) ※2
総数	総数	人数	75	100	132	147	197	275	175	352	399	926	926
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	家庭食	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	89.8	85.0	87.9	86.8	93.9	87.6	87.0	87.8	89.8	88.0	88.1
	調理済み	標準偏差	4.8	2.9	2.5	4.3	2.0	2.9	2.5	2.4	2.4	1.5	1.5
		割合	5.1	6.9	4.9	8.0	4.5	9.6	6.2	6.7	7.7	7.0	7.0
	外食・給食	標準偏差	3.8	3.0	2.3	3.3	1.7	2.9	2.2	1.6	2.3	1.4	1.4
		割合	5.0	8.1	6.5	4.6	1.3	1.0	6.8	4.9	1.0	4.4	4.4
	菓子・果物などのみ	標準偏差	3.4	3.6	2.1	1.8	0.7	0.6	2.7	1.3	0.5	1.2	1.2
		割合	0.0	0.0	0.8	0.5	0.2	1.0	0.0	0.5	0.8	0.9	0.4
男性	総数	人数	35	48	61	74	89	124	83	168	180	431	431
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	家庭食	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	87.4	72.6	85.8	81.5	90.0	89.6	78.7	83.3	91.1	84.3	84.3
	調理済み	標準偏差	7.6	6.3	4.7	6.4	3.7	3.3	4.4	4.1	2.7	2.4	2.4
		割合	11.4	14.0	5.5	9.9	8.5	9.4	13.0	9.0	8.2	9.8	9.9
	外食・給食	標準偏差	7.5	6.2	3.4	4.5	3.7	3.3	4.2	2.6	2.7	2.2	2.3
		割合	1.2	13.4	7.1	7.5	1.5	1.0	8.4	6.6	5.5	5.4	5.4
	菓子・果物などのみ	標準偏差	1.2	7.3	3.5	2.8	0.9	0.6	4.5	2.0	0.5	1.5	1.5
		割合	0.0	0.0	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.4	0.4
女性	総数	人数	40	52	71	73	108	151	92	184	219	495	495
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	家庭食	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	91.8	95.0	89.9	92.1	96.9	85.9	93.7	92.3	88.9	91.6	91.9
	調理済み	標準偏差	6.0	2.8	3.4	2.9	1.5	3.2	3.2	1.8	2.5	1.1	1.2
		割合	0.0	1.2	4.2	6.1	1.4	9.7	0.7	4.4	7.4	4.2	4.0
	外食・給食	標準偏差	0.0	1.2	3.1	2.6	0.9	2.9	0.7	1.6	2.2	0.8	0.8
		割合	8.2	3.8	5.9	1.8	1.2	1.0	5.6	3.3	1.1	3.3	3.3
	菓子・果物などのみ	標準偏差	6.0	2.5	2.7	1.4	0.9	0.6	3.1	1.5	0.5	1.2	1.3
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	0.0	0.0	1.4	0.9	0.4

注:値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

朝食状況別栄養素等摂取量(男女、20歳以上)

	男性			女性		
	朝食欠食(n=62)		P値	朝食欠食(n=52)		P値
	平均	標準誤差		平均	標準誤差	
エネルギー(kcal)	1691.15	69.06	*	1547.01	69.94	*
総たんぱく質(g)	59.93	2.94	*	58.12	2.70	*
動物性たんぱく質(g)	33.28	2.36	*	31.96	2.12	*
総脂質(g)	51.21	3.24	*	53.69	3.39	*
動物性脂質(g)	25.10	2.25	*	25.96	2.17	*
炭水化物(g)	224.46	9.98	*	202.58	10.17	*
食塩相当量(g)	9.04	0.47	*	7.69	0.51	*
食塩相当量(g/1000kcal)	5.41	0.23		5.15	0.25	
カルウム(mg)	1981.07	123.63	*	2217.92	126.68	*
カルシウム(mg)	443.13	40.66	*	566.23	41.20	*
マグネシウム(mg)	212.72	12.66	*	219.14	12.58	*
リン(mg)	880.02	46.30	*	924.71	43.81	*
鉄(mg)	6.68	0.39	*	6.90	0.43	*
亜鉛(mg)	7.08	0.39	*	6.52	0.36	*
銅(mg)	0.98	0.05	*	0.96	0.05	*
ヨウ素(μ g)	609.58	730.77		129.15	1000.91	
ビタミンA(μ gRE)	686.49	93.03		488.14	81.42	
ビタミンD(μ g)	7.05	1.04		9.09	1.16	
ビタミンE(mg)	6.25	0.47	*	6.55	0.50	*
ビタミンK(μ g)	187.52	26.67	*	217.06	27.42	*
ビタミンB1(mg)	0.80	0.06	*	0.80	0.05	*
ビタミンB2(mg)	1.06	0.07	*	1.18	0.08	*
ナイアシン(mgNE)	14.17	1.01	*	13.21	0.88	*
ビタミンB6(mg)	1.01	0.07	*	1.01	0.06	*
ビタミンB12(μ g)	7.58	0.92	*	6.17	0.79	*
葉酸(μ g)	280.92	19.71	*	278.24	20.64	*
パントテン酸(mg)	4.89	0.27	*	5.09	0.26	*
ビタミンC(mg)	80.74	9.44	*	107.90	11.43	*
コレステロール(mg)	258.72	22.06	*	278.13	23.37	*
総食物繊維(g)	12.01	0.89	*	13.02	0.93	*
水溶性食物繊維(g)	2.78	0.22	*	3.06	0.24	*
不溶性食物繊維(g)	8.89	0.68	*	9.59	0.69	*
たんぱく質エネルギー比率(%)	14.08	0.39	*	15.38	0.40	*
脂肪エネルギー比率(%)	27.03	0.96		31.33	1.07	
炭水化物エネルギー比率(%)	58.89	1.09		53.29	1.16	
動物性たんぱく質比率(%)	52.74	1.72		54.55	1.81	
				51.13	0.63	

*: P<0.05

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

※朝食欠食の状況は栄養摂取状況調査の結果を用いている(調査を実施した日(特定の1日)における朝食の結果)

3. 身体状況調査の結果

身体状況 (20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

身長(cm)	性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数		20-29歳	79	164.4	7.8	1.1	141.5	147.7	151.2	154.4	157.7	164.0	170.4	174.2	176.6	183.0	183.0
		30-39歳	102	163.2	9.3	1.1	146.0	146.0	147.1	151.7	156.0	163.7	170.6	175.5	179.2	184.0	184.1
		40-49歳	149	164.5	8.0	0.6	148.6	148.6	152.2	154.5	158.0	164.3	170.3	175.9	177.2	183.2	184.0
		50-59歳	159	163.9	8.6	0.7	145.3	150.0	152.0	153.0	156.5	163.0	171.4	176.7	178.2	181.0	182.0
		60-69歳	213	159.6	9.0	0.5	143.3	143.4	145.7	148.2	153.0	159.0	167.3	171.5	175.2	178.4	183.0
		70歳以上	291	156.4	9.2	0.8	131.0	135.1	140.0	144.9	149.0	157.0	164.9	168.0	170.0	174.3	178.0
		(再掲)20-39歳	181	163.7	8.7	0.8	146.0	146.0	148.9	152.4	157.2	163.7	171.0	174.6	178.0	183.2	184.1
		(再掲)40-64歳	388	163.4	8.5	0.4	145.0	148.1	150.0	152.7	156.5	163.0	170.0	175.0	177.5	181.1	184.0
		(再掲)65歳以上	424	157.3	9.4	0.7	131.0	135.5	141.8	145.8	150.0	157.0	165.0	169.0	172.0	177.5	183.0
		(再掲)20歳以上※1	993	162.2	9.3	0.3	131.0	140.0	147.0	150.0	155.2	162.0	170.0	174.0	176.7	180.6	184.1
男性		(再掲)20歳以上※2	993	162.3	9.2	0.3	131.0	141.0	147.1	150.0	155.5	162.0	170.0	174.0	176.7	180.5	184.1
		20-29歳	37	170.8	5.0	1.0	157.0	157.4	161.6	162.3	168.7	171.6	174.0	177.3	178.6	183.0	183.0
		30-39歳	48	171.9	5.1	1.2	161.0	161.0	162.0	163.5	168.6	171.3	174.7	179.9	180.9	184.1	184.1
		40-49歳	68	170.2	5.8	0.6	159.0	159.0	159.7	160.1	166.0	170.3	174.0	177.2	179.2	184.0	184.0
		50-59歳	82	170.8	5.8	0.5	156.5	156.5	162.1	163.3	167.0	171.1	175.7	178.0	180.1	182.0	182.0
		60-69歳	97	167.6	5.5	0.6	152.7	153.4	158.8	160.0	163.3	167.5	171.0	175.7	177.4	183.0	183.0
		70歳以上	131	163.9	5.5	0.6	144.4	148.4	155.0	156.7	160.2	165.0	167.9	170.0	172.3	177.0	178.0
		(再掲)20-39歳	85	171.4	5.1	0.7	157.0	159.6	162.0	164.0	168.8	171.3	174.5	178.0	180.0	184.1	184.1
		(再掲)40-64歳	186	169.8	5.8	0.4	156.5	158.0	160.0	161.0	166.0	170.0	174.0	177.5	180.0	182.7	184.0
		(再掲)65歳以上	192	165.0	5.9	0.6	144.4	149.0	155.5	157.3	161.0	165.6	169.0	172.1	175.0	178.4	183.0
女性		(再掲)20歳以上※1	463	169.0	6.1	0.4	144.4	155.0	158.8	160.5	165.0	170.0	173.0	176.7	178.2	183.0	184.1
		(再掲)20歳以上※2	463	168.9	6.2	0.4	144.4	153.9	158.5	160.5	164.5	169.5	173.0	176.7	178.2	182.6	184.1
		20-29歳	42	159.4	5.7	1.4	147.5	147.5	148.6	151.9	156.2	158.0	163.2	168.3	169.3	170.0	170.0
		30-39歳	54	156.8	5.7	1.1	146.0	146.0	146.0	148.0	153.0	157.1	160.1	164.8	167.0	170.0	170.0
		40-49歳	81	158.8	5.3	0.4	148.6	148.6	149.0	152.3	155.0	157.9	163.0	166.8	168.0	170.0	170.0
		50-59歳	77	156.9	4.0	0.4	145.3	149.9	150.9	151.7	153.8	156.5	160.3	162.0	164.1	166.0	166.0
		60-69歳	116	153.3	5.4	0.8	143.3	143.3	144.8	146.0	149.0	154.0	156.0	160.0	161.8	168.5	168.5
		70歳以上	160	150.1	6.7	0.5	131.0	133.8	137.8	140.3	146.5	150.0	154.1	159.3	161.5	165.1	167.0
		(再掲)20-39歳	96	157.9	5.8	1.0	146.0	146.0	148.0	150.3	154.3	157.6	161.9	167.0	168.3	170.0	170.0
		(再掲)40-64歳	202	156.9	5.2	0.3	145.0	146.1	148.5	150.0	153.0	156.5	160.7	164.1	166.6	168.4	170.0
		(再掲)65歳以上	232	151.2	6.6	0.6	131.0	134.3	139.0	142.0	147.0	152.0	155.3	160.0	161.5	167.6	168.5
		(再掲)20歳以上※1	530	155.4	6.6	0.4	131.0	137.4	145.0	147.0	151.6	155.5	160.0	163.8	167.0	168.8	170.0
		(再掲)20歳以上※2	530	155.5	6.4	0.4	131.0	137.9	145.0	147.2	152.0	155.5	160.0	163.8	167.0	168.8	170.0
		(再掲)20歳以上※2	530	155.5	6.4	0.4	131.0	137.9	145.0	147.2	152.0	155.5	160.0	163.8	167.0	168.8	170.0

注1)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2)Pはパーセンタイルを表す。

体重の状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)

体重(kg)		人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
性別	20-29歳	79	59.7	13.0	2.1	40.5	40.5	42.1	44.7	50.7	55.8	73.6	79.0	84.3	92.0	92.0
	30-39歳	102	59.8	13.2	1.8	40.0	40.4	43.2	45.3	48.5	59.1	68.4	78.0	85.0	109.3	110.0
	40-49歳	149	63.3	11.8	1.1	40.7	42.0	45.2	49.0	54.0	63.0	71.0	79.1	83.0	101.0	130.0
	50-59歳	159	61.8	13.1	1.2	37.7	37.7	43.8	47.5	52.5	58.9	71.4	78.2	85.7	103.5	113.0
	60-69歳	212	59.4	9.9	0.8	39.6	39.6	42.8	45.0	52.3	60.0	66.8	72.1	74.1	87.9	91.2
	70歳以上	292	56.5	10.4	0.7	32.0	34.9	40.4	44.2	48.9	55.3	63.0	70.7	75.1	84.7	98.5
	(再掲)20-39歳	181	59.8	13.1	1.3	40.0	40.4	43.2	45.2	49.9	57.0	68.6	78.1	84.3	97.8	110.0
	(再掲)40-64歳	387	62.0	12.1	0.6	37.7	40.0	44.4	47.8	53.4	60.0	70.6	77.0	83.0	96.2	130.0
	(再掲)65歳以上	425	57.2	10.3	0.6	32.0	35.0	41.5	45.0	50.0	56.8	64.0	71.6	75.0	84.5	98.5
	(再掲)20歳以上※1	993	60.6	12.1	0.6	32.0	38.0	43.9	46.0	52.0	59.0	68.6	77.0	81.4	95.0	130.0
男性	(再掲)20歳以上※2	993	60.6	12.0	0.6	32.0	38.0	43.9	46.0	52.0	59.0	68.5	76.6	81.3	95.0	130.0
	20-29歳	37	68.0	12.3	2.8	48.5	48.6	49.4	51.1	56.9	69.1	77.0	85.1	90.4	92.0	92.0
	30-39歳	49	68.9	11.1	2.2	51.0	51.0	54.6	58.0	60.0	67.9	75.6	84.8	94.1	100.0	100.0
	40-49歳	68	69.8	10.8	1.3	50.0	50.4	53.3	55.8	63.0	69.7	74.8	82.9	91.5	130.0	130.0
	50-59歳	82	70.7	9.9	0.9	52.0	52.0	57.3	58.7	62.6	71.0	76.5	84.5	90.3	105.6	105.6
	60-69歳	96	66.0	7.4	0.7	46.0	46.0	54.0	58.2	62.0	65.0	70.0	73.8	77.6	91.2	91.2
	70歳以上	131	62.8	9.3	0.9	41.0	43.2	48.0	53.5	56.2	62.0	67.2	75.1	80.9	86.2	86.8
	(再掲)20-39歳	86	68.5	11.6	1.6	48.5	48.8	51.2	54.3	59.5	68.0	76.1	84.3	90.3	110.0	110.0
	(再掲)40-64歳	185	69.6	9.9	0.8	46.0	51.3	55.3	58.0	63.0	69.0	73.2	82.3	89.0	100.5	130.0
	(再掲)65歳以上	192	63.5	9.0	0.7	41.0	43.4	48.0	53.5	57.0	63.0	69.0	75.0	83.1	86.5	88.0
女性	(再掲)20歳以上※1	463	67.6	10.5	0.6	41.0	47.1	52.5	55.0	60.0	67.0	73.6	80.0	87.9	97.6	130.0
	(再掲)20歳以上※2	463	67.5	10.4	0.6	41.0	46.0	52.0	55.0	60.0	66.5	73.5	80.0	87.9	97.4	130.0
	20-29歳	42	53.1	9.2	2.2	40.5	40.5	41.3	42.4	46.3	53.1	55.9	60.7	79.2	85.0	85.0
	30-39歳	53	52.5	9.8	2.1	40.0	40.1	42.3	43.4	46.0	49.9	55.0	69.1	77.0	95.0	95.0
	40-49歳	81	56.8	8.9	1.2	40.7	41.0	44.5	45.3	52.0	55.1	61.8	68.8	73.5	84.5	84.5
	50-59歳	77	52.7	8.9	0.9	37.7	37.7	40.3	43.8	48.0	52.5	56.3	60.0	72.2	113.0	113.0
	60-69歳	116	54.3	8.4	0.9	39.6	39.6	41.8	43.0	48.8	54.0	58.5	67.1	68.7	83.0	83.0
	70歳以上	161	51.1	7.9	0.7	32.0	34.0	38.0	41.4	46.6	50.9	56.0	61.0	64.0	72.0	98.5
	(再掲)20-39歳	95	52.7	9.5	1.4	40.0	40.2	42.0	43.4	46.1	50.1	55.7	62.7	78.9	95.0	95.0
	(再掲)40-64歳	202	54.4	8.9	0.7	37.7	37.7	42.2	44.4	48.7	53.5	58.0	65.9	72.0	82.2	113.0
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	233	52.2	8.3	0.6	32.0	34.4	38.5	42.7	46.7	51.5	57.5	62.2	67.3	80.6	98.5
	(再掲)20歳以上※1	530	53.4	8.9	0.6	32.0	36.4	41.5	43.9	47.3	52.8	57.5	64.0	72.0	80.9	113.0
	(再掲)20歳以上※2	530	53.4	8.9	0.7	32.0	36.7	42.0	43.9	47.1	52.7	57.5	64.0	72.0	81.0	113.0
	(再掲)20歳以上※2	530	53.4	8.9	0.7	32.0	36.7	42.0	43.9	47.1	52.7	57.5	64.0	72.0	81.0	113.0

注1)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2)Pはパーセンタイルを表す。

腹囲の状況（20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上・年齢調整値、妊婦除外）

腹囲 (cm)		人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
性別	20-29歳	73	74.3	9.1	1.5	60.0	60.0	61.9	63.1	67.0	73.0	80.0	90.0	91.7	96.0	96.0
	30-39歳	101	80.4	10.1	1.1	60.3	60.7	65.0	69.0	73.2	77.8	90.0	94.1	97.1	113.8	114.0
	40-49歳	148	81.0	10.1	1.2	60.0	60.4	64.0	68.7	73.0	81.0	87.5	93.0	96.3	107.0	130.0
	50-59歳	159	81.9	10.8	1.1	57.0	58.8	64.0	67.0	75.0	82.0	88.0	93.7	99.1	125.2	130.0
	60-69歳	207	84.5	8.2	0.8	56.0	61.1	70.0	75.0	79.0	85.0	89.0	95.2	97.2	109.1	110.5
	70歳以上	286	86.2	9.6	0.7	58.0	63.9	70.5	75.0	80.0	86.0	91.0	99.5	103.9	109.7	146.0
	(再掲)20-39歳	174	77.9	10.1	1.0	60.0	60.5	63.0	65.1	70.0	76.9	86.0	91.0	96.0	107.8	114.0
	(再掲)40-64歳	384	81.8	10.1	0.6	57.0	61.0	64.0	68.0	75.0	82.5	88.0	93.1	97.5	109.0	130.0
	(再掲)65歳以上	416	85.9	9.3	0.6	56.0	64.2	70.6	75.0	80.0	85.5	90.5	98.0	102.0	109.8	146.0
	(再掲)20歳以上※1	974	82.2	10.2	0.5	56.0	61.0	65.0	69.0	75.0	82.8	89.0	95.0	98.0	109.0	146.0
男性	(再掲)20歳以上※2	974	82.2	10.2	0.5	56.0	61.0	65.0	69.0	75.0	82.5	89.0	95.0	98.1	109.4	146.0
	20-29歳	34	79.3	8.4	1.7	68.0	68.0	68.0	68.2	71.8	78.6	83.6	92.2	94.9	96.0	96.0
	30-39歳	49	85.4	8.3	1.2	70.5	70.5	74.0	76.1	77.5	86.1	90.0	94.8	100.0	114.0	140.0
	40-49歳	68	84.6	8.6	1.0	70.0	70.1	72.1	73.1	78.0	84.9	90.0	94.4	98.0	130.0	130.0
	50-59歳	82	87.9	9.0	0.8	74.0	74.0	76.1	79.0	82.1	86.1	92.0	98.0	106.6	130.0	130.0
	60-69歳	93	86.6	6.3	0.7	73.0	74.3	76.0	78.0	82.6	85.0	90.2	97.0	98.0	107.4	107.4
	70歳以上	130	88.4	9.5	1.4	67.5	72.5	75.0	76.0	81.5	87.0	95.1	101.9	107.1	109.9	110.0
	(再掲)20-39歳	83	83.1	8.8	1.1	68.0	68.0	68.4	71.0	77.0	82.0	90.0	93.4	96.8	114.0	140.0
	(再掲)40-64歳	184	86.2	8.4	0.6	70.0	71.1	74.0	76.0	80.1	85.2	90.0	96.0	100.2	123.3	130.0
	(再掲)65歳以上	189	88.1	8.9	1.2	67.5	73.0	75.0	76.0	81.9	87.0	94.7	100.4	103.9	109.8	110.0
女性	(再掲)20歳以上※1	456	85.7	8.8	0.4	67.5	68.0	72.7	75.0	79.0	85.0	90.0	97.0	100.6	109.9	130.0
	(再掲)20歳以上※2	456	85.8	8.8	0.4	67.5	68.0	73.0	75.0	79.5	85.0	90.0	97.0	101.5	109.9	130.0
	20-29歳	39	70.9	7.9	2.0	60.0	60.0	60.9	63.0	65.0	70.0	75.5	83.6	87.9	90.0	90.0
	30-39歳	52	76.2	9.5	1.7	60.3	60.3	62.2	65.3	70.1	73.9	81.0	91.3	97.0	100.0	100.0
	40-49歳	80	77.3	10.2	1.8	60.0	60.0	61.7	64.0	69.0	78.0	85.0	91.2	95.0	106.5	106.5
	50-59歳	77	75.8	8.9	1.2	57.0	58.0	61.2	64.0	68.1	76.0	82.0	85.0	87.8	123.0	123.0
	60-69歳	114	82.9	9.1	1.0	56.0	56.1	67.3	72.1	77.0	83.4	88.7	94.5	97.2	110.4	110.5
	70歳以上	156	84.3	9.3	0.8	58.0	59.7	69.1	71.0	78.0	85.0	89.5	95.0	100.7	106.9	146.0
	(再掲)20-39歳	91	73.9	9.2	1.2	60.0	60.0	61.8	63.1	67.0	72.0	78.0	88.5	94.9	100.0	100.0
	(再掲)40-64歳	200	77.3	9.7	0.9	57.0	60.3	62.6	64.0	70.0	77.0	83.5	90.0	95.0	106.1	123.0
(再掲)65歳以上※1	(再掲)65歳以上※1	227	84.1	9.2	0.6	56.0	58.7	69.4	72.0	78.0	85.0	89.0	95.0	98.0	109.2	146.0
	(再掲)20歳以上※1	518	78.7	10.3	0.8	58.0	60.2	63.0	65.0	71.0	78.0	86.0	91.0	96.0	106.0	146.0
	(再掲)20歳以上※2	518	78.5	10.2	0.8	56.0	60.2	63.0	65.0	70.6	78.0	86.0	91.0	95.9	106.0	146.0
	(再掲)20歳以上※2	518	78.5	10.2	0.8	56.0	60.2	63.0	65.0	70.6	78.0	86.0	91.0	95.9	106.0	146.0

注1)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2)Pはパーセンタイルを表す。

BMIの状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)

BMI(kg/m ²)		人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
性別	20-29歳	79	21.9	3.7	0.6	17.2	17.2	17.5	18.3	19.0	21.2	24.2	27.7	28.6	39.1	39.1
	30-39歳	101	22.3	3.8	0.6	19.6	17.5	18.5	18.6	19.6	20.7	24.5	27.4	30.2	37.2	37.4
	40-49歳	149	23.3	3.6	0.3	16.2	17.9	18.6	19.0	20.8	22.9	25.2	28.2	30.8	33.7	42.9
	50-59歳	159	22.8	3.3	0.3	14.5	14.6	17.9	19.4	20.9	22.6	24.2	26.7	29.4	36.1	41.7
	60-69歳	212	23.3	2.9	0.3	16.5	16.5	18.5	19.8	21.4	23.2	25.1	27.2	27.9	33.0	35.0
	70歳以上	290	23.0	3.3	0.2	15.4	16.3	18.2	19.0	21.1	22.4	24.9	27.8	29.1	31.1	49.5
	(再掲)20-39歳	180	22.1	3.7	0.4	16.9	17.1	18.2	18.5	19.4	21.0	24.4	27.7	28.8	35.6	39.1
	(再掲)40-64歳	387	23.1	3.3	0.2	14.5	15.9	18.6	19.2	20.9	22.7	24.9	26.9	29.2	32.6	42.9
	(再掲)65歳以上	423	23.1	3.2	0.2	15.4	16.5	18.2	19.4	21.2	22.5	24.9	27.7	28.6	37.7	49.5
	(再掲)20歳以上※1	990	22.9	3.4	0.2	14.5	16.8	18.4	18.9	20.5	22.4	24.9	27.3	28.8	32.9	49.5
男性	(再掲)20歳以上※2	990	22.9	3.4	0.2	14.5	16.8	18.4	18.9	20.5	22.3	24.9	27.2	28.8	33.3	49.5
	20-29歳	37	23.3	3.9	0.9	17.2	17.2	17.2	18.5	19.9	22.3	26.3	28.4	30.3	31.4	31.4
	30-39歳	48	23.6	3.1	0.4	17.9	17.9	19.0	19.7	20.7	23.6	25.5	27.9	29.3	34.1	34.1
	40-49歳	68	24.1	3.5	0.4	18.4	18.5	19.6	20.2	21.6	23.7	26.4	28.5	31.3	42.9	42.9
	50-59歳	82	24.2	2.7	0.2	18.2	18.5	20.5	20.9	22.3	24.1	25.6	27.8	30.4	37.1	37.1
	60-69歳	96	23.5	2.3	0.3	16.9	16.9	19.9	20.3	21.9	23.5	25.4	26.2	27.0	30.1	30.1
	70歳以上	131	23.4	3.2	0.4	15.4	15.7	18.9	19.7	21.6	22.8	25.0	28.1	30.1	32.5	33.5
	(再掲)20-39歳	85	23.4	3.5	0.5	17.2	17.2	18.2	19.3	20.7	23.5	25.5	28.3	30.4	34.1	34.1
	(再掲)40-64歳	185	24.1	3.0	0.2	16.5	18.5	20.0	20.9	22.0	23.9	25.8	27.3	30.4	32.5	42.9
	(再掲)65歳以上	192	23.3	3.0	0.3	15.4	16.0	18.9	19.9	21.7	22.9	24.9	27.6	29.4	30.9	33.5
女性	(再掲)20歳以上※1	462	23.7	3.1	0.2	15.4	17.1	18.9	20.0	21.6	23.4	25.4	27.7	29.6	32.0	42.9
	(再掲)20歳以上※2	462	23.7	3.1	0.2	15.4	17.1	18.9	20.0	21.6	23.4	25.4	27.7	29.5	31.9	42.9
	20-29歳	42	20.9	3.2	0.6	17.5	17.5	17.5	18.3	18.6	20.4	22.1	24.2	27.3	39.1	39.1
	30-39歳	53	21.4	4.0	0.8	16.9	17.4	18.4	18.6	19.2	19.9	21.6	27.0	34.5	37.4	37.4
	40-49歳	81	22.5	3.5	0.5	16.2	16.9	18.5	18.7	19.8	21.8	24.8	27.7	30.0	33.7	33.7
	50-59歳	77	21.4	3.3	0.3	14.5	14.5	16.4	17.9	20.3	21.1	22.6	23.4	26.6	41.7	41.7
	60-69歳	116	23.1	3.3	0.3	16.6	16.6	18.2	19.3	20.9	22.5	25.0	27.6	28.1	34.7	35.0
	70歳以上	159	22.7	3.3	0.3	16.2	16.2	17.4	18.7	20.6	22.1	24.8	27.9	28.4	31.2	49.5
	(再掲)20-39歳	95	21.1	3.6	0.5	16.9	17.3	18.1	18.4	18.9	20.0	21.9	25.3	28.8	39.1	39.1
	(再掲)40-64歳	202	22.1	3.4	0.3	14.5	14.8	17.7	18.6	20.1	21.6	23.5	25.8	28.5	33.4	41.7
総数	(再掲)65歳以上	231	22.9	3.4	0.2	16.2	16.3	17.9	18.8	21.0	22.2	24.8	27.8	28.4	33.3	49.5
	(再掲)20歳以上※1	528	22.1	3.5	0.2	14.5	16.3	18.1	18.6	19.8	21.5	23.7	26.9	28.4	34.9	49.5
	(再掲)20歳以上※2	528	22.1	3.5	0.2	14.5	16.2	18.0	18.6	19.8	21.4	23.6	26.8	28.4	35.3	49.5
	(再掲)20歳以上※2	528	22.1	3.5	0.2	14.5	16.2	18.0	18.6	19.8	21.4	23.6	26.8	28.4	35.3	49.5

注1)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2)PIはバーセンタイルを表す。

体型の状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)

体型の状況

性別	体型の状況	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20-29歳 ※2	(再掲) 20-69歳 ※2	(再掲) 40-69歳 ※2
男 性	低体重(やせ)	人 数	37	48	68	82	96	131	85	185	192	462	37	331	246
		割合 標準誤差	9.3 6.9	3.5 2.7	0.5 0.5	0.7 0.5	3.0 1.6	3.4 1.7	6.1 3.6	0.8 0.4	3.6 1.3	3.2 1.4	9.3 6.9	3.2 1.4	1.4 0.7
	普通	割合 標準誤差	49.5 11.7	65.0 5.4	65.6 8.7	69.3 4.6	69.3 5.4	72.0 4.8	58.0 6.7	66.7 3.9	72.4 3.7	65.7 2.2	49.5 11.7	64.3 2.2	68.1 3.1
		割合 標準誤差	41.2 12.2	31.5 5.5	33.9 8.7	30.1 4.7	27.7 5.6	24.6 5.0	35.9 6.9	32.5 3.9	24.1 4.0	31.2 2.7	41.2 12.2	32.5 2.7	30.5 3.1
	肥満	人 数	42	53	81	77	116	159	95	202	231	528	42	369	274
女 性	低体重(やせ)	割合 標準誤差	18.9 6.8	7.2 3.2	3.5 1.7	11.1 3.6	6.4 3.2	9.0 3.1	12.3 3.8	7.4 2.1	8.0 2.4	8.7 1.4	18.9 6.8	8.9 1.6	6.9 1.6
		割合 標準誤差	74.3 7.0	81.2 8.2	73.0 6.1	83.4 4.6	69.6 5.0	67.4 3.7	78.2 5.7	76.6 3.8	68.2 3.9	74.0 3.3	74.5 7.0	76.2 3.4	75.0 3.6
	普通	割合 標準誤差	6.8 5.0	11.6 5.8	23.5 5.7	5.5 2.3	24.0 4.8	23.6 3.6	9.5 4.0	16.0 2.9	23.8 3.4	17.3 2.7	16.6 2.7	14.9 2.7	18.1 3.0
		割合 標準誤差	41.2 12.2	31.5 5.5	33.9 8.7	30.1 4.7	27.7 5.6	24.6 5.0	35.9 6.9	32.5 3.9	24.1 4.0	31.2 2.7	41.2 12.2	32.5 2.7	30.5 3.1
	肥満	人 数	42	53	81	77	116	159	95	202	231	528	42	369	274

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

低体重(やせ):BMI<18.5kg/m² 普通:18.5kg/m²≤BMI<25kg/m² 肥満:BMI≥25kg/m²

低栄養傾向(BMI≤20)の高齢者の割合(65歳以上、性別)

性別	BMI	年齢区分	65歳以上 人 数
総数	20未満	人 数	423
		割合 標準誤差	13.8 2.7
		割合 標準誤差	86.2 2.7
		人 数	192
男 性	20未満	割合 標準誤差	10.3 2.7
		割合 標準誤差	16.6 3.7
		人 数	231
		割合 標準誤差	89.7 2.7
女 性	20未満	割合 標準誤差	83.4 3.7
		割合 標準誤差	83.4 3.7
		人 数	231
		割合 標準誤差	89.7 2.7

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

体型別栄養素等摂取量(20歳以上、男女)

	男性					女性				
	低体重(やせ)(n=16)		普通(n=327)		P値	低体重(やせ)(n=51)		普通(n=360)		P値
	平均	標準誤差	平均	標準誤差		平均	標準誤差	平均	標準誤差	
エネルギー(kcal)	1952.70	136.47	2107.78	32.87		1723.21	71.07	1712.68	27.67	
総たんぱく質(g)	66.73	5.84	77.33	1.41		66.87	2.75	66.50	1.07	
動物性たんぱく質(g)	35.52	4.57	41.91	1.10		35.78	2.13	35.14	0.83	
総脂質(g)	57.20	6.21	62.44	1.50		52.58	3.42	53.85	1.33	
動物性脂質(g)	27.16	4.30	31.51	1.04		26.88	2.19	25.86	0.85	
炭水化物(g)	278.24	19.68	281.81	4.74		238.43	10.35	233.62	4.03	
食塩相当量(g)	9.49	0.92	10.98	0.22		8.82	0.52	9.36	0.20	
食塩相当量(g/1000kcal)	5.14	0.43	5.33	0.10		5.27	0.25	5.55	0.10	
カルシウム(mg)	2101.54	241.15	2569.00	58.08		2306.73	128.37	2432.15	49.98	
カルシウム(mg)	434.43	77.91	559.52	18.76		532.06	41.64	547.80	16.21	
マグネシウム(mg)	225.54	24.82	279.52	5.98		243.22	12.79	252.01	4.98	
リン(mg)	921.61	90.36	1109.22	21.76		995.28	44.26	980.96	17.23	
鉄(mg)	7.38	0.76	8.41	0.18		7.98	0.44	7.98	0.17	
亜鉛(mg)	7.64	0.76	9.11	0.18		7.87	0.37	7.67	0.14	
銅(mg)	1.08	0.10	1.28	0.02		1.14	0.05	1.14	0.02	
ヨウ素(μg)	354.91	1395.85	1622.75	336.19		2027.04	1018.58	1495.98	396.60	
ビタミンA(μgRE)	507.88	177.70	581.93	42.80		585.10	80.40	562.86	31.31	
ビタミンD(μg)	5.98	1.97	7.94	0.47		7.41	1.17	7.32	0.45	
ビタミンE(mg)	7.32	0.90	7.24	0.22		6.56	0.51	6.86	0.20	
ビタミンK(μg)	158.90	51.09	271.75	12.31		284.67	27.73	279.18	10.80	
ビタミンB1(mg)	0.88	0.11	0.98	0.03		0.84	0.05	0.87	0.02	
ビタミンB2(mg)	1.09	0.13	1.30	0.03		1.23	0.08	1.20	0.03	
ナイアシン(mgNE)	15.13	1.95	17.81	0.47		14.34	0.84	14.34	0.33	
ビタミンB6(mg)	1.09	0.13	1.32	0.03		1.12	0.06	1.16	0.02	
ビタミンB12(μg)	5.07	1.74	7.50	0.42		5.87	0.79	6.10	0.31	
葉酸(μg)	261.56	37.71	331.41	9.08		320.84	20.99	329.89	8.17	
パントテン酸(mg)	5.15	0.53	6.14	0.13		5.66	0.27	5.58	0.10	
ビタミンC(mg)	82.22	18.16	108.72	4.37		118.21	11.59	122.81	4.51	
コレステロール(mg)	330.67	42.34	317.54	10.20		286.14	23.39	277.31	9.11	
総食物繊維(g)	12.39	1.73	15.62	0.42		14.77	0.95	15.68	0.37	
水溶性食物繊維(g)	2.86	0.43	3.60	0.10		3.42	0.24	3.68	0.09	
不溶性食物繊維(g)	9.29	1.32	11.46	0.32		10.84	0.71	11.46	0.27	
たんぱく質エネルギー比率(%)	13.59	0.75	14.77	0.18		15.70	0.40	15.65	0.16	
脂肪エネルギー比率(%)	25.11	1.83	26.50	0.44		26.94	1.08	28.14	0.42	
炭水化物エネルギー比率(%)	61.29	2.07	58.73	0.50		57.36	1.18	56.22	0.46	
動物性たんぱく質比率(%)	49.63	3.28	52.70	0.79		52.98	1.83	51.77	0.71	

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

低体重(やせ): BMI<18.5kg/m²

普通: 18.5kg/m² ≤ BMI<25kg/m²

肥満: BMI ≥ 25kg/m²

*: P<0.05(肥満vs普通)

体型別食品群別摂取量(20歳以上、男女) (g)

	男性						女性					
	低体重(やせ)(n=16)			普通(n=327)			低体重(やせ)(n=51)			普通(n=360)		
	平均	標準誤差		平均	標準誤差		平均	標準誤差		平均	標準誤差	
	肥満(n=119)	平均	標準誤差	P値	肥満(n=117)	平均	標準誤差	P値	肥満(n=117)	平均	標準誤差	P値
穀類	490.5	40.7	470.1	9.8	481.4	15.6	375.2	20.2	349.7	7.9	354.7	14.1
米・加工品	357.2	44.5	343.5	10.7	343.1	17.0	282.2	20.9	233.4	8.1	237.8	14.6
小麦・加工品	119.0	29.1	112.5	7.0	122.4	11.1	91.1	13.7	102.2	5.3	104.8	9.6
その他の穀類・加工品	14.3	14.5	14.1	3.5	15.8	5.6	1.8	7.0	14.1	2.7	12.1	4.9
いも類	63.5	17.4	56.4	4.2	53.2	6.7	38.0	8.8	50.2	3.4	43.2	6.2
砂糖・甘味料類	9.6	2.4	6.5	0.6	7.7	0.9	7.6	1.3	7.6	0.5	6.9	0.9
豆類	47.2	20.7	70.1	5.0	70.9	7.9	69.8	13.0	72.2	5.1	73.0	9.1
野菜類	232.0	48.8	316.9	11.7	341.6	18.7	275.1	23.7	304.2	9.2	307.7	16.6
緑黄色野菜	86.6	23.5	96.9	5.7	115.1	9.0	112.4	13.7	110.5	5.4	111.3	9.6
その他の野菜	131.5	33.2	186.7	8.0	189.7	12.7	140.9	15.5	174.9	6.0	182.4	10.8
漬け物	10.7	4.9	11.3	1.2	11.5	1.9	9.5	3.0	9.3	1.2	9.8	2.1
果実類	111.6	31.5	114.3	7.6	92.8	12.0	145.8	21.4	140.8	8.3	129.0	15.0
きのこ類	7.7	8.9	17.7	2.2	22.5	3.4	13.3	4.0	16.4	1.6	19.6	2.8
海藻類	5.7	5.4	11.7	1.3	10.1	2.1	10.2	2.8	10.0	1.1	11.5	1.9
魚介類	71.9	17.6	83.6	4.2	81.6	6.8	64.6	9.1	68.8	3.6	59.2	6.4
肉類	86.8	21.6	108.4	5.2	112.4	8.3	79.6	9.6	79.5	3.7	90.7	6.7
卵類	35.9	7.8	30.7	1.9	36.9	3.0	33.6	4.2	30.4	1.6	37.1	2.9
乳類	109.1	42.4	133.7	10.2	119.6	16.2	140.4	24.1	147.3	9.4	100.5	16.8
油脂類	10.8	2.6	12.1	0.6	12.3	1.0	8.5	1.2	9.9	0.5	10.2	0.9
菓子類	35.1	10.6	21.6	2.5	15.5	4.0	26.5	9.3	28.9	3.6	43.3	6.5
嗜好飲料類	793.2	146.4	981.0	35.3	919.0	56.1	706.8	81.6	777.9	31.8	893.8	57.0
調味料・香辛料類	99.5	24.0	109.9	5.8	102.6	9.2	106.8	12.6	86.7	4.9	93.1	8.8

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

低体重(やせ): BMI<18.5kg/m²

普通: 18.5kg/m² ≤ BMI<25kg/m²

肥満: BMI ≥ 25kg/m²

※: P<0.05(肥満vs普通)

高齢者の低栄養傾向別栄養素等摂取量(65歳以上、男女)

	男性				女性			
	BMI20以下 (低栄養傾向) (n=21)		BMI20超 (n=171)		BMI20以下 (低栄養傾向) (n=43)		BMI20超 (n=188)	
	平均	標準誤差	平均	標準誤差	平均	標準誤差	平均	標準誤差
エネルギー(kcal)	1967.50	117.43	2107.95	42.51	1735.58	76.64	1759.47	38.43
総たんぱく質(g)	70.46	5.02	79.36	1.82	68.59	3.23	68.47	1.62
動物性たんぱく質(g)	35.66	3.86	41.91	1.40	36.93	2.58	35.27	1.29
総脂質(g)	53.31	5.24	59.42	1.90	50.66	3.45	51.53	1.73
動物性脂質(g)	27.08	3.41	29.37	1.23	26.37	2.18	23.93	1.09
炭水化物(g)	290.61	17.07	288.53	6.18	244.45	11.98	252.07	6.01
食塩相当量(g)	9.87	0.95	11.55	0.34	8.88	0.63	9.84	0.32
食塩相当量(g/1000kcal)	5.17	0.42	5.56	0.15	5.31	0.32	5.64	0.16
カルウム(mg)	2494.39	230.77	2835.97	83.55	2638.02	166.07	2693.30	83.28
カルシウム(mg)	525.29	75.01	616.27	27.15	550.04	49.43	574.13	24.79
マグネシウム(mg)	258.48	23.22	301.43	8.41	263.71	16.32	272.34	8.18
リン(mg)	1008.06	79.69	1159.81	28.85	1021.06	51.90	1016.68	26.02
鉄(mg)	8.39	0.77	9.40	0.28	8.38	0.55	8.69	0.27
亜鉛(mg)	8.09	0.67	9.18	0.24	8.03	0.44	7.68	0.22
銅(mg)	1.29	0.10	1.36	0.04	1.26	0.07	1.21	0.04
ヨウ素(μg)	731.90	1440.23	2455.48	521.40	1862.50	1497.04	2413.38	750.73
ビタミンA(μgRE)	466.70	141.63	622.52	51.27	505.85	76.54	564.46	38.38
ビタミンD(μg)	5.85	1.87	8.88	0.68	8.39	1.35	7.42	0.68
ビタミンE(mg)	7.92	0.84	7.67	0.30	7.30	0.62	7.37	0.31
ビタミンK(μg)	229.37	54.36	313.89	19.68	296.46	37.92	309.14	19.02
ビタミンB1(mg)	0.89	0.10	1.00	0.04	0.88	0.07	0.94	0.03
ビタミンB2(mg)	1.23	0.13	1.38	0.05	1.18	0.09	1.31	0.05
ナイアシン(mgNE)	16.47	2.00	18.15	0.73	15.30	1.10	15.51	0.55
ビタミンB6(mg)	1.29	0.12	1.42	0.04	1.35	0.08	1.25	0.04
ビタミンB12(μg)	6.11	1.83	8.34	0.66	7.64	1.02	6.75	0.51
葉酸(μg)	332.74	35.12	382.56	12.71	357.28	28.34	376.06	14.21
パントテン酸(mg)	5.75	0.50	6.38	0.18	5.78	0.32	5.82	0.16
ビタミンC(mg)	134.02	19.55	137.58	7.08	149.00	15.96	158.37	8.00
コレステロール(mg)	328.82	42.32	315.12	15.32	268.73	24.03	273.26	12.05
総食物繊維(g)	16.00	1.80	18.26	0.65	16.94	1.22	18.02	0.61
水溶性食物繊維(g)	3.76	0.45	4.24	0.16	3.89	0.31	4.21	0.15
不溶性食物繊維(g)	11.86	1.37	13.38	0.50	12.49	0.90	13.07	0.45
たんぱく質エネルギー比率(%)	14.19	0.61	15.11	0.22	15.94	0.49	15.68	0.25
脂肪エネルギー比率(%)	23.79	1.66	25.31	0.60	26.07	1.21	26.37	0.61
炭水化物エネルギー比率(%)	62.02	1.86	59.58	0.67	57.99	1.30	57.95	0.65
動物性たんぱく質比率(%)	47.58	2.85	51.73	1.03	53.70	2.16	50.05	1.08

(注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。(有意差なし)

高齢者の低栄養傾向別食品群別摂取量(65歳以上、男女) (g)									
	男性					女性			
	BMI20以下 (低栄養傾向) (n=21)			BMI20超 (n=171)		BMI20以下 (低栄養傾向) (n=43)			BMI20超 (n=188)
	平均	標準誤差	P値	平均	標準誤差	平均	標準誤差	平均	標準誤差
穀類	487.4	33.1	12.0	445.6	12.0	348.3	22.6	351.9	11.3
米・加工品	338.5	37.5	13.6	304.2	13.6	264.6	22.9	226.6	11.5
小麦・加工品	147.8	26.0	9.4	125.9	9.4	77.5	15.1	106.5	7.6
その他の穀類・加工品	1.0	14.4	5.2	15.5	5.2	6.2	8.8	18.8	4.4
いも類	75.3	16.0	5.8	56.6	5.8	67.3	10.7	55.9	5.4
砂糖・甘味料類	9.0	2.6	1.0	7.4	1.0	8.8	1.6	8.1	0.8
豆類	78.0	20.7	7.5	75.8	7.5	73.4	14.2	64.3	7.1
野菜類	305.3	45.1	16.3	360.1	16.3	315.4	29.8	330.2	14.9
緑黄色野菜	142.1	22.9	8.3	110.5	8.3	131.3	17.4	131.0	8.7
その他の野菜	160.1	30.3	11.0	208.3	11.0	160.4	19.4	182.0	9.7
漬け物	13.1	5.5	2.0	15.1	2.0	14.6	4.6	13.8	2.3
果実類	175.4	37.3	13.5	168.0	13.5	183.5	28.7	205.0	14.4
きのこ類	18.8	8.0	2.9	21.0	2.9	10.9	4.2	17.1	2.1
海藻類	7.7	6.7	2.4	13.6	2.4	13.9	4.1	14.6	2.0
魚介類	90.5	17.4	6.3	96.6	6.3	90.2	12.0	78.3	6.0
肉類	60.2	17.9	6.5	91.7	6.5	64.1	9.5	70.8	4.8
卵類	43.0	8.0	2.9	31.9	2.9	26.5	4.8	30.1	2.4
乳類	87.9	41.1	14.9	142.8	14.9	150.0	25.7	141.7	12.9
油脂類	10.2	2.1	0.8	11.1	0.8	7.4	1.3	9.2	0.7
菓子類	26.2	9.7	3.5	23.4	3.5	34.7	9.6	34.2	4.8
嗜好飲料類	740.0	141.7	51.3	1008.7	51.3	666.2	109.8	878.7	55.1
調味料・香辛料類	67.6	23.6	8.5	104.4	8.5	97.0	16.8	91.8	8.4

(有意差なし)

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

歩行数(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

歩行数(1日装着していた者のみ)(歩/日)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20-29歳	59	9280	4666	882	930	994	1298	4094	5630	9028	12481	14524	16678	23566	23566
	30-39歳	68	8022	3920	609	376	376	2368	3298	5357	7636	10351	12611	16645	20000	20000
	40-49歳	106	8539	4760	579	589	591	1509	3231	5135	7657	11664	15875	17434	24087	24764
	50-59歳	135	8124	3757	375	935	1917	2881	3565	5799	7831	10480	13279	14832	21834	24495
	60-69歳	183	7396	3766	385	411	411	1643	2586	4481	7027	9485	11951	15306	17241	18886
	70歳以上	217	5989	3971	513	155	217	625	1290	3055	5430	8358	11516	12674	19079	19680
	(再掲)20-39歳	127	8592	4303	655	376	960	2195	3480	5585	8411	11155	13357	15850	23235	23566
	(再掲)40-64歳	310	8078	4198	406	411	551	2262	3238	5107	7536	10909	14323	15880	18941	24764
	(再掲)65歳以上	331	6472	3948	479	155	275	841	1527	3439	5947	8772	11745	13282	18851	19680
	(再掲)20歳以上※1	768	7764	4266	342	155	406	1500	2719	4707	7210	10515	13332	15437	19688	24764
男性	(再掲)20歳以上※2	768	7768	4231	339	155	408	1509	2726	4711	7212	10508	13306	15336	19688	24764
	20-29歳	29	9627	5109	1128	930	952	1374	4231	5576	9721	12456	15187	22990	23566	23566
	30-39歳	27	6762	3694	491	376	376	334	2292	4473	6402	8425	12498	15746	17100	17100
	40-49歳	48	9308	4423	779	1448	1448	3216	3630	6077	7866	11517	15800	17287	19695	19695
	50-59歳	67	8774	4562	717	935	1743	2246	2937	6089	8314	11645	14816	16026	24495	24495
	60-69歳	83	7126	3879	452	500	684	1421	2391	3621	6995	9942	11848	14656	17167	17167
	70歳以上	104	6492	3934	622	316	325	815	1506	3500	5490	10004	11498	13283	18502	18612
	(再掲)20-39歳	56	8380	4730	783	376	376	1431	2402	4875	8068	11131	13136	18627	23566	23566
	(再掲)40-64歳	146	8619	4407	590	935	1177	2322	3201	5936	8006	10753	14848	17138	22207	24495
	(再掲)65歳以上	156	6672	3959	575	316	388	912	1517	3734	5557	10168	11587	13295	17671	18612
女性	(再掲)20歳以上※1	358	8015	4436	398	316	506	1515	2462	4747	7655	10706	13654	15521	22547	24495
	(再掲)20歳以上※2	358	7937	4421	390	316	502	1511	2425	4708	7603	10703	13459	15416	22560	24495
	20-29歳	30	8944	4254	1115	1227	1227	1227	3834	5738	8913	12465	14602	15410	15911	15911
	30-39歳	41	8598	3921	786	1138	1138	2913	3428	6100	8531	10617	12579	18508	20000	20000
	40-49歳	58	7854	4980	899	589	589	856	2959	4000	6482	11661	15874	16036	24764	24764
	50-59歳	68	7473	2598	336	2650	2844	3548	3793	5717	7560	9842	10857	11848	13217	13217
	60-69歳	100	7609	3679	388	411	411	2160	3812	4981	7235	9970	12667	15311	18866	18866
	70歳以上	113	5520	3965	667	155	186	397	933	2700	4998	7243	11611	12569	19482	19680
	(再掲)20-39歳	71	8729	4026	792	1138	1140	2365	3486	5950	8765	11101	13801	15770	20000	20000
	(再掲)40-64歳	164	7553	3928	408	411	411	1637	3508	4684	6717	9863	13153	15869	17349	24764
(再掲)65歳以上	(再掲)65歳以上	175	6303	3942	539	155	206	764	1574	3347	6101	8390	11882	13646	19401	19680
	(再掲)20歳以上※1	410	7521	4086	389	155	397	1272	2947	4502	6874	9870	12736	15369	19550	24764
	(再掲)20歳以上※2	410	7603	4035	391	155	402	1492	3080	4714	6981	9902	12730	15311	19542	24764
	(再掲)20歳以上※2	410	7603	4035	391	155	402	1492	3080	4714	6981	9902	12730	15311	19542	24764

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

注1)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2)Pはパーセンタイルを表す。

運動習慣のある者の割合

主)値は保建所轄区域との標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

1. *Introduction*

糖尿病と言われたことのある者の割合（20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値）

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ある	人数	63	83	116	119	179	256	146	302	368	816	816
		割合	1.8	5.4	1.1	7.5	19.3	17.6	3.7	9.1	16.6	10.2	10.4
	ない	標準誤差	1.8	2.1	0.9	2.5	3.3	2.9	1.5	2.2	2.2	1.4	1.4
		割合	98.2	94.6	98.9	92.5	80.7	82.4	96.3	90.9	83.4	89.8	89.6
	無回答	標準誤差	1.8	2.1	0.9	2.5	3.3	2.9	1.5	2.2	2.2	1.4	1.4
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
男性	ある	人数	29	38	47	61	79	120	67	138	169	374	374
		割合	4.1	9.7	0.0	10.5	26.5	19.1	7.0	12.3	19.1	12.8	13.4
	ない	標準誤差	4.2	5.4	0.0	5.5	4.9	3.3	3.7	3.3	3.0	2.0	2.0
		割合	95.9	90.3	100.0	89.5	73.5	80.9	93.0	87.7	80.9	87.2	86.6
	無回答	標準誤差	4.2	5.4	0.0	5.5	4.9	3.3	3.7	3.3	3.0	2.0	2.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女性	ある	人数	34	45	69	58	100	136	79	164	199	442	442
		割合	0.0	2.5	1.9	4.5	13.8	16.1	1.4	6.3	14.6	7.7	7.4
	ない	標準誤差	0.0	1.9	1.5	3.1	4.0	3.7	1.1	2.1	2.6	1.4	1.4
		割合	100.0	97.5	98.1	95.5	86.2	83.9	98.6	93.7	85.4	92.3	92.6
	無回答	標準誤差	0.0	1.9	1.5	3.1	4.0	3.7	1.1	2.1	2.6	1.4	1.4
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

糖尿病の治療を受けている者の割合（20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値）

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	受けている	人数	0	4	2	11	36	48	4	30	67	101	101
		割合 標準誤差	0.0 0.0	45.7 29.7	25.5 27.3	19.0 13.1	54.0 11.7	77.3 8.7	45.7 29.7	28.7 10.9	77.3 7.0	59.0 5.2	58.8 5.1
	受けていない	割合 標準誤差	0.0 0.0	54.3 29.7	74.5 27.3	81.0 13.1	46.0 11.7	22.7 8.7	54.3 29.7	71.3 10.9	22.7 7.0	41.0 5.2	41.2 5.1
		無回答	割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
	男性	受けている	人数	0	2	0	8	22	26	2	19	37	58
割合 標準誤差			0.0 0.0	63.7 33.2	0.0 0.0	17.9 12.7	55.7 12.1	80.8 8.2	63.7 33.2	30.9 13.6	80.8 7.8	60.7 7.1	61.1 7.1
受けていない		割合 標準誤差	0.0 0.0	36.3 33.2	0.0 0.0	82.1 12.7	44.3 12.1	19.2 8.2	36.3 33.2	69.1 13.6	19.2 7.8	39.3 7.1	38.9 7.1
		無回答	割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
女性		受けている	人数	0	2	2	3	14	22	2	11	30	43
	割合 標準誤差		0.0 0.0	0.0 0.0	25.5 27.3	21.6 23.1	51.6 17.0	73.4 17.7	0.0 0.0	24.6 15.8	73.4 14.1	56.5 10.8	54.9 10.5
	受けていない	割合 標準誤差	0.0 0.0	100.0 0.0	74.5 27.3	78.4 23.1	48.4 17.0	26.6 17.7	100.0 0.0	75.4 15.8	26.6 14.1	43.5 10.8	45.1 10.5
		無回答	割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

4. 生活習慣調査①の結果(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(1)栄養・食生活に関する状況

栄養成分表示を参考にする者の状況(%)

問1 あなたは、ふだん食品を購入する時に栄養成分の表示を参考にしていますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	いつもしている	人 数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合	7.4	6.3	6.5	13.3	14.5	9.1	6.8	11.0	10.3	9.2	9.2
	あまりしない	標準誤差	3.2	3.5	2.5	3.5	2.8	2.0	2.5	2.0	1.6	1.2	1.3
		割合	35.8	38.7	34.2	37.5	33.3	28.1	37.5	34.7	30.1	33.4	33.6
	時々している	標準誤差	6.1	7.2	6.4	3.1	4.6	4.6	5.6	4.2	4.0	2.5	2.4
		割合	27.9	33.0	34.0	25.7	36.1	42.1	30.8	32.1	39.5	33.8	33.7
	いつもしない	標準誤差	4.2	9.1	5.5	4.9	3.6	4.2	4.3	4.3	3.6	2.1	2.0
男 性	いつもしている	人 数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合	5.5	0.0	5.0	2.5	10.8	2.2	2.3	4.7	4.7	4.3	4.2
	あまりしない	標準誤差	4.6	0.0	2.8	1.8	3.2	1.4	2.1	1.7	1.5	1.5	1.4
		割合	26.9	27.8	17.1	26.4	20.6	23.3	27.5	22.1	22.0	23.3	23.6
	時々している	標準誤差	11.8	4.4	5.9	4.9	5.4	5.0	6.3	4.4	3.7	2.5	2.4
		割合	10.9	33.3	37.7	28.9	43.7	43.9	23.8	36.1	43.0	34.3	34.5
	いつもしない	標準誤差	4.9	10.8	8.1	6.6	5.5	3.0	6.3	6.2	2.8	3.0	2.9
女 性	いつもしている	人 数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合	8.9	11.1	8.0	23.7	17.6	14.6	10.2	17.3	14.5	13.9	14.1
	あまりしない	標準誤差	5.0	5.8	5.5	6.1	3.7	3.3	3.8	3.6	2.5	1.5	1.6
		割合	42.7	46.9	51.1	48.3	43.7	32.0	45.1	47.3	36.4	43.4	43.7
	時々している	標準誤差	9.2	12.0	7.5	5.6	6.2	5.3	7.0	5.0	4.8	3.0	2.9
		割合	40.9	32.7	30.3	22.5	29.9	40.7	36.2	28.2	36.8	33.2	32.9
	いつもしない	標準誤差	7.5	8.8	6.2	5.5	4.9	6.5	4.1	4.0	5.3	2.3	2.3
無回答	いつもしている	人 数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	あまりしない	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	時々している	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	いつもしない	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

必要だと思う栄養成分表示の項目(%)

問2 あなたが、食品を購入する際の参考として、必要だと思う栄養成分表示はどれですか。(複数回答)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	人 数		81	107	157	161	216	304	188	399	439	1026	1026
	エネルギー(熱量)	割合	56.1	60.5	59.2	62.2	45.2	30.2	58.6	58.9	33.3	50.5	50.7
		標準誤差	5.7	4.3	4.9	4.7	3.6	4.6	4.0	3.8	4.1	2.7	2.7
	たんぱく質	割合	28.7	31.3	18.2	24.9	22.1	29.5	30.2	21.7	27.5	25.4	25.7
		標準誤差	6.2	6.6	3.4	4.2	3.5	2.6	5.6	2.1	2.3	2.3	2.5
	脂質	割合	29.8	26.7	26.9	34.8	33.0	27.9	28.0	29.9	30.4	29.1	29.2
		標準誤差	6.9	7.6	2.9	4.5	3.7	3.0	5.7	2.3	3.1	2.1	2.2
	炭水化物	割合	11.8	12.9	14.9	15.0	15.6	10.2	12.4	15.1	11.6	13.3	13.4
		標準誤差	5.7	3.5	3.7	3.2	2.5	2.1	3.0	1.8	2.0	1.4	1.4
	ナトリウム(食塩相当量)	割合	21.8	18.3	25.1	39.8	37.5	30.6	19.8	33.1	32.5	28.5	28.5
		標準誤差	6.5	5.5	4.4	4.1	4.1	3.9	3.4	2.7	3.5	2.2	2.1
	飽和脂肪酸	割合	5.7	6.6	8.4	9.5	10.0	6.3	6.2	9.1	7.3	7.6	7.6
		標準誤差	3.1	2.9	3.0	3.1	2.5	1.7	2.1	1.8	1.8	1.0	1.0
男 性	コレステロール	割合	9.4	16.0	26.7	28.9	33.6	28.3	13.2	27.8	30.6	24.5	24.4
		標準誤差	3.1	2.5	4.1	4.2	3.4	3.0	2.2	2.9	3.1	1.7	1.8
	糖類	割合	26.5	23.4	26.5	36.8	38.8	26.7	24.7	32.4	30.3	29.3	29.3
		標準誤差	8.2	5.6	3.3	5.8	4.5	3.0	4.8	3.3	2.7	2.5	2.6
	食物繊維	割合	25.5	27.2	24.2	30.9	31.2	34.4	26.5	28.4	33.4	28.8	29.0
		標準誤差	7.0	5.3	4.7	4.9	3.4	3.4	5.0	3.4	2.7	2.2	2.3
	ビタミン・ミネラル類	割合	29.3	40.7	31.4	30.3	30.0	27.9	35.9	30.2	28.9	31.3	31.5
		標準誤差	6.7	5.9	4.9	4.9	3.4	3.6	3.8	3.4	3.3	2.2	2.3
	その他	割合	6.7	3.1	1.6	1.0	1.6	2.4	4.6	1.5	2.1	2.7	2.6
		標準誤差	3.3	2.8	1.5	0.9	1.0	0.9	2.1	0.8	0.7	0.8	0.8
	特にない	割合	14.6	16.8	28.2	17.8	20.9	28.7	15.9	22.7	26.7	22.8	22.4
		標準誤差	3.8	4.1	3.9	3.4	3.7	3.0	3.0	2.4	3.0	2.1	2.1
女 性	人 数		37	49	73	81	99	134	86	191	196	473	473
	エネルギー(熱量)	割合	60.6	44.7	46.5	49.5	46.4	23.7	51.5	48.4	28.6	44.3	43.8
		標準誤差	11.4	7.8	8.7	5.1	5.4	4.7	7.0	4.9	4.4	3.3	3.1
	たんぱく質	割合	33.9	29.1	7.7	13.5	14.8	27.6	31.2	12.3	23.5	20.4	21.0
		標準誤差	9.7	11.3	3.2	3.0	4.0	3.8	6.6	2.1	2.8	2.2	2.3
	脂質	割合	14.1	30.4	19.0	25.0	17.8	23.1	23.4	20.8	22.2	21.7	21.9
		標準誤差	6.9	11.3	5.0	3.7	4.6	6.4	7.0	2.2	5.3	2.6	2.5
	炭水化物	割合	7.9	19.4	10.8	13.0	8.8	11.9	14.5	11.2	11.3	12.0	12.1
		標準誤差	6.5	6.9	5.6	5.0	2.8	3.1	4.9	3.2	2.7	2.1	2.1
	ナトリウム(食塩相当量)	割合	25.8	11.5	10.5	34.0	23.4	21.3	17.6	21.5	22.6	20.3	20.8
		標準誤差	10.1	6.8	4.9	7.1	5.2	2.8	6.7	4.9	3.3	3.4	3.3
	飽和脂肪酸	割合	3.8	4.3	6.9	8.8	6.2	4.0	4.0	7.4	4.7	5.7	5.6
		標準誤差	3.4	2.7	4.6	3.1	2.8	2.0	2.0	1.9	2.2	1.0	1.0
	コレステロール	割合	10.1	19.1	19.6	32.5	20.4	27.2	15.3	25.3	25.2	21.7	22.0
		標準誤差	5.3	5.8	3.7	5.3	4.2	4.0	4.2	2.4	3.6	1.8	1.9
女 性	糖類	割合	13.8	21.9	22.7	33.4	34.4	19.5	18.4	28.7	23.6	24.4	24.5
		標準誤差	7.8	5.9	4.9	4.9	5.5	5.2	4.6	3.8	4.7	2.2	2.2
	食物繊維	割合	34.4	20.3	8.5	18.9	22.9	32.8	26.3	15.9	29.8	22.3	23.0
		標準誤差	9.1	5.2	3.7	3.3	4.7	4.7	4.2	3.1	3.8	2.3	2.3
	ビタミン・ミネラル類	割合	33.7	40.7	16.4	17.0	22.7	28.0	37.7	18.2	26.3	26.0	26.4
		標準誤差	8.8	8.5	5.2	3.4	4.6	4.9	5.7	3.5	3.7	2.4	2.4
	その他	割合	10.3	3.6	2.9	1.2	2.4	0.9	6.5	2.6	0.9	3.3	3.2
		標準誤差	6.8	3.5	2.8	1.0	2.1	0.7	3.6	1.4	0.5	1.3	1.3
	特にない	割合	16.3	31.6	41.3	29.7	31.4	33.5	25.1	34.5	33.4	31.6	31.3
		標準誤差	6.7	6.8	6.8	6.1	6.0	5.0	5.0	3.4	4.6	2.9	2.9
女 性	人 数		44	58	84	80	117	170	102	208	243	553	553
	エネルギー(熱量)	割合	52.7	72.3	71.9	74.7	44.2	35.3	64.0	69.5	36.9	56.7	57.6
		標準誤差	12.4	7.0	3.8	6.4	5.5	6.0	5.6	4.3	5.2	3.5	3.6
	たんぱく質	割合	24.6	33.0	28.6	35.9	28.2	31.0	29.5	31.1	30.5	30.3	30.4
		標準誤差	10.5	8.1	7.2	7.9	5.0	3.2	7.0	5.4	2.8	3.4	3.6
	脂質	割合	42.0	24.0	34.9	44.4	45.4	31.7	31.5	39.0	36.7	36.4	36.6
		標準誤差	13.0	6.2	5.4	8.3	4.7	4.1	6.8	3.4	4.2	3.0	3.1
	炭水化物	割合	14.8	8.0	19.1	17.0	21.2	8.9	10.9	19.1	11.9	14.6	14.6
		標準誤差	6.4	3.5	5.5	4.8	3.2	3.0	3.5	3.2	2.6	1.6	1.6
	ナトリウム(食塩相当量)	割合	18.7	23.3	39.5	45.5	49.1	37.9	21.4	44.8	40.1	36.7	36.4
		標準誤差	9.3	6.5	6.7	7.7	5.2	5.8	4.0	4.5	5.1	2.6	2.5
	飽和脂肪酸	割合	7.1	8.3	10.0	10.1	13.0	8.1	7.8	10.8	9.3	9.5	9.5
		標準誤差	4.9	4.1	5.2	3.9	3.1	2.2	3.1	3.4	2.2	1.7	1.7
	コレステロール	割合	8.8	13.6	33.6	25.4	44.4	29.2	11.6	30.3	34.8	27.3	26.8
		標準誤差	4.0	5.2	7.5	5.3	5.5	4.4	3.7	4.7	4.4	2.7	2.6
女 性	糖類	割合	36.3	24.5	30.4	40.1	42.4	32.4	29.5	36.2	35.4	34.1	34.2
		標準誤差	12.0	9.3	5.6	8.5	5.6	5.5	7.7	3.6	5.1	3.5	3.7
	食物繊維	割合	18.6	32.4	39.8	42.5	37.9	35.7	26.6	40.9	36.1	35.2	35.1
		標準誤差	9.1	11.0	7.9	9.4	4.0	4.5	7.6	5.8	3.6	3.0	3.2
	ビタミン・ミネラル類	割合	26.0	40.7	46.3	43.2	36.0	27.8	34.5	42.2	30.9	36.5	36.7
		標準誤差	9.7	7.5	7.0	8.6	4.3	4.1	4.6	5.4	3.7	2.6	2.7
	その他	割合	4.0	2.7	0.3	0.9	1.0	3.6	3.3	0.5	3.0	2.1	2.1
		標準誤差	2.9	2.4	0.3	0.9	0.8	1.5	1.9	0.4	1.1	0.6	0.7
	特にない	割合	13.3	5.7	15.2	6.3	12.3	24.9	8.9	10.8	21.6	14.0	13.4
		標準誤差	5.6	2.7	3.2	2.3	3.8	2.8	3.1	2.2	2.9	1.9	1.9

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が1日2回以上ある者の状況(%)

問3 あなたは、主食(ごはん、パン、麺類などの料理)、主菜(魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理)、副菜(野菜類、海藻類、きのこ類を主材料にした料理)の3つを組み合わせて食べることが1日2回以上あるのは週に何日ありますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほとんど毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合	39.9	26.4	38.7	45.8	55.9	56.8	32.1	45.6	55.7	44.6	44.6
	週4～5日	標準誤差	5.5	4.5	6.3	5.2	4.7	4.1	4.2	3.3	4.0	3.2	3.2
		割合	16.2	21.4	24.3	22.7	19.4	17.7	19.2	21.1	19.7	20.3	20.2
	週2～3日	標準誤差	4.7	2.5	4.9	5.6	2.8	2.1	1.9	2.8	2.0	1.7	1.6
		割合	29.4	25.9	20.7	21.6	17.8	20.5	27.4	21.3	19.1	22.1	22.2
男性	ほとんど毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合	41.0	31.7	33.9	34.0	52.3	57.2	35.6	40.7	52.6	41.9	42.4
	週4～5日	標準誤差	10.3	7.1	7.1	7.3	6.6	5.4	5.0	4.3	4.9	2.8	2.9
		割合	8.8	22.6	24.5	26.8	18.6	17.2	16.8	21.9	20.0	20.1	20.0
	週2～3日	標準誤差	6.6	5.5	5.6	6.3	4.1	3.2	4.5	3.3	3.0	2.4	2.4
		割合	26.6	21.9	24.1	26.3	17.9	18.2	23.9	23.1	18.9	22.2	22.1
女性	ほとんど毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合	39.2	22.4	43.4	57.3	58.7	56.5	29.4	50.5	58.1	47.3	46.7
	週4～5日	標準誤差	8.8	7.6	8.5	4.8	6.2	4.4	7.5	4.4	4.2	4.5	4.5
		割合	21.8	20.4	24.1	18.8	20.1	18.1	21.0	20.2	19.4	20.4	20.4
	週2～3日	標準誤差	8.5	6.6	7.4	5.8	4.3	2.7	3.7	3.7	2.4	2.0	2.0
		割合	31.7	29.0	17.3	17.1	17.8	22.3	30.1	19.6	19.3	22.0	22.2
	ほとんど毎日	人数	91	44	48	61	39	41	53	34	35	22	22
		割合	7.4	28.2	15.2	6.8	3.4	2.4	19.5	9.7	2.7	10.1	10.5
	週4～5日	標準誤差	4.3	8.8	5.3	3.1	2.5	1.0	5.9	2.5	1.0	2.6	2.7
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.2	0.1
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

主食、主菜、副菜のうち組み合せて食べられないもの(%)

問3-1 主食、主菜、副菜のうち、組み合せて食べられないのはどれですか。(複数回答)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	主食	人数	50	74	94	86	90	133	124	209	194	527	527
		割合	17.3	14.1	10.7	12.2	26.0	18.5	15.3	14.4	19.4	15.9	16.0
		標準誤差	9.5	6.9	4.4	5.1	6.5	2.9	5.4	4.0	3.1	3.1	3.2
		割合	23.0	16.0	14.2	28.9	16.9	26.4	18.6	21.0	23.2	20.2	20.4
	主菜	標準誤差	9.8	4.0	4.4	8.1	4.6	4.3	5.6	2.8	3.6	2.1	2.2
男性	主食	割合	87.0	80.4	79.1	70.3	61.7	71.1	82.9	72.5	69.4	75.5	75.4
		標準誤差	5.8	7.2	6.5	8.9	7.3	6.0	4.7	4.0	5.3	3.5	3.4
		人数	23	33	43	53	48	61	56	109	96	261	261
		割合	20.3	13.4	11.7	13.1	21.7	18.8	16.1	13.1	19.8	15.8	16.0
	主菜	標準誤差	12.6	8.0	7.7	5.5	5.7	6.2	6.4	5.0	5.4	4.1	4.0
女性	主食	割合	19.3	22.7	14.2	25.8	13.7	22.4	21.3	19.4	19.6	19.5	19.9
		標準誤差	10.8	9.0	5.9	7.4	6.1	6.3	6.3	3.1	4.7	2.3	2.4
		割合	86.0	79.7	79.6	74.5	66.8	66.7	82.2	76.0	67.0	76.1	75.7
		標準誤差	9.0	9.2	9.6	7.8	7.6	7.8	7.1	4.9	6.3	4.7	4.5
	副菜	人数	27	41	51	33	42	72	68	100	98	266	266
	主食	割合	15.0	14.5	9.6	10.9	30.1	18.3	14.7	15.9	19.0	16.1	16.1
		標準誤差	9.1	7.1	4.2	5.7	10.0	5.1	5.5	4.4	3.8	2.9	3.0
		割合	25.9	11.5	14.2	33.7	19.9	29.5	16.7	22.9	26.3	21.0	20.9
		標準誤差	14.4	6.7	5.8	10.9	6.4	5.5	9.3	5.6	4.9	3.7	3.9
	副菜	割合	87.8	80.8	78.5	64.0	56.8	74.5	83.3	68.3	71.4	75.0	75.0
		標準誤差	8.5	8.2	6.0	11.4	10.8	7.1	5.9	4.9	6.0	3.7	3.7

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

外食の利用状況(%)

問4 あなたは、外食(飲食店での食事)をどのくらい利用していますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	人 数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	毎日2回以上	割合	0.0	1.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.9	0.0	0.2	0.4	0.4
		標準誤差	0.0	1.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	0.2	0.3	0.3
	毎日1回	割合	5.9	1.5	4.1	3.9	3.3	0.6	3.3	3.9	1.3	3.1	3.1
		標準誤差	2.9	1.0	1.6	1.6	1.5	0.4	1.7	1.0	0.7	0.8	0.7
	週4~6回	割合	11.6	12.3	15.6	14.3	2.6	1.2	12.0	13.4	1.0	9.8	9.5
		標準誤差	4.3	2.6	5.5	3.4	1.1	0.7	2.4	2.2	0.5	1.3	1.3
	週2~3回	割合	21.8	11.1	13.0	9.6	9.6	5.4	15.6	10.6	6.9	11.1	11.2
		標準誤差	5.5	3.6	2.8	3.1	3.7	1.6	3.5	2.0	1.7	1.6	1.6
	週1回	割合	28.9	29.3	17.4	20.0	14.1	13.3	29.1	17.5	13.9	19.4	19.7
		標準誤差	8.7	6.4	5.5	2.6	3.9	3.5	6.3	1.9	2.5	2.4	2.5
	週1回未満	割合	25.2	34.3	38.7	39.6	55.2	49.3	30.5	43.3	49.6	40.9	41.1
		標準誤差	5.9	6.1	5.1	6.3	5.9	3.4	4.2	3.6	3.1	2.4	2.5
男 性	毎日2回以上	割合	0.0	3.6	0.0	0.0	1.3	0.0	2.1	0.0	0.6	0.8	0.9
		標準誤差	0.0	3.5	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.4	0.6	0.6
	毎日1回	割合	5.9	1.4	7.6	7.9	6.3	0.7	3.3	7.1	2.5	4.9	4.7
		標準誤差	5.9	1.1	3.5	3.3	3.2	0.7	2.7	2.0	1.4	1.5	1.4
	週4~6回	割合	14.7	26.9	22.4	27.2	4.3	1.7	21.7	22.0	1.3	16.0	15.5
		標準誤差	7.2	5.5	6.6	5.6	2.2	1.2	4.2	3.2	0.8	2.2	2.2
	週2~3回	割合	13.3	14.4	20.5	9.4	11.6	9.7	13.9	13.9	10.8	13.4	13.0
		標準誤差	6.4	6.4	4.7	4.1	3.7	2.9	4.1	3.0	2.9	2.1	2.0
	週1回	割合	25.3	20.9	15.0	18.1	16.6	13.5	22.9	15.6	15.2	17.8	17.8
		標準誤差	12.7	5.7	5.5	5.5	4.3	4.3	7.6	2.6	3.1	2.9	3.0
	週1回未満	割合	26.2	23.6	24.7	27.9	49.0	49.1	24.7	32.1	47.4	33.8	34.5
		標準誤差	8.0	9.1	5.6	6.2	6.7	4.4	6.5	4.4	3.7	2.6	2.6
女 性	毎日2回以上	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	毎日1回	割合	5.8	1.5	0.7	0.0	0.8	0.6	3.3	0.7	0.4	1.3	1.4
		標準誤差	4.0	1.5	0.7	0.0	0.6	0.6	2.3	0.4	0.4	0.7	0.7
	週4~6回	割合	9.2	1.4	8.9	1.7	1.2	0.8	4.7	4.8	0.8	3.6	3.5
		標準誤差	5.8	1.4	5.5	1.7	0.9	0.6	2.7	2.5	0.5	1.2	1.1
	週2~3回	割合	28.3	8.7	5.5	9.7	8.0	2.0	17.0	7.2	4.0	8.9	9.3
		標準誤差	7.9	4.7	3.0	5.1	4.1	1.2	5.8	2.5	1.4	2.0	2.1
	週1回	割合	31.6	35.6	19.9	21.9	12.1	13.1	33.9	19.3	12.9	21.0	21.7
		標準誤差	14.1	8.7	6.4	4.9	4.4	3.4	8.4	2.7	2.7	3.1	3.2
	週1回未満	割合	24.4	42.4	52.5	50.9	60.1	49.5	34.8	54.6	51.3	48.1	47.7
		標準誤差	9.8	6.3	6.1	8.4	7.1	4.3	6.7	4.8	4.1	2.7	2.8
無回答	割合	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.5	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.4	0.1	0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

持ち帰りの弁当や惣菜の利用状況(%)

問5 あなたは、持ち帰りの弁当や惣菜をどのくらい利用していますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数		人 数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	毎日2回以上	割合	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.5	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.5	0.2	0.2
	毎日1回	割合	2.8	6.4	4.7	2.3	2.7	2.0	4.9	3.5	2.0	3.7	3.7
		標準誤差	1.6	2.9	2.5	1.5	1.2	0.9	1.9	1.7	0.8	1.1	1.1
	週4～6回	割合	2.6	9.2	14.5	12.3	5.3	4.3	6.4	12.7	3.9	8.5	8.2
		標準誤差	1.3	2.5	3.5	3.6	2.0	1.3	1.7	1.8	1.2	0.8	0.8
	週2～3回	割合	23.0	23.5	14.8	23.7	16.3	15.8	23.3	18.3	16.3	18.9	19.2
		標準誤差	7.5	4.0	3.0	3.9	3.3	2.8	3.6	2.6	2.3	1.7	1.7
	週1回	割合	13.8	13.9	20.8	11.0	10.4	8.3	13.9	15.8	8.2	13.0	12.6
		標準誤差	7.3	5.4	3.3	2.5	1.8	1.8	4.5	1.7	1.4	1.3	1.4
	週1回未満	割合	18.3	31.7	21.4	38.9	38.2	36.3	26.0	30.6	37.5	30.5	31.1
		標準誤差	6.2	4.0	4.2	5.2	4.7	2.9	3.7	3.4	2.8	2.1	2.1
男 性	全く利用しない	割合	39.5	15.3	23.2	11.8	27.0	32.3	25.5	18.9	31.2	25.2	24.9
		標準誤差	8.1	2.8	3.4	2.8	4.7	3.1	3.0	2.2	2.9	1.9	1.9
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
	毎日2回以上	人 数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2
	毎日1回	割合	5.5	12.1	5.8	1.9	4.2	3.3	9.3	4.2	3.3	5.5	5.5
		標準誤差	3.5	6.6	2.9	1.3	2.3	1.8	4.2	1.5	1.6	1.6	1.6
	週4～6回	割合	4.1	18.5	15.4	17.2	6.1	2.4	12.4	15.9	1.8	10.8	10.5
		標準誤差	2.6	5.6	6.8	5.8	3.5	1.6	3.8	3.7	1.2	1.5	1.3
	週2～3回	割合	16.5	25.6	15.6	22.8	17.6	15.3	21.7	18.4	16.3	18.7	18.9
		標準誤差	7.9	5.9	4.6	4.4	5.9	2.9	4.7	2.6	2.4	2.0	1.9
	週1回	割合	11.4	10.8	23.3	12.3	10.0	4.4	11.0	17.2	5.0	12.3	11.7
		標準誤差	6.7	5.4	5.3	4.2	3.0	2.0	4.6	2.8	1.6	1.6	1.6
	週1回未満	割合	18.0	12.5	13.3	34.2	31.6	39.8	14.8	23.9	38.9	24.8	25.7
		標準誤差	9.9	5.4	4.7	7.1	6.1	4.4	6.5	3.3	3.8	3.2	3.2
	全く利用しない	割合	44.6	20.5	25.6	11.6	30.5	34.8	30.8	20.0	34.7	27.7	27.7
		標準誤差	10.3	8.9	4.1	3.4	5.9	5.2	5.2	3.2	4.2	2.3	2.3
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女 性	毎日2回以上	人 数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.9	0.3	0.3
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.9	0.3	0.3
	毎日1回	割合	0.6	2.2	3.7	2.6	1.6	0.8	1.5	2.9	1.0	1.9	1.9
		標準誤差	0.7	1.5	2.7	2.6	1.1	0.6	0.9	2.2	0.6	0.9	0.9
	週4～6回	割合	1.3	2.2	13.6	7.6	4.7	5.8	1.8	9.5	5.5	6.2	5.9
		標準誤差	1.0	1.8	5.6	4.0	2.6	2.1	1.2	3.4	2.0	1.4	1.4
	週2～3回	割合	28.1	22.0	14.1	24.6	15.2	16.2	24.5	18.2	16.3	19.1	19.5
		標準誤差	9.9	6.5	3.1	6.4	3.6	3.8	5.4	3.4	2.6	2.0	2.1
	週1回	割合	15.7	16.2	18.4	9.8	10.8	11.5	16.0	14.3	10.7	13.6	13.6
		標準誤差	8.2	6.6	4.1	3.4	2.9	3.0	5.0	2.1	2.3	1.6	1.7
	週1回未満	割合	18.6	46.1	29.4	43.3	43.7	33.6	34.5	37.4	36.5	36.1	36.5
		標準誤差	7.8	7.6	4.4	9.0	6.0	3.1	6.4	4.7	3.0	2.3	2.5
	全く利用しない	割合	35.6	11.4	20.9	12.0	24.1	30.3	21.6	17.8	28.6	22.7	22.2
		標準誤差	8.9	5.7	6.3	5.2	6.2	4.2	5.9	2.6	3.6	3.0	3.1
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(2)身体活動・運動に関する状況

運動ができる場所の状況(%)

問6 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所はありますか。(周辺とは、自宅から徒歩、自転車、車でそれぞれ10分以内程度、あるいは通勤・通学路上にあって気軽に行けることを意味する)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	運動が行える公園	人 数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		ある	割合 83.0 標準誤差 5.3	79.6 6.5	79.6 6.0	81.0 4.1	72.8 5.9	81.0 4.8	81.0 5.1	78.8 4.1	79.0 4.7	79.3 4.0	79.3 4.0
		ない	割合 14.1 標準誤差 4.9	15.6 5.9	17.7 5.1	11.8 3.6	18.4 4.7	12.7 4.0	15.0 4.4	15.5 3.4	14.1 4.1	15.1 3.4	15.1 3.4
		わからない	割合 2.8 標準誤差 1.7	4.8 2.1	2.7 1.3	7.1 3.2	8.1 2.3	5.0 1.7	4.0 1.4	5.7 1.4	5.6 1.5	5.2 1.0	5.2 1.0
	安全な歩道や自転車道など	無回答	割合 0.0 標準誤差 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.1 0.1	0.7 0.6	1.4 1.2	0.0 0.0	0.1 0.1	1.3 1.1	0.4 0.3	0.4 0.3
		ある	割合 66.9 標準誤差 8.1	51.4 11.3	64.4 9.4	64.9 6.3	56.0 4.9	57.9 4.7	58.0 8.5	62.2 6.6	58.2 4.4	60.1 5.7	60.1 5.8
		ない	割合 26.1 標準誤差 8.1	39.5 12.4	32.3 9.5	25.6 5.0	30.6 4.3	27.2 4.7	33.8 7.4	30.2 5.8	27.3 4.2	30.4 5.1	30.3 5.0
		わからない	割合 7.0 標準誤差 4.9	8.1 3.1	3.2 1.2	8.7 2.9	12.8 2.9	13.6 3.1	7.7 1.8	7.3 1.4	13.3 2.2	8.9 1.1	8.9 1.2
	海岸、河原、山など	無回答	割合 0.0 標準誤差 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	0.8 0.6	0.6 0.5	1.4 1.2	0.6 0.6	0.3 0.3	1.3 0.9	0.6 0.4	0.6 0.4
		ある	割合 22.6 標準誤差 6.5	18.1 7.6	23.2 5.9	23.9 6.9	25.9 6.8	18.8 5.9	20.0 6.4	23.4 5.1	21.1 6.3	21.8 5.1	22.0 5.2
		ない	割合 74.8 標準誤差 7.1	76.6 8.6	70.9 5.9	72.0 6.5	68.2 6.7	69.3 5.5	75.8 6.9	71.4 4.9	68.6 5.9	71.7 4.9	71.7 5.1
		わからない	割合 2.6 標準誤差 1.7	5.3 2.9	6.0 2.7	3.1 1.5	5.0 1.6	10.6 2.8	4.2 1.8	4.8 1.3	9.0 2.3	5.9 1.1	5.8 1.1
	体育館	無回答	割合 0.0 標準誤差 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.6	0.9 0.6	1.4 1.2	0.0 0.0	0.5 0.3	1.3 1.1	0.6 0.4	0.6 0.4
		ある	割合 67.7 標準誤差 7.5	55.4 4.2	56.4 10.3	56.2 9.1	45.2 7.0	51.1 9.0	60.6 4.5	54.8 8.2	49.2 8.3	54.5 6.2	54.5 6.0
		ない	割合 29.2 標準誤差 7.5	26.3 4.1	36.9 8.5	35.2 7.4	44.1 7.0	33.0 6.8	27.5 4.7	38.2 6.8	35.3 6.4	34.3 5.3	34.2 5.2
		わからない	割合 3.1 標準誤差 1.8	18.3 4.1	6.7 2.9	7.8 2.5	10.0 2.8	14.5 3.4	11.9 2.3	6.8 2.0	14.2 3.0	10.7 1.4	10.8 1.4
	プール	無回答	割合 0.0 標準誤差 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.6	0.7 0.6	1.4 1.2	0.0 0.0	0.3 0.3	1.3 1.1	0.5 0.4	0.5 0.4
		ある	割合 68.1 標準誤差 6.9	62.2 10.3	51.5 8.2	59.1 5.8	39.8 7.6	50.3 6.4	64.7 6.4	52.9 6.0	47.1 6.6	53.9 5.6	54.2 5.6
		ない	割合 29.0 標準誤差 6.8	26.0 7.7	40.7 9.5	35.5 5.4	53.4 7.0	36.7 5.9	27.3 5.0	40.4 6.2	41.5 6.0	37.7 5.2	37.5 5.2
		わからない	割合 2.8 標準誤差 1.7	11.8 4.0	7.8 2.6	4.6 1.6	6.1 2.0	11.7 3.0	8.0 2.4	6.3 1.4	10.1 2.4	7.9 1.1	7.8 1.1
	グラウンド、テニスコート、 野球場など	無回答	割合 0.0 標準誤差 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.6	0.7 0.6	1.4 1.2	0.0 0.0	0.3 0.3	1.3 1.1	0.5 0.4	0.5 0.4
		ある	割合 67.9 標準誤差 7.2	69.3 8.8	62.4 8.3	62.0 7.4	56.8 7.1	57.6 6.6	68.7 7.1	61.1 7.0	57.5 6.5	62.3 5.7	62.5 5.7
		ない	割合 25.7 標準誤差 7.0	17.8 6.1	29.3 5.2	33.1 6.5	34.6 5.9	28.9 5.7	21.1 5.6	32.6 5.4	29.6 5.4	28.3 4.3	28.1 4.3
		わからない	割合 6.4 標準誤差 3.4	12.9 4.9	8.3 3.9	4.1 1.6	7.9 2.2	12.2 2.5	10.2 3.5	6.0 2.1	11.6 2.1	8.9 1.7	8.9 1.7
	スポーツジム、フィット ネスクラブ	無回答	割合 0.0 標準誤差 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.6	0.7 0.6	1.4 1.2	0.0 0.0	0.3 0.3	1.3 1.1	0.5 0.4	0.5 0.4
		ある	割合 73.9 標準誤差 7.1	60.4 6.7	68.7 7.0	75.8 5.2	56.9 7.1	46.1 6.5	66.1 5.6	70.4 5.0	48.1 6.3	62.1 5.2	62.2 5.2
		ない	割合 24.9 標準誤差 6.9	31.6 5.7	25.0 6.2	16.3 3.8	30.7 5.5	36.2 5.2	28.7 4.9	21.5 3.9	35.6 5.2	28.3 4.4	28.2 4.4
		わからない	割合 1.2 標準誤差 0.8	8.0 3.3	6.3 2.4	7.0 2.3	11.2 2.9	16.4 2.9	5.1 1.9	7.7 1.8	14.8 2.3	9.1 1.6	9.0 1.5
	地域センター、公民館 など	無回答	割合 0.0 標準誤差 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.6	1.2 0.7	1.4 1.2	0.0 0.0	0.4 0.3	1.5 1.1	0.6 0.4	0.6 0.4
		ある	割合 71.9 標準誤差 6.3	78.0 7.0	84.4 3.5	73.2 5.5	68.7 4.8	73.8 4.4	75.4 6.2	77.4 3.2	72.3 4.5	75.4 3.8	75.1 3.8
		ない	割合 23.2 標準誤差 6.6	13.3 5.7	11.1 2.8	18.4 5.2	17.7 3.7	16.6 4.4	17.5 5.8	15.9 3.1	16.3 3.8	16.4 3.4	16.5 3.5
		わからない	割合 4.9 標準誤差 2.9	8.7 3.3	4.2 1.6	7.7 2.6	13.0 3.1	8.2 2.0	7.1 2.4	6.3 1.4	10.2 1.9	7.7 1.3	7.9 1.3
		無回答	割合 0.0 標準誤差 0.0	0.0 0.0	0.2 0.2	0.8 0.6	0.5 0.5	1.4 1.2	0.0 0.0	0.4 0.3	1.2 1.1	0.5 0.4	0.5 0.4

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

運動ができる場所の状況(%)

問6 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所はありますか。(周辺とは、自宅から徒歩、自転車、車でそれぞれ10分以内程度、あるいは通勤・通学路上にあって気軽に行けることを意味する)

性別	回答		年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
男 性	運動が行える公園	ある	人 数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	
			割合	76.3	82.1	81.7	76.1	77.6	81.4	79.6	79.3	79.8	79.5	79.4	
		標準誤差	7.8	7.1	5.1	6.6	5.5	5.1	6.6	3.6	4.9	3.6	3.6		
		ない	割合	19.3	11.1	18.1	10.6	17.5	14.1	14.6	15.3	14.6	15.1	14.9	
			標準誤差	8.1	5.1	5.1	3.7	5.3	4.5	5.1	3.6	4.4	3.3	3.3	
		わからない	割合	4.4	6.8	0.3	13.1	4.8	3.2	5.8	5.3	4.5	5.1	5.3	
			標準誤差	3.4	3.7	0.3	6.3	2.3	1.8	2.4	2.2	1.6	0.9	0.9	
		無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	0.0	0.1	1.0	0.3	0.3	
			標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	0.0	0.1	1.0	0.3	0.3	
		安全な歩道や自転車道など	ある	割合	70.5	59.1	59.3	60.0	58.6	63.8	64.0	58.0	64.0	61.5	61.6
				標準誤差	10.3	10.7	12.4	8.4	6.4	7.6	6.4	9.0	6.2	6.4	6.2
			ない	割合	29.5	33.5	39.0	23.4	32.5	27.7	31.8	32.7	27.7	31.4	30.9
	標準誤差			10.3	11.2	12.5	7.7	6.0	5.8	6.8	7.7	4.6	5.6	5.4	
	わからない		割合	0.0	7.4	1.7	15.0	9.0	7.1	4.2	8.7	7.2	6.6	7.0	
			標準誤差	0.0	4.1	0.9	5.9	3.5	3.2	2.1	2.2	2.7	1.3	1.4	
	無回答		割合	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5	
			標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5	
	海岸、河原、山など		ある	割合	12.1	24.0	23.6	24.8	21.2	24.8	18.9	23.3	24.3	22.2	22.2
				標準誤差	6.9	10.1	6.7	6.8	6.0	8.3	6.9	5.2	7.4	4.8	5.0
			ない	割合	84.1	68.3	67.6	70.2	73.0	63.7	75.0	70.6	65.0	70.4	70.4
				標準誤差	10.1	11.6	5.7	6.1	6.0	7.5	8.1	4.4	6.8	4.2	4.4
		わからない	割合	3.8	7.7	8.9	3.5	5.5	10.1	6.0	5.3	9.7	6.9	6.8	
			標準誤差	3.4	4.2	4.7	2.2	2.3	5.4	2.6	2.0	4.3	1.7	1.7	
		無回答	割合	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	1.4	0.0	0.8	1.0	0.5	0.6	
			標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.4	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5	
		体育館	ある	割合	58.2	62.4	56.9	49.0	45.0	48.9	60.6	53.6	45.8	53.3	53.0
				標準誤差	10.8	4.5	10.7	10.3	8.0	8.6	5.4	8.8	7.4	6.3	6.1
			ない	割合	36.8	14.3	39.0	38.1	42.7	35.2	23.9	38.5	38.0	34.4	34.2
				標準誤差	11.7	5.4	9.8	7.8	8.0	7.8	7.0	7.4	6.6	6.1	6.0
	わからない		割合	5.1	23.2	4.1	11.4	12.3	14.5	15.5	7.3	15.2	11.8	12.3	
			標準誤差	3.4	6.2	2.3	4.1	4.2	3.5	3.7	2.4	3.0	1.6	1.6	
	無回答		割合	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5	
			標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5	
	プール		ある	割合	54.5	67.3	44.9	62.1	38.9	48.7	61.8	51.9	45.0	52.1	52.4
				標準誤差	11.2	10.5	9.2	7.1	7.9	7.2	5.2	6.7	6.7	5.5	5.4
			ない	割合	41.1	23.7	44.2	28.5	53.8	40.8	31.1	38.5	45.3	39.0	38.8
				標準誤差	12.6	8.9	11.9	6.1	7.8	8.2	4.6	7.4	7.2	5.6	5.4
		わからない	割合	4.4	9.0	10.9	7.9	7.3	9.1	7.0	9.0	8.7	8.3	8.3	
			標準誤差	3.4	4.3	4.4	2.5	2.9	2.9	2.7	2.0	2.6	1.3	1.3	
		無回答	割合	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5	
			標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5	
		グラウンド、テニスコート、 野球場など	ある	割合	66.8	78.2	59.9	56.3	56.4	61.4	73.3	59.7	58.3	63.0	63.1
				標準誤差	9.5	8.3	7.8	9.4	7.5	6.0	7.8	7.6	6.0	5.5	5.5
			ない	割合	29.4	12.2	34.6	35.6	32.2	26.8	19.5	34.3	28.4	28.4	28.2
				標準誤差	10.4	5.3	6.4	7.9	6.5	5.8	6.3	6.3	5.2	4.5	4.5
わからない	割合		3.8	9.6	5.5	6.5	11.4	10.5	7.1	5.4	12.3	8.0	8.2		
	標準誤差		3.4	4.7	2.6	2.5	3.6	2.9	2.8	1.9	2.6	1.5	1.5		
無回答	割合		0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5		
	標準誤差		0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5		
スポーツジム、フィット ネスクラブ	ある		割合	66.0	59.7	60.9	72.5	59.6	44.5	62.4	67.2	46.3	59.9	59.6	
			標準誤差	11.2	8.3	8.9	5.7	7.3	8.3	6.7	5.7	7.9	5.2	5.2	
	ない		割合	34.0	27.8	33.7	15.9	30.0	38.4	30.4	24.3	38.0	30.3	30.2	
			標準誤差	11.2	6.5	7.7	4.1	6.1	6.8	5.3	4.3	6.4	4.2	4.2	
	わからない	割合	0.0	12.5	5.4	9.8	10.4	15.7	7.2	7.8	14.6	9.3	9.6		
		標準誤差	0.0	5.5	3.2	3.1	3.3	5.8	2.9	2.1	4.6	1.8	1.8		
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	0.0	0.7	1.0	0.5	0.6		
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5		
	地域センター、公民館 など	ある	割合	60.9	84.5	88.2	69.1	77.6	72.0	74.4	79.5	72.4	76.4	75.9	
			標準誤差	10.9	6.3	4.2	5.2	4.9	5.2	7.9	3.8	4.8	4.0	3.9	
		ない	割合	39.1	7.0	9.0	18.7	14.5	18.0	20.7	13.2	17.9	16.6	16.8	
			標準誤差	10.9	3.9	3.8	5.1	3.5	5.5	6.9	3.0	4.4	3.7	3.7	
わからない		割合	0.0	8.5	2.3	10.6	7.9	8.6	4.9	6.5	8.7	6.4	6.7		
		標準誤差	0.0	4.4	1.4	4.1	3.3	3.1	2.4	2.0	2.8	1.5	1.5		
無回答		割合	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	1.4	0.0	0.8	1.0	0.6	0.6		
		標準誤差	0.0	0.0	0.5	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

運動ができる場所の状況(%)

問6 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所はありますか。(周辺とは、自宅から徒歩、自転車、車でそれぞれ10分以内程度、あるいは通勤・通学路上にあつて気軽にけることを意味する)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
女 性	運動が行える公園	人 数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		ある	割合 88.2	77.6	77.5	85.8	68.8	80.7	82.1	78.3	78.3	79.1	79.3
		標準誤差	6.3	7.0	9.0	4.6	7.2	5.3	5.6	5.1	5.1	4.7	4.7
		ない	割合 10.2	19.0	17.3	12.9	19.2	11.6	15.3	15.7	13.7	15.1	15.2
		標準誤差	5.9	7.3	7.1	4.5	5.1	4.0	5.5	4.0	4.2	3.8	3.8
		わからない	割合 1.6	3.4	5.2	1.2	10.7	6.4	2.6	6.0	6.4	5.2	5.0
		標準誤差	1.3	2.5	2.4	1.2	3.6	2.1	1.6	1.8	1.7	1.3	1.3
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.4	0.4
	安全な歩道や自転車道など	ある	割合 64.0	45.7	69.6	69.6	53.9	53.2	53.4	66.5	53.8	58.7	58.6
		標準誤差	12.2	13.7	7.0	6.8	5.6	4.2	11.5	5.1	4.0	5.6	5.8
		ない	割合 23.5	43.9	25.7	27.7	29.0	26.8	35.3	27.7	26.9	29.4	29.7
		標準誤差	10.3	14.7	6.5	6.4	4.7	4.6	9.1	4.5	4.4	4.8	5.0
		わからない	割合 12.5	8.7	4.7	2.7	15.9	18.7	10.3	5.8	17.9	11.2	10.9
		標準誤差	9.0	3.9	2.0	1.5	3.0	4.6	3.5	1.6	3.3	1.5	1.5
		無回答	割合 0.0	1.7	0.0	0.0	1.1	1.3	1.0	0.0	1.4	0.8	0.8
		標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.0	0.9	1.1	1.0	0.0	0.9	0.4	0.4
	海岸、河原、山など	ある	割合 30.7	13.7	22.8	23.1	29.8	13.9	20.8	23.5	18.8	21.5	21.7
		標準誤差	11.1	6.7	6.5	8.1	8.8	4.3	8.0	5.3	5.9	5.8	6.0
		ない	割合 67.7	82.8	74.2	73.8	64.4	73.8	76.4	72.2	71.3	72.9	73.0
		標準誤差	11.1	7.3	7.1	7.9	8.7	5.7	8.2	5.8	6.5	6.1	6.2
		わからない	割合 1.6	3.6	3.1	2.8	4.6	11.0	2.7	4.2	8.5	5.0	4.8
		標準誤差	1.3	2.3	1.6	1.6	1.8	3.7	1.4	1.6	2.7	1.4	1.4
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.3	0.0	0.2	1.5	0.6	0.6
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.1	0.0	0.2	1.2	0.4	0.4
	体育館	ある	割合 75.1	50.2	55.9	63.3	45.4	52.9	60.7	55.9	51.8	55.7	56.0
		標準誤差	7.3	5.7	12.4	8.5	7.4	10.4	4.8	8.2	9.3	6.5	6.3
		ない	割合 23.3	35.3	34.8	32.4	45.1	31.2	30.2	37.9	33.2	34.2	34.2
		標準誤差	7.1	5.1	10.0	7.9	7.5	7.7	4.5	7.0	7.2	5.1	5.0
		わからない	割合 1.6	14.6	9.3	4.3	8.2	14.6	9.1	6.2	13.5	9.5	9.4
		標準誤差	1.3	5.3	3.6	2.3	3.7	4.4	3.0	2.0	3.7	1.9	1.9
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.4	0.4
	プール	ある	割合 78.6	58.4	58.1	56.2	40.4	51.5	66.9	54.0	48.7	55.7	55.9
		標準誤差	7.9	12.0	9.1	6.7	8.5	6.6	8.9	6.1	7.3	6.3	6.3
		ない	割合 19.8	27.6	37.2	42.3	53.1	33.4	24.3	42.3	38.6	36.3	36.2
		標準誤差	7.5	8.9	9.0	6.4	7.9	4.8	6.9	5.9	5.8	5.4	5.5
		わからない	割合 1.6	13.9	4.7	1.5	5.2	13.8	8.7	3.6	11.3	7.5	7.4
		標準誤差	1.3	4.5	2.0	1.0	2.6	3.8	2.9	1.3	2.9	1.3	1.3
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.4	0.4
	グラウンド、テニスコート、 野球場など	ある	割合 68.7	62.5	64.8	67.6	57.1	54.6	65.1	62.6	57.0	61.6	61.9
		標準誤差	7.4	10.1	11.1	6.0	8.1	8.2	7.5	7.0	7.6	6.2	6.2
		ない	割合 22.8	22.0	24.1	30.6	36.5	30.5	22.4	30.9	30.6	28.2	28.1
		標準誤差	6.9	7.9	6.6	5.9	7.1	6.3	5.8	5.2	5.9	4.3	4.3
		わからない	割合 8.5	15.4	11.1	1.9	5.0	13.6	12.5	6.5	11.0	9.7	9.5
		標準誤差	5.2	6.3	5.4	1.3	2.0	3.5	5.1	2.6	2.6	2.5	2.5
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.4	0.4
	スポーツジム、フィット ネスクラブ	ある	割合 80.1	60.9	76.5	79.1	54.7	47.3	69.0	73.7	49.5	64.3	64.8
		標準誤差	8.0	7.3	6.4	6.0	8.1	6.1	6.6	5.4	5.8	5.4	5.4
		ない	割合 17.9	34.5	16.4	16.6	31.3	34.5	27.5	18.8	33.7	26.2	26.1
		標準誤差	7.5	7.3	6.1	5.0	6.3	5.2	6.5	4.4	5.1	4.7	4.7
		わからない	割合 2.1	4.6	7.2	4.3	11.9	16.9	3.5	7.5	15.0	8.9	8.5
		標準誤差	1.4	2.6	2.6	2.3	3.9	3.0	1.6	2.0	2.3	1.6	1.6
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.3	0.0	0.0	1.8	0.7	0.7
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	0.0	0.0	1.2	0.5	0.4
	地域センター、公民館 など	ある	割合 80.3	73.1	80.7	77.2	61.5	75.3	76.1	75.2	72.2	74.4	74.2
		標準誤差	6.8	8.6	4.1	6.5	6.8	5.2	6.2	3.6	5.5	3.9	4.0
		ない	割合 10.9	18.1	13.3	18.1	20.3	15.6	15.1	18.6	15.2	16.2	16.3
		標準誤差	5.9	8.3	4.1	5.9	5.2	4.2	6.0	3.7	3.9	3.4	3.6
		わからない	割合 8.7	8.9	6.1	4.8	17.2	7.8	8.8	6.2	11.3	9.0	9.0
		標準誤差	5.0	3.3	2.3	3.0	4.7	2.2	3.0	1.7	2.5	1.5	1.5
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.3	0.0	0.0	1.4	0.5	0.4
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.4	0.4

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

運動のために整備を希望する場所(%)

問7 あなたの周辺に、運動ができる場所が整備されるとすれば、次のどれを望みますか。(ここでいう運動とは、スポーツやトレーニングなどのような健康づくりや体力向上など、目的をもって余暇時間に行われる活動のこと。)(複数回答)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	人 数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	運動が行える公園	割合	24.7	37.5	29.7	28.3	38.0	27.4	32.1	30.8	30.0	31.3	31.7
		標準誤差	5.8	7.9	4.6	5.4	6.2	3.4	6.3	3.9	2.7	2.8	2.8
	安全な歩道や自転車道など	割合	28.3	49.4	38.3	39.5	40.5	29.6	40.4	38.7	32.9	37.1	37.5
		標準誤差	7.7	8.8	5.7	3.9	4.7	3.2	5.8	3.3	2.7	2.4	2.5
	整備された海岸、河原、山など	割合	13.8	12.0	13.8	14.8	12.5	10.0	12.8	12.9	11.7	12.8	13.0
		標準誤差	5.1	2.5	3.5	3.4	2.6	1.8	3.0	2.5	2.0	1.7	1.7
	体育館	割合	12.6	21.9	20.1	13.7	15.9	12.3	17.9	17.6	12.5	16.2	16.3
		標準誤差	4.6	3.7	4.0	3.6	4.6	2.9	2.7	3.1	2.7	2.1	2.1
	プール	割合	21.2	24.4	24.1	17.3	18.8	11.0	23.1	21.5	12.2	19.3	19.3
		標準誤差	5.1	4.9	5.4	2.7	4.7	2.0	3.6	2.8	1.9	2.1	2.2
	グラウンド、テニスコート、野球場など	割合	25.6	10.2	14.4	10.7	9.8	6.9	16.7	12.8	7.1	12.5	12.5
		標準誤差	6.1	3.9	3.7	3.4	3.8	1.5	3.3	1.8	1.6	1.4	1.5
	スポーツジム、フィットネスクラブ	割合	28.1	33.8	28.6	29.8	29.4	11.6	31.4	31.8	14.0	26.5	26.7
		標準誤差	6.0	9.2	4.0	4.3	6.3	2.9	5.5	2.0	2.3	1.9	1.9
男 性	地域センター、公民館など	割合	3.7	13.5	9.4	13.4	25.7	25.6	9.3	13.7	25.8	15.8	16.0
		標準誤差	1.9	5.2	2.6	4.7	4.2	5.1	2.9	2.3	4.8	2.2	2.2
	その他	割合	0.4	3.7	1.4	1.8	0.4	1.2	2.3	1.5	0.9	1.5	1.5
		標準誤差	0.4	2.5	1.0	1.2	0.3	0.6	1.4	0.6	0.5	0.5	0.5
	特にない	割合	33.3	18.0	27.7	25.0	23.8	33.6	24.4	25.6	31.3	27.3	26.9
		標準誤差	5.0	3.7	6.6	3.7	3.9	4.0	3.0	3.7	3.2	2.1	2.0
	人 数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
	運動が行える公園	割合	20.9	46.7	37.6	20.7	43.5	38.9	35.7	32.3	39.7	35.7	35.8
		標準誤差	9.9	6.7	5.8	6.7	8.3	4.5	7.2	6.0	3.3	3.5	3.4
	安全な歩道や自転車道など	割合	15.6	42.5	33.4	38.0	41.9	32.3	31.0	37.0	34.5	34.5	34.7
		標準誤差	7.8	9.3	8.0	5.3	7.1	4.5	7.3	4.2	3.5	2.6	2.7
	整備された海岸、河原、山など	割合	18.7	16.8	6.6	13.5	13.9	17.3	17.6	9.2	18.0	14.1	14.5
		標準誤差	9.9	6.3	3.6	4.6	4.1	3.4	5.6	2.6	3.2	2.4	2.4
	体育館	割合	10.9	20.5	27.7	12.9	19.7	19.9	16.4	21.9	18.2	19.3	19.0
		標準誤差	9.3	5.6	7.3	4.5	6.5	5.7	4.8	4.4	4.7	2.9	2.8
	プール	割合	30.6	24.1	21.4	11.9	17.9	13.0	26.8	17.9	13.2	19.5	19.2
		標準誤差	13.6	6.7	6.0	4.1	6.0	3.7	7.5	2.7	3.0	3.3	3.4
女 性	グラウンド、テニスコート、野球場など	割合	35.8	14.5	14.5	8.7	8.9	11.7	23.6	11.7	10.4	14.9	14.7
		標準誤差	13.1	6.2	5.2	3.5	4.3	2.8	5.5	2.8	2.3	2.4	2.3
	スポーツジム、フィットネスクラブ	割合	41.5	35.5	25.2	27.0	34.9	13.2	38.1	31.3	14.9	28.8	28.6
		標準誤差	11.7	13.0	6.2	6.3	7.7	3.2	7.9	3.4	2.8	3.1	3.0
	地域センター、公民館など	割合	3.0	8.7	6.0	4.1	22.6	26.6	6.2	9.4	24.5	12.4	12.9
		標準誤差	1.9	4.2	2.8	3.3	6.3	5.5	2.5	2.4	4.4	1.9	2.0
	その他	割合	0.0	3.9	2.7	3.6	0.4	0.7	2.2	2.7	0.5	1.9	1.9
		標準誤差	0.0	2.7	2.0	2.4	0.4	0.6	1.5	1.3	0.4	0.8	0.7
	特にない	割合	29.9	28.4	29.7	26.9	26.9	25.8	29.0	26.8	27.4	27.9	27.8
		標準誤差	8.6	6.5	8.6	4.6	6.2	5.3	5.5	4.5	3.7	2.5	2.4
	人 数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
	運動が行える公園	割合	27.6	30.6	21.8	35.7	33.5	18.3	29.3	29.3	22.7	27.0	27.6
		標準誤差	7.6	11.0	5.9	5.2	7.2	3.5	7.6	3.5	3.2	3.3	3.4
	安全な歩道や自転車道など	割合	38.0	54.5	43.2	41.0	39.3	27.5	47.6	40.4	31.7	39.7	40.3
		標準誤差	10.7	10.6	7.6	5.3	4.7	3.8	6.9	4.2	3.2	3.3	3.5
	整備された海岸、河原、山など	割合	10.0	8.4	21.1	16.0	11.4	4.2	9.1	16.6	6.8	11.5	11.5
		標準誤差	5.8	3.9	5.6	4.5	3.5	1.4	3.4	3.3	1.6	2.1	2.0
	体育館	割合	13.9	22.9	12.5	14.5	12.7	6.2	19.1	13.2	8.1	13.1	13.6
		標準誤差	5.6	5.8	5.1	5.8	5.0	2.8	4.1	2.9	2.5	1.8	1.9
	プール	割合	14.1	24.7	26.7	22.7	19.6	9.5	20.2	25.1	11.3	19.1	19.4
		標準誤差	5.7	5.3	5.8	5.0	5.6	3.5	3.3	3.6	2.5	2.0	1.9
	グラウンド、テニスコート、野球場など	割合	17.8	6.9	14.2	12.8	10.6	3.2	11.5	13.9	4.5	10.1	10.3
		標準誤差	6.2	4.1	5.4	5.3	3.7	1.3	4.1	2.9	1.4	1.6	1.6
	スポーツジム、フィットネスクラブ	割合	17.7	32.5	31.9	32.5	24.9	10.4	26.3	32.3	13.3	24.2	24.7
		標準誤差	6.0	9.5	3.0	5.2	6.0	4.0	6.7	2.7	3.1	2.2	2.3
	地域センター、公民館など	割合	4.3	17.1	12.7	22.5	28.2	24.8	11.7	18.1	26.8	19.2	19.1
		標準誤差	2.6	7.6	3.6	6.4	5.9	5.5	4.6	3.2	5.6	2.6	2.6
	その他	割合	0.6	3.6	0.0	0.0	0.4	1.6	2.4	0.2	1.2	1.1	1.1
		標準誤差	0.7	3.7	0.0	0.0	0.4	1.0	2.1	0.2	0.7	0.6	0.6
	特にない	割合	35.9	10.1	25.8	23.2	21.3	39.7	21.0	24.4	34.3	26.6	25.9
		標準誤差	11.1	4.7	7.2	5.5	5.6	4.0	5.0	4.4	3.7	2.9	2.9

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(3)睡眠に関する状況

1日の平均睡眠時間(%)

問8 この1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	5時間未満	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028
		割合	4.0	13.9	14.5	12.2	7.2	5.4	9.7	13.3	5.0	9.8
	5時間以上6時間未満	標準誤差	2.1	3.6	4.0	3.0	2.0	1.4	2.7	2.2	1.0	1.3
		割合	28.2	30.6	38.5	38.6	27.8	20.5	29.6	37.0	22.2	30.3
	6時間以上7時間未満	標準誤差	5.2	5.6	4.7	4.2	2.9	3.1	3.5	1.8	2.5	1.4
		割合	55.6	31.4	33.0	33.9	41.3	36.5	41.6	33.8	38.7	38.2
	7時間以上8時間未満	標準誤差	7.0	4.2	4.1	4.8	3.5	3.9	3.9	2.9	3.2	1.8
		割合	11.7	19.5	9.9	13.3	18.3	26.6	19.2	12.3	24.8	16.6
	8時間以上9時間未満	標準誤差	3.6	4.4	3.0	2.8	3.3	4.4	2.5	1.7	3.5	1.0
		割合	0.0	4.0	4.1	1.8	5.4	8.4	2.3	3.6	7.4	4.3
男性	9時間以上	標準誤差	0.0	2.3	1.7	1.1	1.7	2.4	1.3	1.0	1.8	1.0
		割合	0.7	0.7	0.0	0.2	0.0	2.2	0.7	0.1	1.6	0.7
	無回答	標準誤差	0.7	0.7	0.0	0.3	0.0	0.9	0.5	0.1	0.7	0.3
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1
	5時間未満	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474
		割合	6.4	20.1	10.6	8.1	8.3	3.1	14.2	10.4	3.2	9.5
	5時間以上6時間未満	標準誤差	3.8	8.6	3.8	3.2	3.4	1.2	5.9	2.4	1.2	1.9
		割合	19.1	35.1	44.1	37.3	23.5	16.8	28.3	36.5	19.6	29.8
女性	6時間以上7時間未満	標準誤差	5.9	6.4	7.0	6.4	4.6	3.1	3.9	3.2	3.1	1.9
		割合	69.4	35.7	30.8	33.1	41.9	34.6	50.1	34.1	36.0	39.6
	7時間以上8時間未満	標準誤差	8.7	5.1	5.5	8.6	5.5	5.3	4.6	4.8	3.9	2.6
		割合	5.1	4.6	10.4	18.0	20.4	34.1	4.9	15.6	30.3	15.9
	8時間以上9時間未満	標準誤差	3.4	2.8	4.5	4.6	5.1	3.7	2.2	3.1	3.4	1.6
		割合	0.0	2.9	4.1	3.0	5.9	8.7	1.7	3.2	8.8	4.3
	9時間以上	標準誤差	0.0	2.2	3.0	2.0	2.2	2.9	1.2	1.5	2.3	1.1
		割合	0.0	1.6	0.0	0.5	0.0	2.1	0.9	0.2	1.6	0.7
	無回答	標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.5	0.0	1.2	1.0	0.2	0.9	0.4
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1
女性	5時間未満	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554
		割合	2.1	9.3	18.3	16.1	6.3	7.2	6.3	16.1	6.4	10.0
	5時間以上6時間未満	標準誤差	2.0	4.0	5.8	5.2	2.7	2.2	2.6	3.6	1.4	1.3
		割合	35.1	27.2	33.0	39.8	31.3	23.4	30.5	37.5	24.1	30.8
	6時間以上7時間未満	標準誤差	9.7	8.3	6.5	5.3	4.3	3.6	5.3	3.0	3.2	2.3
		割合	45.0	28.2	35.2	34.7	40.8	38.1	35.2	33.4	40.8	36.7
	7時間以上8時間未満	標準誤差	12.6	5.6	6.3	7.7	4.8	4.6	7.0	3.8	4.1	3.0
		割合	16.7	30.6	9.5	8.7	16.6	20.7	24.7	9.0	20.6	17.3
	8時間以上9時間未満	標準誤差	5.7	8.6	3.2	3.7	4.1	6.1	4.8	1.9	4.6	2.6
		割合	0.0	4.7	4.0	0.7	5.0	8.2	2.7	4.0	6.4	4.3
女性	9時間以上	標準誤差	0.0	3.6	2.1	0.7	2.4	2.4	2.2	1.4	1.7	1.2
		割合	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	0.0	1.7	0.7
	無回答	標準誤差	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.5	0.0	0.8	0.3
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

睡眠の質の状況(%)

問9 あなたはこの1ヶ月間に、次のようなことが週3回以上ありましたか。(複数回答)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	人 数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	寝付き(布団に入ってから眠るまでに要する時間)に、いつもより時間がかかった	割合	17.8	6.8	12.6	8.7	11.2	15.3	11.5	10.8	14.2	12.1	11.8
		標準誤差	3.8	3.3	4.6	2.7	2.2	2.1	3.0	2.3	1.6	1.7	1.6
	夜間、睡眠途中で目が覚めて困った	割合	10.2	12.8	23.0	17.9	21.4	28.5	11.7	19.6	27.6	19.8	19.5
		標準誤差	4.1	4.8	4.9	3.9	2.8	3.2	3.4	2.5	2.5	2.1	2.1
	起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった	割合	7.5	12.7	13.4	13.7	18.3	21.4	10.5	14.1	20.8	15.4	15.3
		標準誤差	4.9	4.3	4.7	3.5	4.2	2.5	3.7	2.1	1.9	1.6	1.5
	睡眠時間が足りなかった	割合	47.7	25.1	29.1	25.6	13.4	9.4	34.7	26.6	8.9	23.4	23.3
		標準誤差	7.0	4.2	4.6	3.6	3.5	2.1	4.1	2.9	1.5	2.2	2.1
	睡眠全体の質に満足できなかった	割合	23.4	33.6	25.8	24.4	12.6	20.5	29.3	22.3	19.0	23.3	23.3
		標準誤差	6.5	5.0	8.2	3.1	2.5	2.8	3.4	3.1	1.9	1.5	1.4
	日中、眠気を感じた	割合	58.5	32.7	38.1	45.1	29.0	43.0	43.6	40.5	38.3	40.1	40.1
		標準誤差	7.4	6.0	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.0	2.9	1.5	1.5
男 性	人 数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
	寝付き(布団に入ってから眠るまでに要する時間)に、いつもより時間がかかった	割合	24.3	9.4	10.3	5.3	4.5	8.2	15.8	7.5	7.0	9.9	9.7
		標準誤差	8.1	5.1	5.0	3.1	2.2	2.7	5.1	2.8	2.0	2.3	2.2
	夜間、睡眠途中で目が覚めて困った	割合	8.5	14.2	16.6	16.3	18.1	22.4	11.8	15.2	23.0	16.4	16.6
		標準誤差	5.2	7.2	5.2	5.4	3.3	3.0	4.1	3.2	2.9	2.5	2.4
	起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった	割合	4.5	21.1	19.4	20.3	26.1	20.3	14.0	20.5	22.3	19.2	19.3
		標準誤差	3.2	6.4	8.2	5.2	6.4	3.9	4.1	3.3	2.4	2.2	2.1
	睡眠時間が足りなかった	割合	44.6	33.6	14.5	18.9	11.0	4.4	38.3	15.9	5.8	19.9	19.6
		標準誤差	10.7	8.1	5.7	5.4	4.1	1.7	7.8	4.1	1.9	3.5	3.5
	睡眠全体の質に満足できなかった	割合	18.3	40.2	24.2	17.8	16.7	17.3	30.9	20.0	17.4	22.6	22.5
		標準誤差	5.5	9.6	8.3	5.8	4.5	4.1	5.9	4.2	3.7	1.7	1.8
	日中、眠気を感じた	割合	65.7	32.6	27.3	36.2	23.9	39.6	46.7	31.4	34.5	36.2	36.4
		標準誤差	10.1	5.0	5.6	5.2	5.7	3.7	4.4	4.0	3.2	2.5	2.5
女 性	人 数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
	寝付き(布団に入ってから眠るまでに要する時間)に、いつもより時間がかかった	割合	12.8	4.8	14.9	12.1	16.6	20.9	8.2	14.0	19.7	14.4	14.0
		標準誤差	4.7	3.0	7.0	3.8	3.4	3.2	2.9	3.4	2.3	1.7	1.7
	夜間、睡眠途中で目が覚めて困った	割合	11.5	11.7	29.3	19.5	24.2	33.3	11.6	23.9	31.1	23.2	22.4
		標準誤差	5.5	5.7	7.7	5.6	5.6	4.8	5.0	3.9	3.9	2.9	2.9
	起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった	割合	9.8	6.4	7.4	7.3	11.8	22.3	7.8	7.7	19.7	11.7	11.3
		標準誤差	8.9	4.0	3.7	3.2	3.3	3.4	3.7	1.9	2.5	1.4	1.4
	睡眠時間が足りなかった	割合	50.2	18.7	43.5	32.0	15.3	13.4	31.9	37.4	11.3	26.9	27.1
		標準誤差	10.6	7.1	4.8	5.2	3.9	3.3	4.6	3.2	2.2	1.8	1.8
	睡眠全体の質に満足できなかった	割合	27.4	28.7	27.4	30.8	9.3	23.1	28.1	24.7	20.1	23.9	24.0
		標準誤差	9.8	3.7	9.7	3.9	3.0	4.9	4.1	3.8	3.6	2.4	2.2
	日中、眠気を感じた	割合	52.9	32.8	48.8	53.8	33.1	45.8	41.2	49.7	41.1	44.0	43.9
		標準誤差	8.7	9.7	5.3	7.0	5.5	5.2	5.3	4.2	4.8	2.4	2.5
	上記1～6のようなことはなかった	割合	28.0	44.5	25.1	24.1	37.1	27.7	37.5	25.4	31.3	31.0	31.4
		標準誤差	9.1	6.8	4.3	5.0	4.2	3.6	6.0	3.0	3.2	2.5	2.6

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

睡眠の確保の妨げとなっていることの状況(%)

問10 あなたの睡眠の確保の妨げとなっていることは何ですか。(複数回答)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数		人 数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	仕事	割合	31.8	24.0	30.4	25.9	7.2	2.2	27.3	24.9	3.2	19.7	19.4
		標準誤差	6.0	4.8	3.8	4.3	2.4	0.9	4.0	2.1	1.0	2.1	2.1
	家事	割合	3.2	6.4	22.2	8.0	3.5	1.7	5.1	13.3	2.0	7.3	7.1
		標準誤差	2.8	2.4	4.1	2.1	1.4	1.0	1.8	2.5	1.1	1.5	1.4
	育児	割合	3.7	24.7	10.4	0.0	0.0	0.0	15.8	4.4	0.0	5.9	6.1
		標準誤差	1.9	7.0	2.3	0.0	0.0	0.0	4.6	1.2	0.0	1.4	1.5
	介護	割合	0.0	0.0	1.6	3.8	0.3	0.6	0.0	2.2	0.6	1.0	1.0
		標準誤差	0.0	0.0	1.0	2.8	0.3	0.4	0.0	1.1	0.3	0.4	0.4
	健康状態	割合	7.6	5.4	7.9	16.8	12.3	19.0	6.4	13.0	16.6	11.6	11.6
		標準誤差	5.7	2.1	2.9	4.1	2.7	3.4	2.7	2.5	2.4	1.6	1.6
	通勤・通学の所要時間	割合	22.0	9.0	6.7	7.2	2.6	0.0	14.5	6.7	0.2	7.4	7.4
		標準誤差	6.5	2.4	3.0	2.0	1.2	0.0	3.0	1.7	0.2	1.1	1.1
	睡眠環境(音、照明など)	割合	9.3	2.7	5.6	2.9	6.8	4.3	5.5	5.8	4.0	5.3	5.3
		標準誤差	5.0	2.0	1.8	1.6	2.2	1.5	2.0	1.4	1.2	1.0	1.0
男 性	仕事	割合	41.6	21.2	6.0	3.1	4.9	2.6	29.9	4.8	3.0	11.7	11.8
		標準誤差	8.4	3.6	1.9	1.6	1.8	1.2	5.6	1.1	0.9	1.7	1.7
	家事	割合	3.7	12.1	20.4	16.8	10.0	13.6	8.6	17.5	12.4	13.2	13.0
		標準誤差	2.0	3.8	3.4	2.8	2.2	2.5	2.2	2.0	2.0	1.3	1.3
	育児	割合	19.4	28.1	26.7	38.1	60.7	61.0	24.5	35.7	62.4	40.5	40.8
		標準誤差	5.6	3.9	3.3	5.2	4.2	4.4	3.5	2.6	3.2	2.3	2.3
	健康状態	割合	30.1	45.7	37.6	31.3	9.7	2.8	39.1	29.7	4.7	25.9	25.0
		標準誤差	10.9	7.2	7.4	6.2	3.8	1.7	5.1	4.1	1.8	3.1	3.1
	通勤・通学の所要時間	割合	0.0	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0	0.6	0.6
		標準誤差	0.0	1.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.0	0.4	0.3
	睡眠環境(音、照明など)	割合	0.8	9.0	2.3	0.0	0.0	0.0	5.5	1.0	0.0	2.1	2.0
		標準誤差	0.9	5.6	1.7	0.0	0.0	0.0	3.2	0.7	0.0	1.0	1.0
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中すること	割合	0.0	0.0	0.0	2.2	0.6	1.4	0.0	0.9	1.3	0.7	0.7
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	2.2	0.6	0.9	0.0	0.9	0.7	0.5	0.5
女 性	仕事	割合	3.0	5.1	4.9	8.3	9.2	15.0	4.2	7.9	12.8	7.8	8.1
		標準誤差	3.0	2.9	2.7	5.0	3.4	4.1	2.1	3.3	3.3	1.5	1.5
	家事	割合	25.1	19.5	11.9	12.3	4.1	0.0	21.9	11.1	0.5	11.5	11.1
		標準誤差	11.1	5.0	5.6	3.4	2.4	0.0	4.6	3.0	0.5	2.0	1.9
	育児	割合	14.5	2.7	9.0	2.9	9.0	6.6	7.7	7.7	6.0	7.3	7.2
		標準誤差	11.0	2.3	3.2	2.3	4.0	3.1	4.1	2.4	2.5	1.7	1.8
	健康状態	割合	41.4	24.7	4.8	3.1	4.5	0.8	31.8	3.7	2.0	11.9	11.7
		標準誤差	11.5	4.2	2.6	2.3	2.4	0.7	5.4	1.5	1.1	2.1	2.1
	通勤・通学の所要時間	割合	2.3	13.3	17.5	14.8	6.1	12.5	8.6	13.8	11.4	11.5	11.4
		標準誤差	1.7	6.3	5.3	3.1	2.3	3.5	3.9	2.6	2.8	1.9	1.8
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中すること	割合	14.6	20.6	31.2	47.7	64.5	64.9	18.0	43.4	65.4	41.5	42.6
		標準誤差	7.6	8.9	6.5	7.5	6.4	4.4	6.3	4.4	3.8	3.3	3.3
	睡眠環境(音、照明など)	割合	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		標準誤差	33.2	7.7	23.2	20.6	5.1	1.8	18.4	19.9	2.1	13.5	13.8
	健康状態	割合	10.0	3.7	5.4	5.2	2.1	1.2	4.4	3.1	1.1	2.0	2.0
		標準誤差	5.7	9.8	42.7	15.7	6.4	3.0	8.0	26.1	3.5	14.0	13.6
	通勤・通学の所要時間	割合	4.8	3.6	5.4	4.7	2.6	1.8	2.9	4.8	2.0	2.7	2.6
		標準誤差	6.0	36.6	18.5	0.0	0.0	0.0	23.7	7.8	0.0	9.8	10.2
	睡眠環境(音、照明など)	割合	3.3	8.4	3.8	0.0	0.0	0.0	7.0	2.2	0.0	2.4	2.6
		標準誤差	0.0	0.0	3.2	5.3	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	1.3	1.3
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中すること	割合	0.0	0.0	1.9	5.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.7	0.8
		標準誤差	0.0	0.0	1.9	5.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.7	0.8
	通勤・通学の所要時間	割合	11.2	5.7	10.8	25.0	14.8	22.1	8.0	18.1	19.5	15.3	15.1
		標準誤差	9.6	2.9	5.3	6.5	3.6	4.7	4.4	3.5	3.4	2.5	2.4
	睡眠環境(音、照明など)	割合	19.6	1.2	1.6	2.3	1.3	0.0	9.0	2.3	0.0	3.4	3.5
		標準誤差	8.1	0.9	1.7	1.8	1.3	0.0	4.2	1.5	0.0	1.2	1.3
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中すること	割合	5.2	2.7	2.3	2.8	5.1	2.4	3.8	3.9	2.4	3.3	3.3
		標準誤差	3.3	1.9	1.6	2.2	2.5	1.5	1.9	1.7	1.2	1.1	1.1
	通勤・通学の所要時間	割合	41.7	18.6	7.3	3.1	5.3	4.0	28.4	5.9	3.8	11.4	12.0
		標準誤差	8.4	6.4	2.9	2.4	2.9	1.7	7.4	1.9	1.4	2.1	2.3
	睡眠環境(音、照明など)	割合	4.8	11.3	23.4	18.8	13.3	14.4	8.6	21.1	13.1	14.8	14.6
		標準誤差	3.2	5.9	4.5	5.7	3.6	3.0	3.5	3.2	2.4	1.8	1.8
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中すること	割合	23.2	33.8	22.3	28.9	57.6	58.0	29.3	27.9	60.2	39.5	39.0
		標準誤差	6.0	9.0	3.2	7.2	5.2	5.7	5.6	3.1	4.6	3.1	3.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

睡眠の確保のために必要なことの状況(%)

問11 あなたが、自分の睡眠の確保のために必要なことは何ですか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	人 数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	就労時間の短縮	割合	13.3	8.7	13.9	16.4	2.9	0.0	10.7	13.5	0.3	9.1	8.9
		標準誤差	4.8	3.5	2.6	2.1	1.4	0.0	3.1	1.6	0.3	1.1	1.1
	家事のサポート	割合	0.0	4.2	5.0	1.8	1.3	0.7	2.4	3.4	0.6	2.1	2.1
		標準誤差	0.0	1.9	2.1	1.3	0.9	0.7	1.1	1.0	0.5	0.5	0.5
	育児のサポート	割合	0.4	9.3	3.2	0.0	0.0	0.0	5.5	1.3	0.0	2.0	2.1
		標準誤差	0.4	6.1	1.5	0.0	0.0	0.0	3.6	0.6	0.0	1.0	1.1
	介護のサポート	割合	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.3	0.3
		標準誤差	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.4	0.2	0.2
	健康状態の改善	割合	5.8	3.6	5.6	15.6	10.7	16.3	4.5	10.7	14.7	9.8	9.8
		標準誤差	3.4	1.9	2.1	3.7	2.0	3.0	2.0	2.2	2.4	1.6	1.6
	通勤・通学時間の短縮	割合	10.1	1.5	9.1	1.3	1.3	0.3	5.2	4.6	0.5	3.7	3.5
		標準誤差	4.9	0.9	3.0	0.9	0.7	0.3	2.5	1.4	0.3	0.7	0.7
	睡眠環境を整える	割合	8.9	13.0	11.2	10.4	8.8	6.6	11.3	10.9	6.8	9.5	9.6
男 性		標準誤差	5.0	3.7	3.2	2.9	2.0	1.7	3.5	1.9	1.4	0.9	1.0
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中しない	割合	24.2	16.0	3.9	5.5	6.1	2.6	19.4	5.2	3.3	8.8	9.0
		標準誤差	5.8	2.9	1.6	1.6	1.9	1.2	3.7	1.3	0.9	1.2	1.2
	その他	割合	5.1	10.3	11.3	15.4	9.0	7.5	8.1	12.7	7.8	9.8	9.8
		標準誤差	2.5	5.6	2.5	3.4	2.1	2.0	3.4	1.8	1.7	1.5	1.5
	特にない	割合	14.6	20.5	31.3	26.7	55.3	63.0	18.0	30.8	63.5	37.4	37.2
		標準誤差	4.3	5.6	3.3	4.2	4.3	4.0	4.3	2.3	3.2	2.7	2.8
	無回答	割合	17.6	12.9	5.0	6.8	4.4	2.5	14.9	6.6	2.2	7.6	7.8
		標準誤差	5.6	5.3	2.2	3.0	1.8	1.3	4.7	1.5	1.0	2.2	2.3
	人 数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
	就労時間の短縮	割合	20.7	19.0	14.6	24.6	5.7	0.0	19.7	17.9	0.4	13.4	13.1
		標準誤差	8.5	7.5	4.9	5.2	3.1	0.0	5.9	2.8	0.3	2.3	2.1
	家事のサポート	割合	0.0	0.0	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.3
女 性		標準誤差	0.0	0.0	1.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.2
	育児のサポート	割合	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.8	0.8
		標準誤差	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.8	0.8
	介護のサポート	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	1.2	0.3	0.4
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.9	0.2	0.3
	健康状態の改善	割合	6.8	4.9	1.2	17.5	5.4	11.1	5.7	8.9	9.3	7.5	7.9
		標準誤差	4.2	3.3	1.0	4.9	2.4	4.0	3.3	3.0	3.1	1.7	1.8
	通勤・通学時間の短縮	割合	6.1	2.8	14.5	2.3	2.8	0.0	4.2	7.5	0.6	5.0	4.4
		標準誤差	4.7	1.8	5.5	1.6	1.6	0.0	2.5	2.8	0.5	1.4	1.2
	睡眠環境を整える	割合	2.4	8.5	13.6	5.5	8.0	8.6	5.9	10.2	7.6	8.2	8.0
		標準誤差	2.4	4.9	4.5	2.8	3.2	2.9	3.6	3.0	2.3	1.6	1.5
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中しない	割合	23.9	20.1	2.6	6.7	6.4	1.3	21.7	4.6	2.8	9.3	9.4
		標準誤差	9.4	4.9	1.8	3.1	3.0	0.9	4.7	1.5	1.1	1.6	1.6
	その他	割合	5.1	11.5	11.9	12.3	8.8	7.3	8.8	10.8	8.4	9.6	9.5
		標準誤差	3.2	6.5	5.3	3.2	3.0	2.8	4.0	2.7	2.8	2.1	2.0
	特にない	割合	14.5	12.7	34.2	28.8	55.6	66.2	13.5	33.8	65.8	36.7	37.5
		標準誤差	5.8	5.4	4.6	6.3	6.0	4.7	4.2	3.4	4.4	2.9	3.0
	無回答	割合	20.5	15.7	5.9	2.2	6.2	4.3	17.7	5.4	3.8	8.7	8.6
		標準誤差	11.7	5.8	4.1	2.2	3.4	2.7	7.9	2.5	2.1	3.2	3.2
	人 数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
	就労時間の短縮	割合	7.7	1.0	13.2	8.5	0.5	0.0	3.8	9.0	0.2	4.7	4.7
		標準誤差	5.0	0.8	5.9	3.2	0.5	0.0	2.3	2.6	0.2	1.4	1.3
	家事のサポート	割合	0.0	7.4	8.5	3.6	1.9	1.3	4.3	5.9	1.0	3.8	3.8
		標準誤差	0.0	3.2	4.1	2.5	1.7	1.3	2.0	1.9	0.9	0.8	0.8
	育児のサポート	割合	0.6	12.7	6.4	0.0	0.0	0.0	7.6	2.7	0.0	3.2	3.3
		標準誤差	0.7	6.9	2.9	0.0	0.0	0.0	4.4	1.3	0.0	1.3	1.5
	介護のサポート	割合	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2
	健康状態の改善	割合	5.0	2.7	10.0	13.7	15.1	20.4	3.7	12.4	18.8	12.1	11.7
		標準誤差	4.8	2.4	3.7	4.3	3.6	3.9	2.4	2.4	3.2	2.1	2.1
	通勤・通学時間の短縮	割合	13.1	0.6	3.8	0.4	0.0	0.5	5.9	1.7	0.3	2.5	2.5
		標準誤差	8.2	0.6	2.3	0.4	0.0	0.5	3.9	1.0	0.4	1.0	1.1
	睡眠環境を整える	割合	14.0	16.4	8.8	15.1	9.5	5.0	15.3	11.7	6.1	10.7	11.1
		標準誤差	9.0	6.2	3.7	3.9	2.6	2.2	6.4	2.0	1.8	1.7	1.8
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中しない	割合	24.4	12.8	5.1	4.4	5.9	3.7	17.7	5.8	3.6	8.3	8.6
		標準誤差	7.4	5.2	2.8	2.4	2.9	1.7	5.6	1.8	1.4	1.7	1.8
	その他	割合	5.2	9.4	10.7	18.3	9.2	7.6	7.6	14.6	7.3	9.9	10.1
		標準誤差	3.8	5.3	3.5	6.1	2.8	2.5	3.5	2.8	1.9	1.6	1.8
	特にない	割合	14.6	26.3	28.4	24.7	55.0	60.4	21.4	27.8	61.6	38.0	37.0
		標準誤差	5.5	7.2	6.4	5.9	5.1	6.3	5.4	4.2	4.7	3.6	3.8
	無回答	割合	15.4	10.8	4.2	11.3	2.9	1.1	12.7	7.8	0.9	6.6	7.0
		標準誤差	6.4	5.5	2.8	5.3	2.2	0.8	3.7	2.8	0.6	1.8	2.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(4)喫煙に関する状況

喫煙の状況(%)

問12 あなたはたばこを吸いますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	毎日吸っている	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合 標準誤差	11.8 4.4	16.7 5.9	20.8 3.8	15.0 3.5	17.5 4.7	5.5 1.5	14.6 4.5	18.3 2.6	8.3 1.4	15.4 2.0	15.2 2.0
	時々吸う日がある	割合 標準誤差	1.1 0.9	0.9 0.9	1.4 1.0	2.4 1.5	0.9 0.6	0.2 0.2	1.0 0.7	1.6 0.9	0.5 0.3	1.2 0.4	1.2 0.4
		割合 標準誤差	0.0 0.0	12.5 5.6	10.9 2.9	3.1 1.3	3.7 1.5	5.7 1.5	7.2 3.6	6.6 1.4	5.1 1.2	6.7 1.7	6.6 1.7
	以前は吸っていたが、 1ヶ月以上吸っていない 吸わない	割合 標準誤差	87.1 4.5	69.9 3.7	66.9 4.2	79.5 3.8	77.8 4.2	88.3 2.5	77.2 3.7	73.6 3.0	85.9 1.9	76.6 2.4	76.9 2.4
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.3 0.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.2 0.2	0.1 0.1	0.1 0.1
	無回答	割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
男性	毎日吸っている	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合 標準誤差	22.2 8.2	32.2 12.1	37.7 5.4	22.6 4.8	32.2 8.3	10.6 3.0	27.9 8.5	30.9 3.9	15.7 2.6	26.6 3.0	25.9 3.0
	時々吸う日がある	割合 標準誤差	2.6 2.2	2.1 2.2	0.7 0.7	4.9 2.9	2.1 1.3	0.0 0.0	2.3 1.5	2.2 1.2	0.9 0.6	1.9 0.6	1.9 0.7
		割合 標準誤差	0.0 0.0	20.1 13.2	20.7 5.7	5.9 2.6	5.5 2.3	11.4 3.1	11.5 8.3	12.5 2.6	9.5 2.4	11.4 3.4	11.1 3.4
	以前は吸っていたが、 1ヶ月以上吸っていない 吸わない	割合 標準誤差	75.2 8.4	45.6 8.5	40.9 5.3	66.6 4.9	60.2 7.6	77.3 4.8	58.3 5.5	54.4 4.0	73.4 3.6	59.9 3.7	60.9 3.7
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	0.1 0.1	0.1 0.1
	無回答	割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
女性	毎日吸っている	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合 標準誤差	3.8 2.5	5.0 2.7	3.9 1.9	7.7 3.3	5.6 2.9	1.5 1.0	4.5 2.1	5.6 2.0	2.7 1.2	4.3 1.1	4.5 1.1
	時々吸う日がある	割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	2.1 1.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.3 0.0	0.0 0.0	0.9 0.8	0.2 0.2	0.5 0.4	0.4 0.3
		割合 標準誤差	0.0 0.0	6.8 3.9	1.2 1.2	0.4 0.4	2.3 2.2	1.1 0.8	3.9 2.3	0.7 0.5	1.8 1.0	2.0 0.8	2.1 0.8
	以前は吸っていたが、 1ヶ月以上吸っていない 吸わない	割合 標準誤差	96.2 2.5	88.2 4.1	92.8 2.5	92.0 3.3	92.1 3.2	97.1 1.2	91.6 3.0	92.8 1.9	95.3 1.4	93.2 1.3	93.0 1.3
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
	無回答	割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

喫煙習慣の状況(%)

問12 あなたはたばこを吸いますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	総数	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	現在喫煙者	割合	12.9	17.6	22.2	17.4	18.5	5.7	15.6	19.9	8.8	16.6	16.4
		標準誤差	4.5	6.0	3.6	3.2	4.5	1.5	4.6	2.5	1.4	2.1	2.1
	過去喫煙者	割合	0.0	12.5	10.9	3.1	3.7	5.7	7.2	6.6	5.1	6.7	6.6
		標準誤差	0.0	2.9	1.3	1.3	1.5	1.7	3.6	1.4	1.2	1.7	1.7
男性	非喫煙者	割合	87.1	69.9	66.9	79.5	77.8	88.3	77.2	73.6	85.9	76.6	76.9
		標準誤差	4.5	3.7	4.2	3.8	4.2	2.5	3.7	3.0	1.9	2.4	2.4
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
	総数	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女性	現在喫煙者	割合	24.8	34.3	38.4	27.5	34.3	10.6	30.2	33.2	16.6	28.5	27.9
		標準誤差	8.4	12.5	5.4	4.3	7.9	3.0	8.6	3.7	2.6	3.1	3.1
	過去喫煙者	割合	0.0	20.1	20.7	5.9	5.5	11.4	11.5	12.5	9.5	11.4	11.1
		標準誤差	0.0	13.2	5.7	2.6	2.3	3.1	8.3	2.6	2.4	3.4	3.4
	非喫煙者	割合	75.2	45.6	40.9	66.6	60.2	77.3	58.3	54.4	73.4	59.9	60.9
		標準誤差	8.4	8.5	5.3	4.9	7.6	4.8	5.5	4.0	3.6	3.7	3.7
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
女性	総数	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	現在喫煙者	割合	3.8	5.0	6.0	7.7	5.6	1.8	4.5	6.5	2.9	4.8	4.9
		標準誤差	2.5	2.7	2.2	3.3	2.9	1.0	2.1	1.9	1.2	1.2	1.2
	過去喫煙者	割合	0.0	6.8	1.2	0.4	2.3	1.1	3.9	0.7	1.8	2.0	2.1
		標準誤差	0.0	3.9	1.2	0.4	2.2	0.8	2.3	0.5	1.0	0.8	0.8
女性	非喫煙者	割合	96.2	88.2	92.8	92.0	92.1	97.1	91.6	92.8	95.3	93.2	93.0
		標準誤差	2.5	4.1	2.5	3.3	3.2	1.2	3.0	1.9	1.4	1.3	1.3
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

現在習慣的に喫煙している者とは、たばこを「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」と回答した者。
過去喫煙者とは、「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」と回答した者。

生活習慣調査①(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日の喫煙本数(%)

問12-1 あなたは、通常1日に何本たばこを吸いますか。(問12で1又は2を選択した者)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	1～10本	人 数	13	25	38	38	35	17	38	88	40	166	166
		割合	65.9	40.8	32.0	45.5	32.0	75.8	49.6	36.5	53.5	42.4	43.2
		標準誤差	17.5	9.1	11.3	12.8	8.4	10.8	7.8	7.7	11.0	5.0	4.8
		割合	29.1	59.2	55.6	40.0	46.4	20.0	48.6	52.3	26.1	47.1	46.4
		標準誤差	18.1	9.1	12.6	10.2	14.1	9.8	7.5	5.4	7.9	3.2	3.1
男 性	11～20本	割合	5.0	0.0	12.4	14.5	21.6	4.2	1.8	11.2	20.4	10.5	10.4
		標準誤差	4.9	0.0	10.9	5.8	11.4	4.3	1.8	5.1	11.1	3.7	3.5
		割合	11.5	14.4	17.3	15.1	19.0	11.4	13.4	16.4	16.2	15.7	15.6
		標準誤差	2.9	1.1	3.1	2.0	2.0	1.3	1.1	1.9	2.6	1.3	1.2
		人 数	10	21	30	28	31	13	31	68	34	133	133
女 性	1～10本	割合	65.0	38.2	29.1	45.7	31.5	81.5	47.6	35.1	55.3	41.4	42.2
		標準誤差	20.7	13.1	10.8	13.8	9.7	9.8	9.7	7.8	11.0	5.1	4.9
		割合	35.0	61.8	57.3	41.3	50.8	13.4	52.4	53.7	26.9	49.1	48.5
		標準誤差	20.7	13.1	13.4	11.9	14.0	8.2	9.7	5.5	7.3	3.9	3.8
		割合	0.0	0.0	13.7	13.0	17.7	5.1	0.0	11.3	17.8	9.5	9.3
男 性	11～20本	標準誤差	0.0	0.0	12.4	6.8	8.6	5.3	0.0	5.9	8.7	3.7	3.3
		割合	10.2	14.5	18.1	15.5	19.0	11.3	13.0	17.0	16.1	15.8	15.7
		標準誤差	3.3	1.4	3.3	2.4	1.8	1.5	1.1	2.0	2.5	1.3	1.2
		人 数	3	4	8	10	4	4	7	20	6	33	33
		割合	70.1	53.8	50.6	45.1	34.8	49.4	59.6	43.5	45.6	48.4	48.5
女 性	11～20本	標準誤差	26.7	29.7	22.9	21.7	26.5	28.6	22.6	12.5	23.4	12.5	12.4
		割合	0.0	46.2	45.0	35.4	23.9	50.6	29.7	45.4	22.5	35.0	34.5
		標準誤差	0.0	29.7	21.6	23.5	22.3	28.6	16.6	12.6	17.8	10.6	10.5
		割合	29.9	0.0	4.4	19.5	41.3	0.0	10.7	11.2	31.9	16.6	16.9
		標準誤差	26.7	0.0	4.5	15.5	29.6	0.0	9.7	8.1	24.7	9.0	9.0
男 性	21本以上	割合	17.9	13.8	12.4	13.5	19.3	12.2	15.3	13.5	16.6	14.8	14.8
		標準誤差	8.3	2.5	4.3	3.4	5.9	2.0	3.5	2.3	5.1	2.3	2.3

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

禁煙・節煙の意志(%)

問12-2 たばこをやめたいと思いますか。(問12で1又は2を選択した者)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	やめたい	人数	13	25	38	38	35	17	38	88	40	166	166
		割合	8.2	20.6	37.8	12.3	33.1	14.0	16.3	26.3	27.2	24.5	23.7
		標準誤差	8.1	6.7	11.3	6.0	8.4	8.8	5.0	7.6	7.1	4.5	4.3
	本数を減らしたい	人数	9.9	22.8	43.1	43.4	30.0	41.1	18.3	42.4	32.2	32.5	32.1
		割合	7.0	10.0	12.9	8.7	11.0	18.1	6.7	8.6	11.2	7.1	6.9
		標準誤差	27.8	39.8	10.1	21.1	24.3	28.3	35.6	17.9	23.5	24.2	25.1
男性	やめたくない	人数	14.9	7.1	4.7	10.3	6.5	13.4	6.8	5.1	7.1	3.8	3.9
		割合	54.1	16.8	8.9	23.2	12.6	16.5	29.9	13.3	17.1	18.8	19.1
		標準誤差	16.7	7.0	6.1	7.7	7.0	9.3	9.6	4.0	6.7	4.7	4.7
	わからない	人数	10	21	30	28	31	13	31	68	34	133	133
		割合	0.0	24.6	33.4	8.5	34.1	4.7	16.0	21.6	27.6	22.5	21.9
		標準誤差	0.0	8.3	11.2	4.7	9.1	4.7	5.9	6.7	8.5	4.1	4.0
女性	やめたい	人数	5.9	22.9	46.5	54.5	21.7	50.0	17.0	48.6	26.8	33.4	33.0
		割合	6.1	8.8	13.8	9.9	13.2	20.0	6.1	8.9	12.9	7.5	7.2
		標準誤差	29.1	46.1	11.1	15.1	29.2	32.4	40.1	17.1	28.0	25.9	26.8
	本数を減らしたい	人数	17.2	8.1	5.5	8.6	8.7	16.1	7.3	5.0	8.2	4.3	4.3
		割合	65.0	6.4	9.1	21.8	15.1	12.9	26.9	12.7	17.6	18.2	18.3
		標準誤差	18.0	4.7	7.0	8.4	8.0	8.9	9.7	4.4	7.4	4.8	4.7
女性	やめたくない	人数	3	4	8	10	4	4	7	20	6	33	33
		割合	48.6	0.0	65.8	25.4	28.1	57.6	17.4	50.4	25.6	36.2	34.2
		標準誤差	31.2	0.0	19.2	19.3	23.0	27.8	16.5	16.4	18.6	11.2	11.2
	本数を減らしたい	人数	29.9	22.0	22.0	4.8	71.9	0.0	24.9	10.9	55.5	27.3	27.1
		割合	26.7	21.6	16.8	5.1	23.0	0.0	15.7	7.6	22.8	11.1	11.0
		標準誤差	21.5	7.5	4.4	41.7	0.0	9.2	12.5	22.0	4.1	14.2	15.1
女性	やめたくない	人数	21.2	8.4	4.7	22.8	0.0	9.9	10.0	14.4	4.4	7.8	8.4
		割合	0.0	70.5	7.8	28.1	0.0	33.3	45.2	16.7	14.8	22.3	23.5
		標準誤差	0.0	23.7	8.1	17.7	0.0	27.3	22.2	9.3	14.4	8.2	8.9

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

禁煙治療が受けられる医療機関の状況(%)

問12-3 身近に禁煙治療が受けられる医療機関がありますか。(問12で1又は2を選択した者)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ある	人数	13	25	38	38	35	17	38	88	40	166	166
		割合	35.5	34.7	41.5	45.4	47.7	64.3	35.0	44.1	55.3	43.6	43.8
	ない	標準誤差	17.4	10.4	10.7	10.0	10.1	14.5	10.9	7.4	8.4	4.3	4.3
		割合	2.0	9.6	8.6	4.2	13.2	0.0	6.9	7.7	7.2	7.9	7.8
男性	わからない	標準誤差	2.2	6.2	6.0	3.1	6.4	0.0	4.1	3.9	4.3	2.4	2.4
		割合	62.4	55.7	49.9	50.4	39.2	35.7	58.1	48.2	37.5	48.5	48.3
	ある	標準誤差	17.4	10.0	9.7	9.8	9.7	14.5	11.0	6.6	8.3	3.9	3.9
		人数	10	21	30	28	31	13	31	68	34	133	133
女性	わからない	割合	42.7	41.5	39.2	39.6	52.4	69.2	41.9	40.1	63.8	44.9	45.3
		標準誤差	20.0	14.4	12.3	12.2	10.3	16.0	13.8	7.5	9.8	4.9	4.8
	ない	割合	2.5	11.4	9.9	5.4	15.8	0.0	8.3	9.2	8.9	9.3	9.2
		標準誤差	2.6	6.9	6.9	3.9	7.2	0.0	4.7	4.7	5.1	2.9	2.8
女性	わからない	割合	54.8	47.1	50.9	55.0	31.8	30.8	49.8	50.7	27.3	45.9	45.4
		標準誤差	20.0	13.2	11.1	12.4	8.4	16.0	13.7	6.3	9.0	4.1	4.1
	ある	人数	3	4	8	10	4	4	7	20	6	33	33
		割合	0.0	0.0	56.2	65.6	23.9	41.5	0.0	64.4	18.5	35.9	35.2
女性	ない	標準誤差	0.0	0.0	23.4	13.4	22.3	29.4	0.0	13.2	17.3	12.4	12.4
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	わからない	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	100.0	100.0	43.8	34.4	76.1	58.5	100.0	35.6	81.5	64.1	64.8
女性	わからない	標準誤差	0.0	0.0	23.4	13.4	22.3	29.4	0.0	13.2	17.3	12.4	12.4
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ある	人数	3	4	8	10	4	4	7	20	6	33	33
		割合	0.0	0.0	56.2	65.6	23.9	41.5	0.0	64.4	18.5	35.9	35.2

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「家庭」(現在喫煙者、「無回答・重回答」を除く)(%)
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ア)家庭

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	68	82	120	119	175	272	150	307	379	836	836
		割合 標準誤差	5.3 2.6	6.7 3.2	3.9 1.7	5.5 2.4	12.3 4.4	0.9 0.7	6.1 2.2	5.2 1.5	4.4 1.8	5.4 1.2	5.5 1.3
	週に数回程度	割合 標準誤差	8.2 5.5	3.8 2.3	4.4 2.8	5.7 3.3	2.9 1.8	2.6 1.6	5.7 2.0	4.3 1.7	3.0 1.3	4.2 1.3	4.2 1.3
		割合 標準誤差	1.1 1.1	6.9 3.2	0.7 0.7	0.4 0.4	0.7 0.6	0.6 0.4	4.4 2.1	0.7 0.4	0.5 0.3	1.8 0.8	1.9 0.9
	月に1回程度	割合 標準誤差	6.0 5.5	2.5 2.5	0.0 0.0	0.8 0.5	1.4 0.8	4.1 2.9	4.0 2.3	0.3 0.2	3.7 2.2	2.6 1.4	2.7 1.4
		割合 標準誤差	79.5 10.9	80.0 3.6	91.0 3.6	87.5 4.0	82.6 4.9	91.7 4.4	79.8 4.9	89.5 2.4	88.4 3.6	86.0 3.1	85.7 3.1
男性	ほぼ毎日	人数	27	28	43	50	66	114	55	120	153	328	328
		割合 標準誤差	7.7 4.6	5.4 3.8	0.4 0.4	3.1 2.0	7.4 4.3	0.0 0.0	6.4 3.1	1.9 1.0	2.3 1.6	3.6 1.2	3.7 1.2
	週に数回程度	割合 標準誤差	3.2 3.2	5.0 4.1	0.5 0.5	2.2 1.9	0.0 0.0	1.7 1.5	4.2 2.6	1.1 0.8	1.3 1.1	2.0 0.8	2.1 0.8
		割合 標準誤差	0.0 0.0	13.6 8.6	0.0 0.0	1.0 1.0	1.6 1.6	0.9 0.8	7.3 5.4	1.1 0.8	0.7 0.6	2.8 1.9	2.9 1.9
	月に1回程度	割合 標準誤差	15.9 14.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.4 0.5	4.0 2.3	5.6 3.8	7.3 5.4	0.2 0.2	5.9 3.0	4.1 2.6	4.2 2.6
		割合 標準誤差	73.2 13.9	76.0 6.6	99.1 0.7	93.3 3.0	87.0 5.1	91.9 3.9	74.7 8.6	95.7 1.9	89.8 3.8	87.4 4.0	87.2 4.1
女性	ほぼ毎日	人数	41	54	77	69	109	158	95	187	226	508	508
		割合 標準誤差	3.8 2.5	7.4 3.7	6.1 2.8	7.3 3.5	15.0 4.7	1.6 1.2	5.9 2.5	7.5 2.2	5.7 2.1	6.7 1.5	6.9 1.6
	週に数回程度	割合 標準誤差	11.2 9.3	3.2 2.0	6.9 4.5	8.3 5.5	4.6 2.8	3.2 2.5	6.6 3.5	6.5 2.9	4.1 2.0	5.8 2.4	5.9 2.5
		割合 標準誤差	1.7 1.8	3.5 2.6	1.1 1.1	0.0 0.0	0.2 0.2	0.4 0.4	2.7 1.9	0.5 0.5	0.4 0.3	1.1 0.6	1.2 0.6
	月に1回程度	割合 標準誤差	0.0 0.0	3.8 3.6	0.0 0.0	1.1 0.8	0.0 0.0	3.1 2.5	2.2 2.2	0.5 0.3	2.3 1.8	1.5 0.8	1.5 0.8
		割合 標準誤差	83.2 9.7	82.1 5.7	85.8 5.7	83.3 6.1	80.2 5.2	91.6 5.1	82.6 4.1	85.0 3.6	87.5 3.7	84.9 2.7	84.6 2.7

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「職場」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。イ)職場

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	53	63	102	99	90	67	116	245	113	474	474
		割合 標準誤差	15.9 7.5	11.8 3.5	10.7 3.6	5.6 2.6	4.8 2.3	0.8 0.8	13.7 4.7	7.6 2.3	2.5 1.5	10.0 2.2	9.8 2.2
	週に数回程度	割合 標準誤差	10.5 4.1	21.8 4.2	11.9 3.8	6.9 2.6	7.0 2.7	7.0 3.3	16.6 3.5	8.9 1.8	7.3 2.2	12.0 1.7	11.9 1.7
		割合 標準誤差	2.3 2.4	4.0 2.7	6.1 2.1	5.9 2.7	8.1 3.2	5.7 3.2	3.2 2.4	6.3 1.4	6.4 2.5	5.4 1.2	5.3 1.3
	月に1回程度	割合 標準誤差	10.9 5.3	6.2 4.5	2.1 1.3	2.6 1.6	2.9 1.9	3.0 2.0	8.3 2.8	2.4 0.9	2.8 1.5	4.7 1.1	4.9 1.2
		割合 標準誤差	60.4 8.2	56.3 7.2	69.3 4.4	79.1 4.4	77.2 5.0	83.6 4.6	58.2 6.5	74.7 2.9	81.0 4.1	67.9 3.2	68.1 3.3
男性	ほぼ毎日	人数	20	24	41	46	44	38	44	110	59	213	213
		割合 標準誤差	22.6 15.3	25.2 7.8	22.0 8.5	11.6 4.9	5.6 3.5	0.6 0.7	24.2 7.2	15.0 4.4	2.0 1.4	16.5 3.5	16.1 3.3
	週に数回程度	割合 標準誤差	4.3 4.5	37.0 8.5	17.4 8.3	8.8 4.3	8.5 4.1	3.1 2.6	23.6 6.7	12.2 3.7	4.9 2.7	15.2 3.9	15.1 3.9
		割合 標準誤差	6.8 6.8	2.5 2.6	10.8 4.9	6.7 4.3	13.0 6.0	9.6 5.0	4.2 3.4	8.8 2.8	11.7 4.3	7.9 2.3	7.8 2.2
	月に1回程度	割合 標準誤差	1.5 1.6	14.9 8.9	2.5 2.1	4.3 3.0	6.1 4.1	5.0 3.3	9.4 5.8	3.7 1.7	5.5 2.8	5.9 2.3	6.1 2.4
		割合 標準誤差	64.8 16.3	20.4 13.2	47.3 9.0	68.5 7.7	66.8 6.5	81.6 7.0	38.6 9.1	60.3 5.3	75.9 5.5	54.4 5.0	54.9 5.2
女性	ほぼ毎日	人数	33	39	61	53	46	29	72	135	54	261	261
		割合 標準誤差	12.5 10.5	2.2 1.4	1.6 1.7	0.0 0.0	4.1 2.9	0.9 1.0	7.2 4.6	1.0 0.8	3.1 2.3	3.7 1.9	3.8 2.0
	週に数回程度	割合 標準誤差	13.7 5.9	11.0 7.5	7.4 3.6	5.0 2.8	5.7 3.3	12.5 6.3	12.3 5.0	6.0 2.0	9.9 3.6	8.9 1.9	9.0 2.1
		割合 標準誤差	0.0 0.0	5.1 4.0	2.3 1.8	5.1 3.9	3.7 2.3	0.0 0.0	2.6 2.0	4.1 2.0	0.6 0.7	2.9 1.2	3.0 1.2
	月に1回程度	割合 標準誤差	15.8 7.9	0.0 0.0	1.8 1.5	0.9 0.7	0.0 0.0	0.0 0.0	7.7 4.0	1.2 0.8	0.0 0.0	3.6 1.5	3.7 1.6
		割合 標準誤差	58.1 11.0	81.7 8.0	86.8 4.3	89.0 4.7	86.4 5.1	86.5 6.1	70.1 5.2	87.7 2.7	86.4 3.9	80.8 1.7	80.4 1.8

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「学校」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ウ)学校

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	28	25	32	31	19	31	53	76	37	166	166
		割合	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.0
	週に数回程度	標準誤差	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.0
		割合	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.0
	週に1回程度	標準誤差	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.9
		割合	12.4	3.1	4.8	0.0	0.0	1.1	7.9	1.9	1.0	4.9	4.9
男性	ほぼ毎日	人数	12	4	6	15	13	17	16	29	22	67	67
		割合	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	2.5	2.4
	週に数回程度	標準誤差	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	2.6	2.5
		割合	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	2.0	1.9
	週に1回程度	標準誤差	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	2.0	2.0
		割合	6.7	15.1	0.0	0.0	0.0	2.2	9.3	0.0	1.8	4.7	4.7
女性	ほぼ毎日	人数	16	21	26	16	6	14	37	47	15	99	99
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.3
	週に1回程度	標準誤差	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.3
		割合	17.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	7.2	3.1	0.0	5.1	5.1
女性	ほぼ毎日	人数	16	21	26	16	6	14	37	47	15	99	99
		割合	8.8	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.6	2.9	0.0	2.4	2.5
	週に数回程度	標準誤差	8.8	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.6	2.9	0.0	2.4	2.5
		割合	0.0	2.5	3.6	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	0.0	1.6	1.6
	週に1回程度	標準誤差	0.0	2.0	3.8	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	0.0	1.1	1.0
		割合	81.8	97.5	90.8	100.0	100.0	100.0	90.8	94.8	100.0	93.1	93.1
女性	ほぼ毎日	人数	16	21	26	16	6	14	37	47	15	99	99
		割合	8.8	2.0	5.5	0.0	0.0	0.0	4.6	3.4	0.0	2.5	2.5
	週に数回程度	標準誤差	8.8	2.0	5.5	0.0	0.0	0.0	4.6	3.4	0.0	2.5	2.5
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「飲食店」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。エ)飲食店

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	61	66	91	96	119	159	127	236	229	592	592
		割合	5.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.4	0.9	0.4	1.5	1.5
	週に数回程度	標準誤差	5.1	0.0	0.0	2.1	1.0	0.0	2.4	0.9	0.4	1.0	1.0
		割合	14.5	12.3	10.3	3.6	2.2	2.4	13.3	6.7	1.8	7.7	7.7
	週に1回程度	標準誤差	5.6	3.2	4.7	2.0	1.3	1.5	3.2	2.6	1.2	1.2	1.2
		割合	14.0	8.8	15.3	15.2	8.5	10.4	11.1	14.5	9.6	12.0	11.9
男性	ほぼ毎日	人数	22	22	34	43	46	77	44	97	103	244	244
		割合	15.1	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	6.8	2.1	0.0	3.0	3.0
	週に数回程度	標準誤差	13.7	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	6.9	2.0	0.0	2.3	2.3
		割合	6.1	24.7	14.6	7.9	1.3	2.7	16.3	9.8	2.2	9.8	9.6
	週に1回程度	標準誤差	4.6	7.5	7.7	4.6	1.3	2.4	5.4	4.2	2.0	2.3	2.3
		割合	1.7	9.2	24.9	23.5	16.1	13.2	5.8	23.3	13.3	15.1	14.8
女性	ほぼ毎日	人数	39	44	57	53	73	82	83	139	126	348	348
		割合	60.7	44.2	35.2	23.7	20.5	26.3	51.7	25.4	27.6	34.8	34.5
	週に数回程度	標準誤差	14.8	8.3	6.4	5.6	7.5	6.0	6.7	4.1	5.1	3.5	3.4
		割合	16.5	21.9	25.3	40.1	62.1	57.8	19.4	39.4	56.9	37.3	38.2
	週に1回程度	標準誤差	8.8	6.9	7.8	10.5	7.6	7.7	4.8	7.9	6.1	4.6	4.5
		割合	21.0	8.6	8.5	8.3	3.7	8.1	14.0	7.8	6.8	9.5	9.6
女性	ほぼ毎日	人数	39	44	57	53	73	82	83	139	126	348	348
		割合	60.7	44.2	35.2	23.7	20.5	26.3	51.7	25.4	27.6	34.8	34.5
	週に数回程度	標準誤差	14.8	8.3	6.4	5.6	7.5	6.0	6.7	4.1	5.1	3.5	3.4
		割合	16.5	21.9	25.3	40.1	62.1	57.8	19.4	39.4	56.9	37.3	38.2
	週に1回程度	標準誤差	8.8	6.9	7.8	10.5	7.6	7.7	4.8	7.9	6.1	4.6	4.5
		割合	21.0	8.6	8.5	8.3	3.7	8.1	14.0	7.8	6.8	9.5	9.6

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。オ)遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	26	23	26	30	32	43	49	73	58	180	180
		割合	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	1.8	0.0	3.3	1.4	1.4	1.4
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	1.8	0.0	3.2	1.4	1.2	1.2
		割合	0.0	0.0	2.9	2.4	0.0	10.5	0.0	2.2	8.4	2.7	2.6
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	3.0	2.5	0.0	5.0	0.0	1.7	4.2	1.2	1.2
		割合	10.4	9.7	9.1	0.8	14.7	12.3	10.0	3.9	14.8	10.3	10.1
男性	ほぼ毎日	人数	12	6	8	15	20	27	18	33	37	88	88
		割合	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	2.1	2.2
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	2.2	2.2
		割合	0.0	0.0	8.9	6.2	0.0	10.7	0.0	5.4	8.4	3.9	4.0
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	9.0	6.3	0.0	7.4	0.0	4.1	6.0	2.1	2.2
		割合	19.5	31.1	2.7	0.0	22.1	13.6	23.7	1.8	18.4	16.2	16.4
女性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
男性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
女性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
男性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
女性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
男性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
女性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
男性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
女性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
男性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
女性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
男性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
女性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
男性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
女性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
男性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.7	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	8.5	1.4	1.2
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	6.8	1.3	1.1
		割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	5.4	8.5	4.0	3.5
女性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	3.8	0.	

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「行政機関(市役所、町村役場、公民館など)」「行かなかった」「無回答・重回答」を除く(%)
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。カ)行政機関(市役所、町村役場、公民館など)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	23	32	47	56	66	121	55	132	158	345	345
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.6	0.7	0.5
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.6	0.3
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	0.0	0.0	0.0	1.7	0.6
男性	ほぼ毎日	人数	13	6	16	26	22	55	19	51	68	138	138
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.4	0.7
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	0.5	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	3.8	1.1
女性	ほぼ毎日	人数	10	26	31	30	44	66	36	81	90	207	207
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.9	0.3
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人から吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。キ)医療機関閉

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	人数		34	53	70	78	130	214	87	199	293	579	579
	ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	割合	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
	週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2
	月に1回程度	割合	10.2	1.3	5.1	4.5	2.5	4.1	4.3	3.9	4.0	4.3	4.3
		標準誤差	8.7	1.3	3.9	4.1	1.6	1.7	3.5	2.3	1.4	1.3	1.3
	全くなかった	割合	89.2	98.7	94.9	95.5	97.5	95.1	95.4	96.1	95.4	95.4	95.5
		標準誤差	8.7	1.3	3.9	4.1	1.6	1.9	3.5	2.3	1.7	1.4	1.4
	人数		13	14	22	32	48	95	27	74	123	224	224
	ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
男性	週に数回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5
	月に1回程度	割合	23.6	4.2	0.0	0.0	0.8	4.9	12.3	0.0	4.3	4.9	4.9
		標準誤差	20.2	4.6	0.0	0.0	0.8	2.3	10.8	0.0	1.9	2.9	2.8
	全くなかった	割合	76.4	95.8	100.0	100.0	99.2	93.3	87.7	100.0	94.2	94.6	94.6
女性		標準誤差	20.2	4.6	0.0	0.0	0.8	2.8	10.8	0.0	2.3	2.9	2.8
	人数		21	39	48	46	82	119	60	125	170	355	355
	ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	割合	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1
	週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	月に1回程度	割合	1.1	0.0	7.6	7.5	3.4	3.5	0.3	6.3	3.9	3.9	3.8
		標準誤差	1.2	0.0	5.6	6.8	2.5	2.2	0.4	3.9	1.8	1.7	1.7
	全くなかった	割合	97.8	100.0	92.4	92.5	96.6	96.5	99.3	93.7	96.1	96.0	96.1
		標準誤差	2.3	0.0	5.6	6.8	2.5	2.2	0.7	3.9	1.8	1.7	1.7

(注)直	保健所区域との標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。	
16	0.7	0.9

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「公共交通機関」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ク)公共交通機関

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	49	51	70	80	102	149	100	191	210	501	501
		割合	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	1.1	1.1
	週に数回程度	標準誤差	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	1.1	1.1
		割合	0.0	2.4	3.0	8.0	2.3	0.6	1.2	5.9	0.4	2.6	2.8
	週に1回程度	標準誤差	0.0	2.1	2.0	7.5	2.2	0.6	1.0	3.5	0.4	1.2	1.3
		割合	7.0	4.6	3.9	5.1	3.0	1.2	5.8	5.0	1.0	4.1	4.1
男性	ほぼ毎日	人数	17	18	30	34	43	66	35	83	90	208	208
		割合	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	2.4	2.4
	週に数回程度	標準誤差	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	2.4	2.4
		割合	0.0	1.5	0.0	0.0	6.1	1.3	0.8	2.3	1.0	1.4	1.5
	週に1回程度	標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.0	6.0	1.3	0.9	2.3	1.0	1.0	1.0
		割合	9.2	7.3	0.0	9.4	0.0	0.0	8.2	4.0	0.0	4.1	4.2
女性	ほぼ毎日	人数	32	33	40	46	59	83	65	108	120	293	293
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	3.0	5.5	13.5	0.0	0.0	1.5	8.6	0.0	3.6	3.8
	週に1回程度	標準誤差	0.0	3.1	3.5	12.4	0.0	0.0	1.5	6.2	0.0	2.3	2.5
		割合	5.7	2.7	7.1	2.1	4.9	2.0	4.2	5.8	1.6	4.0	4.0
女性	ほぼ毎日	人数	32	33	40	46	59	83	65	108	120	293	293
		割合	5.8	2.6	4.3	2.2	3.1	1.8	3.1	2.8	1.3	1.4	1.4
	週に数回程度	標準誤差	0.7	0.0	9.2	10.8	6.0	1.3	0.3	8.6	3.5	4.7	4.7
		割合	0.7	0.0	5.4	5.6	3.6	0.9	0.3	4.0	1.9	1.7	1.7
	週に1回程度	標準誤差	93.6	94.4	78.1	73.5	89.1	96.7	94.0	77.0	94.9	87.6	87.5
		割合	5.9	4.0	7.4	12.6	4.2	2.0	3.5	6.5	2.1	2.6	2.7

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「路上」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ケ)路上

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	57	71	113	107	149	231	128	276	324	728	728
		割合	10.6	1.6	6.7	4.7	3.8	2.0	5.4	5.7	2.1	4.6	4.6
	週に数回程度	標準誤差	5.4	1.4	2.8	2.2	2.0	1.4	2.8	1.6	1.1	1.4	1.4
		割合	3.8	11.6	10.4	15.2	10.5	5.5	8.3	12.3	6.9	9.3	9.3
	週に1回程度	標準誤差	2.5	5.8	3.8	3.7	3.9	2.0	3.0	2.7	1.7	1.6	1.5
		割合	22.7	23.9	11.1	12.1	13.1	6.8	23.4	11.5	8.7	14.5	14.8
男性	ほぼ毎日	人数	22	22	40	44	54	102	44	104	136	284	284
		割合	15.0	1.4	3.7	5.9	8.6	2.9	7.6	5.6	3.8	5.7	5.7
	週に数回程度	標準誤差	13.7	1.5	3.5	4.2	4.5	1.8	7.0	3.0	1.7	2.9	2.8
		割合	0.0	8.4	18.1	13.6	6.1	5.1	4.6	15.3	4.4	8.8	8.4
	週に1回程度	標準誤差	0.0	5.4	8.6	4.8	5.3	2.7	2.7	5.5	2.2	2.8	2.6
		割合	20.5	49.7	11.9	6.0	14.3	6.8	36.5	8.2	9.5	17.2	17.2
女性	ほぼ毎日	人数	35	49	73	63	95	129	84	172	188	444	444
		割合	8.0	1.7	8.6	3.7	1.3	1.3	4.3	5.8	1.0	3.9	3.8
	週に数回程度	標準誤差	4.9	1.8	3.1	2.8	1.2	1.4	2.4	1.7	1.0	1.3	1.3
		割合	6.0	13.2	5.6	16.4	12.8	5.8	10.3	10.2	8.5	9.7	10.0
	週に1回程度	標準誤差	3.6	7.0	2.4	7.0	4.1	2.2	3.7	3.5	1.9	1.5	1.6
		割合	24.0	11.5	10.5	16.5	12.5	6.8	16.5	13.6	8.1	12.6	12.9

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。コ)子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	37	56	69	65	93	121	93	171	177	441	441
		割合	5.1	1.4	0.3	0.0	2.1	0.0	2.8	1.1	0.0	1.3	1.3
	週に数回程度	標準誤差	4.6	1.5	0.3	0.0	2.1	0.0	2.1	0.9	0.0	0.7	0.7
		割合	3.3	3.0	0.0	5.7	1.2	3.7	3.1	2.4	3.2	2.6	2.8
	週に1回程度	標準誤差	3.0	2.3	0.0	5.3	1.2	2.0	1.8	2.4	1.5	1.2	1.2
		割合	6.4	3.7	11.4	0.4	5.3	0.0	4.7	5.8	1.4	4.4	4.2
男性	ほぼ毎日	人数	13	14	23	28	38	58	27	65	82	174	174
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	2.5	0.0	0.9	1.0
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	2.3	0.0	0.9	0.9
		割合	0.0	0.0	0.0	7.5	3.1	5.1	0.0	3.1	5.1	2.7	2.8
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	6.9	3.1	3.6	0.0	3.1	3.0	1.3	1.4
		割合	4.3	0.0	8.5	0.0	5.0	0.0	1.7	4.2	1.4	2.9	2.6
女性	ほぼ毎日	人数	24	42	46	37	55	63	66	106	95	267	267
		割合	7.3	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	3.9	0.2	0.0	1.5	1.6
	週に数回程度	標準誤差	6.2	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	2.8	0.2	0.0	1.0	1.0
		割合	4.6	4.1	0.0	4.6	0.0	2.7	4.3	1.9	1.8	2.6	2.7
	週に1回程度	標準誤差	4.1	3.1	0.0	4.5	0.0	2.4	2.5	1.9	1.7	1.2	1.3
		割合	7.3	5.1	13.1	0.6	5.4	0.0	5.9	6.8	1.5	5.4	5.3
全くなかった	ほぼ毎日	人数	71.5	75.4	71.0	92.7	94.6	97.3	74.0	83.5	96.7	83.4	83.2
		割合	11.8	8.6	8.1	4.9	3.8	2.4	6.5	4.2	2.2	3.8	3.9
	週に数回程度	標準誤差	6.2	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	2.8	0.2	0.0	1.0	1.0
		割合	4.6	4.1	0.0	4.6	0.0	2.7	4.3	1.9	1.8	2.6	2.7
	週に1回程度	標準誤差	4.1	3.1	0.0	4.5	0.0	2.4	2.5	1.9	1.7	1.2	1.3
		割合	7.3	5.1	13.1	0.6	5.4	0.0	5.9	6.8	1.5	5.4	5.3

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「家庭」(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ア)家庭

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	ほぼ毎日	人 数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合	6.0	9.7	6.4	6.4	15.4	1.3	8.1	7.2	5.6	7.4	7.4
		標準誤差	2.6	4.8	2.1	2.2	4.7	0.8	3.0	1.9	1.7	1.8	1.8
		割合	7.2	4.1	3.6	5.9	2.3	2.3	5.4	3.9	2.6	3.8	3.9
	週に数回程度	標準誤差	4.9	2.1	2.2	2.9	1.3	1.3	1.9	1.5	1.0	1.1	1.1
		割合	0.9	5.7	3.2	0.3	0.6	0.6	3.7	1.7	0.5	2.0	2.0
	週に1回程度	標準誤差	1.0	2.8	2.5	0.3	0.5	0.4	1.9	1.1	0.3	1.1	1.1
		割合	5.2	2.1	1.5	0.7	1.1	3.7	3.4	0.9	3.2	2.4	2.4
	月に1回程度	標準誤差	4.9	2.0	1.0	0.4	0.7	2.5	2.0	0.5	1.9	1.2	1.1
		割合	80.7	78.5	85.7	85.6	77.6	86.6	79.4	85.6	83.1	82.6	82.5
男 性	ほぼ毎日	人 数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合	7.9	11.7	4.9	3.7	13.0	0.0	10.1	5.1	4.0	6.7	6.7
		標準誤差	3.9	6.4	2.6	1.8	5.9	0.0	3.8	1.8	1.7	1.9	1.9
		割合	2.4	4.4	0.6	2.8	0.0	1.5	3.6	1.4	1.2	1.9	1.9
	週に数回程度	標準誤差	2.4	2.8	0.6	1.8	0.0	1.3	1.9	0.8	0.9	0.6	0.7
		割合	0.0	8.9	5.3	0.7	1.0	0.8	5.1	2.9	0.6	3.0	2.8
	週に1回程度	標準誤差	0.0	6.9	4.6	0.7	1.0	0.6	4.3	2.0	0.5	2.3	2.1
		割合	12.0	0.0	0.9	0.3	2.5	4.6	5.1	0.5	4.6	3.1	3.1
	月に1回程度	標準誤差	11.1	0.0	1.0	0.3	1.5	2.9	4.3	0.4	2.2	1.8	1.8
		割合	77.7	75.0	88.4	90.6	80.1	86.8	76.1	89.2	83.7	83.3	83.3
女 性	ほぼ毎日	人 数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合	4.5	8.1	7.2	9.0	17.5	2.4	6.6	9.2	6.9	8.0	8.2
		標準誤差	2.8	4.1	3.0	3.7	4.5	1.4	2.7	2.8	1.9	1.9	1.9
		割合	10.8	3.9	6.5	8.9	4.2	3.0	6.8	6.5	3.8	5.7	5.8
	週に数回程度	標準誤差	8.9	2.2	4.3	5.1	2.5	2.3	3.4	2.8	1.8	2.2	2.3
		割合	1.7	3.3	1.1	0.0	0.2	0.4	2.6	0.4	0.4	1.0	1.1
	週に1回程度	標準誤差	1.7	2.4	1.0	0.0	0.2	0.3	1.8	0.4	0.3	0.5	0.6
		割合	0.0	3.6	2.1	1.0	0.0	2.9	2.1	1.3	2.1	1.8	1.7
	月に1回程度	標準誤差	0.0	3.5	1.8	0.7	0.0	2.3	2.1	0.9	1.7	0.8	0.8
		割合	83.1	81.1	83.1	80.7	75.6	86.4	81.9	81.9	82.6	81.9	81.7
	全くなかった	標準誤差	9.4	6.0	5.2	5.7	5.6	6.6	4.1	3.6	4.6	3.0	3.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	2.6	4.9	0.0	0.6	4.2	1.6	1.5
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.4	2.1	0.7	0.6

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「職場」(%)
問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。イ)職場

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合	18.9	17.3	19.5	11.3	7.2	0.2	18.0	14.9	1.3	12.8	12.4
	週に数回程度	標準誤差	6.1	3.9	2.9	2.8	2.9	0.2	3.4	1.9	0.6	1.7	1.7
		割合	7.5	16.2	8.8	6.1	4.7	1.6	12.5	7.4	2.1	7.5	7.5
	週に1回程度	標準誤差	2.9	2.3	2.7	4.2	1.8	0.7	1.3	1.4	0.6	1.0	0.9
		割合	2.8	2.7	4.2	3.9	3.0	1.1	2.7	4.2	1.4	3.0	3.0
	月に1回程度	標準誤差	1.9	1.5	1.5	1.9	1.1	0.7	1.5	0.9	0.6	0.6	0.6
		割合	7.8	3.8	2.2	1.8	1.1	0.6	5.5	1.9	0.6	2.6	2.6
	全くなかった	標準誤差	3.8	3.1	1.4	1.1	0.7	0.4	2.2	0.7	0.4	0.7	0.7
		割合	48.1	37.0	50.8	60.2	33.6	17.1	40.9	52.8	20.4	38.7	39.0
男性	ほぼ毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合	28.5	37.1	37.3	21.0	12.6	0.3	33.4	27.3	2.3	22.7	21.7
	週に数回程度	標準誤差	10.3	9.1	4.4	4.6	5.7	0.3	6.3	3.1	1.3	2.5	2.4
		割合	2.4	27.4	12.2	8.4	7.9	1.9	16.7	10.6	2.3	10.2	10.1
	週に1回程度	標準誤差	2.4	6.4	5.0	3.0	3.3	0.9	4.4	2.5	1.0	2.1	2.0
		割合	6.5	1.5	6.4	4.8	5.1	2.5	3.6	5.5	3.2	4.4	4.3
	月に1回程度	標準誤差	4.1	1.5	3.0	3.1	2.3	1.5	2.0	1.8	1.3	1.2	1.2
		割合	0.8	8.9	3.0	2.9	2.4	1.3	5.5	2.9	1.5	3.3	3.3
	全くなかった	標準誤差	0.9	6.9	2.5	2.0	1.7	0.9	4.2	1.3	0.8	1.3	1.3
		割合	42.3	17.5	34.7	54.4	36.5	23.0	28.1	44.1	25.1	33.9	33.7
女性	ほぼ毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合	11.5	2.5	1.9	1.9	2.8	0.1	6.3	2.4	0.6	2.9	3.0
	週に数回程度	標準誤差	8.9	1.5	1.4	1.3	1.7	0.1	3.3	1.0	0.4	1.1	1.1
		割合	11.4	7.8	5.5	3.9	2.1	1.8	9.3	4.2	1.9	4.9	5.0
	週に1回程度	標準誤差	4.8	4.8	2.9	2.0	1.3	1.1	3.5	1.4	0.9	1.0	1.1
		割合	0.0	3.6	2.0	3.5	1.3	0.0	2.1	2.8	0.1	1.6	1.7
	月に1回程度	標準誤差	0.0	2.5	1.4	2.6	0.8	0.0	1.4	1.3	0.1	0.6	0.6
		割合	13.1	0.0	1.4	0.6	0.0	0.0	5.5	0.8	0.0	1.9	2.0
	全くなかった	標準誤差	6.7	0.0	1.1	0.5	0.0	0.0	3.0	0.5	0.0	0.8	0.9
		割合	49.0	51.7	66.8	65.7	31.3	12.5	50.5	61.5	16.8	43.4	44.4
女性	ほぼ毎日	人数	15.1	34.4	22.6	23.9	59.7	83.7	26.3	27.8	78.3	44.4	43.0
		割合	5.4	5.3	4.7	5.4	5.5	3.6	5.0	4.1	3.7	2.7	2.6
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	2.8	1.9	0.0	0.4	2.3	1.0	0.9
		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.2	0.0	0.3	1.4	0.5	0.5
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.2	0.0	0.3	1.4	0.5	0.5
		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.2	0.0	0.3	1.4	0.5	0.5
	月に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.2	0.0	0.3	1.4	0.5	0.5
		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.2	0.0	0.3	1.4	0.5	0.5
	全くなかった	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.2	0.0	0.3	1.4	0.5	0.5
		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.2	0.0	0.3	1.4	0.5	0.5

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「学校」(%)
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ウ)学校

性別	回答	年齢区分					(再掲)					(再掲)		(再掲)	
		人数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2		
総数	ほぼ毎日	割合 標準誤差	1.6 1.4	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028		
	週に数回程度	割合 標準誤差	2.5 1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	週に1回程度	割合 標準誤差	5.0 3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	月に1回程度	割合 標準誤差	0.3 0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	全くなかった	割合 標準誤差	35.1 7.8	28.6	18.4	22.6	8.2	11.2	31.3	19.1	9.6	19.2	19.6		
	行かなかった	割合 標準誤差	54.8 9.1	68.4	78.7	74.3	88.1	86.0	62.6	77.9	87.1	76.8	76.4		
	無回答	割合 標準誤差	0.9 0.9	1.5 1.4	1.5 1.2	2.9 1.3	3.2 1.5	2.7 1.3	1.3 0.9	2.0 0.8	3.2 1.4	2.2 0.7	2.2 0.7		
	ほぼ毎日	割合 標準誤差	3.6 3.1	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474		
	週に数回程度	割合 標準誤差	5.2 3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	週に1回程度	割合 標準誤差	2.8 2.7	2.1 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
男性	月に1回程度	割合 標準誤差	0.6 0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	全くなかった	割合 標準誤差	37.3 12.8	16.4	9.4	22.1	14.2	13.9	25.3	16.1	13.1	17.7	17.9		
	行かなかった	割合 標準誤差	48.6 13.1	81.5	87.6	72.3	80.9	83.6	67.4	79.8	83.5	77.4	77.2		
	無回答	割合 標準誤差	2.0 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ほぼ毎日	割合 標準誤差	0.6 0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	週に数回程度	割合 標準誤差	0.5 0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	週に1回程度	割合 標準誤差	6.7 4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	月に1回程度	割合 標準誤差	0.0 0.0	1.0 0.8	1.1 1.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0		
	全くなかった	割合 標準誤差	33.3 9.2	37.7	27.4	23.1	3.2	9.0	35.9	22.2	7.0	20.6	21.2		
	行かなかった	割合 標準誤差	59.5 11.7	58.6	69.9	76.2	94.0	87.9	59.0	76.1	89.9	76.2	75.5		
女性	無回答	割合 標準誤差	0.0 0.0	2.7 2.4	0.0 0.0	0.7 0.7	2.8 1.5	3.1 1.5	1.6 1.5	0.6 0.4	3.1 1.5	1.7 0.6	1.7 0.6		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「飲食店」(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。エ)飲食店

性別	回答	年齢区分		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 20歳以上 ※1		(再掲) 20歳以上 ※2		
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
総数	ほぼ毎日	81	4.8	0.0	1.9	2.7	2.0	0.0	2.1	1.9	0.8	1.9	0.8	1.8	1.9	0.8	1.9	0.8	1.9	0.8	1.9	0.8	1.8	0.7
	週に数回程度		12.6	10.9	9.1	3.0	1.6	1.7	11.6	5.8	1.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	
	週に1回程度		15.1	9.7	13.2	15.0	4.7	6.6	12.0	12.8	0.7	5.8	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	
	月に1回程度		35.4	23.2	26.1	17.3	14.8	15.5	28.4	20.5	15.4	21.9	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	
	全くなかった		18.6	41.5	31.8	42.5	44.2	40.5	31.8	40.0	40.0	36.4	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9	
	行かなかった		13.5	14.7	17.9	19.0	30.4	33.6	14.2	18.7	34.3	22.4	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	
	無回答		0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	2.1	0.0	0.4	2.3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
男性	ほぼ毎日	37	4.9	0.0	3.9	5.5	3.2	0.0	4.8	3.8	1.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
	週に数回程度		7.3	19.0	12.7	6.1	1.5	2.2	14.0	8.4	1.6	8.3	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
	週に1回程度		7.6	9.5	20.1	23.1	7.6	8.0	8.7	19.3	7.6	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
	月に1回程度		44.3	33.6	29.5	17.4	13.9	19.0	38.2	20.0	19.5	25.7	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	
	全くなかった		11.1	23.2	17.3	29.8	46.8	40.6	18.1	30.8	39.0	28.6	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	
	行かなかった		18.5	14.6	16.4	17.6	24.0	27.9	16.3	17.3	28.0	20.0	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	
	無回答		0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	2.3	0.0	0.4	2.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
女性	ほぼ毎日	44	5.8	0.0	8.5	8.0	11.7	1.5	10.2	20.9	24.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	
	週に数回程度		16.6	4.8	5.4	0.0	1.7	1.3	9.8	3.2	0.9	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	
	週に1回程度		20.9	9.8	6.4	7.2	2.3	5.5	14.4	6.2	4.5	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
	月に1回程度		28.5	15.5	22.7	17.3	15.7	12.8	21.0	20.9	12.3	18.0	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	
	全くなかった		24.3	55.2	46.2	54.7	42.1	40.5	42.2	49.1	40.8	44.1	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	
	行かなかった		9.7	14.9	19.3	20.3	35.6	38.1	12.7	20.1	39.2	24.8	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	
	無回答		0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	1.9	0.0	0.4	1.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)」「(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。オ:遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)

性別	回答	年齢区分				(再掲)				(再掲)				(再掲)			
		人数				20-29歳				30-39歳				40-49歳			
総数	ほぼ毎日	割合	0.0	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	※1	20歳以上	65歳以上	※2	1028
		標準誤差	0.0	0.0	0.6	0.6	1.5	0.3	0.0	0.9	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4
	週に数回程度	割合	3.0	0.5	3.4	1.4	1.4	1.8	1.5	2.0	1.5	1.9	1.8	1.5	2.0	1.9	1.8
		標準誤差	2.3	0.5	3.0	1.1	1.1	1.0	0.9	1.3	0.7	0.7	0.6	1.3	0.7	0.7	0.6
	週に1回程度	割合	4.1	2.5	1.5	0.8	5.7	3.4	3.2	1.1	4.8	3.3	3.3	3.2	1.1	4.8	3.3
		標準誤差	3.0	1.6	1.0	0.7	1.8	1.4	1.6	0.5	1.1	0.7	0.7	0.5	1.1	0.7	0.7
	月に1回程度	割合	15.1	5.7	4.3	1.5	3.7	2.9	9.7	3.5	2.7	5.3	5.4	3.0	2.0	5.3	5.4
		標準誤差	4.9	3.0	2.8	1.1	1.6	1.1	3.7	2.0	0.9	1.3	1.3	3.0	0.9	1.3	1.3
	全くなかった	割合	17.5	21.6	12.1	21.8	11.0	12.0	19.9	16.4	11.3	15.3	15.7	11.3	16.4	11.3	15.7
		標準誤差	4.7	3.6	3.5	5.3	2.8	3.1	3.7	2.4	2.5	1.8	1.9	2.4	2.5	1.8	1.9
男性	行かなかった	割合	60.4	69.7	78.0	70.9	76.7	77.5	65.8	75.1	77.1	72.7	72.2	75.1	77.1	72.7	72.2
		標準誤差	6.7	4.6	4.7	6.1	3.4	3.4	4.0	3.4	2.9	2.4	2.4	3.4	2.9	2.4	2.4
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	2.1	0.0	1.0	2.4	1.2	1.2	1.0	2.4	1.2	1.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	1.3	0.0	0.8	1.3	0.7	0.7	0.0	1.3	0.7	0.7
	ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	1.2	3.0	0.4	0.0	8.6	1.8	0.0	0.7	0.7	0.0	1.8	0.0	0.7
		標準誤差	0.0	0.0	1.2	2.9	0.4	0.0	0.0	1.3	0.0	0.5	0.5	0.0	1.3	0.0	0.5
	週に数回程度	割合	6.9	1.1	6.9	2.5	0.9	2.6	3.5	3.9	2.3	3.4	3.2	3.5	3.9	2.3	3.4
		標準誤差	5.3	1.2	5.8	2.2	0.9	1.9	2.2	2.6	1.5	1.4	1.2	2.2	2.6	1.5	1.4
	週に1回程度	割合	9.4	5.9	0.5	1.3	9.8	6.3	7.4	1.0	8.7	5.3	5.5	7.4	1.0	8.7	5.3
		標準誤差	7.0	3.9	0.4	1.3	3.5	2.9	3.8	0.6	2.7	1.3	1.3	3.8	0.6	2.7	1.3
女性	月に1回程度	割合	18.2	9.6	4.4	3.1	8.3	5.6	13.3	5.3	5.6	7.8	7.8	13.3	5.3	5.6	7.8
		標準誤差	6.9	4.6	2.5	2.1	3.6	2.5	4.6	2.5	2.1	1.8	1.8	4.6	2.5	2.1	1.8
	全くなかった	割合	19.1	15.4	8.5	14.4	14.5	16.2	17.0	12.1	15.7	14.4	14.6	17.0	12.1	15.7	14.4
		標準誤差	10.6	6.0	3.5	4.7	3.9	4.3	7.5	3.1	3.3	2.1	2.1	7.5	3.1	3.3	2.1
	行かなかった	割合	48.4	67.9	78.5	72.6	63.2	67.0	58.8	74.7	64.6	66.9	66.6	58.8	74.7	64.6	66.9
		標準誤差	10.4	5.7	7.1	6.4	6.2	4.4	6.0	5.2	4.1	3.2	3.1	6.0	5.2	4.1	3.2
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	3.1	3.0	2.3	0.0	1.2	3.0	1.4	1.5	0.0	1.2	3.0	1.4
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	2.5	2.7	1.5	0.0	1.0	1.9	0.8	0.9	0.0	1.0	1.9	0.8
	ほぼ毎日	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	10.2	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1
女性	週に数回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.2	0.0	0.1	0.9	0.3	0.3	0.0	0.1	0.9	0.3
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.2	0.0	0.1	0.8	0.3
	週に1回程度	割合	0.0	0.0	2.4	0.4	2.3	1.2	0.0	1.2	1.8	1.2	1.1	0.0	1.2	1.8	1.2
		標準誤差	0.0	0.0	1.8	0.4	2.3	1.2	0.0	0.8	1.2	0.6	0.6	0.0	0.8	1.2	0.6
	月に1回程度	割合	12.7	2.7	4.2	0.0	0.0	0.7	6.9	1.8	0.5	2.9	2.9	12.7	1.8	0.5	2.9
		標準誤差	4.5	2.4	3.7	0.0	0.0	0.8	2.5	1.7	0.5	1.2	1.2	4.5	1.7	0.5	1.2
	全くなかった	割合	16.2	26.3	15.8	28.9	8.2	8.6	22.0	20.7	7.9	16.3	16.9	16.2	20.7	7.9	16.3
		標準誤差	5.7	3.7	4.4	9.8	3.4	2.7	3.1	4.6	2.3	1.8	2.0	5.7	4.6	2.3	1.8
	行かなかった	割合	71.1	71.0	77.6	69.2	87.7	85.9	71.1	75.5	86.6	78.3	77.8	71.1	75.5	86.6	78.3
		標準誤差	8.0	4.9	4.5	10.0	4.2	4.0	4.0	4.2	3.0	2.1	2.2	8.0	4.2	3.0	2.1
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	1.2	1.8	1.9	0.0	0.8	1.9	0.9	0.9	0.0	0.8	1.9	0.9
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	0.0	0.5	1.2	0.6	0.6	0.0	0.5	1.2	0.6

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「行政機関(市役所、町村役場、公民館など)」、「(%)」

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。カ行政機関(市役所、町村役場、公民館など)

性別	回答	年齢区分		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 20歳以上 ※1		(再掲) 20歳以上 ※2	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
総数	ほぼ毎日	81	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1028	1028	
	週に数回程度			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	
	週に1回程度			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
	月に1回程度			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全くなかった			4.2	3.3	2.1	4.3	2.5	1.5	3.7	3.6	1.3	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	0.9	0.9	0.9	0.9	
	行かなかった			28.4	31.3	33.1	46.8	26.7	44.9	30.1	37.1	40.5	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	
	無回答			6.1	3.5	4.0	4.6	4.2	3.3	3.6	2.5	2.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
	割合			67.4	64.4	64.9	46.6	68.0	49.8	65.7	58.2	54.4	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	
	標準誤差			5.7	3.7	3.6	6.1	4.2	3.0	3.2	2.7	2.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
	無回答			0.0	1.0	0.0	1.7	2.5	2.4	0.6	0.9	2.6	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
男性	ほぼ毎日	37	49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	474	474	
	週に数回程度			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	
	週に1回程度			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	
	月に1回程度			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	
	全くなかった			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	
	行かなかった			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	
	無回答			9.6	7.2	1.5	3.3	2.4	3.3	8.2	2.6	2.9	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	
	割合			9.2	5.4	1.1	2.2	1.3	2.1	5.1	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
	標準誤差			38.8	23.8	33.1	46.0	22.7	42.0	30.2	35.8	37.7	34.0	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	
	無回答			11.3	4.6	5.2	8.0	5.1	4.9	6.1	4.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	
女性	ほぼ毎日	44	58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	554	554		
	週に数回程度			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	週に1回程度			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
	月に1回程度			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
	全くなかった			0.0	0.4	2.7	5.3	2.6	0.0	0.2	4.7	0.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
	行かなかった			20.4	37.0	33.0	47.6	30.0	47.3	30.0	38.3	42.7	39.9	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
	無回答			6.3	4.4	7.6	3.5	5.1	5.7	3.9	3.7	3.9	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
	割合			79.6	61.0	64.3	46.7	65.3	49.7	68.8	56.6	54.5	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	
	標準誤差			6.3	4.9	6.3	6.2	4.8	5.5	4.2	3.6	3.7	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
	無回答			0.0	1.7	0.0	0.4	1.8	2.5	1.0	0.4	2.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「医療機関」(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。キ)医療機関

性別	回答	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数
総数	ほぼ毎日	81	0.0	107	0.0	158	0.0	161	0.0	217	0.0	304	0.0	188	0.0	439	0.0	1028
	週に数回程度		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
	週に1回程度		0.3		0.0		0.1		0.0		0.7		0.0		0.1		0.4	0.2
	月に1回程度		0.3		0.0		0.2		0.0		0.7		0.0		0.1		0.3	0.1
	全くなかった		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.4	0.1
	行かなかった		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.4	0.1
	無回答		4.5		2.7		2.9		3.3		2.8		3.1		3.4		2.5	3.3
			4.0		1.6		1.9		2.6		1.2		1.3		2.0		1.0	0.8
			43.2		68.5		50.8		65.7		63.8		70.0		57.8		68.9	61.0
			6.8		9.0		4.7		3.6		4.8		6.1		7.2		4.7	2.4
男性	ほぼ毎日	37	0.0	49	0.0	73	0.0	81	0.0	100	0.0	134	0.0	86	0.0	192	0.0	474
	週に数回程度		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
	週に1回程度		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1	0.0
	月に1回程度		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		0.9	0.2
	全くなかった		9.6		6.2		0.9		1.3		2.9		3.2		7.7		0.9	3.8
	行かなかった		9.2		3.8		1.0		1.2		1.9		1.5		4.5		0.6	1.5
	無回答		38.6		54.8		45.2		59.6		55.7		70.9		47.9		53.1	55.4
			12.4		14.1		3.9		8.2		6.7		7.1		12.6		3.7	3.4
			51.7		38.9		53.6		36.0		38.0		22.3		44.4		44.5	38.9
			13.0		13.1		4.0		7.8		6.6		7.3		11.2		3.9	2.8
女性	ほぼ毎日	44	0.0	58	0.0	85	0.0	80	0.0	117	0.0	170	0.0	102	0.0	243	0.0	554
	週に数回程度		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
	週に1回程度		0.5		0.0		0.0		0.0		1.3		0.0		0.2		0.7	0.3
	月に1回程度		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
	全くなかった		46.7		78.7		56.3		71.5		70.5		69.2		65.2		64.0	66.5
	行かなかった		8.8		7.5		7.5		7.6		5.4		6.6		6.5		4.7	2.9
	無回答		52.3		21.3		38.9		22.8		24.1		25.8		34.3		30.7	29.7
			8.7		7.5		8.8		7.4		5.1		6.3		6.4		3.7	2.7
			0.0		0.0		0.0		0.4		1.8		1.9		0.0		0.4	0.8
			0.0		0.0		0.0		0.4		1.2		1.2		0.0		0.3	0.4

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「公共交通機関」(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ク)公共交通機関

性別	回答	年齢区分		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 20歳以上 ※1		(再掲) 20歳以上 ※2	
		人数	割合	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028											
総数	ほぼ毎日		割合	4.2	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	1.8	0.4	0.0	0.8	0.8											
		標準誤差	4.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	1.8	0.4	0.0	0.6	0.6												
	週に数回程度		割合	0.0	1.3	1.6	6.0	1.3	0.3	0.8	3.7	0.2	1.6	1.7											
		標準誤差	0.0	1.1	1.1	5.2	1.2	0.3	0.6	2.1	0.2	0.7	0.8												
	週に1回程度		割合	6.6	2.5	2.1	3.4	1.7	0.7	4.3	3.0	0.6	2.6	2.6											
		標準誤差	3.5	1.9	1.3	1.8	1.0	0.6	1.9	1.2	0.5	0.7	0.7												
	月に1回程度		割合	0.3	4.0	3.8	10.1	4.2	2.5	2.4	6.1	3.2	4.2	4.3											
		標準誤差	0.3	3.1	2.3	4.0	1.8	0.9	1.9	2.0	1.0	1.1	1.1												
	全くなかった		割合	65.7	56.6	58.2	59.1	55.1	56.6	60.5	57.3	56.8	57.9	57.8											
		標準誤差	7.0	5.4	5.5	8.3	5.1	4.5	3.5	4.7	4.0	3.3	3.4												
男性	行かなかった		割合	23.2	35.5	33.5	20.1	35.3	37.9	30.3	28.8	36.8	31.9	31.7											
		標準誤差	6.3	6.7	4.1	5.0	5.2	4.2	3.7	3.8	3.7	3.0	3.0												
	無回答		割合	0.0	0.0	0.0	1.1	2.5	2.1	0.0	0.7	2.4	1.0	1.1											
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	1.3	0.0	0.3	1.3	0.5	0.5												
	ほぼ毎日		割合	9.6	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	4.1	0.8	0.0	1.6	1.5											
		標準誤差	9.2	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	4.2	0.7	0.0	1.3	1.2											
	週に数回程度		割合	0.0	0.8	0.0	1.3	2.8	0.7	0.5	1.7	0.5	0.9	1.0											
		標準誤差	0.0	0.9	0.0	1.2	2.8	0.7	0.5	1.3	0.5	0.6	0.6												
	週に1回程度		割合	9.2	3.9	0.0	5.2	0.0	0.0	6.2	2.1	0.0	2.6	2.7											
		標準誤差	4.5	2.7	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	2.9	1.4	0.0	1.0	1.0											
女性	月に1回程度		割合	0.0	9.4	0.0	11.7	4.7	4.6	5.4	5.6	4.6	5.0	5.2											
		標準誤差	0.0	6.8	0.0	6.2	3.1	1.9	1.9	4.2	2.1	1.9	2.0												
	全くなかった		割合	52.0	56.4	68.6	54.7	51.1	55.7	54.5	59.7	54.7	57.0	56.5											
		標準誤差	10.5	6.6	5.8	7.6	5.6	6.7	6.1	4.7	5.3	3.4	3.4												
	行かなかった		割合	29.2	29.5	29.8	24.9	38.1	36.7	29.4	29.3	37.1	31.6	31.8											
		標準誤差	8.6	10.1	6.0	6.3	6.6	6.2	7.5	4.5	5.5	3.4	3.4												
	無回答		割合	0.0	0.0	0.0	1.8	3.3	2.3	0.0	0.9	3.0	1.3	1.3											
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	2.7	1.5	0.0	0.5	1.9	0.7	0.8												
	ほぼ毎日		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
	週に数回程度		割合	0.0	1.7	3.3	10.6	0.0	0.0	1.0	5.8	0.0	2.3	2.5											
		標準誤差	0.0	1.7	2.1	10.0	0.0	0.0	1.0	4.3	0.0	2.3	2.5												
	週に1回程度		割合	4.6	1.5	4.2	1.7	3.1	1.2	2.8	3.9	1.0	2.6	2.6											
		標準誤差	4.6	1.5	2.4	1.7	1.9	1.1	2.1	1.8	0.8	0.9	0.9												
	月に1回程度		割合	0.5	0.0	7.5	8.5	3.8	0.7	0.2	6.7	2.1	3.4	3.4											
		標準誤差	0.5	0.0	4.4	4.3	2.4	0.5	0.2	3.0	1.1	1.2	1.2												
	全くなかった		割合	76.3	56.8	47.9	63.4	58.3	57.3	65.0	54.9	58.5	58.8	59.2											
		標準誤差	10.2	5.7	5.9	10.2	6.2	5.5	5.0	5.0	5.4	4.0	4.0												
	行かなかった		割合	18.6	40.0	37.1	15.4	33.0	38.9	31.0	28.3	36.6	32.1	31.6											
		標準誤差	9.2	5.3	4.9	5.1	5.9	5.3	4.9	4.4	4.9	3.3	3.3												
	無回答		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	1.9	0.0	0.4	1.9	0.8	0.8											
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.2	1.2	0.0	0.3	1.2	0.5	0.4											

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「路上」(%)
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ケ)路上

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合	8.0	1.2	9.9	3.8	3.4	1.6	4.1	6.8	1.7	4.6	4.4
	週に数回程度	標準誤差	4.4	1.0	3.0	1.7	1.5	1.1	2.2	1.4	0.8	0.9	0.9
		割合	3.7	8.9	10.4	11.8	8.7	5.2	6.7	10.5	6.3	8.0	8.0
	週に1回程度	標準誤差	2.1	4.2	2.9	3.2	3.1	2.2	2.3	2.3	1.7	1.3	1.3
		割合	19.3	22.0	9.6	10.8	9.8	5.8	20.9	9.7	7.2	12.6	12.8
	月に1回程度	標準誤差	5.3	5.1	3.2	2.9	2.1	2.1	3.5	1.7	1.8	1.5	1.5
		割合	15.6	13.5	13.9	17.2	9.8	14.3	14.4	14.2	13.4	13.8	13.8
	全くなかった	標準誤差	5.8	2.3	4.8	3.7	3.5	3.1	2.7	2.7	3.0	1.6	1.5
		割合	41.0	43.2	52.1	48.5	50.1	59.7	42.3	50.4	57.0	49.8	49.4
男性	ほぼ毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合	9.6	0.8	12.1	4.3	4.6	2.3	4.6	7.6	2.8	5.6	5.3
	週に数回程度	標準誤差	9.2	0.8	4.6	2.8	2.5	1.5	4.2	2.2	1.2	1.7	1.6
		割合	2.0	4.9	15.9	9.0	6.2	5.7	3.6	11.9	5.2	7.7	7.3
	週に1回程度	標準誤差	2.0	2.7	5.5	3.4	3.3	3.4	1.8	3.5	2.6	1.9	1.8
		割合	18.4	37.6	7.6	5.6	9.0	5.9	29.4	5.8	7.9	13.7	13.8
	月に1回程度	標準誤差	6.9	10.1	4.5	3.0	3.4	2.5	6.0	2.2	2.8	2.9	2.9
		割合	9.3	8.3	10.6	21.2	10.0	18.6	8.7	14.7	16.5	13.0	13.2
	全くなかった	標準誤差	5.8	4.3	6.1	5.3	3.3	3.5	3.5	2.9	2.8	1.8	1.7
		割合	48.9	31.8	49.9	48.2	44.8	57.1	39.1	48.0	54.4	46.9	46.9
女性	ほぼ毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合	6.7	1.5	7.8	3.3	2.4	1.1	3.7	5.9	0.8	3.6	3.6
	週に数回程度	標準誤差	4.3	1.6	2.9	2.5	1.6	1.1	2.1	1.8	0.8	1.2	1.2
		割合	5.0	11.9	5.1	14.5	10.7	4.8	9.0	9.1	7.0	8.3	8.7
	週に1回程度	標準誤差	3.1	6.3	2.1	6.2	3.7	1.8	3.4	3.2	1.6	1.4	1.5
		割合	20.0	10.3	11.7	15.9	10.5	5.6	14.4	13.6	6.7	11.4	11.7
	月に1回程度	標準誤差	6.2	5.1	5.8	5.2	3.4	2.5	4.8	3.0	2.0	1.3	1.3
		割合	20.5	17.5	17.1	13.4	9.7	10.9	18.7	13.7	11.1	14.3	14.5
	全くなかった	標準誤差	9.0	4.2	4.5	5.5	4.5	3.3	4.2	3.4	3.6	1.9	1.9
		割合	35.0	51.8	54.3	48.9	54.4	61.7	44.7	52.8	59.0	52.6	52.0
女性	ほぼ毎日	人数	128	70	42	37	115	145	95	45	143	93	91
		割合	12.8	7.0	4.2	3.7	11.5	14.5	9.5	4.5	14.3	9.3	9.1
	週に数回程度	標準誤差	9.0	3.4	1.9	2.3	3.2	3.6	3.4	1.9	2.8	1.7	1.7
		割合	9.0	3.4	1.9	2.3	3.2	3.6	3.4	1.9	2.8	1.7	1.7
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.3	0.0	0.4	1.1	0.5	0.5
		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.3	0.0	0.4	1.1	0.5	0.5
	全くなかった	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	0.0	0.3	0.8	0.3	0.3
		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	0.0	0.3	0.8	0.3	0.3
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	0.0	0.3	0.8	0.3	0.3
		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	0.0	0.3	0.8	0.3	0.3

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)」(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。コ)子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)

性別	回答	年齢区分		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 20歳以上 ※1		(再掲) 20歳以上 ※2	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
総数	ほぼ毎日	81	2.6	107	0.9	158	0.1	161	0.0	217	0.9	304	0.0	188	1.6	401	0.5	439	0.0	1028	0.6	1028	0.6		
	週に数回程度		2.4		0.9		0.2		0.0		0.9		0.0		1.2		0.4		0.0		0.3		0.3		
	週に1回程度		1.6		1.8		0.0		2.7		0.5		1.6		1.8		1.1		1.4		1.2		1.3		
	月に1回程度		1.6		1.3		0.0		2.5		0.5		0.9		1.0		1.1		0.7		0.6		0.6		
	全くなかった		3.2		2.5		5.3		0.2		2.4		0.0		2.8		2.7		0.6		2.2		2.1		
	行かなかった		2.5		2.2		2.3		2.8		1.4		0.0		1.7		1.0		0.5		0.8		0.7		
	無回答		3.9		7.1		8.1		2.6		1.6		1.1		5.7		4.6		2.1		4.2		4.2		
			2.0		2.7		2.6		1.6		1.1		1.0		1.7		1.5		0.8		0.7		0.6		
			45.7		58.2		38.8		49.9		45.0		44.4		52.9		43.6		45.2		46.3		46.8		
			8.6		7.7		5.2		4.1		5.4		3.9		6.2		2.7		3.5		2.3		2.4		
男性	ほぼ毎日		42.6		29.5		47.7		43.3		46.4		50.2		35.1		46.8		48.2		44.5		43.9		
	週に数回程度		9.1		4.9		4.2		3.7		5.5		4.0		5.0		2.5		3.8		2.3		2.3		
	週に1回程度		0.4		0.0		0.0		1.1		2.5		2.1		0.2		0.7		2.4		1.1		1.1		
	月に1回程度		0.4		0.0		0.0		0.7		1.4		1.3		0.2		0.3		1.3		0.5		0.6		
	全くなかった		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		0.0		0.0		0.9		0.0		0.4		0.4		
	行かなかった		0.0		0.0		0.0		2.7		1.2		2.2		0.0		1.1		2.1		1.0		1.1		
	無回答		0.0		0.0		0.0		2.5		1.2		1.6		0.0		1.1		1.3		0.5		0.5		
			1.5		0.5		3.2		0.0		1.9		0.0		0.9		1.6		0.6		1.2		1.1		
			1.5		0.5		3.0		0.0		1.3		0.0		0.7		1.2		0.5		0.7		0.6		
			1.5		2.6		7.4		4.5		5.0		3.9		2.1		5.1		4.9		4.3		4.2		
女性	ほぼ毎日	44	4.6	58	1.5	85	0.3	80	0.0	117	0.0	170	0.0	102	2.8	209	0.1	243	0.0	554	0.8	554	0.9		
	週に数回程度		4.2		1.6		0.3		0.0		0.0		0.0		2.1		0.1		0.0		0.5		0.6		
	週に1回程度		2.9		3.2		0.0		2.6		0.0		1.2		3.1		1.1		0.9		1.5		1.6		
	月に1回程度		2.7		2.3		0.0		2.5		0.0		1.1		1.7		1.0		0.8		0.7		0.7		
	全くなかった		4.6		4.0		7.4		0.4		2.8		0.0		4.2		3.8		0.7		3.1		3.0		
	行かなかった		4.2		3.8		3.6		0.4		1.9		0.0		2.7		1.8		0.7		1.1		1.1		
	無回答		5.8		10.4		8.7		1.2		0.0		0.0		8.5		4.2		0.0		4.1		4.2		
			3.2		4.2		3.8		1.2		0.0		0.0		2.9		1.7		0.0		1.1		1.2		
			48.7		61.5		42.3		58.8		48.4		44.4		56.1		49.7		45.8		49.9		50.5		
			10.8		9.9		7.3		8.5		6.5		4.7		6.0		4.5		4.0		3.5		3.6		
		32.7		19.3		41.2		36.6		47.1		52.5		25.0		40.6		50.7		39.8		38.9			
		11.9		5.5		6.4		7.3		6.1		4.6		5.1		3.6		3.7		3.0		3.0			
	無回答		0.6		0.0		0.0		0.4		1.8		1.9		0.3		0.4		1.9		0.9		0.8		
			0.7		0.0		0.0		0.4		1.2		1.2		0.3		0.3		1.2		0.5		0.4		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

受動喫煙防止対策の推進を望む場所(%)

問14 あなたが、受動喫煙の防止対策が今よりも推進されることを望む場所がありますか。(複数回答)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	人 数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	家庭	割合	10.0	11.0	3.3	6.7	14.3	7.5	10.6	6.1	9.8	8.9	9.1
		標準誤差	4.3	3.0	1.4	2.6	4.7	1.7	2.6	1.6	2.2	1.6	1.7
	職場	割合	10.7	14.4	10.2	11.4	13.4	7.0	12.8	11.7	8.2	11.4	11.5
		標準誤差	4.1	4.0	2.5	3.0	2.9	1.8	2.8	2.1	1.7	1.5	1.5
	学校	割合	6.7	9.3	8.0	6.6	13.6	6.5	8.2	9.3	7.6	8.7	8.8
		標準誤差	3.5	2.6	3.2	2.2	3.0	1.9	2.5	1.6	1.8	1.4	1.4
	飲食店	割合	21.1	31.3	39.5	48.2	38.1	35.1	27.0	43.3	35.5	35.7	35.8
		標準誤差	6.0	4.3	4.2	6.1	3.7	3.7	3.9	3.3	3.4	2.3	2.3
	遊技場(ゲームセンター、 パチンコ、競馬場など)	割合	11.2	14.0	23.0	22.0	21.0	15.3	12.9	22.0	17.1	18.1	18.2
		標準誤差	3.4	5.3	5.2	4.2	3.4	2.8	3.4	3.3	2.2	2.1	2.0
	行政機関(市役所、町村 役場、公民館など)	割合	9.5	9.3	9.5	13.0	26.8	9.7	9.4	15.4	13.0	13.2	13.4
		標準誤差	5.0	3.0	3.1	3.4	5.0	2.3	3.4	2.5	2.2	1.7	1.7
	医療機関	割合	8.8	11.0	18.4	14.4	19.4	11.1	10.1	17.7	12.7	14.0	14.1
		標準誤差	3.9	2.8	4.2	5.2	2.9	2.6	2.1	2.1	2.0	1.5	1.4
	公共交通機関	割合	12.6	14.6	22.8	21.8	25.3	13.5	13.8	23.2	16.3	18.7	18.8
		標準誤差	5.9	2.6	7.9	5.8	5.2	2.8	3.2	4.1	2.7	2.6	2.5
男 性	路上	割合	39.6	48.4	43.2	46.1	46.7	40.3	44.7	45.6	41.5	43.4	43.7
		標準誤差	8.2	6.7	6.2	5.4	4.4	4.6	5.1	4.2	4.0	2.6	2.6
	子供が利用する屋外 の空間(公園、通学路な 特にない)	割合	29.0	56.9	36.9	26.8	31.1	25.8	45.0	31.0	27.9	33.8	34.2
		標準誤差	6.3	8.8	6.7	4.3	3.8	2.8	6.3	3.7	2.5	2.4	2.4
		割合	23.7	18.2	30.1	21.9	24.6	35.7	20.5	24.3	34.0	27.0	26.4
		標準誤差	6.8	3.0	7.4	3.9	4.1	3.7	3.7	3.2	3.6	2.9	2.8
	無回答	割合	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.6	0.0	0.5	0.3	0.3
		標準誤差	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.6	0.0	0.3	0.3	0.3
	人 数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
	家庭	割合	20.9	13.3	0.3	6.9	11.4	10.5	16.5	4.4	11.3	9.9	10.2
		標準誤差	9.4	6.3	0.3	4.2	4.2	3.1	4.7	2.1	2.5	2.2	2.3
	職場	割合	19.1	19.4	14.6	17.2	20.1	8.0	19.3	17.1	10.5	16.1	16.0
		標準誤差	7.7	6.9	5.2	4.3	5.0	2.5	4.7	3.6	2.3	2.4	2.3
	学校	割合	11.3	10.7	2.8	7.0	20.5	7.3	11.0	8.8	9.4	9.7	10.0
		標準誤差	7.0	6.6	2.0	2.9	6.1	2.5	4.3	2.2	2.5	2.0	2.1
	飲食店	割合	15.3	28.1	27.6	40.7	39.3	37.4	22.6	35.5	37.4	31.8	32.3
		標準誤差	5.8	7.2	5.4	6.3	5.4	4.2	5.1	3.5	3.0	2.6	2.5
	遊技場(ゲームセンター、 パチンコ、競馬場など)	割合	10.1	15.5	17.2	26.8	29.3	21.9	13.2	21.9	25.1	20.3	20.6
		標準誤差	4.1	7.7	4.6	5.3	5.6	5.2	4.8	3.8	4.1	2.7	2.7
	行政機関(市役所、町村 役場、公民館など)	割合	20.1	12.0	3.4	12.2	27.8	10.9	15.5	12.6	13.9	13.9	14.3
		標準誤差	11.3	6.4	1.9	3.8	5.5	3.0	7.9	3.0	3.0	2.4	2.4
	医療機関	割合	4.0	15.3	7.5	8.6	22.4	12.6	10.5	11.0	14.7	12.0	12.3
		標準誤差	3.0	6.0	3.0	3.2	5.0	3.2	3.7	2.9	2.8	1.3	1.4
	公共交通機関	割合	25.0	16.5	9.1	15.0	26.9	16.4	20.1	14.4	19.4	17.7	18.0
		標準誤差	13.1	5.8	4.3	5.6	6.6	4.5	7.9	3.7	3.9	2.7	2.7
	路上	割合	31.1	40.1	31.1	36.9	39.4	41.3	36.3	35.6	40.1	36.8	37.1
		標準誤差	12.0	10.4	6.2	6.0	5.7	5.6	8.4	3.3	4.9	3.1	3.1
	子供が利用する屋外 の空間(公園、通学路な 特にない)	割合	20.4	45.4	26.8	27.5	29.7	30.9	34.7	26.5	31.7	30.4	30.7
		標準誤差	8.9	8.4	7.1	5.4	6.0	5.6	6.1	4.3	4.3	2.4	2.4
		割合	27.8	31.0	41.0	34.7	25.6	29.3	29.6	33.9	30.2	31.9	31.5
		標準誤差	9.9	4.2	7.5	4.4	5.6	4.8	5.1	3.4	3.9	3.0	3.0
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2
女 性	人 数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
	家庭	割合	1.6	9.3	6.4	6.5	16.7	5.2	6.1	7.8	8.7	7.8	7.9
		標準誤差	1.0	4.4	2.8	3.2	6.5	1.8	2.7	2.4	3.0	1.7	1.8
	職場	割合	4.2	10.6	5.7	5.9	7.9	6.2	7.9	6.3	6.5	6.8	6.9
		標準誤差	2.9	5.0	3.2	3.0	2.7	1.9	3.3	2.4	1.7	1.3	1.4
	学校	割合	3.2	8.2	13.3	6.2	7.9	5.9	6.1	9.8	6.2	7.7	7.6
		標準誤差	2.2	3.8	4.6	3.0	2.6	2.1	2.7	2.0	1.9	1.7	1.6
	飲食店	割合	25.6	33.7	51.3	55.5	37.1	33.4	30.3	51.2	34.0	39.5	39.5
		標準誤差	8.8	5.3	6.4	8.1	5.1	4.4	5.0	4.6	4.7	3.2	3.1
	遊技場(ゲームセンター、 パチンコ、競馬場など)	割合	12.1	13.0	28.8	17.3	14.3	10.1	12.6	22.1	10.9	15.9	15.8
		標準誤差	5.3	4.2	8.0	5.3	3.6	3.3	3.5	4.1	2.5	2.6	2.5
	行政機関(市役所、町村 役場、公民館など)	割合	1.3	7.2	15.5	13.8	26.0	8.8	4.7	18.2	12.3	12.6	12.5
		標準誤差	1.0	4.8	5.2	5.5	6.1	2.4	3.0	3.2	2.3	2.0	1.9
	医療機関	割合	12.5	7.8	29.2	20.1	17.0	9.9	9.8	24.4	11.1	16.1	15.8
		標準誤差	6.3	4.8	5.4	9.7	4.1	2.5	3.9	3.8	1.9	2.0	2.0
	公共交通機関	割合	3.2	13.2	36.5	28.5	23.9	11.2	9.0	32.1	14.0	19.8	19.6
		標準誤差	2.2	5.0	11.0	9.5	5.3	2.3	3.4	5.9	2.5	3.4	3.2
	路上	割合	46.1	54.7	55.4	54.9	52.7	39.5	51.1	55.6	42.6	50.0	50.3
		標準誤差	6.8	5.6	7.5	8.3	5.3	5.4	3.6	5.7	4.6	3.1	3.1
	子供が利用する屋外 の空間(公園、通学路な 特にない)	割合	35.6	65.5	46.8	29.1	32.3	21.8	52.9	35.6	24.9	37.2	37.8
		標準誤差	6.7	10.3	6.4	6.9	4.4	2.5	7.4	4.7	2.7	3.3	3.4
		割合	20.6	8.5	19.2	9.4	23.9	40.7	13.6	14.8	37.0	22.2	21.2
		標準誤差	9.6	3.4	7.0	3.7	5.1	4.0	3.7	3.5	4.4	3.3	3.2
	無回答	割合	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.5	0.4	0.4
		標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.4	0.3	0.3

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙防止対策の推進を望む場所(現在喫煙者、「無回答」を除く)(%)

問14 あなたが、受動喫煙の防止対策が今よりも推進されることを望む場所はありませんか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	人 数		68	81	120	123	182	284	149	313	396	858	858
	家庭	割合	8.2	12.8	4.3	8.1	17.2	7.4	10.8	7.6	10.2	9.8	10.1
		標準誤差	3.7	3.2	1.8	3.0	5.4	1.9	2.2	2.0	2.4	1.8	1.8
	職場	割合	12.3	17.6	10.7	13.0	14.1	6.3	15.3	12.6	8.0	12.5	12.6
		標準誤差	4.8	5.2	3.1	3.4	3.2	1.8	3.6	2.4	1.7	1.9	1.9
	学校	割合	3.2	11.4	7.6	7.2	11.8	5.8	7.8	7.8	7.5	8.1	8.2
		標準誤差	1.8	2.7	2.9	2.7	2.5	2.0	2.1	1.9	1.9	1.3	1.3
	飲食店	割合	24.3	37.7	49.4	55.7	44.6	36.1	31.8	51.6	37.8	41.4	41.4
		標準誤差	7.0	4.6	4.6	6.3	3.5	3.5	4.6	3.7	3.4	2.2	2.2
	遊技場(ゲームセンター、 パチンコ、競馬場など)	割合	12.4	15.8	25.3	25.7	23.3	14.9	14.3	24.4	17.5	19.8	19.8
		標準誤差	4.0	6.5	5.5	4.9	3.9	2.8	4.3	3.6	2.2	2.7	2.7
	行政機関(市役所、町村 役場、公民館など)	割合	10.9	11.1	12.2	15.8	30.2	9.6	11.0	17.9	13.7	15.2	15.3
		標準誤差	5.6	3.6	4.0	4.1	5.8	2.4	3.9	3.1	2.3	2.1	2.1
	医療機関	割合	9.0	12.0	20.3	17.1	21.1	10.6	10.7	19.2	13.1	15.1	15.1
		標準誤差	4.4	3.6	3.8	6.0	3.4	2.6	2.7	2.1	2.2	1.4	1.5
男 性	公共交通機関	割合	13.3	18.0	25.9	26.4	28.3	13.3	15.9	26.3	17.1	21.1	21.1
		標準誤差	6.5	3.3	7.9	6.7	5.8	2.8	3.6	4.2	2.8	2.9	2.9
	路上	割合	38.8	58.1	52.4	53.6	53.0	43.0	49.6	53.2	45.2	49.3	49.6
		標準誤差	8.6	4.9	6.9	6.6	4.9	5.1	4.0	4.4	4.4	2.9	2.8
	子供が利用する屋外 の空間(公園、通学路な 特にない)	割合	23.4	62.0	39.6	29.6	36.6	25.0	45.1	34.1	28.5	35.2	35.7
		標準誤差	5.7	9.2	6.5	4.9	3.6	2.4	6.6	3.9	2.3	2.2	2.3
		割合	22.2	11.7	21.4	13.1	18.1	35.2	16.3	16.9	31.4	21.7	21.1
		標準誤差	6.6	3.1	6.5	3.6	3.9	3.3	3.4	2.8	3.4	2.7	2.6
	人 数		27	28	43	53	69	120	55	124	161	340	340
	家庭	割合	19.1	20.3	0.4	9.5	16.3	11.4	19.7	6.6	12.9	12.4	12.8
		標準誤差	9.7	7.0	0.4	5.5	5.8	3.6	5.0	3.0	3.0	2.6	2.7
	職場	割合	25.4	29.5	17.7	22.2	24.4	6.4	27.6	20.8	9.9	19.7	19.6
		標準誤差	9.9	9.2	7.9	5.1	6.4	2.5	6.0	4.8	2.7	3.4	3.3
	学校	割合	6.4	16.3	1.0	7.9	20.2	6.3	11.8	6.6	9.8	9.4	9.7
		標準誤差	4.2	7.8	0.8	3.9	5.7	2.5	4.7	2.6	2.9	1.8	1.8
	飲食店	割合	20.4	40.8	41.4	50.7	53.9	38.7	31.4	47.6	41.8	41.2	41.3
		標準誤差	7.5	8.5	8.3	6.8	5.6	4.0	6.3	5.4	3.3	3.1	3.0
	遊技場(ゲームセンター、 パチンコ、競馬場など)	割合	13.4	19.5	20.5	35.5	37.7	21.3	16.7	27.1	27.0	24.5	24.7
		標準誤差	5.8	11.8	6.1	6.7	6.6	4.5	7.2	4.2	3.9	4.0	3.9
	行政機関(市役所、町村 役場、公民館など)	割合	26.8	17.5	5.6	16.9	37.3	10.3	21.8	16.8	15.1	18.1	18.4
		標準誤差	13.8	7.5	3.2	5.2	6.2	3.1	9.2	4.2	3.5	3.1	3.1
	医療機関	割合	4.5	19.1	7.4	10.9	29.1	12.2	12.3	12.1	16.1	13.8	14.1
		標準誤差	3.7	7.4	3.9	4.2	6.2	3.4	4.7	3.2	3.4	1.7	1.8
	公共交通機関	割合	33.2	25.1	11.3	20.7	36.0	16.5	28.8	18.2	21.7	22.9	23.2
		標準誤差	15.9	5.1	4.7	7.4	7.9	4.3	8.5	4.3	4.2	3.4	3.4
	路上	割合	28.2	57.1	43.2	50.0	50.4	46.3	43.8	47.6	47.0	46.2	46.4
		標準誤差	13.5	7.2	8.7	7.3	7.0	6.7	7.3	3.9	5.5	3.3	3.2
	子供が利用する屋外 の空間(公園、通学路な 特にない)	割合	7.5	52.2	30.3	33.7	40.8	29.6	31.6	32.0	33.2	32.6	32.8
		標準誤差	4.4	10.6	8.1	6.4	6.1	4.8	8.0	5.0	4.1	2.5	2.5
		割合	23.5	19.1	26.3	22.6	13.4	26.7	21.1	22.6	23.9	22.3	22.2
		標準誤差	9.5	6.8	7.2	5.3	4.0	4.3	4.5	3.2	3.8	2.8	2.7
女 性	人 数		41	53	77	70	113	164	94	189	235	518	518
	家庭	割合	1.6	8.8	6.8	7.1	17.7	4.6	5.7	8.3	8.5	7.9	8.0
		標準誤差	1.1	4.5	2.9	3.5	6.8	1.7	2.8	2.6	3.1	1.7	1.8
	職場	割合	4.4	11.3	6.1	6.0	8.3	6.3	8.4	6.6	6.7	7.1	7.2
		標準誤差	3.0	5.5	3.3	3.2	2.8	2.0	3.6	2.5	1.7	1.4	1.5
	学校	割合	1.3	8.7	11.9	6.7	7.0	5.5	5.6	8.8	6.0	7.1	7.0
		標準誤差	1.1	4.2	4.4	3.3	2.7	2.1	2.8	2.0	1.9	1.6	1.6
	飲食店	割合	26.7	36.1	54.6	59.6	39.3	34.2	32.1	54.5	35.2	41.6	41.6
		標準誤差	9.1	6.0	6.9	7.9	5.1	4.4	5.4	4.3	4.7	3.2	3.2
	遊技場(ゲームセンター、 パチンコ、競馬場など)	割合	11.8	13.9	28.4	18.2	15.1	10.3	13.0	22.4	11.3	16.2	16.1
		標準誤差	5.5	4.7	7.4	5.5	4.0	3.4	3.8	4.0	2.6	2.6	2.6
	行政機関(市役所、町村 役場、公民館など)	割合	1.3	7.7	16.5	14.9	26.2	9.0	5.0	18.7	12.7	13.0	12.9
		標準誤差	1.1	5.3	5.7	6.0	6.5	2.5	3.3	3.5	2.4	2.2	2.1
	医療機関	割合	11.8	8.3	28.8	21.8	16.6	9.5	9.8	24.4	11.1	16.0	15.8
		標準誤差	6.6	5.3	4.7	10.3	4.1	2.4	4.2	3.8	2.0	1.9	1.9
	公共交通機関	割合	1.3	14.2	35.5	30.8	23.9	10.9	8.7	32.1	14.0	19.7	19.5
		標準誤差	1.1	5.7	10.7	10.2	5.6	2.2	3.6	5.9	2.5	3.4	3.2
	路上	割合	45.2	58.6	58.4	56.4	54.4	40.6	52.9	57.2	44.1	51.6	52.0
		標準誤差	7.0	5.6	8.0	8.8	6.0	5.3	3.6	6.0	4.7	3.3	3.3
	子供が利用する屋外 の空間(公園、通学路な 特にない)	割合	33.0	67.3	45.7	26.4	34.2	21.8	52.6	35.5	25.4	37.2	37.9
		標準誤差	6.8	10.4	6.0	7.0	4.5	2.3	7.6	4.5	2.6	3.0	3.1
		割合	21.5	7.8	18.2	5.9	20.8	41.3	13.7	12.9	36.3	21.3	20.2
		標準誤差	10.0	3.4	7.1	2.6	5.2	4.2	3.8	3.2	4.3	3.2	3.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(5)飲酒に関する状況

飲酒の頻度(%)

問15 あなたは、週に何日位お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	人 数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	毎日	割合	4.2	15.5	19.5	18.9	19.1	15.5	10.7	18.5	17.0	16.5	16.7
		標準誤差	2.5	8.4	3.1	4.6	3.2	2.6	5.1	3.0	2.1	2.0	2.0
	週5～6日	割合	0.5	5.8	5.2	8.1	6.0	8.3	3.5	5.7	8.4	6.0	6.2
		標準誤差	0.5	3.2	2.6	2.7	2.4	2.3	1.8	1.2	1.7	0.8	0.8
	週3～4日	割合	6.3	9.5	18.9	9.8	3.3	4.7	8.1	12.1	4.6	6.8	6.5
		標準誤差	4.7	4.9	5.5	5.2	1.6	1.8	3.7	3.3	1.5	1.0	1.0
	週1～2日	割合	12.5	8.3	13.9	12.5	3.9	4.7	10.1	11.3	4.7	9.0	8.9
		標準誤差	3.8	2.7	3.9	2.5	1.4	1.5	2.7	1.6	1.2	1.1	1.0
	月に1～3日	割合	25.0	7.7	7.4	11.8	9.3	6.2	15.1	9.5	7.0	10.2	10.4
		標準誤差	6.1	3.2	2.1	3.4	2.2	2.2	4.7	1.9	2.1	1.8	1.9
	ほとんど飲まない	割合	20.0	16.9	14.0	19.0	20.1	13.4	18.2	16.4	15.8	16.6	16.8
		標準誤差	5.2	5.1	3.0	3.1	3.1	2.4	4.6	2.2	2.2	1.7	1.8
男 性	やめた	割合	0.0	0.9	1.0	0.5	2.1	2.7	0.5	1.5	2.1	1.3	1.4
		標準誤差	0.0	0.9	0.8	0.4	1.2	1.0	0.5	0.7	0.8	0.4	0.4
	飲まない(飲めない)	割合	33.4	37.2	24.8	22.1	35.1	46.4	35.6	26.7	42.4	33.3	32.9
		標準誤差	9.5	5.0	4.9	5.4	5.0	3.4	6.0	4.2	3.4	3.5	3.6
	無回答	割合	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2
	人 数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
	毎日	割合	5.5	23.7	29.4	28.8	32.7	30.8	15.9	28.6	32.5	26.1	26.1
		標準誤差	4.9	12.7	5.7	6.3	5.4	4.6	7.7	4.0	3.9	2.9	2.9
	週5～6日	割合	0.8	4.7	7.4	1.6	1.3	5.2	3.1	3.8	4.3	8.3	8.6
		標準誤差	0.9	3.9	5.4	1.2	1.0	2.5	2.2	2.2	1.8	1.7	1.8
	週3～4日	割合	2.9	3.6	9.5	4.3	5.4	1.3	3.4	8.4	1.0	9.0	8.6
		標準誤差	2.2	2.6	2.8	2.2	2.7	0.8	2.1	2.1	0.6	1.7	1.7
	週1～2日	割合	8.8	10.2	11.9	20.2	2.8	5.6	9.6	13.5	5.0	9.7	9.6
		標準誤差	4.7	5.9	5.5	6.2	1.4	2.6	3.9	2.8	1.9	1.7	1.6
	月に1～3日	割合	20.3	6.0	5.5	7.4	7.6	7.0	12.1	7.0	6.8	8.4	8.5
		標準誤差	8.6	3.8	3.7	3.2	3.0	2.7	4.6	2.0	2.2	1.8	1.8
	ほとんど飲まない	割合	28.1	9.8	7.3	9.6	13.5	12.6	17.6	9.6	12.6	12.8	12.9
		標準誤差	8.5	4.1	3.0	3.4	4.4	3.0	5.4	2.6	2.6	1.9	1.9
女 性	やめた	割合	0.0	0.0	1.7	1.1	3.3	5.1	0.0	2.5	3.9	2.0	2.1
		標準誤差	0.0	0.0	1.7	0.8	2.1	2.2	0.0	1.2	1.7	0.6	0.6
	飲まない(飲めない)	割合	31.0	32.5	22.3	8.3	25.1	21.8	31.9	19.0	20.8	23.5	23.4
		標準誤差	10.3	7.1	6.6	4.0	6.2	3.7	6.4	4.3	3.3	3.6	3.5
	無回答	割合	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2
	人 数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
	毎日	割合	3.3	9.4	9.7	9.3	8.0	3.3	6.8	8.4	5.3	7.1	7.2
		標準誤差	2.3	5.3	3.1	5.0	3.2	1.8	3.3	3.0	1.6	1.4	1.5
	週5～6日	割合	0.8	4.7	7.4	1.6	1.3	5.2	3.1	3.8	4.3	3.8	3.7
		標準誤差	0.9	3.9	5.4	1.2	1.0	2.5	2.2	2.2	1.8	1.2	1.1
	週3～4日	割合	2.9	3.6	9.5	4.3	5.4	1.3	3.4	8.4	1.0	4.5	4.4
		標準誤差	2.2	2.6	2.8	2.2	2.7	0.8	2.1	2.1	0.6	1.1	1.1
	週1～2日	割合	15.4	7.0	15.8	4.9	4.8	4.0	10.5	9.1	4.5	8.2	8.2
		標準誤差	5.6	3.0	4.1	2.6	1.9	1.5	3.3	2.4	1.3	1.6	1.6
	月に1～3日	割合	28.6	9.0	9.4	16.1	10.7	5.5	17.3	12.1	7.2	11.9	12.3
		標準誤差	7.6	5.2	2.6	5.5	3.6	2.6	5.8	2.6	2.6	2.2	2.3
	ほとんど飲まない	割合	13.8	22.3	20.7	28.2	25.4	14.1	18.7	23.3	18.3	20.5	20.8
		標準誤差	6.0	7.5	5.5	5.6	5.3	2.8	5.5	3.7	2.7	2.8	2.9
	やめた	割合	0.0	1.5	0.3	0.0	1.1	0.7	0.9	0.5	0.7	0.7	0.7
		標準誤差	0.0	1.5	0.3	0.0	0.8	0.8	0.9	0.4	0.6	0.3	0.3
	飲まない(飲めない)	割合	35.2	40.7	27.3	35.5	43.3	65.8	38.4	34.4	58.8	43.1	42.5
		標準誤差	11.8	7.4	5.5	8.6	6.4	3.9	7.3	5.1	4.2	4.6	4.7
	無回答	割合	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.3
		標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.3

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日あたりの飲酒量(%)

問15-1 お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。(問15で「1～5」を選択した者)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	1合(180ml)未満	人数	38	46	87	91	88	107	84	209	164	457	457
		割合	36.5	45.2	26.1	26.1	49.3	58.6	41.4	30.8	53.5	38.2	38.9
	1合以上2合(360ml)未満	割合	9.0	8.9	6.0	5.1	7.8	5.2	7.0	4.2	5.7	2.6	2.6
		標準誤差	25.2	28.5	49.2	35.7	33.3	32.9	27.1	41.2	33.5	36.1	35.5
	2合以上3合(540ml)未満	割合	5.6	10.3	6.4	7.5	7.6	4.1	6.1	4.7	4.8	2.7	2.5
		標準誤差	23.7	12.3	10.8	26.9	10.2	7.0	17.3	16.6	9.2	14.9	15.1
	3合以上4合(720ml)未満	割合	9.7	6.2	3.6	3.9	3.2	2.4	5.4	2.3	2.4	1.8	1.8
		標準誤差	4.4	7.1	10.4	10.3	7.2	1.5	5.9	9.6	3.8	7.6	7.4
	4合以上5合(900ml)未満	割合	2.9	4.1	4.1	3.7	3.4	1.1	2.6	2.8	1.5	1.3	1.5
		標準誤差	9.6	4.8	2.2	0.6	0.0	0.0	6.9	1.2	0.0	2.5	2.4
男性	1合(180ml)未満	割合	4.7	4.9	2.1	0.6	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	1.0	1.0
		標準誤差	0.6	2.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	0.0	0.8	0.7
	1合以上2合(360ml)未満	割合	0.6	2.1	1.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	0.0	0.6	0.6
		標準誤差	15	29	47	63	58	77	44	129	116	289	289
	2合以上3合(540ml)未満	割合	22.7	38.6	10.0	13.1	40.2	50.5	33.0	15.7	46.8	28.3	29.5
		標準誤差	13.7	8.9	4.9	4.9	8.9	6.6	9.4	4.0	6.0	2.7	2.7
	3合以上4合(720ml)未満	割合	48.8	16.9	61.5	40.7	38.4	40.3	28.0	49.8	38.9	41.9	40.9
		標準誤差	15.2	8.1	8.6	7.5	8.2	6.1	9.1	5.3	5.6	3.0	2.9
	4合以上5合(900ml)未満	割合	17.6	22.1	8.4	33.0	9.6	7.1	20.5	19.3	8.7	16.1	16.4
		標準誤差	14.4	10.0	4.2	5.9	5.2	2.6	8.6	3.5	2.3	2.1	2.1
女性	1合(180ml)未満	割合	9.5	10.2	13.8	12.3	11.8	2.1	9.9	12.2	5.6	10.2	9.9
		標準誤差	6.2	6.6	6.4	4.3	5.6	1.5	4.8	3.1	2.3	1.9	1.9
	2合以上3合(540ml)未満	割合	0.0	8.6	3.8	0.8	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.3	2.2
		標準誤差	0.0	8.6	3.7	0.8	0.0	0.0	5.6	1.5	0.0	1.3	1.5
	3合以上4合(720ml)未満	割合	1.5	3.6	2.4	0.0	0.0	0.0	2.9	1.0	0.0	1.2	1.1
		標準誤差	1.6	3.8	2.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.8	0.0	1.0	0.9
	4合以上5合(900ml)未満	割合	23	17	40	28	30	30	40	80	48	168	168
		標準誤差	45.0	53.5	47.4	55.6	63.6	78.7	49.1	55.9	67.9	55.4	55.2
	5合(900ml)以上	割合	11.3	16.1	9.5	11.3	10.0	5.9	10.4	6.8	6.9	4.2	4.2
		標準誤差	10.7	43.2	32.8	24.8	25.3	14.7	26.2	26.9	21.8	26.1	26.2

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎25度(110ml)、焼酎35度(80ml)、チェウハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

飲酒習慣の状況(%)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	総数	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	あり	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	4.0	18.6	35.0	29.1	15.7	12.0	9.9	28.5	13.7	19.6	19.3
男性	総数	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	あり	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	7.0	23.2	49.0	49.1	30.7	24.8	16.3	43.8	28.2	31.6	31.0
女性	総数	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	あり	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	1.7	7.4	21.2	9.8	3.5	1.9	5.0	13.2	2.6	7.6	7.5
なし	総数	人数	98.3	92.6	78.8	90.2	96.5	98.1	95.0	86.8	97.4	92.4	92.5
		割合	98.3	92.6	78.8	90.2	96.5	98.1	95.0	86.8	97.4	92.4	92.5
	あり	標準誤差	1.2	4.3	6.0	3.9	1.9	1.3	2.5	3.1	1.2	1.4	1.4
		割合	1.2	4.3	6.0	3.9	1.9	1.3	2.5	3.1	1.2	1.4	1.4

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

○飲酒習慣のある者：週3日以上、飲酒日1日あたり1合以上飲酒すると回答した者

○清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎25度(110ml)、焼酎35度(80ml)、チューハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

生活習慣調査①(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者の状況(%)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	総数	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	あり	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	2.7	9.8	18.1	15.6	7.5	2.8	6.8	14.4	4.8	9.6	9.5
男性	総数	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	あり	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	1.3	12.9	15.0	21.5	12.4	3.9	8.0	15.5	7.7	11.4	11.2
女性	総数	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	あり	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	3.8	7.4	21.2	9.8	3.5	1.9	5.9	13.2	2.6	7.9	7.8
なし	総数	人数	96.2	92.6	78.8	90.2	96.5	98.1	94.1	86.8	97.4	92.1	92.2
		割合	96.2	92.6	78.8	90.2	96.5	98.1	94.1	86.8	97.4	92.1	92.2
	あり	標準誤差	2.3	4.3	6.0	3.9	1.9	1.3	2.5	3.1	1.2	1.4	1.4
		割合	2.3	4.3	6.0	3.9	1.9	1.3	2.5	3.1	1.2	1.4	1.4

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」に関する知識(%)
問16 飲酒の知識についておたずねします。「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」とは、男女それぞれ1日平均でどのくらいだと思いますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男 性	1合(180ml)以上	人 数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合	16.5	9.1	18.9	7.9	22.5	11.7	12.3	13.9	15.7	14.6	14.3
		標準誤差	9.6	5.9	5.2	4.0	4.8	3.5	5.5	2.6	3.7	2.4	2.4
		2合(360ml)以上	20.8	25.7	25.6	25.5	28.6	38.0	23.6	26.0	35.8	27.7	28.0
		標準誤差	8.0	4.5	5.0	4.1	4.5	4.2	4.1	3.3	3.8	2.0	2.0
	3合(540ml)以上	割合	21.3	13.7	21.2	23.5	15.6	14.4	16.9	21.2	14.7	18.1	17.9
		標準誤差	8.7	6.2	6.7	5.7	4.2	4.0	5.3	3.7	3.1	3.3	3.3
		4合(720ml)以上	0.0	5.4	11.3	2.6	3.5	4.5	3.1	6.8	3.8	5.0	4.7
		標準誤差	0.0	2.9	4.8	1.8	2.2	2.0	1.6	2.4	1.5	1.3	1.2
		5合(900ml)以上	0.0	2.1	4.2	3.5	2.7	1.1	1.2	3.3	1.9	2.4	2.3
女 性	1合(180ml)以上	割合	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		標準誤差	9.1	21.4	22.4	26.0	32.5	35.9	16.2	25.9	34.7	26.0	25.6
		2合(360ml)以上	25.5	34.7	39.5	23.5	26.3	10.6	30.8	31.0	14.7	25.9	26.2
		標準誤差	9.6	7.9	5.9	5.2	3.4	2.8	6.4	3.1	2.4	2.5	2.6
		3合(540ml)以上	18.9	12.5	6.8	12.9	5.7	4.2	15.2	9.0	4.8	9.2	9.6
	4合(720ml)以上	割合	6.5	4.9	2.4	4.5	2.5	2.4	4.0	1.9	2.0	1.4	1.5
		標準誤差	0.5	3.5	1.9	1.5	0.0	1.0	2.2	1.4	0.7	1.4	1.4
		5合(900ml)以上	0.5	2.1	1.4	1.3	0.0	1.0	1.2	0.8	0.7	0.6	0.6
		標準誤差	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.5	0.4
		わからない	46.1	26.2	25.2	36.0	34.5	47.5	34.6	31.0	44.1	36.1	35.9
無回答	1合(180ml)以上	割合	8.4	6.5	6.3	5.6	4.8	5.9	4.1	3.9	5.3	3.0	2.9
		標準誤差	0.0	1.7	1.7	0.0	1.0	0.8	1.0	0.7	1.0	0.9	0.9
		2合(360ml)以上	0.0	1.7	1.4	0.0	1.0	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	0.6
		標準誤差	0.0	1.7	1.4	0.0	1.0	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	0.6
		3合(540ml)以上	0.0	1.7	1.4	0.0	1.0	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	0.6
	4合(720ml)以上	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5合(900ml)以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		わからない	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎25度(110ml)、焼酎35度(80ml)、チューハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(6)歯・歯下に関する状況

歯の本数(%)

問17 自分の歯は何本ありますか。(自分の歯には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。)

性別	回答	年齢区分				(再掲)				(再掲)		(再掲)	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1	20歳以上 ※2	
総数	0本	人数 81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	
		割合 0.0	0.0	0.0	1.8	3.5	11.3	0.0	1.5	9.1	3.2	3.2	
		標準誤差 0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	2.1	0.0	0.9	1.5	0.7	0.8	
	1～9本	割合 0.0	0.0	0.0	1.1	8.1	15.2	0.0	2.7	12.5	4.7	4.7	
		標準誤差 0.0	0.0	0.0	0.7	3.1	2.5	0.0	1.1	2.2	0.9	1.0	
	10～19本	割合 0.0	0.7	1.5	4.5	17.7	17.1	0.4	4.6	18.1	7.6	7.6	
		標準誤差 0.0	0.7	0.8	2.5	3.5	2.6	0.4	1.5	1.7	1.0	1.0	
	20～27本	割合 12.0	33.5	34.8	56.4	48.5	43.1	24.4	45.0	45.4	38.9	38.9	
		標準誤差 3.8	3.5	3.8	5.2	4.4	3.1	3.2	3.6	2.8	1.6	1.6	
	28本	割合 88.0	65.8	63.7	35.2	21.9	12.0	75.2	45.7	13.9	45.0	45.1	
男性		標準誤差 3.8	3.6	3.6	5.3	3.2	2.4	3.3	3.4	2.4	2.2	2.2	
	無回答	割合 0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	1.3	0.0	0.4	1.0	0.5	0.5	
		標準誤差 0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.9	0.0	0.4	0.6	0.2	0.2	
	平均値(本)	割合 27.8	27.1	27.0	24.8	20.8	16.8	27.4	25.0	17.9	23.6	23.6	
		標準誤差 0.1	0.2	0.2	0.6	0.9	0.6	0.1	0.4	0.6	0.4	0.4	
	0本	人数 37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	
		割合 0.0	0.0	0.0	1.0	6.4	12.7	0.0	1.6	11.1	3.6	3.8	
		標準誤差 0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.6	0.0	1.3	2.8	1.2	1.2	
	1～9本	割合 0.0	0.0	0.0	0.6	11.8	15.4	0.0	3.1	13.8	4.9	5.3	
		標準誤差 0.0	0.0	0.0	0.6	6.0	5.5	0.0	2.0	4.5	1.7	1.8	
女性	10～19本	割合 0.0	0.0	2.1	7.4	17.2	17.1	0.0	5.8	18.3	7.6	7.9	
		標準誤差 0.0	0.0	1.5	3.8	3.7	3.5	0.0	2.0	2.7	1.1	1.1	
	20～27本	割合 13.3	35.7	35.8	54.4	40.1	39.1	26.2	43.2	40.1	36.9	37.2	
		標準誤差 5.8	6.5	4.8	6.0	5.8	4.6	5.6	4.0	3.3	2.3	2.3	
	28本	割合 86.7	64.3	62.2	34.5	24.1	14.3	73.8	45.3	15.4	46.4	45.0	
		標準誤差 5.8	6.5	4.6	6.2	5.0	4.8	5.6	4.6	3.7	2.6	2.6	
	無回答	割合 0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	1.4	0.0	0.9	1.2	0.7	0.7	
		標準誤差 0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	1.0	0.0	0.8	0.8	0.3	0.4	
	平均値(本)	割合 27.9	27.2	27.0	24.5	19.3	16.2	27.5	24.7	16.9	23.5	23.3	
		標準誤差 0.2	0.2	0.3	0.8	1.6	1.2	0.1	0.6	1.1	0.5	0.5	
女性	0本	人数 44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	
		割合 0.0	0.0	0.0	2.6	1.2	10.1	0.0	1.5	7.5	2.9	2.6	
		標準誤差 0.0	0.0	0.0	2.6	0.9	2.8	0.0	1.1	2.0	0.7	0.7	
	1～9本	割合 0.0	0.0	0.0	1.5	5.1	15.0	0.0	2.4	11.5	4.6	4.1	
		標準誤差 0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	3.4	0.0	1.2	2.6	1.2	1.1	
	10～19本	割合 0.0	1.2	0.9	1.7	18.2	17.1	0.7	3.4	18.0	7.7	7.3	
		標準誤差 0.0	1.2	0.8	1.4	5.2	3.8	0.7	1.6	2.5	1.4	1.4	
	20～27本	割合 11.0	31.8	33.8	58.3	55.4	46.4	23.1	46.7	49.5	40.9	40.6	
		標準誤差 4.1	5.4	5.9	7.6	5.5	6.2	3.7	4.7	5.0	1.8	1.8	
	28本	割合 89.0	67.0	65.2	35.9	20.2	10.2	76.2	46.0	12.7	43.7	45.1	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

歯の本数が24本以上、20本以上の者の状況(%)

問17 自分の歯は何本ありますか。(自分の歯には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	(再掲) 60歳 (55-64歳) ※2	(再掲) 80歳 (75-84歳) ※2
総数	24本以上	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	170	133
		割合	100.0	94.9	95.3	78.4	51.1	33.1	97.1	81.5	37.2	72.8	72.9	67.5	-
		標準誤差	0.0	2.3	1.5	5.0	5.4	4.0	1.2	3.0	3.7	2.7	2.7	5.3	-
		割合	100.0	99.3	98.5	91.5	70.5	55.2	99.6	90.7	59.3	83.9	84.0	-	52.4
男性	20本以上	標準誤差	0.0	0.7	0.8	2.9	5.4	2.9	0.4	2.0	2.8	1.9	1.9	-	4.1
		人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	88	66
		割合	100.0	95.2	92.3	75.0	48.9	35.4	97.3	78.9	37.2	73.4	72.0	64.2	-
		標準誤差	0.0	3.1	3.1	5.8	6.6	6.8	1.7	3.1	6.1	2.2	2.3	5.5	-
女性	24本以上	割合	100.0	100.0	97.9	88.8	64.2	53.4	100.0	88.6	55.5	83.3	82.2	-	52.0
		標準誤差	0.0	0.0	1.5	4.1	7.1	5.6	0.0	2.6	4.6	1.8	1.9	-	7.7
		人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	82	67
		割合	100.0	94.7	98.3	81.7	52.9	31.3	96.9	84.1	37.2	72.3	73.9	71.9	-
女性	20本以上	標準誤差	0.0	3.0	1.0	6.4	7.1	4.2	1.7	4.1	4.4	3.8	3.7	7.0	-
		割合	100.0	98.8	99.1	94.2	75.6	56.6	99.3	92.7	62.2	84.5	85.7	-	53.0
		標準誤差	0.0	1.2	0.8	3.1	5.5	5.7	0.7	2.8	4.5	2.8	2.7	-	5.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

咀嚼の状況(%)

問18 かねで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

総数	20-29歳		30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
	人 数		107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	なんでも噛んで食べる ことができる	割合	95.7	93.7	92.5	83.8	73.6	62.4	94.5	85.9	65.1	82.4
		標準誤差	2.9	2.9	1.9	3.3	4.2	2.4	2.0	2.0	2.3	2.0
		割合	3.9	5.4	7.5	16.1	21.8	34.1	4.7	12.6	31.6	15.9
		標準誤差	2.9	2.6	1.9	3.3	3.5	2.1	1.9	1.9	2.0	1.7
	かめない食べ物が多い	割合	0.4	0.0	0.0	0.1	0.4	2.4	0.2	1.5	2.3	1.3
		標準誤差	0.4	0.0	0.0	0.1	1.8	0.8	0.2	0.8	0.7	0.4
	かんで食べることはで きない	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.5	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1
	無回答	割合	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.3
男 性	なんでも噛んで食べる ことができる	割合	92.6	97.2	91.4	83.8	71.9	58.6	95.3	85.4	61.3	82.1
		標準誤差	6.5	2.0	3.8	4.8	5.6	3.5	3.1	3.4	3.3	2.4
		割合	6.5	2.8	8.6	16.2	21.5	37.1	4.4	13.0	34.2	15.9
		標準誤差	6.4	2.0	3.8	4.8	4.5	3.3	3.1	3.2	2.9	2.1
	かめない食べ物が多い	割合	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	0.4	1.6	3.2	1.7
		標準誤差	0.9	0.0	0.0	0.0	3.3	1.2	0.4	1.3	1.2	0.7
	かんで食べることはで きない	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.8	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.6	0.2
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1
女 性	なんでも噛んで食べる ことができる	割合	98.1	91.0	93.6	83.8	75.0	65.4	94.0	86.4	68.1	82.6
		標準誤差	1.9	4.4	2.3	4.8	4.9	4.8	2.9	2.4	4.1	2.3
		割合	1.9	7.3	6.4	16.0	21.9	31.8	5.0	12.3	29.6	15.9
		標準誤差	1.9	4.1	2.3	4.8	4.6	4.9	2.7	2.5	4.0	2.2
	かめない食べ物が多い	割合	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	1.9	0.0	1.3	1.7	1.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	0.9	0.0	1.1	0.7	0.4
	かんで食べることはで きない	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1
	無回答	割合	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.4	0.4
標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.4	0.4	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

食べ方や食事の様子(%)

問19 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	ゆつくりよくかんで食事を する	人 数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		はい	割合 -----53.5 標準誤差 8.7	割合 -----46.6 標準誤差 5.2	割合 -----41.2 標準誤差 5.0	割合 -----45.8 標準誤差 5.0	割合 -----46.8 標準誤差 4.9	割合 -----65.5 標準誤差 3.2	割合 -----49.5 標準誤差 5.3	割合 -----44.6 標準誤差 3.0	割合 -----60.0 標準誤差 2.5	割合 -----50.0 標準誤差 2.1	割合 -----50.0 標準誤差 2.2
		いいえ	割合 -----46.5 標準誤差 8.7	割合 -----53.4 標準誤差 5.2	割合 -----58.8 標準誤差 5.0	割合 -----54.1 標準誤差 5.0	割合 -----53.1 標準誤差 4.9	割合 -----33.5 標準誤差 3.2	割合 -----50.5 標準誤差 5.3	割合 -----55.3 標準誤差 3.0	割合 -----39.2 標準誤差 2.7	割合 -----49.8 標準誤差 2.2	割合 -----49.7 標準誤差 2.3
	半年前に比べて固いも のが食べにくくなった	はい	割合 -----2.4 標準誤差 2.0	割合 -----5.5 標準誤差 2.5	割合 -----9.0 標準誤差 2.7	割合 -----17.5 標準誤差 4.1	割合 -----25.8 標準誤差 3.5	割合 -----29.8 標準誤差 2.4	割合 -----4.2 標準誤差 1.7	割合 -----15.1 標準誤差 2.2	割合 -----29.0 標準誤差 2.2	割合 -----15.9 標準誤差 1.7	割合 -----16.1 標準誤差 1.7
		いいえ	割合 -----97.6 標準誤差 2.0	割合 -----94.5 標準誤差 2.5	割合 -----91.0 標準誤差 2.7	割合 -----81.7 標準誤差 4.0	割合 -----74.2 標準誤差 3.5	割合 -----69.3 標準誤差 2.8	割合 -----95.8 標準誤差 1.7	割合 -----84.6 標準誤差 2.1	割合 -----70.3 標準誤差 2.4	割合 -----83.7 標準誤差 1.7	割合 -----83.6 標準誤差 1.7
		無回答	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.8 標準誤差 0.6	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----1.0 標準誤差 0.9	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----0.7 標準誤差 0.7	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----0.3 標準誤差 0.3
	お茶や汁物等でむせる ことがある	はい	割合 -----13.6 標準誤差 6.4	割合 -----7.4 標準誤差 3.1	割合 -----11.2 標準誤差 3.5	割合 -----15.3 標準誤差 4.3	割合 -----14.9 標準誤差 2.5	割合 -----20.6 標準誤差 3.3	割合 -----10.1 標準誤差 3.5	割合 -----13.7 標準誤差 2.7	割合 -----18.9 標準誤差 2.8	割合 -----14.1 標準誤差 2.3	割合 -----14.0 標準誤差 2.3
		いいえ	割合 -----86.4 標準誤差 6.4	割合 -----92.6 標準誤差 3.1	割合 -----88.8 標準誤差 3.5	割合 -----84.0 標準誤差 4.4	割合 -----84.9 標準誤差 2.5	割合 -----78.7 標準誤差 3.5	割合 -----89.9 標準誤差 3.5	割合 -----86.0 標準誤差 2.7	割合 -----80.5 標準誤差 3.0	割合 -----85.6 標準誤差 2.3	割合 -----85.7 標準誤差 2.3
		無回答	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.8 標準誤差 0.6	割合 -----0.2 標準誤差 0.2	割合 -----0.7 標準誤差 0.6	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----0.6 標準誤差 0.4	割合 -----0.3 標準誤差 0.2	割合 -----0.3 標準誤差 0.2
	口の渇きが気になる	はい	割合 -----13.6 標準誤差 5.3	割合 -----13.4 標準誤差 3.9	割合 -----13.3 標準誤差 3.0	割合 -----17.7 標準誤差 4.6	割合 -----13.0 標準誤差 3.9	割合 -----23.5 標準誤差 3.6	割合 -----13.5 標準誤差 1.8	割合 -----15.7 標準誤差 2.3	割合 -----20.2 標準誤差 2.5	割合 -----16.1 標準誤差 1.2	割合 -----16.1 標準誤差 1.2
		いいえ	割合 -----86.1 標準誤差 5.4	割合 -----86.6 標準誤差 3.9	割合 -----86.7 標準誤差 3.0	割合 -----81.5 標準誤差 4.7	割合 -----86.9 標準誤差 3.9	割合 -----75.2 標準誤差 3.9	割合 -----86.4 標準誤差 1.8	割合 -----84.0 標準誤差 2.3	割合 -----78.8 標準誤差 2.7	割合 -----83.5 標準誤差 1.3	割合 -----83.5 標準誤差 1.4
		無回答	割合 -----0.4 標準誤差 0.4	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.8 標準誤差 0.6	割合 -----0.2 標準誤差 0.2	割合 -----1.3 標準誤差 1.2	割合 -----0.2 標準誤差 0.2	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----1.0 標準誤差 0.9	割合 -----0.5 標準誤差 0.3	割合 -----0.5 標準誤差 0.4
	左右両方の奥歯でしっ かりかみしめられる	はい	割合 -----73.0 標準誤差 6.5	割合 -----84.4 標準誤差 3.7	割合 -----74.3 標準誤差 4.0	割合 -----59.1 標準誤差 6.6	割合 -----62.6 標準誤差 5.4	割合 -----49.3 標準誤差 3.7	割合 -----79.6 標準誤差 3.9	割合 -----66.8 標準誤差 3.1	割合 -----52.1 標準誤差 3.2	割合 -----66.4 標準誤差 2.3	割合 -----66.3 標準誤差 2.3
		いいえ	割合 -----27.0 標準誤差 6.5	割合 -----15.6 標準誤差 3.7	割合 -----25.7 標準誤差 4.0	割合 -----40.1 標準誤差 6.6	割合 -----37.1 標準誤差 5.3	割合 -----49.7 標準誤差 3.7	割合 -----20.4 標準誤差 3.9	割合 -----32.9 標準誤差 3.1	割合 -----47.9 標準誤差 3.3	割合 -----33.2 標準誤差 2.3	割合 -----33.3 標準誤差 2.3
		無回答	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.8 標準誤差 0.6	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----1.0 標準誤差 0.9	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----0.9 標準誤差 0.7	割合 -----0.4 標準誤差 0.3	割合 -----0.4 標準誤差 0.3
男 性	ゆつくりよくかんで食事を する	人 数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		はい	割合 -----41.3 標準誤差 11.2	割合 -----47.9 標準誤差 10.2	割合 -----38.3 標準誤差 5.3	割合 -----43.0 標準誤差 5.6	割合 -----44.8 標準誤差 7.2	割合 -----60.1 標準誤差 5.0	割合 -----45.1 標準誤差 9.1	割合 -----43.2 標準誤差 3.4	割合 -----54.4 標準誤差 4.2	割合 -----46.1 標準誤差 3.9	割合 -----46.7 標準誤差 4.0
		いいえ	割合 -----58.7 標準誤差 11.2	割合 -----52.1 標準誤差 10.2	割合 -----61.7 標準誤差 5.3	割合 -----56.7 標準誤差 5.6	割合 -----55.2 標準誤差 7.2	割合 -----38.6 標準誤差 5.0	割合 -----54.9 標準誤差 9.1	割合 -----56.7 標準誤差 3.4	割合 -----44.5 標準誤差 4.2	割合 -----53.6 標準誤差 4.0	割合 -----53.0 標準誤差 4.0
	半年前に比べて固いも のが食べにくくなった	はい	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 1.4	割合 -----0.0 標準誤差 0.1	割合 -----0.1 標準誤差 0.1	割合 -----1.0 標準誤差 1.0	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----0.3 標準誤差 0.3
		いいえ	割合 -----0.7 標準誤差 0.7	割合 -----4.4 標準誤差 3.1	割合 -----7.2 標準誤差 3.6	割合 -----18.9 標準誤差 5.5	割合 -----25.0 標準誤差 4.5	割合 -----32.3 標準誤差 4.5	割合 -----2.8 標準誤差 1.7	割合 -----14.6 標準誤差 3.1	割合 -----31.0 標準誤差 3.9	割合 -----15.2 標準誤差 2.0	割合 -----16.0 標準誤差 2.1
		無回答	割合 -----99.3 標準誤差 0.7	割合 -----95.6 標準誤差 3.1	割合 -----92.8 標準誤差 3.6	割合 -----79.6 標準誤差 5.4	割合 -----75.0 標準誤差 4.5	割合 -----66.4 標準誤差 4.7	割合 -----97.2 標準誤差 1.7	割合 -----84.8 標準誤差 3.2	割合 -----68.0 標準誤差 4.0	割合 -----84.3 標準誤差 2.1	割合 -----83.5 標準誤差 2.2
	お茶や汁物等でむせる ことがある	はい	割合 -----12.8 標準誤差 8.0	割合 -----8.3 標準誤差 4.7	割合 -----10.6 標準誤差 5.2	割合 -----18.8 標準誤差 4.5	割合 -----15.7 標準誤差 4.0	割合 -----17.3 標準誤差 4.9	割合 -----10.3 標準誤差 5.2	割合 -----14.7 標準誤差 3.1	割合 -----16.9 標準誤差 4.0	割合 -----13.8 標準誤差 2.9	割合 -----14.0 標準誤差 2.9
		いいえ	割合 -----87.2 標準誤差 8.0	割合 -----91.7 標準誤差 4.7	割合 -----89.4 標準誤差 5.2	割合 -----79.7 標準誤差 5.0	割合 -----84.3 標準誤差 4.0	割合 -----81.4 標準誤差 5.4	割合 -----89.7 標準誤差 5.2	割合 -----84.7 標準誤差 3.2	割合 -----82.1 標準誤差 4.3	割合 -----85.7 標準誤差 3.0	割合 -----85.5 標準誤差 3.0
		無回答	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----1.5 標準誤差 1.3	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----1.4 標準誤差 1.4	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.6 標準誤差 0.5	割合 -----1.0 標準誤差 1.0	割合 -----0.5 標準誤差 0.4	割合 -----0.5 標準誤差 0.5
	口の渇きが気になる	はい	割合 -----21.7 標準誤差 11.7	割合 -----13.0 標準誤差 5.8	割合 -----9.7 標準誤差 3.6	割合 -----9.1 標準誤差 3.4	割合 -----12.5 標準誤差 3.9	割合 -----21.0 標準誤差 4.5	割合 -----16.7 標準誤差 4.6	割合 -----10.0 標準誤差 2.2	割合 -----18.9 標準誤差 3.5	割合 -----14.3 標準誤差 1.8	割合 -----14.5 標準誤差 1.8
		いいえ	割合 -----77.5 標準誤差 11.7	割合 -----87.0 標準誤差 5.8	割合 -----90.3 標準誤差 3.6	割合 -----89.4 標準誤差 4.2	割合 -----87.5 標準誤差 3.9	割合 -----77.6 標準誤差 4.8	割合 -----83.0 標準誤差 4.6	割合 -----89.4 標準誤差 2.4	割合 -----80.1 標準誤差 3.6	割合 -----85.1 標準誤差 1.9	割合 -----84.9 標準誤差 2.0
		無回答	割合 -----0.8 標準誤差 0.9	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----1.5 標準誤差 1.3	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----1.4 標準誤差 1.4	割合 -----0.4 標準誤差 0.4	割合 -----0.6 標準誤差 0.5	割合 -----1.0 標準誤差 1.0	割合 -----0.6 標準誤差 0.4	割合 -----0.6 標準誤差 0.5
	左右両方の奥歯でしっ かりかみしめられる	はい	割合 -----66.2 標準誤差 11.2	割合 -----90.5 標準誤差 4.6	割合 -----70.0 標準誤差 5.0	割合 -----62.8 標準誤差 6.6	割合 -----63.5 標準誤差 6.8	割合 -----44.4 標準誤差 6.3	割合 -----80.1 標準誤差 7.3	割合 -----66.9 標準誤差 3.4	割合 -----48.1 標準誤差 5.4	割合 -----66.1 標準誤差 2.5	割合 -----65.6 標準誤差 2.4
		いいえ	割合 -----33.8 標準誤差 11.2	割合 -----9.5 標準誤差 4.6	割合 -----30.0 標準誤差 5.0	割合 -----35.7 標準誤差 6.5	割合 -----36.2 標準誤差 6.6	割合 -----54.2 標準誤差 6.6	割合 -----19.9 標準誤差 7.3	割合 -----32.5 標準誤差 3.5	割合 -----50.7 標準誤差 5.7	割合 -----33.4 標準誤差 2.6	割合 -----33.8 標準誤差 2.6
		無回答	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----1.5 標準誤差 1.3	割合 -----0.4 標準誤差 0.4	割合 -----1.4 標準誤差 1.4	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.6 標準誤差 0.5	割合 -----1.2 標準誤差 1.0	割合 -----0.5 標準誤差 0.4	割合 -----0.6 標準誤差 0.5
女 性	ゆつくりよくかんで食事を する	人 数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		はい	割合 -----62.8 標準誤差 10.6	割合 -----45.6 標準誤差 7.5	割合 -----44.1 標準誤差 7.5	割合 -----48.4 標準誤差 8.6	割合 -----48.4 標準誤差 4.5	割合 -----69.8 標準誤差 4.0	割合 -----52.9 標準誤差 6.0	割合 -----46.1 標準誤差 5.7	割合 -----64.3 標準誤差 2.9	割合 -----53.8 標準誤差 2.7	割合 -----53.4 標準誤差 2.8
		いいえ	割合 -----37.2 標準誤差 10.6	割合 -----54.4 標準誤差 7.5	割合 -----55.9 標準誤差 7.5	割合 -----51.6 標準誤差 8.6	割合 -----51.3 標準誤差 4.5	割合 -----29.6 標準誤差 4.0	割合 -----47.1 標準誤差 6.0	割合 -----53.9 標準誤差 5.7	割合 -----35.1 標準誤差 2.9	割合 -----46.0 標準誤差 2.8	割合 -----46.4 標準誤差 2.9
	半年前に比べて固いも のが食べにくくなった	はい	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----0.7 標準誤差 0.6	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.6 標準誤差 0.4	割合 -----0.2 標準誤差 0.1	割合 -----0.2 標準誤差 0.1
		いいえ	割合 -----3.7 標準誤差 3.6	割合 -----6.3 標準誤差 3.8	割合 -----10.7 標準誤差 3.6	割合 -----16.3 標準誤差 6.3	割合 -----26.4 標準誤差 5.2	割合 -----27.8 標準誤差 3.5	割合 -----5.2 標準誤差 2.8	割合 -----15.6 標準誤差 3.3	割合 -----27.4 標準誤差 2.9	割合 -----16.7 標準誤差 2.0	割合 -----16.2 標準誤差 2.0
		無回答	割合 -----96.3 標準誤差 3.6	割合 -----93.7 標準誤差 3.8	割合 -----89.3 標準誤差 3.6	割合 -----83.7 標準誤差 6.3	割合 -----73.6 標準誤差 5.2	割合 -----71.6 標準誤差 3.7	割合 -----94.8 標準誤差 2.8	割合 -----84.4 標準誤差 3.3	割合 -----72.1 標準誤差 3.0	割合 -----83.2 標準誤差 2.0	割合 -----83.7 標準誤差 2.0
	お茶や汁物等でむせる ことがある	はい	割合 -----14.3 標準誤差 9.8	割合 -----6.7 標準誤差 4.0	割合 -----11.9 標準誤差 2.8	割合 -----11.9 標準誤差 5.6	割合 -----14.3 標準誤差 3.4	割合 -----23.2 標準誤差 4.6	割合 -----9.9 標準誤差 5.0	割合 -----12.6 標準誤差 3.1	割合 -----20.5 標準誤差 3.7	割合 -----14.4 標準誤差 2.2	割合 -----14.0 標準誤差 2.2
		いいえ	割合 -----85.7 標準誤差 9.8	割合 -----93.3 標準誤差 4.0	割合 -----88.1 標準誤差 2.8	割合 -----88.1 標準誤差 5.6	割合 -----85.4 標準誤差 3.4	割合 -----76.7 標準誤差 4.6	割合 -----90.1 標準誤差 5.0	割合 -----87.4 標準誤差 3.1	割合 -----79.3 標準誤差 3.7	割合 -----85.5 標準誤差 2.2	割合 -----85.9 標準誤差 2.2
		無回答	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----0.1 標準誤差 0.1	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.2 標準誤差 0.2	割合 -----0.1 標準誤差 0.1	割合 -----0.1 標準誤差 0.1
	口の渇きが気になる	はい	割合 -----7.3 標準誤差 4.4	割合 -----13.8 標準誤差 5.5	割合 -----16.9 標準誤差 4.7	割合 -----26.1 標準誤差 7.9	割合 -----13.3 標準誤差 4.7	割合 -----25.4 標準誤差 4.0	割合 -----11.1 標準誤差 3.7	割合 -----21.3 標準誤差 4.2	割合 -----21.1 標準誤差 3.1	割合 -----17.9 標準誤差 2.2	割合 -----17.7 標準誤差 2.2
		いいえ	割合 -----92.7 標準誤差 4.4	割合 -----86.2 標準誤差 5.5	割合 -----83.1 標準誤差 4.7	割合 -----73.9 標準誤差 7.9	割合 -----86.4 標準誤差 4.7	割合 -----73.4 標準誤差 4.3	割合 -----88.9 標準誤差 3.7	割合 -----78.7 標準誤差 4.2	割合 -----77.9 標準誤差 3.3	割合 -----81.8 標準誤差 2.2	割合 -----82.0 標準誤差 2.2
		無回答	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----1.2 標準誤差 1.1	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----0.0 標準誤差 0.0	割合 -----1.0 標準誤差 0.8	割合 -----0.3 標準誤差 0.3	割合 -----0.3 標準誤差 0.2
	左右両方の奥歯でしっ かりかみしめられる	はい	割合 -----78.2 標準誤差 10.4	割合 -----79.9 標準誤差 5.5	割合 -----78.7 標準誤差 4.0	割合 -----55.6 標準誤差 8.8	割合 -----61.9 標準誤差 6.3	割合 -----53.1 標準誤差 3.8	割合 -----79.2 標準誤差 6.3	割合 -----66.8 標準誤差 4.7	割合 -----55.2 標準誤差 3.7	割合 -----66.8 標準誤差 3.6	割合 -----67.1 標準誤差 3.7
		いいえ	割合 -----21.8 標準誤差 10.4	割合 -----20.1 標準誤差 5.5	割合 -----21.3 標準誤差 4.0	割合 -----44.4 標準誤差 8.8	割合 -----37.8 標準誤差 6.2	割合 -----46.2 標準誤差 3.6	割合 -----20.8 標準誤差 6.3	割合 -----33.2 標準誤差 4.7	割合 -----44.2 標準誤差 3.6	割合 -----33.0 標準誤差 3.6	割合 -----32.7 標準誤

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(7)居住する地域に関する状況

お互いに助け合っていると感じる者の状況(%)

問20-ア あなたのお住まいの地域の人々はお互いに助け合っていますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	強くそう思う	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合 標準誤差	4.6 2.5	9.0 6.0	6.2 2.9	5.2 2.4	2.9 1.3	13.5 5.6	7.1 3.4	4.9 1.3	10.9 4.4	7.3 2.1	7.2 2.2
	どちらかといえばそう 思う	人数	60.1	53.7	48.8	49.4	54.3	47.9	56.4	50.9	48.8	51.7	51.8
		割合 標準誤差	7.5 6.7	6.0 4.5	4.0 1.5	5.6 2.1	7.0 2.4	2.9 1.3	5.3 2.1	3.4 1.3	3.0 1.3	2.6 1.3	2.6
	どちらともいえない	人数	29.3	28.0	38.5	37.0	31.4	27.3	28.6	36.7	28.3	32.3	32.0
		割合 標準誤差	6.1 3.1	7.7 4.3	5.2 2.3	7.4 2.6	8.4 3.0	6.3 1.6	7.0 2.8	6.1 1.8	7.3 1.8	6.6 1.3	6.7 1.3
	どちらかといえばそう 思わない 全くそう思わない	人数	0.0	1.5	1.4	1.0	3.0	4.4	0.9	1.3	4.2	2.1	2.1
		割合 標準誤差	0.0 0.0	1.1 0.9	0.9 0.9	0.9 0.9	1.0 1.0	1.5 0.5	0.6 0.1	0.8 0.1	1.1 0.5	0.5 0.2	0.5
	無回答	人数	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	0.0	0.1	0.5	0.2	0.2
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.1 0.1	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	0.1 0.1	0.4 0.4	0.1 0.1	0.1
男性	強くそう思う	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合 標準誤差	6.5 4.1	9.4 6.8	5.5 3.2	8.3 4.1	1.8 1.3	13.3 7.8	8.2 3.9	5.6 1.8	10.8 6.1	7.5 2.4	7.7 2.6
	どちらかといえばそう 思う	人数	48.1	58.7	47.2	45.6	52.1	47.9	54.2	48.3	48.0	50.0	50.1
		割合 標準誤差	11.0 8.2	8.2 5.0	5.0 1.5	5.8 2.1	7.7 2.4	5.9 1.3	7.0 2.1	3.7 1.3	4.6 1.7	3.1 0.6	3.0
	どちらともいえない	人数	41.6	30.7	42.6	35.9	33.0	25.8	35.4	38.3	27.4	34.8	34.2
		割合 標準誤差	10.4 7.5	12.0 7.5	5.8 2.1	7.5 2.4	6.1 1.3	5.7 1.3	9.6 3.5	4.0 1.3	4.5 1.3	3.8 1.3	3.8
	どちらかといえばそう 思わない 全くそう思わない	人数	3.9	1.1	4.5	8.1	9.0	6.0	2.3	6.8	6.7	5.4	5.5
		割合 標準誤差	3.1 1.2	1.2 0.3	3.3 0.3	3.1 0.3	3.3 1.8	2.4 0.7	1.6 0.0	2.3 0.7	2.1 1.7	1.4 0.6	1.4
	無回答	人数	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.8	0.6	2.2	2.3
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.3 0.3	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	0.1 0.1	0.5 0.5	0.2 0.1	0.2
女性	強くそう思う	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合 標準誤差	3.0 3.1	8.8 5.5	6.9 3.3	2.1 1.5	3.8 2.3	13.6 4.4	6.4 3.4	4.3 1.4	11.0 3.4	7.1 1.9	6.8 1.9
	どちらかといえばそう 思う	人数	69.3	50.0	50.3	53.1	56.0	47.8	58.1	53.5	49.3	53.3	53.6
		割合 標準誤差	7.1 7.1	6.5 4.5	7.1 2.4	6.7 2.1	7.7 2.4	3.4 1.3	5.3 1.1	4.5 1.3	3.3 1.3	2.8 1.3	2.9
	どちらともいえない	人数	19.9	26.0	34.6	37.9	30.1	28.5	23.4	35.0	29.1	29.8	29.7
		割合 標準誤差	6.7 4.9	8.6 7.2	6.5 2.1	5.0 3.3	6.2 3.3	4.3 2.2	6.1 4.8	3.6 1.9	3.7 2.2	3.0 1.8	3.1
	どちらかといえばそう 思わない 全くそう思わない	人数	7.8	12.6	5.8	6.6	8.0	6.5	10.6	5.4	7.7	7.7	7.9
		割合 標準誤差	4.9 2.6	7.2 2.4	2.1 0.3	3.3 0.3	3.3 2.9	2.2 1.4	4.8 1.5	1.9 1.8	2.2 2.4	1.8 1.9	1.9
	無回答	人数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.2	0.1
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.7 0.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.4	0.2 0.1	0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

信頼できると感じている者の状況(%)
問20-イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	強くそう思う	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合 標準誤差	4.5 2.7	6.1 2.8	7.7 3.0	5.9 2.4	6.2 1.9	14.9 3.6	5.4 1.8	6.4 2.0	12.9 2.9	7.9 1.2	7.8 1.2
	どちらかといえばそう 思う	人数	49.3	50.6	54.6	62.0	47.9	49.2	50.1	57.0	48.3	52.1	52.1
		割合 標準誤差	4.2 2.7	5.3 2.8	4.4 3.0	5.8 2.4	6.1 1.9	3.4 1.2	3.6 1.8	3.5 2.0	3.4 2.9	2.9 1.2	2.9 1.2
	どちらともいえない	人数	37.8	37.5	32.5	27.6	39.3	29.6	37.6	31.9	32.0	34.1	33.9
		割合 標準誤差	5.4 2.7	7.2 2.8	4.8 3.0	4.9 2.4	6.0 1.9	5.0 1.2	4.7 1.8	3.7 2.0	4.3 2.9	3.4 1.2	3.4 1.2
	どちらかといえばそう 思わない	人数	6.5	4.4	3.4	3.8	3.6	2.9	5.3	3.6	3.1	3.9	3.9
		割合 標準誤差	5.4 2.7	2.9 1.2	1.2 0.8	1.6 0.8	1.5 0.8	1.2 0.8	2.8 1.1	1.0 0.8	1.1 0.8	0.9 0.8	0.9 0.8
	全くそう思わない	人数	2.0	1.3	1.7	0.0	2.6	2.7	1.6	0.8	3.0	1.8	1.8
		割合 標準誤差	1.5 0.8	1.0 0.5	0.9 0.5	0.0 0.0	1.4 0.5	1.0 0.5	0.9 0.0	0.4 0.3	0.8 0.7	0.5 0.3	0.5 0.3
男性	強くそう思う	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合 標準誤差	1.5 1.5	2.6 2.1	6.4 3.4	9.8 4.1	6.4 2.5	13.9 5.0	2.1 1.4	7.7 3.1	12.1 4.1	7.0 1.3	7.2 1.3
	どちらかといえばそう 思う	人数	42.8	57.1	56.3	54.3	46.8	51.6	51.0	53.5	50.7	51.9	51.8
		割合 標準誤差	11.1 4.1	5.0 2.8	8.5 3.0	6.0 2.4	7.0 2.4	4.1 1.2	5.3 1.9	4.6 1.7	3.5 1.3	3.0 0.7	2.9 0.8
	どちらともいえない	人数	43.9	39.3	34.2	30.4	41.6	24.2	41.2	34.4	28.2	35.2	35.0
		割合 標準誤差	11.8 4.7	4.7 2.8	7.9 3.0	5.9 2.4	7.6 2.4	4.7 1.2	5.9 1.9	4.7 1.9	4.1 1.3	3.3 0.7	3.3 0.7
	どちらかといえばそう 思わない	人数	7.4	1.1	2.9	4.0	4.1	4.3	3.8	3.7	4.1	3.8	3.8
		割合 標準誤差	6.5 3.3	1.2 0.0	1.9 0.3	2.3 0.0	2.3 1.2	2.1 2.0	3.0 1.5	1.9 0.1	1.9 1.7	1.3 0.7	1.3 0.8
	全くそう思わない	人数	4.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.9	0.1	4.5	1.8	1.9
		割合 標準誤差	3.3 0.0	0.0 0.0	0.3 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.0	0.1 0.0	1.7 0.5	0.7 0.4	0.8 0.4
女性	強くそう思う	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合 標準誤差	6.7 4.7	8.8 5.5	9.0 3.1	2.1 1.5	6.0 2.8	15.7 3.5	7.9 3.6	5.1 1.5	13.5 3.0	8.8 1.6	8.4 1.6
	どちらかといえばそう 思う	人数	54.4	45.8	52.9	69.5	48.7	47.3	49.4	60.5	46.5	52.2	52.5
		割合 標準誤差	7.9 2.8	7.1 2.8	6.1 2.4	7.2 2.4	7.5 2.4	4.2 1.2	6.1 1.5	4.1 1.7	4.1 1.7	3.2 0.7	3.3 0.7
	どちらともいえない	人数	33.1	36.2	30.9	24.8	37.4	33.8	34.9	29.3	34.9	32.9	32.9
		割合 標準誤差	6.8 2.8	10.5 4.8	6.8 2.4	5.7 2.5	6.8 1.4	6.1 1.3	7.7 3.4	3.9 1.3	4.9 1.1	4.0 1.2	4.1 1.3
	どちらかといえばそう 思わない	人数	5.8	6.9	4.0	3.6	3.2	1.8	6.5	3.5	2.3	4.0	4.1
		割合 標準誤差	4.8 2.3	4.8 2.3	1.9 1.4	2.5 1.4	1.4 0.8	1.3 0.8	3.4 1.3	1.3 0.8	1.1 0.8	1.2 0.8	1.3 0.8
	全くそう思わない	人数	0.0	2.3	3.2	0.0	3.8	0.8	1.3	1.6	1.9	1.8	1.8
		割合 標準誤差	0.0 0.0	2.3 0.0	1.7 0.0	0.0 0.0	2.4 0.0	0.6 0.0	1.0 0.0	0.8 0.0	1.0 0.9	0.7 0.3	0.7 0.3
	無回答	人数	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 0.0	0.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.0	0.3 0.3	0.3 0.3

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとしていると感じている者の状況
問20-エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとしていますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	強くそう思う	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
		割合 標準誤差	9.2 4.0	10.9 5.7	7.2 2.8	7.8 2.6	5.6 1.8	12.7 3.8	10.2 3.3	7.3 1.8	10.7 3.2	9.1 1.7	9.0 1.7
	どちらかといえばそう 思う	人数	36.6	47.2	37.3	56.3	47.9	43.4	42.7	46.0	45.4	44.3	44.8
		割合 標準誤差	8.3 3.9	5.9 2.7	5.7 2.1	4.0 1.6	5.1 1.8	3.3 1.1	4.9 1.5	3.5 1.2	3.4 1.1	2.9 1.1	2.9
	どちらともいえない	人数	50.6	38.7	44.0	30.6	38.4	34.0	43.8	38.9	34.0	39.3	39.1
		割合 標準誤差	10.4 4.6	8.3 3.7	5.2 2.1	2.6 1.0	4.6 1.6	3.7 1.5	5.9 1.1	3.2 1.8	3.1 1.5	3.0 1.1	3.0
	どちらかといえばそう 思わない	人数	2.3	3.1	9.4	3.9	5.1	4.3	2.8	6.3	4.6	4.8	4.6
		割合 標準誤差	1.3 0.5	1.6 0.7	3.7 1.3	1.6 0.7	2.1 0.8	1.5 0.6	1.1 0.4	1.8 0.7	1.5 0.6	1.1 0.6	1.0
	全くそう思わない	人数	1.3	0.0	2.1	0.7	2.5	4.9	0.6	1.2	4.6	2.2	2.1
		割合 標準誤差	1.3 0.5	0.0 0.0	1.3 0.5	0.7 0.3	1.2 0.5	1.7 0.6	0.6 0.2	0.6 0.3	0.6 0.3	0.6 0.3	0.6
	無回答	人数	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	0.0	0.3	0.7	0.3	0.3
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.6 0.2	0.5 0.2	0.6 0.2	0.0 0.0	0.3 0.1	0.7 0.3	0.3 0.1	0.3
女性	強くそう思う	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
		割合 標準誤差	7.5 3.1	13.3 6.2	6.7 3.4	12.5 4.3	7.0 2.6	9.8 3.6	10.8 4.0	9.1 3.3	9.1 2.9	9.4 2.0	9.5 2.0
	どちらかといえばそう 思う	人数	35.2	43.8	38.5	45.4	40.8	42.8	40.1	40.3	43.7	41.1	41.4
		割合 標準誤差	10.2 4.4	5.5 2.5	11.3 4.1	6.2 2.7	4.3 1.8	5.4 2.1	6.2 2.5	4.7 1.1	4.0 1.0	2.9 1.0	2.8
	どちらともいえない	人数	53.4	41.8	44.6	35.7	46.8	35.9	46.8	43.7	36.3	42.8	42.4
		割合 標準誤差	11.9 5.0	5.0 2.3	9.7 4.1	5.9 2.5	5.3 2.1	3.5 1.5	5.7 2.3	4.4 1.8	4.6 1.7	3.0 1.0	2.9
	どちらかといえばそう 思わない	人数	0.8	1.1	7.4	4.9	1.2	5.1	1.0	5.1	4.2	3.6	3.5
		割合 標準誤差	0.9 0.4	1.2 0.5	3.7 1.5	2.8 1.1	0.7 0.3	2.2 0.9	0.8 0.3	1.9 0.8	1.7 0.7	1.0 0.4	1.0
	全くそう思わない	人数	3.0	0.0	2.9	0.0	4.3	5.8	1.3	1.2	6.2	2.8	2.8
		割合 標準誤差	3.0 1.3	0.0 0.0	2.5 1.1	0.0 0.0	2.1 0.8	2.5 1.0	1.3 0.5	1.1 0.4	2.0 0.8	1.0 0.4	1.0
	無回答	人数	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.7	0.0	0.6	0.5	0.4	0.4
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.3 0.6	0.0 0.0	0.7 0.3	0.0 0.0	0.5 0.2	0.5 0.2	0.3 0.1	0.3
女性	強くそう思う	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
		割合 標準誤差	10.4 4.4	9.1 4.1	7.7 3.3	3.2 1.8	4.5 1.8	15.1 4.4	9.7 3.6	5.6 1.6	11.9 3.6	8.8 2.1	8.5 2.0
	どちらかといえばそう 思う	人数	37.7	49.8	36.1	66.9	53.6	43.9	44.7	51.7	46.6	47.5	48.2
		割合 標準誤差	11.8 5.1	9.0 4.1	5.6 2.3	6.8 2.7	7.4 3.1	5.1 2.1	6.7 2.5	3.8 1.5	4.8 1.8	3.8 1.5	3.8
	どちらともいえない	人数	48.4	36.4	43.5	25.6	31.5	32.6	41.5	34.1	32.3	35.9	35.8
		割合 標準誤差	13.4 5.8	11.7 5.1	6.0 2.7	5.5 2.3	5.9 2.3	4.1 1.9	7.8 2.8	3.1 1.2	3.7 1.5	3.8 1.6	3.9
	どちらかといえばそう 思わない	人数	3.4	4.6	11.5	2.9	8.4	3.6	4.1	7.5	4.9	5.9	5.8
		割合 標準誤差	2.2 0.9	2.6 1.1	4.6 1.8	2.5 1.0	3.6 1.4	1.9 0.8	1.8 0.7	2.7 1.1	1.8 0.8	1.6 0.6	1.5
	全くそう思わない	人数	0.0	0.0	1.3	1.3	1.0	4.2	0.0	1.2	3.4	1.6	1.4
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.4	1.3 0.6	0.8 0.3	1.9 0.8	0.0 0.0	0.7 0.3	1.4 0.6	0.6 0.3	0.5
	無回答	人数	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.9	0.3	0.3
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 0.4	0.7 0.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.9 0.4	0.3 0.1	0.3

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

5. 生活習慣調査②の結果(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(1) 食生活の状況

朝食を食べる頻度(習慣)

問1 あなたはふだん朝食を食べますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			人数	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差	割合 標準誤差					
総数	ほとんど毎日食べる		82	56.6 8.6	75.6 5.9	156 4.2	84.3 4.2	95.0 1.7	188 3.1	400 2.6	435 1.5	1023 1.8	1023
	週2~3日食べない			26.4 8.7	12.2 3.9	108 2.4	8.4 2.5	2.0 0.9	18.4 2.6	9.3 1.6	2.9 0.9	10.5 1.0	10.4
	週4~5日食べない			3.7 2.2	0.7 0.7	1.4 1.0	1.7 1.3	0.4 0.3	2.0 1.1	2.9 1.2	0.3 0.2	1.8 0.6	1.8
	ほとんど食べない			13.3 4.7	11.5 3.3	10.3 3.1	5.5 2.0	2.7 1.4	12.3 3.3	6.6 1.6	3.7 1.5	7.7 1.6	7.7
		人数	37		48	72	81	133	85	191	196	472	472
男性	ほとんど毎日食べる		49.1 10.1	66.6 8.8	76.2 6.6	77.1 6.1	78.8 7.2	95.8 1.7	58.8 5.6	75.7 3.3	92.8 1.8	75.1 2.4	75.6
	週2~3日食べない		33.8 11.2	16.7 6.1	12.8 4.7	11.8 4.4	11.2 4.0	0.8 0.8	24.4 4.5	12.8 2.8	2.8 1.2	13.7 1.4	13.3
	週4~5日食べない		4.8 4.6	0.0 0.0	1.7 1.7	0.9 0.9	5.1 5.1	0.0 0.0	2.2 2.2	3.3 2.2	0.0 0.0	2.0 1.0	2.0
	ほとんど食べない		12.2 7.1	16.7 6.9	9.3 4.5	10.3 3.9	4.8 3.0	3.4 1.6	14.7 6.4	8.2 2.6	4.5 1.8	9.2 2.3	9.0
		人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
女性	ほとんど毎日食べる		62.2 11.4	81.8 5.7	78.7 6.1	91.3 3.4	92.0 3.4	94.3 2.1	73.3 5.1	86.8 3.0	93.3 1.8	84.7 2.4	84.5
	週2~3日食べない		20.9 9.4	9.1 4.9	8.9 2.8	5.2 2.4	2.4 2.1	2.9 1.3	14.2 3.8	5.8 1.3	3.1 1.2	7.4 1.3	7.6
	週4~5日食べない		2.8 2.1	1.1 1.1	1.1 1.1	2.5 1.9	1.7 1.7	0.6 0.6	1.8 1.1	2.4 1.1	0.5 0.4	1.5 0.6	1.6
	ほとんど食べない		14.1 6.3	8.0 3.6	11.3 4.0	0.9 0.7	3.9 2.5	2.1 1.3	10.6 3.3	5.0 1.9	3.2 1.5	6.3 1.5	6.3
		人数	63										

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

人と比較した際の食べる速さの自覚

問2 あなたは、人と比較して食べる速度が速いですか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	速い	人 数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	27.9	38.0	37.2	34.2	31.7	15.7	33.6	34.8	20.3	30.9	31.0
	ふつう	標準誤差	5.8	4.1	5.6	4.8	3.2	2.8	4.1	3.5	3.1	2.4	2.4
		割合	50.8	51.0	53.3	52.5	57.3	67.7	50.9	54.2	64.4	55.8	55.6
	遅い	標準誤差	7.9	4.1	5.9	4.3	4.5	3.8	5.0	3.9	3.1	2.4	2.4
		割合	21.3	11.0	9.5	12.6	11.0	16.5	15.5	10.8	15.3	13.2	13.3
無回答	標準誤差	割合	5.3	3.3	2.6	3.3	2.8	3.6	3.2	1.7	2.4	1.0	1.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1
	標準誤差	割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1
		割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1
男 性	速い	人 数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	41.6	45.5	41.9	37.2	34.0	24.1	43.7	38.4	26.8	37.1	36.7
	ふつう	標準誤差	11.1	5.9	8.9	6.8	4.7	4.1	5.9	5.5	4.1	3.2	3.1
		割合	46.0	45.1	52.1	48.6	56.4	59.7	45.5	51.2	59.1	51.8	51.9
	遅い	標準誤差	11.2	5.6	8.7	7.9	5.0	4.2	5.8	6.7	4.1	3.0	2.9
		割合	12.4	9.4	6.0	12.9	9.5	16.2	10.7	9.9	14.1	10.9	11.2
無回答	標準誤差	割合	6.9	5.9	3.9	3.9	3.5	3.9	4.7	2.7	3.1	1.9	1.9
		割合	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2
	標準誤差	割合	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2
		割合	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2
女 性	速い	人 数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	17.8	32.9	32.4	31.3	29.9	9.1	26.4	31.2	15.3	24.9	25.4
	ふつう	標準誤差	5.8	5.0	5.7	9.5	4.3	2.9	4.4	5.0	3.3	2.5	2.6
		割合	54.3	55.0	54.6	56.3	58.0	74.1	54.7	57.2	68.5	59.8	59.3
	遅い	標準誤差	8.4	6.3	4.9	8.9	7.0	5.1	6.3	5.2	4.2	3.4	3.6
		割合	27.9	12.2	13.0	12.3	12.2	16.9	18.9	11.7	16.2	15.3	15.3
無回答	標準誤差	割合	9.7	5.4	4.2	4.2	3.8	4.7	5.8	2.3	3.1	1.7	1.8
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準誤差	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

満腹になるまで食べる者の状況

問3 あなたは、ついついお腹いっぱい食べるほうですか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	73.3	65.9	72.7	62.4	48.3	40.5	69.2	63.5	43.1	59.5	59.1
	いいえ	標準誤差	5.2	5.9	4.9	5.6	3.9	2.7	4.1	3.4	2.0	2.0	2.1
		割合	29.2	30.1	18.1	36.8	54.9	63.0	30.8	36.2	56.9	40.4	40.8
男性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	70.8	69.9	81.9	61.9	45.1	37.0	70.3	65.5	40.6	60.9	59.5
	いいえ	標準誤差	11.0	8.7	4.7	7.5	4.8	3.9	8.5	4.3	3.1	3.3	3.4
		割合	29.2	30.1	18.1	36.8	54.9	63.0	29.7	34.0	59.4	38.9	40.3
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	75.2	63.2	63.6	62.8	51.0	43.2	68.4	61.6	45.0	58.1	58.7
	いいえ	標準誤差	7.1	5.9	6.5	7.9	4.7	4.0	4.4	4.2	3.1	2.2	2.3
		割合	24.8	36.8	36.4	37.2	49.0	56.8	31.6	38.4	55.0	41.9	41.3
無回答	はい	人数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	いいえ	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の状況

問4 あなたは、就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ありますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	44.8	37.0	30.5	29.5	19.3	14.6	40.4	26.8	17.0	29.3	29.1
		標準誤差	8.3	3.8	6.8	3.7	3.5	3.0	4.2	3.6	2.7	2.1	2.0
		割合	54.6	63.0	69.5	69.9	80.7	85.4	59.3	72.9	83.0	70.5	70.7
	いいえ	標準誤差	8.3	3.8	6.8	3.4	3.5	3.0	4.2	3.5	2.7	2.1	2.0
男性	はい	割合	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1
		人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	59.7	65.0	37.2	38.6	28.3	14.2	62.6	34.4	19.6	39.2	38.7
	いいえ	標準誤差	11.2	10.4	10.3	6.2	6.2	4.0	8.0	5.6	3.4	2.9	2.7
女性	はい	割合	38.8	35.0	62.8	60.2	71.7	85.8	36.7	65.1	80.4	60.4	60.9
		標準誤差	10.9	10.4	10.3	5.7	6.2	4.0	7.9	5.5	3.4	2.8	2.7
		割合	1.5	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.4	0.4
		標準誤差	1.5	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.3	0.3
	無回答	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
	はい	割合	33.7	18.0	23.8	20.9	12.0	14.9	24.7	19.3	15.0	19.6	19.7
		標準誤差	8.0	5.2	5.8	4.5	3.3	3.1	3.2	3.4	3.0	1.9	1.9
		割合	66.3	82.0	76.2	79.1	88.0	85.1	75.3	80.7	85.0	80.4	80.3
		標準誤差	8.0	5.2	5.8	4.5	3.3	3.1	3.2	3.4	3.0	1.9	1.9
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

夕食後に間食をとることが週3回以上ある者の状況

問5 あなたは、夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ありますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	人数		82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
	はい	割合	32.8	16.2	30.0	23.2	20.3	7.7	23.5	26.2	10.4	20.9	20.7
		標準誤差	5.9	4.6	4.8	4.5	3.4	2.1	5.1	3.1	2.2	2.6	2.6
	いいえ	割合	71.9	80.8	71.7	85.4	76.1	93.6	76.5	73.5	89.6	79.0	79.2
		標準誤差	10.7	7.2	8.0	3.5	5.9	2.1	5.1	3.1	2.2	2.6	2.5
男性	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1
	人数		37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
	はい	割合	28.1	19.2	28.3	13.4	23.9	6.4	23.2	20.7	11.6	19.8	19.2
		標準誤差	10.7	7.2	8.0	3.6	5.9	2.1	8.3	4.0	2.6	3.9	3.8
女性	いいえ	割合	71.9	80.8	71.7	85.4	76.1	93.6	76.8	78.8	88.4	80.0	80.6
		標準誤差	10.7	7.2	8.0	3.5	5.9	2.1	8.3	3.9	2.6	3.9	3.7
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2
	人数		45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
	はい	割合	36.2	14.2	31.8	32.7	17.3	8.8	23.7	31.7	9.6	22.0	22.3
		標準誤差	9.1	5.4	5.2	6.8	3.6	2.5	6.1	4.0	2.2	2.7	2.7
	いいえ	割合	67.2	83.8	70.0	76.1	79.7	92.3	76.3	68.3	90.4	78.0	77.7
		標準誤差	5.9	4.6	4.8	4.3	3.4	2.1	6.1	4.0	2.2	2.7	2.7
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

清涼飲料をほぼ毎日飲む者の状況

問6 あなたは、甘みのある茶類やコーヒー、炭酸飲料、ジュース、スポーツドリンクなどをほぼ毎日飲みますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	44.6	43.8	53.2	32.3	37.6	31.3	44.2	41.1	33.6	41.0	40.5
		標準誤差	8.6	7.0	5.6	5.2	4.6	4.1	5.1	3.6	3.8	2.8	2.8
		割合	55.4	56.2	46.8	67.1	62.4	68.7	55.8	58.6	66.4	58.9	59.4
	無回答	標準誤差	8.6	7.0	5.6	5.2	4.6	4.1	5.1	3.6	3.8	2.8	2.8
男性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	46.2	57.7	62.6	37.7	48.2	31.7	52.5	48.5	37.2	47.7	46.8
		標準誤差	11.1	9.5	9.1	8.0	6.4	4.8	7.2	5.4	4.1	3.3	3.2
		割合	53.8	42.3	37.4	61.0	51.8	68.3	47.5	51.0	62.8	52.1	53.0
	無回答	標準誤差	11.1	9.5	9.1	7.9	6.4	4.8	7.2	5.2	4.1	3.2	3.1
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	43.5	34.3	44.0	27.1	28.9	31.0	38.3	33.7	30.9	34.5	34.3
		標準誤差	10.7	10.9	7.6	8.2	6.3	5.4	5.9	5.0	5.5	3.5	3.6
		割合	56.5	65.7	56.0	72.9	71.1	69.0	61.7	66.3	69.1	65.5	65.7
	無回答	標準誤差	10.7	10.9	7.6	8.2	6.3	5.4	5.9	5.0	5.5	3.5	3.6
	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	43.5	34.3	44.0	27.1	28.9	31.0	38.3	33.7	30.9	34.5	34.3
		標準誤差	10.7	10.9	7.6	8.2	6.3	5.4	5.9	5.0	5.5	3.5	3.6
		割合	56.5	65.7	56.0	72.9	71.1	69.0	61.7	66.3	69.1	65.5	65.7
	無回答	標準誤差	10.7	10.9	7.6	8.2	6.3	5.4	5.9	5.0	5.5	3.5	3.6

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

家庭の煮物の味付けが濃いと感じる者の状況

問7 あなたの家庭の煮物などの味付けは濃いほうですか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	人数		82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
	はい	割合	20.4	38.2	29.3	26.7	23.0	25.7	30.4	27.3	24.8	27.5	27.3
		標準誤差	6.1	5.0	4.0	4.9	3.2	3.0	4.9	3.4	3.0	2.7	2.7
	いいえ	割合	79.6	61.8	70.7	72.7	77.0	74.3	69.6	72.5	75.2	72.4	72.6
		標準誤差	6.1	5.0	4.0	5.0	3.2	3.0	4.9	3.4	3.0	2.7	2.7
男性	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1
	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	29.5	42.4	30.4	32.0	12.6	20.9	36.6	26.5	20.0	27.6	27.3
	女性	はい	標準誤差	9.1	6.3	6.1	4.3	3.7	3.8	5.7	3.8	3.4	2.8
いいえ			割合	70.5	57.6	69.6	66.7	87.4	79.1	63.4	73.0	80.0	72.2
		標準誤差	9.1	6.3	6.1	4.5	3.7	3.8	5.7	3.9	3.4	2.8	2.7
無回答		割合	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2
	人数		45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
	はい	割合	13.6	35.4	28.2	21.5	31.7	29.5	26.0	28.0	28.5	27.5	27.4
		標準誤差	5.8	5.8	4.3	6.6	4.0	3.7	5.1	3.9	3.7	3.1	3.1
	いいえ	割合	86.4	64.6	71.8	78.5	68.3	70.5	74.0	72.0	71.5	72.5	72.6
		標準誤差	5.8	5.8	4.3	6.6	4.0	3.7	5.1	3.9	3.7	3.1	3.1
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

汁物を1日2杯以上飲む者の状況

問8 あなたは、汁物(みそ汁、スープ類)を1日2杯以上飲みますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023	
		割合	32.4	26.6	25.1	20.2	17.8	23.5	29.1	21.4	22.3	24.6	24.3	
		標準誤差	6.1	4.1	3.9	3.7	4.4	3.3	3.2	2.9	3.2	2.0	2.0	
		割合	67.6	73.4	74.9	79.2	82.2	76.5	70.9	78.3	77.7	75.3	75.6	
	いいえ	標準誤差	6.1	4.1	3.9	3.6	4.4	3.3	3.2	2.9	3.2	2.0	2.0	
無回答		割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	
		人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472	
	男性	はい	割合	53.8	28.7	31.5	27.4	20.0	21.5	21.5	16.1	22.4	29.6	29.2
標準誤差			13.2	6.6	6.3	5.2	5.2	4.1	5.0	3.0	3.4	2.7	2.8	
割合			46.2	71.3	68.5	71.4	80.0	78.5	78.5	83.9	77.6	70.2	70.6	
標準誤差			13.2	6.6	6.3	5.2	5.2	4.1	5.0	3.0	3.4	2.7	2.8	
無回答		割合	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	
	女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
			割合	16.6	25.2	18.8	13.3	16.0	25.1	40.0	26.7	22.1	19.7	19.5
標準誤差			6.8	7.1	3.8	5.1	4.8	3.9	7.0	4.2	3.8	2.4	2.5	
割合			83.4	74.8	81.2	86.7	84.0	74.9	60.0	72.8	77.9	80.3	80.5	
いいえ		標準誤差	6.8	7.1	3.8	5.1	4.8	3.9	7.0	4.3	3.8	2.4	2.5	
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	
		人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

単品料理を週3日以上食べる者の状況

問9 あなたは、単品料理(牛丼、天丼などの丼物、カレーライスやめん類など)を食べる日は、週に3日以上ですか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	人数		82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
	はい	割合	33.5	39.5	22.1	18.1	12.7	9.7	36.8	18.8	10.5	22.3	22.4
		標準誤差	8.3	6.0	3.7	3.7	2.8	2.5	4.8	2.4	1.7	2.2	2.2
	いいえ	割合	66.5	60.5	77.9	81.9	87.3	90.3	63.2	81.2	89.5	77.7	77.6
		標準誤差	8.3	6.0	3.7	3.7	2.8	2.5	4.8	2.4	1.7	2.2	2.2
男性	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	人数		37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
	はい	割合	51.7	45.1	27.7	30.4	21.7	12.7	48.1	27.3	15.4	30.4	30.0
		標準誤差	10.8	8.5	7.1	5.2	5.0	3.5	7.5	4.2	2.7	3.2	3.0
女性	いいえ	割合	48.3	54.9	72.3	69.6	78.3	87.3	51.9	72.7	84.6	69.6	70.0
		標準誤差	10.8	8.5	7.1	5.2	5.0	3.5	7.5	4.2	2.7	3.2	3.0
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	人数		45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
	はい	割合	19.9	35.6	16.6	6.3	5.2	7.4	28.9	10.3	6.8	14.5	15.0
		標準誤差	9.9	7.7	3.6	2.7	2.6	3.2	5.9	1.8	2.3	2.4	2.5
	いいえ	割合	80.1	64.4	83.4	93.7	94.8	92.6	71.1	89.7	93.2	85.5	85.0
		標準誤差	9.9	7.7	3.6	2.7	2.6	3.2	5.9	1.8	2.3	2.4	2.5
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

めん類の汁をほとんど全部飲む者の状況

問10 あなたは、めん類の汁をほとんど全部飲みますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	24.4	26.5	26.3	35.8	22.1	19.9	25.6	29.6	20.4	26.2	26.3
		標準誤差	4.9	7.3	3.6	5.1	3.4	2.5	3.8	2.6	2.4	1.7	1.7
		割合	75.6	73.5	73.7	64.2	77.9	80.1	74.4	70.4	79.6	73.8	73.7
	いいえ	標準誤差	4.9	7.3	3.6	5.1	3.4	2.5	3.8	2.6	2.4	1.7	1.7
男性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	35.5	33.6	41.1	60.0	31.3	27.1	34.5	48.1	27.0	37.8	37.6
		標準誤差	8.8	6.6	5.3	6.8	5.8	3.9	5.7	4.0	3.0	2.5	2.6
		割合	64.5	66.4	59.0	40.0	68.7	72.9	65.5	51.9	73.0	62.2	62.4
	いいえ	標準誤差	8.8	6.6	5.3	6.8	5.8	3.9	5.7	4.0	3.0	2.5	2.6
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	16.1	21.7	11.6	12.6	14.5	14.2	19.3	11.2	15.3	15.0	15.2
		標準誤差	5.7	10.1	3.5	3.4	5.3	3.4	5.6	2.3	3.9	2.3	2.4
		割合	83.9	78.3	88.4	87.4	85.5	85.8	80.7	88.8	84.7	85.0	84.8
	いいえ	標準誤差	5.7	10.1	3.5	3.4	5.3	3.4	5.6	2.3	3.9	2.3	2.4
	無回答	人数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

塩蔵品を食べる日が週3回以上ある者の状況

問11 あなたは、塩蔵品(塩さけ、たらこ、佃煮など)を食べる日は、週に3日以上ですか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	11.3	9.6	10.0	14.1	17.5	23.3	10.3	13.2	21.5	14.8	14.7
		標準誤差	4.7	3.3	2.8	4.0	2.5	3.4	3.1	2.5	2.8	1.5	1.6
		割合	88.7	90.4	90.0	85.9	82.5	76.7	89.7	86.8	78.5	85.2	85.3
	無回答	標準誤差	4.7	3.3	2.8	4.0	2.5	3.4	3.1	2.5	2.8	1.5	1.6
男性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	13.4	9.0	8.4	18.0	19.2	18.6	11.0	14.4	18.8	14.4	14.8
		標準誤差	7.4	4.1	3.3	5.0	4.0	3.7	4.0	3.5	3.2	2.4	2.4
		割合	86.6	91.0	91.6	82.0	80.8	81.4	89.0	85.6	81.2	85.6	85.2
	無回答	標準誤差	7.4	4.1	3.3	5.0	4.0	3.7	4.0	3.5	3.2	2.4	2.4
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	9.7	10.0	11.5	10.3	16.0	27.1	9.9	12.1	23.7	15.1	14.7
		標準誤差	5.6	4.1	3.5	4.7	3.8	5.6	3.6	2.5	4.2	1.7	1.7
		割合	90.3	90.0	88.5	89.7	84.0	72.9	90.1	87.9	76.3	84.9	85.3
	無回答	標準誤差	5.6	4.1	3.5	4.7	3.8	5.6	3.6	2.5	4.2	1.7	1.7
	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	9.7	10.0	11.5	10.3	16.0	27.1	9.9	12.1	23.7	15.1	14.7
		標準誤差	5.6	4.1	3.5	4.7	3.8	5.6	3.6	2.5	4.2	1.7	1.7
		割合	90.3	90.0	88.5	89.7	84.0	72.9	90.1	87.9	76.3	84.9	85.3
	無回答	標準誤差	5.6	4.1	3.5	4.7	3.8	5.6	3.6	2.5	4.2	1.7	1.7

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

漬物や味付けしてあるおかずは、調味料をかけることが多い者の状況

問12 あなたは、漬物や味付けしてあるおかずは、しょうゆやソースをかけることが多いですか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	11.1	9.0	9.9	14.3	16.8	15.6	9.9	12.6	16.3	13.6	13.8
		標準誤差	4.2	2.9	2.0	3.3	3.3	3.6	2.9	1.6	3.2	1.7	1.7
		割合	88.9	91.0	90.1	85.7	83.2	84.3	90.1	87.4	83.7	86.4	86.2
	いいえ	標準誤差	4.2	2.9	2.0	3.3	3.3	3.6	2.9	1.6	3.2	1.7	1.7
男性	はい	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
		人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	21.3	14.3	18.7	24.0	30.8	27.3	17.4	21.2	30.2	22.8	23.1
	いいえ	標準誤差	8.7	5.2	4.9	4.9	6.3	5.9	5.7	2.7	5.7	3.0	3.0
女性	はい	割合	78.7	85.7	81.3	76.0	69.2	72.6	82.6	78.8	69.7	77.1	76.8
		標準誤差	8.7	5.2	4.9	4.9	6.3	5.9	5.7	2.7	5.7	3.0	3.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	無回答	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
	はい	割合	3.6	5.4	1.3	5.1	5.1	6.4	4.6	4.0	5.7	4.6	4.6
		標準誤差	2.7	2.7	1.0	2.7	1.9	2.2	1.9	1.3	1.8	0.9	1.0
		割合	96.4	94.6	98.7	94.9	94.9	93.6	95.4	96.0	94.3	95.4	95.4
		標準誤差	2.7	2.7	1.0	2.7	1.9	2.2	1.9	1.3	1.8	0.9	1.0
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

漬物を1日2回以上食べる者の状況
問13 あなたは、漬物を1日2回以上食べますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数		人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
	はい	割合	4.5	5.6	8.3	4.5	16.8	31.6	5.1	8.0	27.8	13.0	12.8
		標準誤差	2.6	2.1	2.0	1.5	3.6	4.3	1.4	1.7	3.4	1.6	1.5
	いいえ	割合	95.5	94.4	91.7	95.5	83.2	68.4	94.9	92.0	72.2	87.0	87.2
		標準誤差	2.6	2.1	2.0	1.5	3.6	4.3	1.4	1.7	3.4	1.6	1.5
男性	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	6.8	3.2	10.8	6.1	13.2	33.1	4.8	8.4	28.9	12.7	13.2
		標準誤差	5.0	2.1	4.4	2.8	4.0	5.9	2.4	2.8	4.3	1.7	1.7
女性	いいえ	割合	93.2	96.8	89.2	93.9	86.8	66.9	95.2	91.6	71.1	87.3	86.8
		標準誤差	5.0	2.1	4.4	2.8	4.0	5.9	2.4	2.8	4.3	1.7	1.7
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	2.8	7.3	5.8	3.1	19.7	30.4	5.3	7.6	26.9	13.2	12.5
		標準誤差	2.6	3.4	2.2	1.4	5.2	4.6	2.2	2.2	3.9	2.0	2.0
	いいえ	割合	97.2	92.7	94.2	96.9	80.3	69.6	94.7	92.4	73.1	86.8	87.5
		標準誤差	2.6	3.4	2.2	1.4	5.2	4.6	2.2	2.2	3.9	2.0	2.0
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日あたりの食塩摂取目標量を知っている者の状況
問14 あなたは、1日の食塩の摂取目標量を知っていますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	人数		82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
	はい	割合	10.3	13.1	13.1	14.2	23.8	29.6	11.8	16.4	27.1	17.5	17.4
		標準誤差	4.8	3.9	3.6	3.4	3.1	3.9	3.6	2.5	3.4	1.6	1.6
	いいえ	割合	89.7	86.9	86.9	85.8	76.0	69.8	88.2	83.5	72.4	82.4	82.5
男性	はい	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.1	0.5	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.1	0.5	0.1	0.1
	いいえ	割合	99.3	97.7	89.1	94.5	84.4	78.3	98.5	90.0	80.4	89.9	89.7
		標準誤差	0.7	2.2	3.2	2.9	3.4	4.2	1.3	2.1	3.3	1.6	1.6
女性	はい	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
	いいえ	割合	82.6	79.5	84.8	77.4	69.1	63.1	80.9	77.1	66.3	75.0	75.3
		標準誤差	9.0	6.4	5.6	5.1	5.9	4.7	6.5	4.4	4.2	3.0	3.0
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.2	0.4	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.2	0.4	0.1	0.1
	はい	割合	17.4	20.5	15.2	22.6	30.6	36.4	19.1	22.8	33.3	24.8	24.5
		標準誤差	9.0	6.4	5.6	5.1	5.9	4.8	6.5	4.4	4.2	3.0	3.0
	いいえ	割合	82.6	79.5	84.8	77.4	69.1	63.1	80.9	77.1	66.3	75.0	75.3
		標準誤差	9.0	6.4	5.6	5.1	5.9	4.7	6.5	4.4	4.2	3.0	3.0
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.2	0.4	0.2	0.2
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.2	0.4	0.1	0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日あたりの食塩摂取目標量の知識に関する状況

問14-1 あなたは、1日の食塩の摂取目標量を知っていますか。それは何グラムですか。(問14で「2 いいえ」と回答した者を「知らない」として計上した。)

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男 性	8g未満	人 数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	0.7	0.0	0.0	3.2	11.4	14.8	0.3	3.4	14.0	5.3	5.7
	8g以上	標準誤差	0.7	0.0	0.0	1.9	3.7	4.0	0.3	1.5	3.2	1.1	1.2
		割合	0.0	2.3	10.9	2.2	4.2	6.2	1.2	6.6	5.1	4.7	4.5
	知らない	標準誤差	0.0	2.2	4.4	1.6	2.9	1.9	1.2	2.3	1.5	1.2	1.1
		割合	99.3	97.7	89.1	94.5	84.4	78.3	98.5	90.0	80.4	89.9	89.7
	無回答	標準誤差	0.7	2.2	4.4	2.5	4.5	4.4	1.3	2.7	3.5	1.6	1.6
割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	
女 性	7g未満	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		人 数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
	7g以上	割合	1.8	10.2	9.1	9.3	9.9	18.1	6.6	11.0	14.4	10.5	10.3
		標準誤差	1.8	6.7	4.5	4.0	3.7	3.7	4.0	2.9	2.8	1.8	1.8
	知らない	割合	15.5	10.3	6.2	13.3	20.7	18.3	12.5	11.8	18.9	14.3	14.2
		標準誤差	8.7	5.1	3.3	5.8	4.7	4.1	4.8	3.2	3.3	2.1	2.2
	無回答	割合	82.6	79.5	84.8	77.4	69.1	63.1	80.9	77.1	66.3	75.0	75.3
標準誤差		8.7	7.8	5.3	6.5	5.4	4.8	5.8	4.0	3.9	2.6	2.6	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

食塩の表示を参考にする者の状況

問15 あなたは、食品購入時、食塩の表示(ナトリウム量や食塩相当量、「減塩」などの表示)を参考にしていますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	人数		82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
	はい	割合	16.3	18.6	27.4	32.6	37.6	39.5	17.6	33.6	37.0	29.0	28.9
		標準誤差	4.5	6.1	4.3	5.0	4.7	4.3	4.6	3.3	2.7	2.9	2.9
	いいえ	割合	83.7	81.4	72.6	67.2	62.4	60.2	82.4	66.3	62.8	71.0	71.0
男性	はい	割合	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
	いいえ	割合	9.1	9.9	18.5	18.4	30.4	35.0	9.5	22.9	31.5	20.9	21.3
		標準誤差	5.6	5.3	5.7	4.4	5.6	4.3	4.1	4.4	3.5	3.0	2.9
女性	はい	割合	90.9	90.1	81.5	81.6	69.6	64.3	90.5	77.1	68.0	79.0	78.5
		標準誤差	5.6	5.3	5.7	4.4	5.6	4.4	4.1	4.4	3.7	3.0	3.0
	いいえ	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
無回答	人数		45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
	はい	割合	21.6	24.6	36.2	46.3	43.5	43.0	23.3	44.3	41.1	36.8	36.5
		標準誤差	7.3	8.5	5.3	6.9	5.4	6.1	6.0	4.6	4.2	3.0	3.1
	いいえ	割合	78.4	75.4	63.8	53.4	56.5	57.0	76.7	55.6	58.9	63.1	63.5
無回答	はい	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1
	いいえ	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

減塩に取り組んでいる者の状況

問16 あなたは、ふだんの食事において、減塩に取り組んでいますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	積極的に取り組んでいる	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合 標準誤差	0.6 0.5	6.5 3.5	8.0 2.7	7.5 2.4	25.9 4.4	17.0 2.8	3.9 1.7	11.5 2.5	19.0 2.3	11.6 1.8	11.6 1.8
	少し取り組んでいる	人数	16.5	31.5	33.7	51.3	46.1	56.8	24.9	42.1	54.9	39.7	39.9
		割合 標準誤差	4.9 5.4	5.4 6.9	6.9 2.7	5.2 2.4	4.5 1.7	3.7 1.1	3.1 1.0	3.2 1.1	3.0 1.1	2.1 0.7	2.0 0.7
	あまり取り組んでいない	人数	46.1	39.8	41.9	30.7	17.8	20.6	42.6	32.2	20.5	32.1	31.9
		割合 標準誤差	5.7 3.4	3.4 4.1	5.4 2.0	4.1 1.7	4.2 1.2	4.0 1.4	3.1 1.1	2.6 0.9	3.3 1.2	2.3 0.8	2.2 0.8
	まったく取り組んでいない 無回答	人数	36.8	22.2	16.4	8.8	10.2	5.6	28.6	13.5	5.6	16.4	16.3
		割合 標準誤差	6.5 0.0	4.9 0.0	4.1 0.0	2.0 0.0	2.9 0.0	1.7 0.0	2.2 0.0	1.7 0.0	1.2 0.0	1.4 0.0	1.4 0.0
男性	積極的に取り組んでいる	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合 標準誤差	0.7 0.7	4.5 3.2	4.2 2.4	3.5 1.8	22.3 4.4	14.9 3.9	2.8 1.8	9.0 2.3	15.1 2.9	8.8 1.6	9.1 1.7
	少し取り組んでいる	人数	11.4	12.1	23.3	34.6	37.1	52.9	11.8	29.6	49.7	29.4	30.2
		割合 標準誤差	7.0 4.6	4.8 5.7	5.7 2.4	4.6 1.7	6.4 2.1	5.8 1.1	4.1 1.4	3.4 1.1	4.2 1.4	3.2 1.1	3.1 1.1
	あまり取り組んでいない	人数	46.7	38.7	51.2	41.2	24.3	24.4	42.3	40.1	26.4	37.5	36.6
		割合 標準誤差	12.2 4.3	9.7 4.6	6.9 2.4	6.7 2.4	6.7 2.4	6.1 2.4	5.3 2.4	3.9 1.4	4.6 1.4	3.4 1.1	3.3 1.1
	まったく取り組んでいない 無回答	人数	41.3	44.6	21.4	17.3	16.3	7.9	43.1	19.9	8.9	23.8	23.5
		割合 標準誤差	11.4 0.0	13.4 0.0	5.6 0.0	4.5 0.0	5.7 0.0	2.4 0.0	5.8 0.0	2.7 0.0	2.0 0.0	2.7 0.0	2.8 0.0
女性	積極的に取り組んでいる	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合 標準誤差	0.6 0.6	7.8 5.3	11.8 4.0	11.3 4.0	28.9 6.5	18.7 4.0	4.7 2.7	14.0 3.8	22.0 3.5	14.3 2.5	13.9 2.6
	少し取り組んでいる	人数	20.2	44.8	44.1	67.4	53.6	59.9	34.2	54.6	58.9	49.7	49.5
		割合 標準誤差	9.0 4.5	7.9 8.1	10.0 7.6	7.8 2.6	6.5 3.2	5.0 1.7	6.3 2.4	5.8 2.4	4.7 1.9	3.7 1.4	3.7 1.4
	あまり取り組んでいない	人数	45.7	40.5	32.6	20.6	12.4	17.7	42.7	24.4	15.9	26.9	27.3
		割合 標準誤差	8.5 3.3	8.1 6.9	7.6 1.5	5.6 0.7	3.2 1.1	4.9 1.7	4.6 1.8	3.5 1.1	4.0 1.2	2.4 0.9	2.4 0.9
	まったく取り組んでいない 無回答	人数	33.5	6.9	11.5	0.7	5.1	3.8	18.3	7.1	3.2	9.1	9.2
		割合 標準誤差	6.7 0.0	3.4 0.0	3.9 0.0	0.7 0.0	1.9 0.0	1.7 0.0	4.4 0.0	1.7 0.0	1.2 0.0	1.4 0.0	1.4 0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日あたりの望ましい野菜摂取量を知っている者の状況

問17 あなたは、健康のために1日に食べることが望ましい野菜の重量を知っていますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	10.9	16.3	8.4	14.5	21.2	24.1	13.9	13.2	23.3	16.0	16.0
	いいえ	標準誤差	4.8	5.9	2.8	5.0	3.3	4.2	5.2	2.3	3.8	1.8	1.9
		割合	89.1	83.8	91.6	85.5	78.8	75.3	86.1	86.8	76.2	83.9	83.8
男性	はい	標準誤差	4.8	5.9	2.8	5.0	3.3	4.2	5.2	2.3	3.8	1.8	1.9
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
	いいえ	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
女性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	4.4	17.6	6.1	6.5	13.6	15.1	11.7	7.4	15.0	10.7	11.0
	いいえ	標準誤差	3.4	7.3	2.9	2.8	4.1	3.6	4.1	2.0	3.7	1.4	1.4
		割合	95.6	82.4	93.9	93.5	86.4	84.2	88.3	92.6	84.5	89.2	88.8
女性	はい	標準誤差	3.4	7.3	2.9	2.8	4.1	3.6	4.1	2.0	3.7	1.4	1.4
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
	いいえ	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	15.7	15.3	10.8	22.1	27.4	31.2	15.5	18.9	29.7	21.2	21.0
	いいえ	標準誤差	8.9	5.6	4.1	9.3	5.0	5.6	6.2	5.1	4.8	2.8	3.0
		割合	84.3	84.7	89.2	77.9	72.6	68.2	84.5	81.1	69.9	78.7	78.9
女性	はい	標準誤差	8.9	5.6	4.1	9.3	5.0	5.6	6.2	5.1	4.8	2.8	3.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
	いいえ	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日あたりの望ましい野菜摂取量の知識に関する状況

問17-1 あなたは、健康のために1日に食べることが望ましい野菜の重量を知っていますか。それは何グラムですか。(問17で「2 いいえ」と回答した者を「知らない」として計)

性別	回答	年齢区分	人 数						(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	350g未満	人 数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	2.0	1.6	2.0	3.8	5.1	8.6	1.8	2.8	8.0	4.1	4.0
	350g以上	標準誤差	1.6	1.6	1.4	1.5	2.1	2.1	1.1	0.9	1.7	0.7	0.7
		割合	9.0	14.6	6.4	10.7	16.1	15.5	12.2	10.3	15.3	11.9	12.0
	知らない	標準誤差	5.3	5.6	2.3	4.0	3.2	2.5	3.9	2.2	2.1	1.5	1.6
男 性	350g未満	割合	89.1	83.8	91.6	85.5	78.8	75.3	86.1	86.8	76.2	83.9	83.8
		標準誤差	5.4	5.7	2.7	4.1	3.6	3.1	4.0	2.4	2.5	1.6	1.7
	350g以上	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1
	知らない	人 数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
女 性	350g未満	割合	3.8	0.0	1.7	3.1	6.2	5.2	1.7	2.9	5.7	3.3	3.4
		標準誤差	3.7	0.0	1.7	1.8	3.6	2.5	1.7	1.4	2.3	1.0	1.1
	350g以上	割合	0.7	17.6	4.3	3.5	7.4	9.9	10.0	4.5	9.3	7.4	7.6
		標準誤差	0.7	9.4	2.7	2.5	3.3	3.0	5.6	1.9	2.4	1.9	2.0
	知らない	割合	95.6	82.4	93.9	93.5	86.4	84.2	88.3	92.6	84.5	89.2	88.8
男 性	350g未満	標準誤差	3.8	9.4	3.2	3.1	4.7	3.8	5.7	2.3	3.2	2.1	2.2
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
	350g以上	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
	知らない	人 数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
女 性	350g未満	割合	0.6	2.7	2.2	4.5	4.2	11.2	1.8	2.8	9.8	4.8	4.6
		標準誤差	0.6	2.7	2.2	2.3	2.4	3.1	1.6	1.3	2.4	1.1	1.0
	350g以上	割合	15.1	12.6	8.5	17.6	23.2	20.0	13.7	16.1	19.9	16.4	16.4
		標準誤差	8.7	6.8	3.8	7.1	5.0	3.8	5.4	3.8	3.1	2.3	2.4
	知らない	割合	84.3	84.7	89.2	77.9	72.6	68.2	84.5	81.1	69.9	78.7	78.9
女 性	350g未満	標準誤差	8.7	7.1	4.2	7.1	5.3	4.5	5.5	3.9	3.7	2.4	2.5
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
	350g以上	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
	知らない	人 数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

野菜摂取量に関する自覚の状況

問18 あなたは、ふだんの食事で十分に野菜を食べていると思いますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	十分に食べていると思う やや不足だと思 う 不足していると思	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	24.6	21.8	20.5	38.8	45.0	44.8	23.0	31.8	45.5	33.2	33.5
		標準誤差	6.2	4.3	4.1	6.1	6.7	3.8	3.5	4.4	3.8	3.0	3.0
		割合	47.7	46.9	55.6	48.9	37.4	46.8	47.2	50.1	43.7	47.2	47.0
		標準誤差	6.4	6.1	4.0	5.2	5.4	3.8	3.9	3.9	3.5	2.3	2.2
男性	十分に食べていると思 う やや不足だと思 う 不足していると思	割合	27.8	31.3	23.8	12.3	17.6	8.5	29.7	18.1	10.8	19.6	19.5
		標準誤差	8.3	7.3	3.4	2.5	3.9	1.6	5.9	1.9	1.9	2.0	2.1
		人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	26.4	26.0	17.5	31.2	44.4	44.1	26.2	28.3	44.1	31.7	32.6
		標準誤差	11.2	7.2	4.6	7.6	8.7	3.9	8.0	4.7	4.3	4.2	4.4
女性	十分に食べていると思 う やや不足だと思 う 不足していると思	割合	38.6	54.3	56.2	53.7	36.5	47.6	47.2	51.9	44.3	48.1	47.8
		標準誤差	9.9	6.0	6.0	7.1	6.8	4.1	4.9	5.1	3.8	3.3	3.3
		割合	35.0	19.7	26.2	15.1	19.1	8.3	26.6	19.8	11.6	20.2	19.6
		標準誤差	10.4	8.2	5.1	4.4	5.1	2.3	6.6	2.7	2.6	2.1	2.2
		人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
	十分に食べていると思 う やや不足だと思 う 不足していると思	割合	23.2	19.0	23.4	46.1	45.5	45.3	20.8	35.3	46.5	34.7	34.4
		標準誤差	9.1	7.5	6.5	7.3	7.7	4.5	5.2	4.9	4.2	2.5	2.4
		割合	54.4	41.8	55.1	44.3	38.2	46.1	47.2	48.4	43.2	46.4	46.1
		標準誤差	9.9	9.4	6.3	7.1	6.3	4.7	7.0	4.2	4.1	2.9	2.9
		割合	22.4	39.3	21.5	9.5	16.4	8.6	32.0	16.3	10.2	18.9	19.4
		標準誤差	8.8	9.2	5.6	3.3	4.1	2.4	6.8	3.1	2.2	2.8	2.9

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1:週間のうちの食事づくりの頻度

問19 あなたは、1週間のうち、どれくらいの頻度で食事づくり(調理)をしていますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ほとんど毎日2回以上	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	2.9	37.1	34.1	35.8	39.6	51.0	22.1	34.1	49.4	33.4	33.0
	ほとんど毎日1回	標準誤差	1.6	4.8	4.2	3.2	3.7	4.5	3.6	2.8	3.3	1.8	1.8
		割合	2.2	8.8	9.3	15.1	13.4	7.8	5.9	12.2	9.6	9.2	9.4
	週2~5日	標準誤差	1.4	2.6	2.2	3.6	3.0	2.0	1.7	1.6	2.0	1.2	1.2
		割合	10.3	8.6	6.7	12.7	10.1	3.5	9.4	10.5	4.6	8.0	8.2
	週1回以下	標準誤差	3.6	3.2	2.6	2.8	2.4	1.0	2.2	1.9	0.9	1.0	1.0
男性	ほとんど毎日2回以上	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	0.0	2.3	1.7	5.4	9.7	16.6	1.2	4.7	14.7	6.2	6.6
	ほとんど毎日1回	標準誤差	0.0	2.3	1.4	2.7	3.6	5.2	1.3	1.7	4.0	1.6	1.7
		割合	3.6	2.7	1.9	7.4	5.8	8.4	3.1	4.6	7.9	4.9	5.1
	週2~5日	標準誤差	3.0	2.1	1.3	2.8	2.0	2.4	1.8	1.3	2.0	1.2	1.2
		割合	2.0	2.3	8.8	15.7	10.7	4.2	2.1	12.5	5.4	7.4	7.4
	週1回以下	標準誤差	2.0	1.5	4.1	5.7	3.7	1.8	1.3	2.6	1.7	1.0	0.9
女性	ほとんど毎日2回以上	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	5.1	61.0	66.3	65.0	64.3	78.3	36.9	63.5	75.8	60.0	59.0
	ほとんど毎日1回	標準誤差	3.0	6.7	4.3	7.0	6.0	4.0	6.6	4.4	3.4	2.4	2.5
		割合	1.1	12.9	16.7	22.5	19.8	7.3	7.9	19.8	10.8	13.4	13.6
	週2~5日	標準誤差	0.9	4.2	3.4	6.6	5.0	2.2	2.5	3.1	2.8	2.0	2.0
		割合	16.5	13.0	4.6	9.7	9.6	3.0	14.5	8.6	4.1	8.7	9.1
	週1回以下	標準誤差	5.8	5.6	2.4	3.5	3.7	1.1	3.6	2.3	1.2	1.4	1.4
	週1回以下	割合	77.2	13.1	12.4	2.8	6.3	11.5	40.7	8.2	9.3	18.0	18.3
		標準誤差	6.2	5.1	3.4	2.4	3.2	3.3	6.8	1.9	2.7	1.8	1.9
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

食を通じたコミュニケーションの状況

問20 あなたは、家族や友達と食卓を囲み、食事を楽しむ機会を持つなど、食を通じたコミュニケーションをとっていますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	毎食している	人 数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合 標準誤差	20.0 6.2	25.7 5.1	23.0 4.7	19.6 4.8	32.1 3.9	30.0 3.0	23.2 3.4	22.2 3.5	31.5 2.7	25.1 2.1	25.2 2.1
	ほとんどしている	人 数	37.3	30.7	28.8	35.8	13.2	16.3	33.6	28.9	15.4	25.5	25.9
		割合 標準誤差	8.8 3.7	8.0 3.2	4.3 2.8	5.3 4.2	2.8 3.5	2.8 3.2	6.0 3.3	3.6 3.3	2.5 2.1	3.3 2.1	3.3 2.2
	時々々している	人 数	37.7	32.2	28.3	28.9	31.3	31.0	34.6	30.1	30.1	31.7	31.5
		割合 標準誤差	5.8 4.5	8.5 3.1	5.6 4.1	4.2 3.1	3.5 3.3	3.2 2.6	5.6 2.3	3.3 2.2	3.3 2.4	2.1 1.3	2.2 1.3
	あまりしていない	人 数	4.5	8.9	16.0	10.0	17.4	15.2	7.0	13.1	16.3	12.9	12.7
		割合 標準誤差	2.4 0.5	3.1 2.5	4.1 3.9	3.1 5.7	3.3 6.1	2.6 7.2	2.3 7.2	2.2 5.6	2.4 6.4	1.3 4.7	1.3 4.7
	全くしていない	人 数	0.5	2.5	3.9	5.7	6.1	7.2	1.6	5.6	6.4	4.7	4.7
		割合 標準誤差	0.5 0.0	1.5 0.0	2.0 0.0	1.9 0.0	2.3 0.0	2.3 0.3	0.8 0.0	1.7 0.0	1.1 0.2	1.1 0.1	1.1 0.1
	無回答	人 数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.3	0.0 0.3	0.0 0.2	0.0 0.2	0.1 0.1	0.1 0.1
男 性	毎食している	人 数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合 標準誤差	23.7 11.7	9.2 4.4	14.4 6.6	16.2 6.1	26.3 5.6	30.5 4.4	15.7 4.7	17.6 3.8	29.2 3.8	20.1 2.7	20.5 2.7
	ほとんどしている	人 数	27.9	25.7	17.5	30.1	14.3	20.6	26.7	21.0	20.0	22.1	22.3
		割合 標準誤差	8.1 3.6	9.0 4.8	4.5 3.7	5.5 3.2	3.9 2.8	3.9 2.4	6.4 4.3	2.6 3.5	4.1 2.4	2.8 3.5	3.0 3.2
	時々々している	人 数	36.7	48.8	37.5	32.9	28.2	24.6	43.4	35.0	24.4	34.5	34.2
		割合 標準誤差	9.2 4.2	13.0 6.2	9.7 6.2	6.2 4.5	5.0 4.3	4.5 2.5	6.9 2.5	5.3 4.2	4.2 2.5	2.5 2.5	2.5 2.5
	あまりしていない	人 数	10.6	12.4	23.1	9.2	22.8	16.1	11.6	16.6	18.6	16.3	16.0
		割合 標準誤差	4.7 1.1	5.3 3.9	6.4 7.5	3.2 11.6	5.8 8.4	4.3 8.1	3.9 2.6	3.9 9.7	3.9 7.8	2.3 7.0	2.2 7.0
	全くしていない	人 数	1.1	3.9	7.5	11.6	8.4	8.1	2.6	9.7	7.8	7.0	7.0
		割合 標準誤差	1.1 0.0	2.6 0.0	3.8 0.0	4.0 0.0	3.5 0.0	2.8 0.0	1.5 0.0	3.0 0.0	2.5 0.0	1.6 0.0	1.6 0.0
	無回答	人 数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
女 性	毎食している	人 数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合 標準誤差	17.2 7.4	37.1 6.9	31.5 7.8	22.8 6.0	37.0 5.0	29.6 3.9	28.5 4.3	26.8 5.0	33.2 3.7	29.9 2.6	29.8 2.6
	ほとんどしている	人 数	44.3	34.2	40.0	41.3	12.3	12.9	38.5	36.8	11.9	28.9	29.5
		割合 標準誤差	11.3 3.8	10.1 3.4	7.4 4.1	5.4 4.2	4.1 2.8	2.8 3.5	7.0 3.5	5.4 3.7	2.4 3.1	4.1 3.1	4.2 3.1
	時々々している	人 数	38.5	20.8	19.1	25.0	33.8	36.0	28.4	25.2	34.5	29.0	28.8
		割合 標準誤差	8.9 0.0	6.4 3.9	5.1 3.6	4.3 5.4	4.7 3.9	3.5 3.9	5.4 2.3	3.7 2.7	3.5 3.6	3.1 1.6	3.1 1.6
	あまりしていない	人 数	0.0	6.4	9.0	10.8	12.8	14.4	3.7	9.6	14.6	9.6	9.4
		割合 標準誤差	0.0 0.0	3.9 0.0	3.6 0.4	5.4 0.0	3.9 4.2	3.9 6.5	2.3 0.9	2.7 1.5	3.6 5.3	1.6 2.5	1.6 2.3
	全くしていない	人 数	0.0	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.3	2.5	2.3
		割合 標準誤差	0.0 0.0	1.6 0.0	0.4 0.0	0.0 0.0	2.6 0.0	2.2 0.6	0.9 0.0	1.1 0.0	1.8 0.4	0.8 0.1	0.8 0.1
	無回答	人 数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
		割合 標準誤差	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.4 0.4	0.1 0.1	0.1 0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(2)体重及び生活習慣等に関する状況

高血圧(血圧が高い)と言われたことのある者の割合(%)

問21 あなたはこれまでに医療機関や健診で高血圧(血圧が高い)と言われたことがありますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
総数	ある	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023	
		割合	4.0	6.8	17.0	25.6	45.6	50.8	5.6	25.0	50.0	27.1	27.2	
		標準誤差	2.4	3.0	3.3	4.2	3.5	3.6	2.6	2.5	3.0	2.0	1.9	
		割合	96.0	93.2	83.0	74.4	54.4	48.9	94.4	75.0	49.7	72.8	72.7	
	ない	標準誤差	2.4	3.0	3.3	4.2	3.5	3.6	2.6	2.5	3.0	2.0	1.9	
無回答		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	
		男性	ある	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472
	割合			8.4	7.7	20.5	38.3	49.5	59.5	8.0	31.9	58.3	31.7	32.9
標準誤差	5.6			3.6	5.2	5.9	5.7	5.8	3.0	3.6	4.7	2.0	2.0	
割合	91.6			92.3	79.5	61.7	50.5	39.7	92.0	68.1	41.2	68.2	67.0	
ない	標準誤差		5.6	3.6	5.2	5.9	5.7	5.7	3.0	3.6	4.6	2.0	2.0	
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	
		女性	ある	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551
割合				0.8	6.1	13.4	13.4	42.4	43.9	3.8	18.0	43.7	22.6	21.6
標準誤差	0.8			4.8	4.2	4.3	4.4	5.9	2.9	3.0	4.7	2.8	2.8	
割合	99.2			93.9	86.6	86.6	57.6	56.1	96.2	82.0	56.3	77.4	78.4	
ない	標準誤差		0.8	4.8	4.2	4.3	4.4	5.9	2.9	3.0	4.7	2.8	2.8	
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

高血圧の治療を受けている者の状況(%)

問21-1 現在、高血圧の治療(通院)による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けていますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	受けている	人数	4	10	29	46	102	157	14	113	221	348	348
		割合	0.0	42.7	23.9	37.9	82.7	89.6	29.1	45.8	88.5	68.5	68.9
	受けていない	標準誤差	0.0	10.9	8.7	11.6	4.3	2.5	8.0	6.8	2.3	4.0	4.1
		割合	100.0	57.3	76.1	62.1	17.0	10.4	70.9	53.9	11.5	31.4	31.0
男性	受けている	人数	3	6	17	28	47	73	9	63	102	174	174
		割合	0.0	41.0	38.1	32.1	80.5	87.2	21.7	44.8	86.2	64.1	65.4
	受けていない	標準誤差	0.0	21.9	14.0	12.3	5.8	3.9	14.0	9.0	3.0	5.7	5.5
		割合	100.0	59.0	61.9	67.9	19.5	12.8	78.3	55.2	13.8	35.9	34.6
女性	受けている	人数	1	4	12	18	55	84	5	50	119	174	174
		割合	0.0	44.1	2.3	53.8	84.8	92.2	40.2	47.7	90.9	74.6	74.2
	受けていない	標準誤差	0.0	6.4	2.4	13.1	5.5	2.8	9.3	6.8	3.1	4.1	4.2
		割合	100.0	55.9	97.7	46.2	14.5	7.8	59.8	51.5	9.1	25.2	25.6
無回答	受けていない	人数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	0.2
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	0.3
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	0.3

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

血中コレステロール(総コレステロールまたはLDLコレステロール)が高いと言われたことのある者の割合(%)

問22 あなたはこれまでに医療機関や健診で血中コレステロール(総コレステロールまたはLDLコレステロール)が高いと言われたことがありますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	ある	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	7.8	15.9	27.6	48.2	56.0	44.1	12.4	40.7	47.9	35.0	34.8
	ない	標準誤差	3.9	2.2	4.8	3.7	3.5	3.3	2.7	3.0	3.0	2.0	1.9
		割合	92.2	84.1	72.4	51.8	44.0	55.3	87.6	59.3	51.6	64.9	65.1
男性	ある	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	12.2	31.2	33.8	47.4	52.0	31.8	22.7	44.1	35.7	35.4	35.7
	ない	標準誤差	8.0	6.9	7.3	6.4	4.9	5.6	6.4	3.7	4.8	3.0	3.0
		割合	87.8	68.8	66.2	52.6	48.0	67.4	77.3	55.9	63.8	64.5	64.1
女性	ある	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	4.6	5.4	21.5	49.0	59.3	53.8	5.1	37.3	57.2	34.6	33.8
	ない	標準誤差	3.6	2.6	7.4	5.2	4.4	3.9	2.2	3.8	3.3	2.6	2.6
		割合	95.4	94.6	78.5	51.0	40.7	45.6	94.9	62.7	42.4	65.3	66.0
無回答	ある	人数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
	ない	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

血中コレステロールの治療を受けている者の状況(%)

問22-1 現在、血中コレステロール(脂質異常症)の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けていますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	受けている	人数	6	16	44	70	108	130	22	150	202	374	374
		割合	26.2	16.0	17.1	35.1	50.2	67.4	18.8	34.6	61.0	43.0	43.1
	受けていない	標準誤差	23.0	9.6	5.4	8.7	5.2	3.2	12.4	6.4	2.8	3.8	3.9
		割合	73.8	84.0	82.9	64.9	49.8	29.4	81.2	65.4	36.9	56.2	56.2
	無回答	標準誤差	23.0	9.6	5.4	8.7	5.2	3.6	12.4	6.4	3.2	3.4	3.5
割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	2.1	0.8	0.7
男性	受けている	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	2.1	0.8	0.7
		人数	3	11	28	32	44	45	14	78	71	163	163
	受けていない	割合	39.6	7.4	24.7	36.5	51.9	68.4	15.2	36.4	63.3	39.5	40.5
		標準誤差	32.6	6.1	7.1	10.6	8.8	8.2	9.6	6.8	6.8	5.0	5.0
	無回答	割合	60.4	92.6	75.3	63.5	48.1	31.6	84.9	63.6	36.7	60.5	59.5
標準誤差		32.6	6.1	7.1	10.6	8.8	8.2	9.6	6.8	6.8	5.0	5.0	5.0
女性	受けている	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	受けていない	人数	3	5	16	38	64	85	8	72	131	211	211
		割合	0.0	50.1	5.2	33.8	48.9	67.0	30.4	32.5	59.9	46.6	45.8
	無回答	標準誤差	0.0	28.8	5.6	10.8	5.8	5.1	24.0	7.5	4.1	4.3	4.2
割合		100.0	49.9	94.8	66.2	51.1	28.4	69.6	67.5	37.0	51.8	52.7	52.7
	受けていない	標準誤差	0.0	28.8	5.6	10.8	5.8	4.1	24.0	7.5	3.8	3.9	3.9
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.1	1.6	1.4
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	3.2	1.6	1.4

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

過去1ヶ月間の健康状態(%)

問23 全体的に見て、過去1ヶ月間のあなたの健康状態はいかがでしたか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総 数	最高に良い	人 数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	3.7	8.1	4.5	0.3	4.8	1.3	6.2	3.2	1.9	3.7	3.6
	とても良い	標準誤差	2.7	4.2	2.3	0.0	1.6	0.8	2.5	1.1	0.7	0.8	0.8
		割合	18.0	14.9	11.7	13.0	13.6	12.7	16.3	12.4	13.1	13.9	14.0
	良い	標準誤差	4.8	3.5	3.4	4.2	3.4	2.5	3.2	2.3	2.4	2.0	2.0
		割合	50.4	60.8	60.1	59.4	66.0	63.9	56.2	61.1	64.2	60.2	60.6
	あまり良くない	標準誤差	4.6	5.9	4.6	5.6	4.6	3.6	4.2	2.7	3.5	2.0	2.1
		割合	23.4	12.3	19.6	24.5	12.7	18.8	17.1	20.1	17.4	18.4	18.2
	良くない	標準誤差	5.1	4.4	2.9	4.8	2.9	2.3	3.7	2.8	2.2	1.7	1.7
		割合	3.1	1.8	3.9	1.8	1.8	1.6	2.4	2.7	1.6	2.5	2.4
男 性	最高に良い	標準誤差	2.7	1.2	1.4	1.5	0.7	0.8	1.4	0.8	0.6	0.6	0.5
		割合	1.3	2.1	0.1	0.8	1.3	1.4	1.7	0.4	1.5	1.2	1.2
	とても良くない	標準誤差	1.3	1.2	0.1	0.6	1.2	0.8	0.9	0.3	0.7	0.4	0.4
		割合	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1
		割合	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1
	最高に良い	人 数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	1.3	4.5	7.3	0.7	4.4	0.0	3.1	4.6	0.5	3.2	3.0
	とても良い	標準誤差	1.0	4.1	4.4	0.5	2.4	0.0	2.4	1.7	0.5	1.1	1.0
		割合	19.4	16.3	13.1	15.9	15.9	14.6	17.7	14.3	15.5	15.7	15.7
女 性	良い	標準誤差	1.12	7.8	4.8	6.2	5.6	4.4	8.9	4.1	4.0	4.0	4.1
		割合	37.9	52.6	60.9	58.4	69.1	73.8	46.0	60.8	73.2	59.9	60.2
	あまり良くない	標準誤差	1.17	8.4	8.6	6.9	7.0	4.2	6.1	3.6	3.8	2.8	2.7
		割合	31.0	16.9	14.4	20.8	8.7	10.7	23.2	16.6	9.5	16.3	16.2
	良くない	標準誤差	10.4	6.8	5.3	4.9	3.3	3.0	6.0	3.2	2.3	2.6	2.5
		割合	7.4	4.5	4.0	3.7	1.9	0.9	5.8	3.4	1.3	3.6	3.5
	ぜんぜん良くない	標準誤差	6.5	2.9	2.5	2.9	1.3	0.7	3.5	1.5	0.7	1.2	1.1
		割合	3.0	5.1	0.3	0.3	0.0	0.0	4.2	0.2	0.0	1.3	1.3
	無回答	標準誤差	3.0	3.0	0.3	0.3	0.0	0.0	2.2	0.2	0.0	0.6	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
女 性	最高に良い	人 数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	5.5	10.6	1.7	0.0	5.1	2.4	8.4	1.8	2.9	4.1	4.3
	とても良い	標準誤差	4.6	6.0	1.6	0.0	2.5	1.6	3.7	1.3	1.3	1.1	1.2
		割合	17.0	14.0	10.3	10.3	11.6	11.2	15.3	10.6	11.3	12.1	12.3
	良い	標準誤差	5.2	5.4	3.6	4.6	3.1	2.3	3.7	1.9	2.1	1.8	1.9
		割合	59.7	66.4	59.3	60.4	63.4	56.0	63.5	61.4	57.3	60.6	60.9
	あまり良くない	標準誤差	6.3	8.4	4.5	10.2	5.6	5.6	6.9	4.6	5.6	3.8	4.0
		割合	17.8	9.1	24.8	28.1	15.9	25.2	12.8	23.7	23.4	20.1	20.1
	良くない	標準誤差	6.6	3.5	4.6	8.1	5.2	4.4	3.6	4.1	4.2	2.4	2.4
		割合	0.0	0.0	3.8	0.0	1.7	2.1	0.0	2.0	1.9	1.4	1.3
女 性	ぜんぜん良くない	標準誤差	0.0	0.0	2.4	0.0	0.9	1.3	0.0	1.0	1.0	0.6	0.5
		割合	0.0	0.0	0.0	1.2	2.3	2.4	0.0	0.5	2.7	1.1	1.1
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	2.2	1.4	0.0	0.5	1.3	0.6	0.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
	最高に良い	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1

注:値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

この1年間で体重が3kg以上増加した者の状況(%)
問24 この1年間で体重が3kg以上増加しましたか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい いいえ 無回答	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	21.4	27.2	19.1	8.6	7.3	7.1	24.7	13.7	6.2	14.6	14.5
		標準誤差	6.0	4.4	2.6	2.6	2.8	1.9	4.1	2.2	1.3	2.3	2.3
		割合	78.6	72.8	80.9	91.4	92.7	92.9	75.3	86.3	93.8	85.4	85.5
男性	はい いいえ 無回答	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	20.6	24.3	16.0	13.6	8.2	6.3	22.6	15.5	4.8	14.5	14.2
		標準誤差	11.6	7.7	5.7	4.2	5.2	3.5	5.1	4.0	2.7	3.4	3.3
		割合	79.4	75.7	84.0	86.4	91.8	93.7	77.4	84.5	95.2	85.5	85.8
女性	はい いいえ 無回答	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	22.0	29.2	22.3	3.9	6.5	7.6	26.1	11.9	7.2	14.7	14.9
		標準誤差	6.8	5.5	4.0	2.7	2.7	2.3	5.1	2.8	1.5	2.4	2.5
		割合	78.0	70.8	77.7	96.1	93.5	92.4	73.9	88.1	92.8	85.3	85.1
無回答	割合	人数	6.8	5.5	4.0	2.7	2.7	2.3	5.1	2.8	1.5	2.4	2.5
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

この1年間で体重が3kg以上減少した者の状況(%)
問25 この1年間で体重が3kg以上減少しましたか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい いいえ 無回答	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	8.8	12.5	10.2	11.0	9.5	7.8	10.8	11.0	7.7	9.7	9.8
		標準誤差	3.6	5.4	2.5	3.2	3.2	2.0	3.5	1.9	1.5	1.3	1.3
		割合	91.2	87.5	89.8	89.0	90.5	92.2	89.2	89.0	92.3	90.3	90.2
男性	はい いいえ 無回答	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	9.4	4.7	13.7	6.5	10.8	8.4	6.8	11.7	7.4	9.1	8.9
		標準誤差	6.5	2.7	5.7	3.0	5.2	2.8	3.4	3.1	2.2	1.9	1.8
		割合	90.6	95.3	86.3	93.5	89.2	91.6	93.2	88.3	92.6	90.9	91.1
女性	はい いいえ 無回答	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	8.3	17.7	6.7	15.4	8.4	7.3	13.7	10.4	7.9	10.3	10.7
		標準誤差	3.6	8.7	2.6	5.7	4.3	2.7	5.6	2.9	2.4	2.3	2.5
		割合	91.7	82.3	93.3	84.6	91.6	92.7	86.3	89.6	92.1	89.7	89.3
無回答	割合	人数	3.6	8.7	2.6	5.7	4.3	2.7	5.6	2.9	2.4	2.3	2.5
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

6. 食習慣・生活習慣別の体型・食塩摂取量の比較

食習慣・生活習慣別 BMIの比較(20歳以上、男女)

			20-39歳			40-64歳			65歳以上		
			人数	BMI平均	P値	人数	BMI平均	P値	人数	BMI平均	P値
男性	外食の頻度	週2～3回以上	29	22.8		61	24.5		23	23.4	
		週1回以下	49	23.2		103	23.9		152	23.1	
	持ち帰り弁当の頻度	週2～3回以上	31	23.3		63	24.4		34	23.3	
		週1回以下	47	22.8		101	23.9		141	23.1	
	朝食摂取	毎日	45	23.0		120	23.8	0.0767	164	23.0	
		欠食あり	33	23.0		44	24.9		11	24.2	
	食べる速さ	速い	32	24.1	0.0098	67	24.6	0.0592	50	23.9	0.0155
		普通	46	22.3		97	23.7		125	22.8	
	満腹まで食べる	はい	55	23.5	0.0332	102	24.4		74	23.7	0.0172
		いいえ	23	21.8		62	23.7		101	22.7	
	遅い夕食(週3回以上)	はい	38	23.3		65	23.9		38	23.3	
		いいえ	40	22.8		99	24.3		137	23.1	
	夕食(週3回以上)	はい	19	22.8		30	24.9		22	24.4	0.0250
		いいえ	59	23.1		134	23.9		153	22.9	
	清涼飲料水の摂取頻度(毎日)	はい	42	22.8		77	24.0		69	23.3	
		いいえ	36	23.2		87	24.2		106	23.0	
	ゆっくりよくかんで食事をする	はい	37	22.0	0.0055	69	23.9		97	22.4	0.0004
		いいえ	41	24.0		95	24.2		78	23.9	
	飲酒量	2合未満	64	23.1		128	24.2		159	23.0	0.0922
		2合以上	14	22.9		36	23.9		16	24.2	
女性	外食の頻度	週2～3回以上	23	21.7		16	22.8		9	21.1	
		週1回以下	61	22.0		162	22.4		201	23.1	
	持ち帰り弁当の頻度	週2～3回以上	26	24.1	0.0035	51	22.4		44	23.0	
		週1回以下	58	20.9		127	22.5		166	23.0	
	朝食摂取	毎日	57	21.9		153	22.4		197	23.0	
		欠食あり	27	21.9		25	22.8		13	23.3	
	食べる速さ	速い	21	22.5		42	23.1		38	24.6	0.0054
		普通	63	21.7		136	22.3		172	22.7	
	満腹まで食べる	はい	60	22.4	0.0967	103	23.1	0.0057	108	23.7	0.0062
		いいえ	24	20.6		75	21.6		102	22.3	
	遅い夕食(週3回以上)	はい	22	23.5	0.0660	31	22.2		38	23.7	
		いいえ	62	21.4		147	22.5		172	22.9	
	夕食(週3回以上)	はい	21	21.0		47	21.9		24	24.3	0.0768
		いいえ	63	22.2		131	22.7		186	22.8	
	清涼飲料水の摂取頻度(毎日)	はい	37	21.8		67	22.5		59	23.7	
		いいえ	47	22.0		111	22.4		151	22.7	
	ゆっくりよくかんで食事をする	はい	49	21.8		89	22.4		130	22.8	
		いいえ	35	22.1		89	22.5		80	23.4	
	飲酒量	2合未満	74	22.2		166	22.5		207	23.0	
		2合以上	10	19.7		12	22.4		3	22.7	

※算術平均値(重み付けのない平均値)を用いている。

食習慣・生活習慣別 肥満者の割合の比較(20歳以上、男女)

			20-39歳			40-64歳			65歳以上		
			人数	肥満(%)	P値	人数	肥満(%)	P値	人数	肥満(%)	P値
男性	外食の頻度	週2～3回以上	29	13.8	0.0449	61	39.3	0.0800	23	21.7	
		週1回以下	49	34.7		103	26.2		152	21.1	
	持ち帰り弁当の頻度	週2～3回以上	31	29.0		63	36.5		34	26.5	
		週1回以下	47	25.5		101	27.7		141	19.9	
	朝食摂取	毎日	45	33.3		120	28.3		164	20.7	
		欠食あり	33	18.2		44	38.6		11	27.3	
	食べる速さ	速い	32	40.6	0.0228	67	34.3		50	26.0	
		普通	46	17.4		97	28.9		125	19.2	
	満腹まで食べる	はい	55	32.7	0.0756	102	35.3		74	25.7	
		いいえ	23	13.0		62	24.2		101	17.8	
	遅い夕食(週3回以上)	はい	38	28.9		65	26.2		38	23.7	
		いいえ	40	25.0		99	34.3		137	20.4	
	夜食(週3回以上)	はい	19	15.8		30	36.7		22	27.3	
		いいえ	59	30.5		134	29.9		153	20.3	
	清涼飲料水の摂取頻度 (毎日)	はい	42	23.8		77	31.2		69	20.3	
		いいえ	36	30.6		87	31.0		106	21.7	
	ゆっくりよくかんで食事をする	はい	37	18.9		69	29.0		97	15.5	0.0404
		いいえ	41	34.1		95	32.6		78	28.2	
	飲酒量	2合未満	64	29.7		128	31.3		159	20.8	
		2合以上	14	14.3		36	30.6		16	25.0	
女性	外食の頻度	週2～3回以上	23	8.7		16	12.5		9	11.1	
		週1回以下	61	14.8		162	21.6		201	25.4	
	持ち帰り弁当の頻度	週2～3回以上	26	23.1	0.0709	51	19.6		44	25.0	
		週1回以下	58	8.6		127	21.3		166	24.7	
	朝食摂取	毎日	57	14.0		153	20.3		197	24.4	
		欠食あり	27	11.1		25	24.0		13	30.8	
	食べる速さ	速い	21	14.3		42	26.2		38	42.1	0.006
		普通	63	12.7		136	19.1		172	20.9	
	満腹まで食べる	はい	60	13.3		103	22.3		108	27.8	
		いいえ	24	12.5		75	18.7		102	21.6	
	遅い夕食(週3回以上)	はい	22	22.7		31	19.4		38	34.2	
		いいえ	62	9.7		147	21.1		172	22.7	
	夜食(週3回以上)	はい	21	9.5		47	14.9		24	45.8	0.0109
		いいえ	63	14.3		131	22.9		186	22.0	
	清涼飲料水の摂取頻度 (毎日)	はい	37	13.5		67	25.4		59	30.5	
		いいえ	47	12.8		111	18.018		151	22.517	
	ゆっくりよくかんで食事をする	はい	49	12.4		89	21.3		130	23.8	
		いいえ	35	14.3		89	20.2		80	26.3	
	飲酒量	2合未満	74	14.9		166	21.7		207	24.6	
		2合以上	10	0.0		12	8.3		3	33.3	

※算術平均値(重み付けのない平均値)を用いている。

肥満: BMI \geq 25kg/m²

食習慣・生活習慣別 1日の食塩摂取量(g)の比較(20歳以上、男女)

			20-39歳			40-64歳			65歳以上		
			人数	g	P値	人数	g	P値	人数	g	P値
男性	外食の頻度	週2～3回以上	29	10.2		61	10.7		23	11.4	
		週1回以下	49	10.1		103	10.9		152	11.3	
	持ち帰り弁当の頻度	週2～3回以上	31	10.0		63	10.3		34	10.3	0.0685
		週1回以下	47	10.2		101	11.1		141	11.6	
	朝食摂取	毎日	45	10.0		120	11.2	0.0077	164	11.5	0.0273
		欠食あり	33	10.3		44	9.6		11	8.9	
	家庭料理の味付けが濃い	はい	32	9.7		55	10.6		47	12.4	0.0203
		いいえ	46	10.4		109	10.9		128	10.9	
	汁物の摂取頻度(1日2杯以上)	はい	25	10.8		48	11.6		52	12.0	
		いいえ	53	9.8		116	10.5		123	11.1	
	丼物、カレー、麺類の摂取頻度(週3日以上)	はい	37	10.9		49	11.1		22	11.1	
		いいえ	41	9.4		115	10.7		153	11.4	
	麺類の汁を全部飲む	はい	27	11.0		73	11.6	0.0065	52	11.8	
		いいえ	51	9.7		91	10.2		123	11.2	
	塩蔵品の摂取頻度(週3日以上)	はい	10	12.4	0.0268	24	11.0		42	11.9	
		いいえ	68	9.8		140	10.8		133	11.2	
	味付け済み食品に醤油やソースをかける	はい	15	10.3		45	11.5		48	11.7	
		いいえ	63	10.1		119	10.5		127	11.2	
	漬け物の摂取頻度(1日2回以上)	はい	7	12.1		22	11.6		51	12.2	0.0697
		いいえ	71	9.9		142	10.7		124	11.0	
	1日の食塩摂取目標量を知っている	はい	2	10.8		15	10.7		38	10.6	
		いいえ	76	10.1		149	10.8		137	11.5	
	食品の食塩表示を参考にする	はい	9	11.8		38	9.7	0.0273	53	11.2	
		いいえ	69	9.9		126	11.1		122	11.4	
	減塩取組状況	積極的・少し	16	10.0		70	10.5		114	11.0	0.0843
		あまり・全く	62	10.1		94	11.0		61	12.0	
女性	外食の頻度	週2～3回以上	23	8.8		16	10.3		9	8.3	
		週1回以下	61	8.5		162	9.3		201	9.7	
	持ち帰り弁当の頻度	週2～3回以上	26	8.6		51	9.1		44	9.4	
		週1回以下	58	8.5		127	9.5		166	9.8	
	朝食摂取	毎日	57	9.3	0.0013	153	9.5		197	9.7	
		欠食あり	27	6.9		25	8.6		13	8.8	
	家庭料理の味付けが濃い	はい	30	7.7	0.0997	62	10.0	0.0976	63	9.9	
		いいえ	54	9.0		116	9.1		147	9.6	
	汁物の摂取頻度(1日2杯以上)	はい	21	10.2	0.0083	32	10.2		48	11.5	<0.0001
		いいえ	63	8.0		146	9.2		162	9.1	
	丼物、カレー、麺類の摂取頻度(週3日以上)	はい	17	9.7		21	9.3		12	9.1	
		いいえ	67	8.2		157	9.4		198	9.7	
	麺類の汁を全部飲む	はい	11	8.6		26	10.5		26	9.6	
		いいえ	73	8.5		152	9.2	0.0711	184	9.7	
	塩蔵品の摂取頻度(週3日以上)	はい	5	9.9		19	9.8		47	10.9	0.0034
		いいえ	79	8.5		159	9.3		163	9.3	
	味付け済み食品に醤油やソースをかける	はい	7	8.3		10	9.9		19	9.9	
		いいえ	77	8.6		168	9.4		191	9.7	
	漬け物の摂取頻度(1日2回以上)	はい	7	10.7	0.0777	23	11.2	0.0053	62	11.3	<0.0001
		いいえ	77	8.3		155	9.1		148	9.0	
	1日の食塩摂取目標量を知っている	はい	14	9.8		35	9.0		69	9.8	
		いいえ	70	8.3		143	9.5		141	9.6	
	食品の食塩表示を参考にする	はい	24	9.0		76	8.7	0.0209	86	9.7	
		いいえ	60	8.4		102	9.9		124	9.7	
	減塩取組状況	積極的・少し	30	9.4	0.0836	121	9.1	0.0833	165	9.7	
		あまり・全く	54	8.1		57	10.0		45	9.7	

※算術平均値(重み付けのない平均値)を用いている。

食習慣・生活習慣別 1日の食塩摂取量(g/1000kcal)の比較(20歳以上、男女)

			20-39歳		40-64歳		65歳以上	
			人数	g/1000kcal P値	人数	g/1000kcal P値	人数	g/1000kcal P値
男性	外食の頻度	週2～3回以上	29	4.8	61	5.3	23	5.4
		週1回以下	49	5.2	103	5.3	152	5.6
	持ち帰り弁当の頻度	週2～3回以上	31	5.1	63	5.2	34	5.1
		週1回以下	47	5.0	101	5.4	141	5.6
	朝食摂取	毎日	45	5.0	120	5.4	164	5.6
		欠食あり	33	5.2	44	5.3	11	4.3
	家庭料理の味付けが濃い	はい	32	5.3	55	5.3	47	5.7
		いいえ	46	4.9	109	5.4	128	5.5
	汁物の摂取頻度(1日2杯以上)	はい	25	5.0	48	5.6	52	5.6
		いいえ	53	5.1	116	5.2	123	5.5
	丼物、カレー、麺類の摂取頻度(週3日以上)	はい	37	5.1	49	5.6	22	5.5
		いいえ	41	5.0	115	5.2	153	5.6
	麺類の汁を全部飲む	はい	27	5.6	73	5.6	52	5.4
		いいえ	51	4.8	91	5.1	123	5.6
	塩蔵品の摂取頻度(週3日以上)	はい	10	6.2	24	5.5	42	5.7
		いいえ	68	4.9	140	5.3	133	5.5
	味付け済み食品に醤油やソースをかける	はい	15	4.7	45	5.7	48	5.4
		いいえ	63	5.1	119	5.2	127	5.6
	漬け物の摂取頻度(1日2回以上)	はい	7	5.1	22	5.8	51	5.8
		いいえ	71	5.0	142	5.3	124	5.5
	1日の食塩摂取目標量を 知っている	はい	2	6.8	15	4.7	38	5.5
		いいえ	76	5.0	149	5.4	137	5.6
	食品の食塩表示を参考にする	はい	9	5.6	38	4.7	53	5.7
		いいえ	69	5.0	126	5.5	122	5.5
	減塩取組状況	積極的・少し あまり・全く	16 62	5.0 5.1	70 94	5.3 5.4	114 61	5.5 5.7
女性	外食の頻度	週2～3回以上	23	4.9	16	5.8	9	5.4
		週1回以下	61	5.5	162	5.4	201	5.7
	持ち帰り弁当の頻度	週2～3回以上	26	5.1	51	5.2	44	5.6
		週1回以下	58	5.4	127	5.6	166	5.6
	朝食摂取	毎日	57	5.5	153	5.5	197	5.7
		欠食あり	27	4.9	25	4.9	13	4.6
	家庭料理の味付けが濃い	はい	30	5.0	62	5.6	63	5.5
		いいえ	54	5.5	116	5.4	147	5.7
	汁物の摂取頻度(1日2杯以上)	はい	21	6.0	32	5.6	48	6.5
		いいえ	63	5.1	146	5.4	162	5.4
	丼物、カレー、麺類の摂取頻度(週3日以上)	はい	17	5.7	21	5.1	12	5.8
		いいえ	67	5.2	157	5.5	198	5.6
	麺類の汁を全部飲む	はい	11	5.2	26	5.7	26	5.7
		いいえ	73	5.3	152	5.4	184	5.6
	塩蔵品の摂取頻度(週3日以上)	はい	5	5.3	19	5.8	47	5.9
		いいえ	79	5.3	159	5.4	163	5.6
	味付け済み食品に醤油やソースをかける	はい	7	5.3	10	5.2	19	5.9
		いいえ	77	5.3	168	5.5	191	5.6
	漬け物の摂取頻度(1日2回以上)	はい	7	5.6	23	6.4	62	6.2
		いいえ	77	5.3	155	5.3	148	5.4
	1日の食塩摂取目標量を 知っている	はい	14	5.6	35	5.1	69	5.4
		いいえ	70	5.3	143	5.5	141	5.8
	食品の食塩表示を参考にする	はい	24	5.3	76	5.2	86	5.7
		いいえ	60	5.3	102	5.7	124	5.6
	減塩取組状況	積極的・少し あまり・全く	30 54	5.9 5.0	121 57	5.4 5.6	165 45	5.6 5.8

※算術平均値(重み付けのない平均値)を用いている。

食塩過剰摂取につながる食習慣の数別 食塩摂取量の平均値(20歳以上、男女)

性別	回答		20～39歳	P for trend	40～64歳	P for trend	65歳以上	P for trend
男性	0つ	人数	16	0.0255	29	0.0001	50	0.022
		食塩相当量 (g)	8.4		9.2		10.3	
	1つ	人数	25		53		42	
		食塩相当量 (g)	10.1		10.2		11.6	
	2つ以上	人数	37		82		83	
		食塩相当量 (g)	10.8		11.8		11.9	
女性	0つ	人数	37	0.0019	95	0.0042	88	P<0.001
		食塩相当量 (g)	7.4		8.7		8.6	
	1つ	人数	30		48		57	
		食塩相当量 (g)	9.0		10.2		9.9	
	2つ以上	人数	17		35		65	
		食塩相当量 (g)	10.3		10.3		11.0	

※算術平均値(重み付けのない平均値)を用いている。

IV 参考

(重み付けしていない平均値の結果)

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(1歳以上、全体、年齢階級別)

	総 数				1-6歳				7-14歳				15-19歳				20-29歳			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	1090				49				70				45				75			
エネルギー(kcal)	1883 ¹	571 ¹	20 ¹	1857	1277 ¹	439 ¹	48 ¹	1273	1918 ¹	529 ¹	71 ¹	1867	2331 ¹	860 ¹	121 ¹	2212	1973 ¹	745 ¹	88 ¹	1841
たんぱく質(g)	70.2 ¹	22.6 ¹	0.9 ¹	68.2	44.9 ¹	17.4 ¹	2.1 ¹	41.0	70.9 ¹	17.8 ¹	2.5 ¹	66.7	82.4 ¹	32.6 ¹	4.1 ¹	77.8	75.0 ¹	30.0 ¹	3.9 ¹	73.3
うち動物性(g)	38.2 ¹	17.3 ¹	0.7 ¹	36.3	25.7 ¹	13.7 ¹	1.7 ¹	21.3	42.9 ¹	13.3 ¹	2.1 ¹	41.1	49.6 ¹	25.8 ¹	3.1 ¹	45.2	43.3 ¹	22.5 ¹	2.6 ¹	39.0
脂質(g)	58.6 ¹	25.3 ¹	1.1 ¹	55.6	40.1 ¹	20.2 ¹	2.2 ¹	37.4	64.9 ¹	20.5 ¹	3.0 ¹	65.4	77.5 ¹	39.6 ¹	5.8 ¹	73.3	67.0 ¹	32.0 ¹	4.0 ¹	61.8
うち動物性(g)	29.8 ¹	16.9 ¹	0.7 ¹	27.3	22.1 ¹	14.2 ¹	2.0 ¹	18.1	38.0 ¹	14.0 ¹	2.5 ¹	36.4	43.3 ¹	25.8 ¹	3.6 ¹	35.8	36.5 ¹	22.5 ¹	2.4 ¹	30.2
飽和脂肪酸(g)	16.1 ¹	8.4 ¹	0.3 ¹	14.7	12.9 ¹	7.7 ¹	0.9 ¹	11.2	20.8 ¹	7.1 ¹	1.1 ¹	21.1	21.3 ¹	11.7 ¹	1.8 ¹	18.6	19.1 ¹	11.5 ¹	1.3 ¹	15.9
一価不飽和脂肪酸(g)	20.2 ¹	9.9 ¹	0.5 ¹	18.7	13.6 ¹	7.1 ¹	0.8 ¹	12.7	21.7 ¹	7.6 ¹	1.1 ¹	21.5	28.3 ¹	16.4 ¹	2.4 ¹	25.0	23.2 ¹	11.8 ¹	1.5 ¹	20.9
多価不飽和脂肪酸(g)	12.3 ¹	5.8 ¹	0.3 ¹	11.4	7.6 ¹	4.1 ¹	0.5 ¹	6.6	11.8 ¹	4.5 ¹	0.7 ¹	11.4	15.8 ¹	7.7 ¹	1.2 ¹	14.6	13.1 ¹	7.2 ¹	1.0 ¹	11.4
n-6系脂肪酸(g)	9.9 ¹	4.9 ¹	0.2 ¹	9.1	6.5 ¹	3.4 ¹	0.4 ¹	5.9	9.8 ¹	3.8 ¹	0.6 ¹	9.3	13.0 ¹	6.7 ¹	1.1 ¹	11.8	10.9 ¹	6.2 ¹	0.9 ¹	9.1
n-3系脂肪酸(g)	2.2 ¹	1.4 ¹	0.1 ¹	1.9	1.1 ¹	0.8 ¹	0.1 ¹	1.0	1.9 ¹	1.0 ¹	0.2 ¹	1.7	2.6 ¹	1.4 ¹	0.2 ¹	2.5	2.1 ¹	1.3 ¹	0.2 ¹	1.7
炭水化物(g)	254.3 ¹	81.1 ¹	3.3 ¹	247.9	180.2 ¹	55.3 ¹	5.8 ¹	177.7	256.0 ¹	83.2 ¹	11.2 ¹	245.5	312.8 ¹	114.0 ¹	17.0 ¹	294.6	257.8 ¹	96.4 ¹	11.0 ¹	246.4
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	9.8 ¹	3.7 ¹	0.1 ¹	9.5	5.4 ¹	2.8 ¹	0.3 ¹	5.0	8.7 ¹	2.9 ¹	0.4 ¹	8.4	11.1 ¹	3.9 ¹	0.5 ¹	10.9	9.3 ¹	3.7 ¹	0.5 ¹	8.8
食塩(g/1,000kcal)	5.3 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.1	4.1 ¹	1.3 ¹	0.2 ¹	4.2	4.6 ¹	1.0 ¹	0.1 ¹	4.5	5.0 ¹	1.9 ¹	0.2 ¹	4.4	4.9 ¹	1.6 ¹	0.2 ¹	4.7
カリウム(mg)	2373 ¹	940 ¹	47 ¹	2245	1507 ¹	643 ¹	74 ¹	1383	2178 ¹	607 ¹	103 ¹	2096	2244 ¹	956 ¹	153 ¹	2033	2242 ¹	957 ¹	145 ¹	2152
カルシウム(mg)	536 ¹	294 ¹	13 ¹	495	428 ¹	279 ¹	35 ¹	398	658 ¹	245 ¹	38 ¹	623	487 ¹	242 ¹	44 ¹	456	533 ¹	371 ¹	45 ¹	463
マグネシウム(mg)	250 ¹	95 ¹	5 ¹	242	147 ¹	59 ¹	8 ¹	143	217 ¹	60 ¹	11 ¹	209	238 ¹	91 ¹	15 ¹	232	236 ¹	97 ¹	13 ¹	230
リン(mg)	1012 ¹	344 ¹	15 ¹	978	704 ¹	329 ¹	37 ¹	652	1083 ¹	293 ¹	46 ¹	1045	1089 ¹	416 ¹	58 ¹	1041	1042 ¹	437 ¹	57 ¹	975
鉄(mg)	7.8 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	7.3	4.4 ¹	1.8 ¹	0.2 ¹	4.0	6.3 ¹	2.1 ¹	0.3 ¹	6.4	7.4 ¹	2.8 ¹	0.4 ¹	6.7	7.5 ¹	3.1 ¹	0.5 ¹	6.9
亜鉛(mg)	8.2 ¹	2.9 ¹	0.1 ¹	7.9	5.5 ¹	2.1 ¹	0.3 ¹	5.2	8.9 ¹	2.5 ¹	0.3 ¹	8.6	10.1 ¹	4.1 ¹	0.6 ¹	9.6	9.0 ¹	4.0 ¹	0.5 ¹	8.4
銅(mg)	1.15 ¹	0.40 ¹	0.02 ¹	1.10	0.68 ¹	0.21 ¹	0.03 ¹	0.66	1.03 ¹	0.31 ¹	0.05 ¹	0.99	1.25 ¹	0.44 ¹	0.07 ¹	1.16	1.12 ¹	0.42 ¹	0.06 ¹	1.09
マンガン(mg)	3.54 ¹	1.71 ¹	0.10 ¹	3.26	1.77 ¹	0.66 ¹	0.10 ¹	1.61	2.55 ¹	1.18 ¹	0.16 ¹	2.31	3.90 ¹	1.97 ¹	0.26 ¹	3.51	3.14 ¹	1.32 ¹	0.16 ¹	2.97
ヨウ素(μg)	1429 ¹	5892 ¹	290 ¹	62	253 ¹	710 ¹	96 ¹	44	909 ¹	2783 ¹	526 ¹	74	1195 ¹	4943 ¹	947 ¹	49	1378 ¹	4774 ¹	705 ¹	61
セレン(μg)	44 ¹	30 ¹	1 ¹	36	25 ¹	16 ¹	3 ¹	21	43 ¹	24 ¹	4 ¹	34	42 ¹	30 ¹	4 ¹	30	43 ¹	30 ¹	4 ¹	32
クロム(μg)	6 ¹	3 ¹	0.2 ¹	5	4 ¹	2 ¹	0.3 ¹	3	4 ¹	3 ¹	0.3 ¹	4	6 ¹	3 ¹	0.3 ¹	5	6 ¹	4 ¹	0.5 ¹	5
モリブデン(μg)	162 ¹	86 ¹	4 ¹	144	103 ¹	40 ¹	6 ¹	91	151 ¹	73 ¹	11 ¹	143	209 ¹	99 ¹	16 ¹	184	164 ¹	87 ¹	10 ¹	149
ビタミンA(μgRE)	549 ¹	593 ¹	24 ¹	439	470 ¹	266 ¹	39 ¹	422	589 ¹	378 ¹	57 ¹	502	464 ¹	350 ¹	55 ¹	398	479 ¹	303 ¹	39 ¹	442
ビタミンD(μg)	7.2 ¹	7.7 ¹	0.3 ¹	4.0	5.1 ¹	6.5 ¹	1.1 ¹	3.0	5.9 ¹	5.7 ¹	0.7 ¹	3.3	6.2 ¹	6.8 ¹	1.0 ¹	3.3	6.3 ¹	7.4 ¹	1.0 ¹	2.9
ビタミンE(mg)	6.9 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	6.3	4.4 ¹	2.2 ¹	0.3 ¹	4.0	6.1 ¹	2.7 ¹	0.4 ¹	5.8	6.9 ¹	3.8 ¹	0.6 ¹	6.4	6.7 ¹	3.5 ¹	0.4 ¹	6.2
ビタミンK(μg)	262 ¹	193 ¹	9 ¹	208	142 ¹	110 ¹	20 ¹	112	170 ¹	109 ¹	16 ¹	136	234 ¹	154 ¹	29 ¹	177	237 ¹	152 ¹	23 ¹	220
ビタミンB1(mg)	0.90 ¹	0.40 ¹	0.01 ¹	0.84	0.58 ¹	0.23 ¹	0.02 ¹	0.59	0.87 ¹	0.24 ¹	0.04 ¹	0.89	1.10 ¹	0.52 ¹	0.08 ¹	1.01	0.98 ¹	0.48 ¹	0.05 ¹	0.86
ビタミンB2(mg)	1.23 ¹	0.53 ¹	0.02 ¹	1.15	0.83 ¹	0.46 ¹	0.06 ¹	0.72	1.32 ¹	0.52 ¹	0.09 ¹	1.17	1.31 ¹	0.57 ¹	0.08 ¹	1.18	1.25 ¹	0.61 ¹	0.08 ¹	1.17
ナイアシン(mgNE)	15.0 ¹	7.1 ¹	0.3 ¹	13.9	7.6 ¹	3.5 ¹	0.4 ¹	7.2	12.0 ¹	4.4 ¹	0.5 ¹	11.2	15.4 ¹	7.9 ¹	1.2 ¹	14.1	15.0 ¹	7.5 ¹	1.0 ¹	13.6
ビタミンB6(mg)	1.18 ¹	0.49 ¹	0.02 ¹	1.11	0.72 ¹	0.32 ¹	0.04 ¹	0.65	1.05 ¹	0.31 ¹	0.05 ¹	1.02	1.27 ¹	0.58 ¹	0.08 ¹	1.12	1.17 ¹	0.57 ¹	0.07 ¹	1.14
ビタミンB12(μg)	6.1 ¹	6.0 ¹	0.3 ¹	4.1	3.0 ¹	2.9 ¹	0.5 ¹	2.1	5.6 ¹	4.8 ¹	0.6 ¹	3.9	4.6 ¹	3.3 ¹	0.5 ¹	3.5	4.6 ¹	3.8 ¹	0.5 ¹	3.4
葉酸(μg)	310 ¹	151 ¹	8 ¹	288	162 ¹	62 ¹	9 ¹	162	233 ¹	77 ¹	13 ¹	232	268 ¹	126 ¹	20 ¹	247	272 ¹	115 ¹	18 ¹	251
パントテン酸(mg)	5.71 ¹	2.02 ¹	0.09 ¹	5.54	4.03 ¹	1.75 ¹	0.23 ¹	3.70	6.15 ¹	1.66 ¹	0.28 ¹	5.78	6.24 ¹	2.48 ¹	0.37 ¹	6.29	5.87 ¹	2.51 ¹	0.34 ¹	5.79
ビオチン(μg)	24.3 ¹	16.6 ¹	0.8 ¹	22.3	12.4 ¹	6.5 ¹	1.0 ¹	11.3	19.9 ¹	10.3 ¹	1.3 ¹	18.9	20.6 ¹	9.1 ¹	1.3 ¹	19.0	21.4 ¹	11.3 ¹	1.9 ¹	19.7
ビタミンC(mg)	108 ¹	80 ¹	4 ¹	83	62 ¹	36 ¹	5 ¹	58	72 ¹	43 ¹	7 ¹	63	86 ¹	75 ¹	13 ¹	61	88 ¹	60 ¹	8 ¹	72
コレステロール(mg)	305 ¹	168 ¹	8 ¹	288	218 ¹	144 ¹	19 ¹	192	326 ¹	140 ¹	24 ¹	324	390 ¹	221 ¹	27 ¹	361	374 ¹	241 ¹	34 ¹	343
食物繊維総量(g)	14.9 ¹	6.8 ¹	0.3 ¹	14.0	8.3															

30-39歲					40-49歲					50-59歲					60-69歲					70歲以上				
平均	標準偏差	標準誤差	中央值		平均	標準偏差	標準誤差	中央值		平均	標準偏差	標準誤差	中央值		平均	標準偏差	標準誤差	中央值		平均	標準偏差	標準誤差	中央值	
100					132					147					197					275				
1822	578	67	1728		1918	558	41	1862		1874	531	42	1850		1933	492	37	1908		1860	475	35	1806	
65.5	19.9	2.2	65.2		68.5	21.5	1.8	66.0		69.1	21.3	1.5	68.4		74.8	20.7	1.6	72.1		71.0	19.8	1.7	69.7	
35.7	14.7	1.1	33.5		38.3	18.1	1.7	36.4		36.2	16.6	1.0	34.9		39.5	16.4	1.2	36.8		37.1	15.2	1.3	36.2	
58.4	25.3	2.7	55.1		62.5	26.6	1.8	58.2		58.4	24.4	2.2	55.5		58.4	22.5	2.2	57.3		53.3	20.0	1.3	51.9	
30.5	14.9	1.6	29.5		31.3	18.0	1.5	27.6		28.9	18.7	1.7	24.9		28.3	13.7	1.1	27.0		25.5	12.9	0.8	24.9	
16.3	7.8	0.7	16.6		17.0	9.5	0.7	14.6		15.7	8.4	0.7	13.7		15.2	7.2	0.6	14.3		14.3	6.4	0.4	13.5	
20.9	10.0	1.1	19.3		22.5	10.4	0.7	20.0		20.0	9.4	1.0	18.5		19.9	8.8	0.8	18.5		17.7	7.8	0.5	17.0	
11.6	6.3	0.9	10.7		12.9	5.5	0.4	12.4		12.2	5.1	0.4	11.5		12.9	5.7	0.6	12.1		11.9	5.5	0.4	10.9	
9.8	5.5	0.8	8.9		10.4	4.7	0.4	9.9		10.0	4.3	0.3	9.4		10.3	4.9	0.5	9.6		9.3	4.6	0.3	8.7	
1.8	1.2	0.2	1.5		2.3	1.4	0.1	2.1		2.1	1.1	0.1	1.9		2.5	1.6	0.1	2.1		2.4	1.5	0.1	2.1	
239.4	88.6	11.9	225.9		250.0	77.9	7.5	244.4		250.1	77.2	5.9	245.4		260.7	70.8	4.2	251.9		261.5	70.9	5.4	254.3	
9.5	3.5	0.4	9.3		10.0	3.6	0.3	9.9		10.1	3.5	0.3	10.1		10.4	3.7	0.2	9.9		10.3	3.7	0.3	9.9	
5.4	1.9	0.2	5.1		5.3	1.5	0.1	5.3		5.5	1.7	0.2	5.3		5.5	1.6	0.1	5.2		5.6	1.8	0.1	5.2	
1925	777	99	1882		2205	865	85	2149		2295	851	62	2144		2681	956	64	2660		2698	959	94	2570	
433	249	31	400		470	279	28	403		506	290	22	484		559	282	29	532		603	299	26	546	
213	80	11	206		235	85	9	227		251	92	6	243		285	97	9	280		277	95	8	259	
910	320	38	888		960	331	32	930		991	339	21	954		1075	313	25	1059		1057	317	27	1012	
6.9	2.8	0.4	6.4		7.3	2.7	0.2	7.0		7.6	2.9	0.2	7.3		8.9	3.2	0.3	8.9		8.8	3.1	0.3	8.2	
7.8	2.6	0.4	7.5		8.1	2.9	0.2	8.0		8.1	2.6	0.2	8.2		8.4	2.6	0.2	7.9		8.2	2.7	0.2	7.8	
1.03	0.40	0.06	0.98		1.07	0.35	0.03	1.06		1.13	0.37	0.03	1.08		1.26	0.38	0.03	1.25		1.26	0.41	0.03	1.20	
2.98	1.44	0.19	2.71		3.20	1.28	0.12	2.87		3.52	1.54	0.11	3.22		3.97	1.53	0.15	3.77		4.25	2.00	0.19	3.93	
726	2256	290	47		704	2202	244	58		2116	7054	677	76		1942	9176	638	70		1691	5804	425	65	
44	33	4	34		43	28	2	37		41	30	3	34		53	32	3	44		46	31	2	38	
5	3	0.4	4		6	4	0.3	5		5	3	0.3	4		6	3	0.3	6		6	3	0.3	6	
163	91	13	143		156	79	8	141		170	88	6	152		163	85	7	137		166	87	6	148	
605	1235	122	333		552	729	56	395		456	340	27	370		586	480	38	484		587	512	40	480	
5.4	7.4	0.6	2.7		6.7	7.7	0.7	3.3		6.9	7.5	0.5	3.8		8.9	9.0	0.7	6.1		8.0	7.7	0.6	5.2	
6.2	4.3	0.5	5.3		6.5	3.1	0.2	5.9		6.7	3.2	0.3	6.1		7.8	3.6	0.4	7.0		7.4	3.4	0.3	7.0	
223	165	20	177		219	147	14	178		260	180	13	218		319	232	20	254		314	211	18	275	
0.82	0.38	0.03	0.78		0.85	0.39	0.04	0.77		0.89	0.40	0.03	0.82		0.95	0.39	0.04	0.92		0.94	0.40	0.03	0.85	
1.08	0.54	0.05	0.99		1.16	0.51	0.05	1.05		1.19	0.50	0.03	1.14		1.23	0.46	0.04	1.16		1.38	0.55	0.05	1.28	
13.6	6.5	0.6	12.0		15.3	6.2	0.5	14.0		15.3	6.5	0.6	14.3		17.4	7.6	0.6	16.0		15.6	7.3	0.6	14.6	
1.00	0.42	0.05	0.92		1.15	0.56	0.05	1.05		1.12	0.41	0.03	1.10		1.32	0.49	0.04	1.29		1.29	0.48	0.04	1.20	
5.4	7.4	0.8	3.0		6.8	7.5	0.7	4.1		5.0	3.9	0.3	3.9		7.0	6.0	0.5	5.1		7.2	6.7	0.5	4.9	
254	178	21	233		274	135	11	251		297	126	10	290		363	137	12	356		380	160	15	357	
5.20	2.07	0.25	5.19		5.46	2.07	0.17	5.26		5.49	1.81	0.12	5.31		5.90	1.79	0.13	5.76		6.05	1.94	0.16	5.76	
24.0	34.4	3.6	18.4		24.7	20.2	1.6	20.9		23.8	11.4	1.1	23.0		26.0	10.2	0.8	24.9		27.8	14.2	1.2	25.8	
63	48	6	52		83	62	5	62		95	67	6	80		139	88	6	123		149	88	8	136	
299	145	13	290		315	165	13	312		286	162	15	277		308	173	15	275		287	142	11	270	
12.4	6.3	0.8	11.5		13.1	4.9	0.5	12.4		14.0	6.3	0.5	13.2		17.7	7.1	0.6	17.2		17.4	7.2	0.6	16.5	
2.8	1.4	0.2	2.6		3.1	1.3	0.1	2.8		3.1	1.5	0.1	2.9		4.1	1.8	0.2	3.9		4.1	1.8	0.1	3.8	
9.2	5.0	0.7	8.2		9.6	3.6	0.4	9.2		10.2	4.9	0.4	9.5		13.0	5.2	0.4	12.6		12.8	5.4	0.5	12.2	
28.8	7.5	1.0	29.1		29.0	8.2	0.7	29.0		27.8	7.7	0.7	27.0		26.9	7.3	0.6	26.8		25.7	6.7	0.4	25.2	
56.5	8.8	1.1	56.5		56.5	8.6	0.7	56.8		57.3	8.7	0.8	57.5		57.4	7.8	0.7	57.2		58.9	7.5	0.5	59.5	
53.5	13.1	1.6	53.6		54.2	14.2	1.7	56.6		50.9	13.6	0.9	51.1		51.6	12.4	1.0	52.9		50.9	12.1	0.8	52.1	
43.6	13.9	1.9	43.2		39.6	13.7	1.2	40.8		40.7	11.5	1.4	40.8		38.2	11.6	1.0	37.4		37.1	12.3	1.0	36.8	

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(1歳以上、全体、年齢階級別)

	(再掲) 20歳以上				(再掲) 20-39歳				(再掲) 40-64歳				(再掲) 65歳以上			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	926				175				352				399			
エネルギー(kcal)	1891 ¹	537 ¹	19 ¹	1862	1887 ¹	657 ¹	47 ¹	1774	1897 ¹	523 ¹	21 ¹	1870	1887 ¹	491 ¹	31 ¹	1876
たんぱく質(g)	70.9 ¹	21.6 ¹	0.9 ¹	69.2	69.6 ¹	25.1 ¹	1.9 ¹	67.8	69.6 ¹	20.6 ¹	0.9 ¹	67.8	72.6 ¹	20.7 ¹	1.5 ¹	71.0
うち動物性(g)	38.0 ¹	16.8 ¹	0.8 ¹	36.2	38.9 ¹	18.8 ¹	1.3 ¹	36.4	37.2 ¹	16.5 ¹	0.9 ¹	35.4	38.2 ¹	16.2 ¹	1.1 ¹	36.4
脂質(g)	58.2 ¹	24.2 ¹	1.0 ¹	55.3	62.1 ¹	28.6 ¹	2.4 ¹	57.0	60.3 ¹	25.1 ¹	1.2 ¹	57.8	54.6 ¹	20.6 ¹	1.1 ¹	52.7
うち動物性(g)	28.9 ¹	16.2 ¹	0.6 ¹	26.5	33.1 ¹	18.7 ¹	1.3 ¹	30.0	29.6 ¹	17.4 ¹	0.9 ¹	26.2	26.5 ¹	13.4 ¹	0.7 ¹	25.7
飽和脂肪酸(g)	15.7 ¹	8.1 ¹	0.3 ¹	14.4	17.5 ¹	9.6 ¹	0.6 ¹	16.4	16.2 ¹	8.7 ¹	0.4 ¹	14.5	14.5 ¹	6.5 ¹	0.4 ¹	13.7
一価不飽和脂肪酸(g)	20.0 ¹	9.4 ¹	0.4 ¹	18.5	21.9 ¹	10.9 ¹	1.0 ¹	19.5	21.0 ¹	9.8 ¹	0.5 ¹	19.1	18.3 ¹	8.1 ¹	0.5 ¹	17.4
多価不飽和脂肪酸(g)	12.4 ¹	5.7 ¹	0.3 ¹	11.4	12.3 ¹	6.7 ¹	0.7 ¹	10.8	12.7 ¹	5.5 ¹	0.2 ¹	12.0	12.2 ¹	5.5 ¹	0.3 ¹	11.3
n-6系脂肪酸(g)	10.0 ¹	4.9 ¹	0.2 ¹	9.1	10.3 ¹	5.8 ¹	0.6 ¹	9.0	10.4 ¹	4.7 ¹	0.2 ¹	9.7	9.5 ¹	4.6 ¹	0.3 ¹	8.8
n-3系脂肪酸(g)	2.2 ¹	1.4 ¹	0.1 ¹	2.0	1.9 ¹	1.3 ¹	0.1 ¹	1.6	2.2 ¹	1.3 ¹	0.1 ¹	2.0	2.4 ¹	1.6 ¹	0.1 ¹	2.1
炭水化物(g)	255.2 ¹	77.4 ¹	3.2 ¹	248.7	247.3 ¹	92.2 ¹	7.6 ¹	239.2	250.5 ¹	74.6 ¹	4.2 ¹	245.8	262.8 ¹	72.0 ¹	4.6 ¹	255.3
食塩(g) (ナトリウム×2.54/1,000)	10.1 ¹	3.6 ¹	0.1 ¹	9.8	9.4 ¹	3.6 ¹	0.3 ¹	9.1	10.1 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	10.0	10.4 ¹	3.8 ¹	0.2 ¹	9.9
食塩(g/1,000kcal)	5.4 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.2	5.2 ¹	1.8 ¹	0.2 ¹	5.0	5.4 ¹	1.6 ¹	0.1 ¹	5.3	5.6 ¹	1.8 ¹	0.1 ¹	5.2
カリウム(mg)	2440 ¹	948 ¹	46 ¹	2307	2061 ¹	870 ¹	87 ¹	2010	2339 ¹	891 ¹	48 ¹	2247	2695 ¹	961 ¹	76 ¹	2598
カルシウム(mg)	535 ¹	298 ¹	14 ¹	491	476 ¹	310 ¹	23 ¹	414	503 ¹	286 ¹	17 ¹	471	589 ¹	294 ¹	25 ¹	538
マグネシウム(mg)	258 ¹	95 ¹	5 ¹	248	223 ¹	89 ¹	9 ¹	217	252 ¹	93 ¹	5 ¹	244	279 ¹	95 ¹	7 ¹	265
リン(mg)	1019 ¹	337 ¹	15 ¹	981	967 ¹	379 ¹	32 ¹	927	992 ¹	327 ¹	15 ¹	959	1067 ¹	320 ¹	23 ¹	1029
鉄(mg)	8.1 ¹	3.1 ¹	0.1 ¹	7.6	7.2 ¹	3.0 ¹	0.3 ¹	6.7	7.7 ¹	2.9 ¹	0.2 ¹	7.3	8.8 ¹	3.2 ¹	0.2 ¹	8.4
亜鉛(mg)	8.2 ¹	2.8 ¹	0.1 ¹	7.9	8.3 ¹	3.3 ¹	0.3 ¹	7.9	8.1 ¹	2.7 ¹	0.1 ¹	8.0	8.2 ¹	2.7 ¹	0.2 ¹	7.8
銅(mg)	1.18 ¹	0.40 ¹	0.02 ¹	1.14	1.07 ¹	0.41 ¹	0.04 ¹	1.00	1.14 ¹	0.37 ¹	0.02 ¹	1.11	1.26 ¹	0.41 ¹	0.03 ¹	1.20
マンガン(mg)	3.70 ¹	1.70 ¹	0.09 ¹	3.44	3.05 ¹	1.39 ¹	0.12 ¹	2.84	3.43 ¹	1.39 ¹	0.07 ¹	3.20	4.21 ¹	1.91 ¹	0.15 ¹	3.91
ヨウ素(μg)	1542 ¹	6245 ¹	309 ¹	62	1005 ¹	3563 ¹	322 ¹	50	1461 ¹	5690 ¹	395 ¹	66	1848 ¹	7504 ¹	503 ¹	65
セレン(μg)	46 ¹	31 ¹	2 ¹	38	43 ¹	32 ¹	3 ¹	33	43 ¹	29 ¹	2 ¹	37	49 ¹	33 ¹	2 ¹	41
クロム(μg)	6 ¹	3 ¹	0.2 ¹	5	5 ¹	3 ¹	0.4 ¹	5	6 ¹	4 ¹	0.2 ¹	5	6 ¹	3 ¹	0.2 ¹	6
モリブデン(μg)	164 ¹	86 ¹	3 ¹	146	163 ¹	89 ¹	8 ¹	145	166 ¹	85 ¹	5 ¹	148	163 ¹	85 ¹	5 ¹	143
ビタミンA(μgRE)	554 ¹	627 ¹	25 ¹	435	551 ¹	954 ¹	72 ¹	398	511 ¹	518 ¹	23 ¹	397	593 ¹	525 ¹	33 ¹	480
ビタミンD(μg)	7.4 ¹	8.0 ¹	0.3 ¹	4.3	5.8 ¹	7.4 ¹	0.5 ¹	2.8	7.1 ¹	8.2 ¹	0.4 ¹	3.7	8.4 ¹	7.9 ¹	0.5 ¹	5.7
ビタミンE(mg)	7.1 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	6.4	6.4 ¹	3.9 ¹	0.3 ¹	5.5	6.9 ¹	3.3 ¹	0.2 ¹	6.3	7.5 ¹	3.5 ¹	0.3 ¹	7.0
ビタミンK(μg)	277 ¹	198 ¹	9 ¹	230	229 ¹	160 ¹	13 ¹	185	258 ¹	184 ¹	11 ¹	207	315 ¹	218 ¹	16 ¹	260
ビタミンB1(mg)	0.91 ¹	0.40 ¹	0.01 ¹	0.85	0.89 ¹	0.43 ¹	0.03 ¹	0.82	0.88 ¹	0.38 ¹	0.02 ¹	0.81	0.95 ¹	0.40 ¹	0.02 ¹	0.88
ビタミンB2(mg)	1.24 ¹	0.53 ¹	0.02 ¹	1.16	1.15 ¹	0.57 ¹	0.04 ¹	1.08	1.18 ¹	0.49 ¹	0.02 ¹	1.12	1.34 ¹	0.53 ¹	0.04 ¹	1.24
ナイアシン(mgNE)	15.6 ¹	7.1 ¹	0.3 ¹	14.4	14.2 ¹	7.0 ¹	0.6 ¹	12.6	15.5 ¹	6.1 ¹	0.3 ¹	14.6	16.4 ¹	7.9 ¹	0.5 ¹	15.0
ビタミンB6(mg)	1.21 ¹	0.50 ¹	0.02 ¹	1.15	1.07 ¹	0.50 ¹	0.04 ¹	1.00	1.17 ¹	0.48 ¹	0.03 ¹	1.11	1.30 ¹	0.49 ¹	0.03 ¹	1.22
ビタミンB12(μg)	6.4 ¹	6.3 ¹	0.3 ¹	4.4	5.1 ¹	6.1 ¹	0.5 ¹	3.1	5.8 ¹	5.6 ¹	0.3 ¹	4.1	7.4 ¹	6.7 ¹	0.5 ¹	5.1
葉酸(μg)	326 ¹	154 ¹	8 ¹	310	262 ¹	154 ¹	16 ¹	237	300 ¹	132 ¹	7 ¹	290	377 ¹	155 ¹	12 ¹	358
パントテン酸(mg)	5.74 ¹	1.99 ¹	0.08 ¹	5.56	5.49 ¹	2.29 ¹	0.21 ¹	5.43	5.57 ¹	1.90 ¹	0.08 ¹	5.38	6.01 ¹	1.91 ¹	0.13 ¹	5.72
ビオチン(μg)	25.4 ¹	17.3 ¹	0.8 ¹	23.5	22.9 ¹	27.0 ¹	2.5 ¹	18.9	24.6 ¹	15.1 ¹	0.8 ¹	23.0	27.2 ¹	13.2 ¹	0.9 ¹	25.1
ビタミンC(mg)	115 ¹	82 ¹	4 ¹	94	74 ¹	54 ¹	5 ¹	56	96 ¹	69 ¹	4 ¹	77	149 ¹	89 ¹	7 ¹	137
コレステロール(mg)	304 ¹	167 ¹	8 ¹	288	331 ¹	195 ¹	17 ¹	308	301 ¹	160 ¹	9 ¹	289	294 ¹	157 ¹	10 ¹	266
食物繊維総量(g)	15.5 ¹	6.9 ¹	0.3 ¹	14.7	12.9 ¹	6.2 ¹	0.6 ¹	11.6	14.3 ¹	6.1 ¹	0.4 ¹	13.7	17.7 ¹	7.2 ¹	0.5 ¹	16.7
うち水溶性(g)	3.6 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	3.4	3.0 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	2.8	3.3 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	3.0	4.1 ¹	1.8 ¹	0.1 ¹	3.9
うち不溶性(g)	11.4 ¹	5.2 ¹	0.2 ¹	10.8	9.5 ¹	4.9 ¹	0.5 ¹	8.4	10.5 ¹	4.5 ¹	0.3 ¹	9.8	13.0 ¹	5.4 ¹	0.4 ¹	12.3
脂肪エネルギー比率(%)	27.5 ¹	7.4 ¹	0.4 ¹	27.0	29.3 ¹	7.3 ¹	0.8 ¹	29.7	28.3 ¹	7.9 ¹	0.5 ¹	27.7	25.9 ¹	6.7 ¹	0.3 ¹	25.7
炭水化物エネルギー比率(%)	57.4 ¹	8.2 ¹	0.4 ¹	57.6	55.7 ¹	8.4 ¹	0.8 ¹	55.2	56.9 ¹	8.6 ¹	0.5 ¹	57.2	58.6 ¹	7.5 ¹	0.4 ¹	58.7
動物性たんぱく質比率(%)	52.2 ¹	12.9 ¹	0.6 ¹	53.1	54.4 ¹	12.7 ¹	1.1 ¹	54.7	52.1 ¹	13.6 ¹	0.9 ¹	53.2	51.3 ¹	12.2 ¹	0.7 ¹	52.4
穀類エネルギー比率(%)	39.3 ¹	12.5 ¹	0.6 ¹	39.2	42.6 ¹	13.1 ¹	1.5 ¹	42.6	39.5 ¹	12.6 ¹	0.9 ¹	39.5	37.7 ¹	12.0 ¹	0.8 ¹	37.2

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(1歳以上、男性、年齢階級別)

	総 数				1-6歳				7-14歳				15-19歳				20-29歳			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	513				22				33				27				35			
エネルギー(kcal)	2071 ¹	598 ¹	29 ¹	2024	1332 ¹	479 ¹	99 ¹	1274	2072 ¹	583 ¹	110 ¹	1903	2642 ¹	898 ¹	164 ¹	2561	2282 ¹	805 ¹	155 ¹	2083
たんぱく質(g)	75.7 ¹	24.8 ¹	1.3 ¹	75.3	44.2 ¹	16.9 ¹	3.9 ¹	40.2	74.8 ¹	18.1 ¹	3.4 ¹	73.3	93.7 ¹	34.3 ¹	5.6 ¹	86.4	85.3 ¹	34.1 ¹	6.8 ¹	81.1
うち動物性(g)	41.7 ¹	19.2 ¹	1.1 ¹	40.0	23.5 ¹	10.8 ¹	2.6 ¹	19.5	45.3 ¹	12.6 ¹	2.3 ¹	43.6	57.3 ¹	27.7 ¹	5.1 ¹	51.7	49.1 ¹	26.9 ¹	4.8 ¹	51.1
脂質(g)	62.3 ¹	26.3 ¹	1.2 ¹	60.1	39.4 ¹	18.9 ¹	3.6 ¹	34.8	65.9 ¹	18.9 ¹	2.8 ¹	67.7	86.9 ¹	40.7 ¹	7.5 ¹	86.1	74.0 ¹	36.1 ¹	6.6 ¹	66.7
うち動物性(g)	32.0 ¹	18.0 ¹	0.9 ¹	29.2	18.8 ¹	9.5 ¹	2.1 ¹	16.3	38.2 ¹	12.0 ¹	2.2 ¹	36.4	49.7 ¹	27.4 ¹	5.7 ¹	45.3	38.1 ¹	23.6 ¹	3.6 ¹	36.5
飽和脂肪酸(g)	16.7 ¹	8.1 ¹	0.4 ¹	15.7	11.7 ¹	6.2 ¹	1.2 ¹	9.5	20.9 ¹	5.8 ¹	1.0 ¹	21.6	23.6 ¹	12.5 ¹	2.5 ¹	22.9	19.7 ¹	10.6 ¹	2.0 ¹	17.7
一価不飽和脂肪酸(g)	21.9 ¹	10.4 ¹	0.5 ¹	20.2	13.6 ¹	6.7 ¹	1.3 ¹	12.6	21.9 ¹	7.1 ¹	1.0 ¹	22.4	31.8 ¹	16.4 ¹	3.1 ¹	30.5	26.0 ¹	13.8 ¹	2.6 ¹	22.0
多価不飽和脂肪酸(g)	13.3 ¹	6.1 ¹	0.3 ¹	12.3	8.1 ¹	4.6 ¹	0.9 ¹	6.7	11.8 ¹	5.0 ¹	0.8 ¹	11.7	18.0 ¹	8.0 ¹	1.3 ¹	16.9	15.5 ¹	8.5 ¹	1.8 ¹	13.7
n-6系脂肪酸(g)	10.7 ¹	5.3 ¹	0.3 ¹	9.7	6.9 ¹	3.7 ¹	0.8 ¹	5.7	9.7 ¹	4.1 ¹	0.6 ¹	9.7	14.7 ¹	7.1 ¹	1.3 ¹	13.7	12.9 ¹	7.3 ¹	1.6 ¹	11.3
n-3系脂肪酸(g)	2.4 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	2.1	1.2 ¹	1.0 ¹	0.2 ¹	0.9	1.9 ¹	1.2 ¹	0.2 ¹	1.7	3.0 ¹	1.5 ¹	0.2 ¹	3.0	2.4 ¹	1.5 ¹	0.3 ¹	1.8
炭水化物(g)	278.3 ¹	85.3 ¹	4.8 ¹	273.2	195.4 ¹	64.3 ¹	13.2 ¹	189.7	286.6 ¹	97.3 ¹	19.7 ¹	256.8	354.4 ¹	120.4 ¹	23.9 ¹	348.2	305.0 ¹	98.6 ¹	18.6 ¹	275.0
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	10.6 ¹	3.8 ¹	0.2 ¹	10.3	5.5 ¹	3.1 ¹	0.6 ¹	5.0	9.2 ¹	2.9 ¹	0.5 ¹	8.8	12.2 ¹	4.1 ¹	0.9 ¹	11.8	10.4 ¹	3.3 ¹	0.7 ¹	9.9
食塩(g/1,000kcal)	5.2 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.0	4.0 ¹	1.1 ¹	0.3 ¹	4.1	4.5 ¹	0.9 ¹	0.1 ¹	4.5	4.8 ¹	1.6 ¹	0.2 ¹	4.3	4.7 ¹	1.3 ¹	0.3 ¹	4.5
カリウム(mg)	2440 ¹	981 ¹	56 ¹	2317	1495 ¹	691 ¹	147 ¹	1434	2261 ¹	596 ¹	120 ¹	2164	2369 ¹	1027 ¹	213 ¹	2230	2438 ¹	1038 ¹	204 ¹	2209
カルシウム(mg)	536 ¹	306 ¹	16 ¹	482	364 ¹	241 ¹	54 ¹	288	642 ¹	231 ¹	50 ¹	615	487 ¹	236 ¹	42 ¹	450	548 ¹	393 ¹	61 ¹	445
マグネシウム(mg)	262 ¹	100 ¹	6 ¹	252	147 ¹	69 ¹	16 ¹	136	226 ¹	62 ¹	13 ¹	211	258 ¹	96 ¹	20 ¹	242	257 ¹	107 ¹	20 ¹	245
リン(mg)	1070 ¹	371 ¹	20 ¹	1038	669 ¹	301 ¹	69 ¹	611	1124 ¹	273 ¹	60 ¹	1155	1201 ¹	428 ¹	71 ¹	1126	1156 ¹	492 ¹	91 ¹	1139
鉄(mg)	8.1 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	7.6	4.6 ¹	2.1 ¹	0.4 ¹	4.1	6.5 ¹	2.2 ¹	0.4 ¹	6.7	7.9 ¹	3.0 ¹	0.6 ¹	7.8	8.0 ¹	3.1 ¹	0.7 ¹	7.5
亜鉛(mg)	8.9 ¹	3.2 ¹	0.2 ¹	8.6	5.5 ¹	2.1 ¹	0.4 ¹	5.1	9.3 ¹	2.3 ¹	0.4 ¹	9.0	11.2 ¹	4.3 ¹	0.9 ¹	10.2	10.2 ¹	4.4 ¹	0.7 ¹	9.4
銅(mg)	1.22 ¹	0.42 ¹	0.02 ¹	1.20	0.73 ¹	0.25 ¹	0.06 ¹	0.72	1.11 ¹	0.35 ¹	0.07 ¹	1.12	1.36 ¹	0.44 ¹	0.08 ¹	1.33	1.23 ¹	0.44 ¹	0.09 ¹	1.15
マンガン(mg)	3.75 ¹	1.65 ¹	0.11 ¹	3.48	1.97 ¹	0.78 ¹	0.18 ¹	1.82	2.97 ¹	1.44 ¹	0.31 ¹	2.66	4.39 ¹	2.36 ¹	0.44 ¹	3.79	3.76 ¹	1.45 ¹	0.27 ¹	3.66
ヨウ素(μg)	1413 ¹	5284 ¹	283 ¹	66	173 ¹	332 ¹	75 ¹	46	777 ¹	2656 ¹	632 ¹	59	1873 ¹	6325 ¹	1539 ¹	61	532 ¹	2067 ¹	332 ¹	53
セレン(μg)	49 ¹	33 ¹	2 ¹	41	23 ¹	18 ¹	4 ¹	19	45 ¹	24 ¹	5 ¹	39	52 ¹	31 ¹	5 ¹	53	50 ¹	32 ¹	6 ¹	45
クロム(μg)	6 ¹	4 ¹	0.2 ¹	5	3 ¹	3 ¹	1 ¹	3	4 ¹	2 ¹	0.4 ¹	4	6 ¹	3 ¹	1 ¹	6	7 ¹	4 ¹	1 ¹	6
モリブデン(μg)	181 ¹	88 ¹	4 ¹	163	111 ¹	44 ¹	8 ¹	110	174 ¹	80 ¹	14 ¹	160	237 ¹	106 ¹	21 ¹	227	197 ¹	93 ¹	17 ¹	181
ビタミンA(μgRE)	547 ¹	650 ¹	33 ¹	437	392 ¹	186 ¹	39 ¹	421	529 ¹	234 ¹	48 ¹	481	477 ¹	384 ¹	63 ¹	406	551 ¹	370 ¹	64 ¹	448
ビタミンD(μg)	7.5 ¹	7.8 ¹	0.4 ¹	4.2	4.6 ¹	5.0 ¹	1.0 ¹	3.6	6.5 ¹	6.0 ¹	1.0 ¹	3.8	7.3 ¹	7.7 ¹	1.5 ¹	3.8	6.2 ¹	7.8 ¹	1.7 ¹	2.7
ビタミンE(mg)	7.1 ¹	3.6 ¹	0.2 ¹	6.4	4.6 ¹	2.4 ¹	0.4 ¹	4.1	6.4 ¹	3.2 ¹	0.6 ¹	5.8	7.3 ¹	3.9 ¹	0.6 ¹	6.4	7.3 ¹	3.7 ¹	0.6 ¹	6.7
ビタミンK(μg)	266 ¹	198 ¹	9 ¹	214	156 ¹	134 ¹	35 ¹	111	167 ¹	123 ¹	22 ¹	122	247 ¹	159 ¹	35 ¹	203	263 ¹	167 ¹	33 ¹	229
ビタミンB1(mg)	0.96 ¹	0.44 ¹	0.02 ¹	0.89	0.62 ¹	0.23 ¹	0.04 ¹	0.62	0.89 ¹	0.23 ¹	0.04 ¹	0.89	1.25 ¹	0.57 ¹	0.12 ¹	1.22	1.13 ¹	0.56 ¹	0.10 ¹	0.97
ビタミンB2(mg)	1.26 ¹	0.55 ¹	0.03 ¹	1.18	0.82 ¹	0.47 ¹	0.10 ¹	0.73	1.34 ¹	0.52 ¹	0.10 ¹	1.19	1.36 ¹	0.66 ¹	0.12 ¹	1.18	1.32 ¹	0.61 ¹	0.11 ¹	1.25
ナイアシン(mgNE)	16.7 ¹	7.9 ¹	0.5 ¹	15.6	7.7 ¹	4.0 ¹	0.9 ¹	6.8	13.5 ¹	5.0 ¹	0.8 ¹	12.5	18.0 ¹	8.7 ¹	1.9 ¹	17.1	17.2 ¹	9.1 ¹	2.0 ¹	14.0
ビタミンB6(mg)	1.26 ¹	0.54 ¹	0.03 ¹	1.18	0.71 ¹	0.35 ¹	0.08 ¹	0.62	1.12 ¹	0.31 ¹	0.06 ¹	1.10	1.37 ¹	0.62 ¹	0.12 ¹	1.23	1.33 ¹	0.63 ¹	0.12 ¹	1.21
ビタミンB12(μg)	6.7 ¹	6.7 ¹	0.4 ¹	4.6	3.1 ¹	3.7 ¹	0.8 ¹	2.2	6.2 ¹	5.0 ¹	0.9 ¹	4.7	5.5 ¹	3.5 ¹	0.7 ¹	4.6	4.4 ¹	4.3 ¹	0.9 ¹	3.4
葉酸(μg)	313 ¹	154 ¹	9 ¹	295	169 ¹	63 ¹	16 ¹	180	237 ¹	80 ¹	17 ¹	228	270 ¹	138 ¹	28 ¹	247	294 ¹	119 ¹	24 ¹	312
パントテン酸(mg)	5.99 ¹	2.17 ¹	0.11 ¹	5.83	3.95 ¹	1.73 ¹	0.41 ¹	3.65	6.39 ¹	1.58 ¹	0.33 ¹	6.33	6.80 ¹	2.72 ¹	0.48 ¹	6.54	6.61 ¹	2.68 ¹	0.48 ¹	6.27
ビオチン(μg)	24.9 ¹	17.9 ¹	1.1 ¹	23.1	12.3 ¹	7.3 ¹	1.7 ¹	11.3	19.7 ¹	6.2 ¹	1.2 ¹	19.1	22.7 ¹	9.9 ¹	1.8 ¹	23.5	22.4 ¹	11.4 ¹	2.5 ¹	19.6
ビタミンC(mg)	103 ¹	74 ¹	5 ¹	78	59 ¹	31 ¹	7 ¹	57	76 ¹	48 ¹	8 ¹	64	75 ¹	68 ¹	13 ¹	58	94 ¹	66 ¹	11 ¹	87
コレステロール(mg)	321 ¹	173 ¹	10 ¹	300	219 ¹	132 ¹	34 ¹	206	330 ¹	127 ¹	28 ¹	344	428 ¹	221 ¹	34 ¹	400	390 ¹	214 ¹	47 ¹	332
食物繊維総量(g)	15.0 ¹	6.9 ¹	0.3 ¹																	

30-39歲				40-49歲				50-59歲				60-69歲				70歲以上			
平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值
48				61				74				89				124			
1987	621	102	2034	2091	565	77	1965	2028	448	47	2059	2147	508	41	2058	2011	458	47	2050
69.3	23.4	3.7	70.8	74.5	23.6	3.5	73.8	72.1	21.5	2.0	71.2	82.2	22.0	2.3	81.0	75.4	20.4	2.3	74.4
39.0	17.7	2.4	38.0	41.8	20.5	3.1	40.4	38.6	17.4	1.5	36.3	43.7	17.4	1.9	42.3	39.8	15.7	1.6	38.8
62.0	27.3	4.3	61.8	66.0	25.9	3.2	63.3	58.9	23.2	2.0	56.2	64.0	22.4	2.6	65.6	55.8	20.1	1.9	54.0
33.8	16.8	1.9	31.8	33.1	18.9	2.6	27.6	30.6	19.6	2.0	27.2	31.8	14.1	1.5	30.4	26.8	13.5	1.2	26.2
16.7	8.1	1.1	16.6	17.1	8.2	1.1	14.8	15.6	8.0	0.7	14.6	16.6	7.3	0.7	15.9	14.6	5.9	0.6	14.1
23.0	11.1	1.8	22.5	24.4	10.8	1.3	23.6	20.8	8.8	0.9	19.2	22.2	9.0	0.9	21.8	18.7	7.8	0.8	19.0
12.6	7.0	1.4	11.4	14.0	4.8	0.5	14.1	12.6	4.9	0.4	11.9	14.1	5.7	0.7	13.3	12.5	5.7	0.5	11.4
10.6	6.1	1.2	9.6	11.1	4.3	0.5	11.2	10.3	4.2	0.3	9.6	11.3	5.0	0.6	11.1	9.8	4.8	0.5	9.0
1.9	1.4	0.3	1.7	2.6	1.5	0.2	2.5	2.2	1.1	0.1	2.0	2.6	1.6	0.2	2.5	2.5	1.6	0.1	2.2
258.0	101.0	17.7	244.7	272.9	81.3	11.0	260.0	273.0	65.3	7.1	270.4	281.2	77.6	5.8	273.8	278.4	66.7	6.9	282.2
9.8	3.7	0.5	9.8	10.7	3.7	0.5	10.3	10.9	3.3	0.5	11.1	11.2	3.8	0.3	10.4	11.2	3.8	0.3	10.6
5.2	2.1	0.3	5.0	5.2	1.5	0.1	5.1	5.5	1.9	0.2	5.2	5.3	1.4	0.2	5.2	5.7	1.8	0.2	5.1
2012	913	159	1960	2346	972	128	2262	2213	815	89	2094	2748	1024	88	2716	2798	954	102	2736
421	266	45	386	490	257	35	441	478	307	30	426	577	316	41	520	618	317	34	570
224	91	16	214	257	93	12	250	248	90	9	243	306	106	10	302	290	96	11	284
951	374	63	962	1017	348	52	997	1013	356	30	972	1162	340	34	1126	1114	330	37	1107
7.2	3.2	0.5	6.6	7.8	2.4	0.3	7.3	7.5	2.8	0.3	7.2	9.5	3.2	0.4	9.3	9.0	3.1	0.4	8.5
8.5	2.9	0.5	8.4	8.9	3.3	0.5	8.5	8.6	2.6	0.3	8.8	9.1	2.7	0.3	8.7	8.7	2.8	0.3	8.3
1.09	0.43	0.08	1.02	1.18	0.38	0.05	1.16	1.14	0.36	0.03	1.07	1.35	0.40	0.03	1.35	1.32	0.42	0.04	1.26
3.04	1.34	0.21	2.87	3.43	1.25	0.18	3.24	3.65	1.52	0.16	3.40	4.05	1.49	0.17	3.77	4.40	1.73	0.22	4.03
564	2083	281	43	844	2460	297	70	1956	5667	736	154	1364	6160	648	70	2272	7204	655	67
47	39	7	40	48	31	4	41	42	29	3	36	59	34	4	52	51	34	3	44
5	3	1	4	7	4	0.4	5	5	3	0.3	5	7	4	0.5	6	6	3	0.4	6
174	91	15	162	179	86	11	173	184	84	8	172	190	89	10	177	175	85	7	156
675	1625	227	318	492	316	39	430	442	338	33	352	620	605	73	467	581	509	47	478
5.0	6.1	0.9	2.5	7.0	8.4	1.0	3.4	7.3	7.7	0.7	4.1	8.9	8.2	0.9	6.6	8.8	8.3	0.8	6.0
6.8	5.2	0.8	5.6	6.7	2.6	0.3	6.8	6.5	2.8	0.3	6.1	8.1	3.8	0.5	7.1	7.6	3.4	0.3	7.4
218	183	29	157	251	169	20	195	248	182	18	192	326	240	22	275	310	213	21	254
0.89	0.43	0.05	0.89	0.91	0.44	0.06	0.80	0.91	0.45	0.05	0.86	1.03	0.43	0.05	0.97	0.98	0.41	0.04	0.90
1.08	0.54	0.06	1.00	1.16	0.48	0.07	1.06	1.17	0.54	0.05	1.13	1.31	0.47	0.05	1.23	1.40	0.56	0.06	1.30
15.2	8.0	1.1	14.8	17.6	7.1	0.9	17.2	16.6	6.8	0.7	15.2	19.6	9.0	1.0	18.5	16.7	7.1	0.7	15.7
1.10	0.48	0.07	1.07	1.26	0.69	0.09	1.08	1.14	0.41	0.05	1.12	1.41	0.52	0.05	1.37	1.38	0.48	0.05	1.31
6.4	9.5	1.3	3.6	7.8	7.8	1.1	4.3	5.5	4.2	0.5	4.4	7.3	6.5	0.7	5.1	8.1	7.6	0.8	5.3
271	232	32	241	282	124	14	255	284	128	14	272	363	138	15	362	385	149	16	363
5.38	2.43	0.35	5.61	5.84	2.16	0.27	5.57	5.51	1.80	0.19	5.25	6.37	1.94	0.16	6.39	6.23	2.04	0.19	5.86
26.2	45.9	6.5	18.4	24.2	9.5	1.0	24.0	22.7	10.6	1.2	20.2	28.5	11.2	1.0	27.3	28.3	14.1	1.4	25.5
66	56	9	46	86	68	8	62	86	59	7	72	123	77	8	100	144	81	8	137
306	158	21	326	316	153	21	317	307	169	20	288	343	197	21	286	295	147	15	288
12.6	7.4	1.2	12.6	14.0	5.0	0.6	13.6	13.1	5.6	0.7	12.5	17.9	7.9	0.8	17.1	17.7	7.0	0.7	17.0
2.8	1.6	0.3	2.8	3.3	1.4	0.2	3.1	2.9	1.4	0.1	2.7	4.2	2.0	0.2	4.0	4.1	1.7	0.2	3.9
9.3	5.9	1.0	8.1	10.2	3.7	0.4	10.1	9.6	4.4	0.5	8.9	13.1	5.8	0.6	12.2	13.0	5.4	0.5	12.6
28.1	8.4	1.5	28.3	28.1	7.3	0.9	27.1	26.0	7.8	0.7	24.7	26.7	7.2	0.9	27.4	24.7	6.4	0.5	24.5
57.7	10.2	1.7	58.9	57.5	7.7	0.8	57.6	59.8	8.9	0.9	60.9	57.8	7.8	1.0	57.7	60.2	7.4	0.6	60.4
54.5	14.8	2.3	56.3	53.6	15.6	2.5	56.8	52.2	12.7	1.2	51.8	52.0	12.3	1.3	53.1	51.5	12.1	1.0	53.0
44.0	15.6	3.1	44.0	41.4	13.5	1.3	42.1	43.8	11.1	1.4	43.1	39.5	11.6	1.3	39.1	38.6	12.4	1.2	37.7

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(1歳以上、男性、年齢階級別)

	(再掲) 20歳以上				(再掲) 20-39歳				(再掲) 40-64歳				(再掲) 65歳以上			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	431				83				168				180			
エネルギー(kcal)	2073 ¹	540 ¹	28 ¹	2046	2112 ¹	715 ¹	68 ¹	2046	2052 ¹	491 ¹	39 ¹	2011	2074 ¹	490 ¹	42 ¹	2053
たんぱく質(g)	76.2 ¹	23.4 ¹	1.5 ¹	75.6	76.1 ¹	29.3 ¹	3.0 ¹	74.6	74.0 ¹	21.8 ¹	1.8 ¹	73.9	78.3 ¹	21.8 ¹	2.1 ¹	78.2
うち動物性(g)	41.4 ¹	18.5 ¹	1.2 ¹	39.5	43.3 ¹	22.5 ¹	2.3 ¹	39.9	40.0 ¹	18.1 ¹	1.5 ¹	38.3	41.7 ¹	16.9 ¹	1.6 ¹	40.4
脂質(g)	61.6 ¹	24.8 ¹	1.2 ¹	60.0	67.0 ¹	31.7 ¹	3.7 ¹	65.8	62.4 ¹	24.0 ¹	1.4 ¹	59.8	58.4 ¹	21.4 ¹	1.7 ¹	58.2
うち動物性(g)	31.1 ¹	17.1 ¹	0.7 ¹	28.6	35.6 ¹	19.9 ¹	1.9 ¹	35.2	31.0 ¹	18.1 ¹	1.2 ¹	27.5	29.1 ¹	14.3 ¹	1.0 ¹	28.2
飽和脂肪酸(g)	16.2 ¹	7.7 ¹	0.4 ¹	15.3	18.0 ¹	9.3 ¹	1.1 ¹	16.6	16.2 ¹	7.8 ¹	0.4 ¹	15.2	15.4 ¹	6.6 ¹	0.5 ¹	14.6
一価不飽和脂肪酸(g)	21.6 ¹	9.9 ¹	0.5 ¹	20.1	24.2 ¹	12.4 ¹	1.5 ¹	22.5	22.4 ¹	9.8 ¹	0.6 ¹	20.3	19.8 ¹	8.3 ¹	0.7 ¹	19.5
多価不飽和脂肪酸(g)	13.3 ¹	5.9 ¹	0.3 ¹	12.5	13.9 ¹	7.7 ¹	1.0 ¹	11.8	13.6 ¹	5.2 ¹	0.3 ¹	13.2	12.8 ¹	5.6 ¹	0.5 ¹	11.9
n-6系脂肪酸(g)	10.7 ¹	5.1 ¹	0.3 ¹	9.8	11.6 ¹	6.7 ¹	0.9 ¹	10.0	11.0 ¹	4.5 ¹	0.2 ¹	10.7	10.1 ¹	4.7 ¹	0.4 ¹	9.4
n-3系脂肪酸(g)	2.4 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	2.2	2.1 ¹	1.5 ¹	0.2 ¹	1.8	2.4 ¹	1.3 ¹	0.1 ¹	2.3	2.6 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	2.2
炭水化物(g)	277.2 ¹	78.4 ¹	4.4 ¹	273.8	277.8 ¹	102.1 ¹	10.7 ¹	269.7	270.2 ¹	72.6 ¹	6.1 ¹	263.6	283.3 ¹	70.6 ¹	5.9 ¹	282.5
食塩(g) (ナトリウム×2.54/1,000)	10.9 ¹	3.6 ¹	0.2 ¹	10.5	10.0 ¹	3.5 ¹	0.3 ¹	9.8	10.8 ¹	3.5 ¹	0.3 ¹	10.9	11.3 ¹	3.8 ¹	0.3 ¹	10.6
食塩(g/1,000kcal)	5.4 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.1	5.0 ¹	1.8 ¹	0.2 ¹	4.7	5.3 ¹	1.6 ¹	0.1 ¹	5.3	5.5 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.1
カリウム(mg)	2506 ¹	989 ¹	57 ¹	2382	2192 ¹	984 ¹	110 ¹	2178	2378 ¹	967 ¹	69 ¹	2298	2771 ¹	950 ¹	79 ¹	2763
カルシウム(mg)	540 ¹	315 ¹	18 ¹	483	475 ¹	330 ¹	35 ¹	408	499 ¹	299 ¹	23 ¹	444	609 ¹	310 ¹	32 ¹	565
マグネシウム(mg)	271 ¹	100 ¹	6 ¹	261	238 ¹	99 ¹	10 ¹	233	264 ¹	100 ¹	7 ¹	258	294 ¹	96 ¹	9 ¹	288
リン(mg)	1078 ¹	365 ¹	22 ¹	1045	1037 ¹	437 ¹	49 ¹	1014	1032 ¹	349 ¹	27 ¹	1006	1140 ¹	335 ¹	31 ¹	1146
鉄(mg)	8.4 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	8.0	7.6 ¹	3.1 ¹	0.4 ¹	7.1	7.9 ¹	2.8 ¹	0.2 ¹	7.5	9.2 ¹	3.2 ¹	0.3 ¹	8.9
亜鉛(mg)	8.9 ¹	3.0 ¹	0.2 ¹	8.5	9.2 ¹	3.7 ¹	0.4 ¹	8.5	8.7 ¹	2.9 ¹	0.2 ¹	8.5	8.9 ¹	2.8 ¹	0.2 ¹	8.6
銅(mg)	1.24 ¹	0.41 ¹	0.02 ¹	1.23	1.15 ¹	0.44 ¹	0.05 ¹	1.09	1.19 ¹	0.38 ¹	0.03 ¹	1.21	1.33 ¹	0.41 ¹	0.03 ¹	1.29
マンガン(mg)	3.86 ¹	1.58 ¹	0.10 ¹	3.61	3.35 ¹	1.43 ¹	0.15 ¹	3.09	3.58 ¹	1.36 ¹	0.12 ¹	3.40	4.35 ¹	1.70 ¹	0.18 ¹	4.03
ヨウ素(μg)	1496 ¹	5492 ¹	263 ¹	68	551 ¹	2064 ¹	186 ¹	49	1710 ¹	5968 ¹	427 ¹	84	1733 ¹	6064 ¹	453 ¹	75
セレン(μg)	50 ¹	33 ¹	2 ¹	43	49 ¹	36 ¹	5 ¹	42	47 ¹	30 ¹	2 ¹	41	54 ¹	35 ¹	3 ¹	46
クロム(μg)	6 ¹	4 ¹	0.2 ¹	6	6 ¹	4 ¹	0.5 ¹	5	6 ¹	4 ¹	0.3 ¹	5	6 ¹	4 ¹	0.3 ¹	6
モリブデン(μg)	182 ¹	87 ¹	4 ¹	168	184 ¹	92 ¹	9 ¹	168	185 ¹	86 ¹	7 ¹	173	178 ¹	86 ¹	6 ¹	157
ビタミンA(μgRE)	560 ¹	698 ¹	35 ¹	438	623 ¹	1254 ¹	129 ¹	409	481 ¹	335 ¹	21 ¹	396	606 ¹	578 ¹	42 ¹	474
ビタミンD(μg)	7.7 ¹	8.0 ¹	0.5 ¹	4.4	5.5 ¹	6.9 ¹	0.9 ¹	2.7	7.4 ¹	8.2 ¹	0.6 ¹	3.8	8.9 ¹	8.0 ¹	0.8 ¹	6.1
ビタミンE(mg)	7.3 ¹	3.6 ¹	0.2 ¹	6.7	7.0 ¹	4.6 ¹	0.4 ¹	5.9	7.0 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	6.5	7.6 ¹	3.4 ¹	0.3 ¹	7.2
ビタミンK(μg)	280 ¹	204 ¹	10 ¹	234	237 ¹	176 ¹	17 ¹	194	269 ¹	189 ¹	13 ¹	223	311 ¹	225 ¹	19 ¹	250
ビタミンB1(mg)	0.97 ¹	0.44 ¹	0.02 ¹	0.91	0.99 ¹	0.50 ¹	0.04 ¹	0.92	0.93 ¹	0.43 ¹	0.04 ¹	0.87	1.00 ¹	0.42 ¹	0.03 ¹	0.94
ビタミンB2(mg)	1.26 ¹	0.54 ¹	0.03 ¹	1.20	1.18 ¹	0.58 ¹	0.06 ¹	1.12	1.18 ¹	0.49 ¹	0.04 ¹	1.13	1.38 ¹	0.54 ¹	0.05 ¹	1.29
ナイアシン(mgNE)	17.3 ¹	7.8 ¹	0.5 ¹	16.2	16.0 ¹	8.5 ¹	1.1 ¹	14.6	17.2 ¹	6.5 ¹	0.5 ¹	16.4	17.9 ¹	8.5 ¹	0.7 ¹	16.3
ビタミンB6(mg)	1.29 ¹	0.54 ¹	0.03 ¹	1.21	1.20 ¹	0.56 ¹	0.06 ¹	1.14	1.23 ¹	0.54 ¹	0.04 ¹	1.16	1.39 ¹	0.51 ¹	0.04 ¹	1.34
ビタミンB12(μg)	6.9 ¹	7.0 ¹	0.4 ¹	4.8	5.6 ¹	7.8 ¹	0.9 ¹	3.4	6.4 ¹	5.9 ¹	0.5 ¹	4.8	8.0 ¹	7.5 ¹	0.6 ¹	5.3
葉酸(μg)	329 ¹	157 ¹	9 ¹	313	281 ¹	192 ¹	24 ¹	244	298 ¹	132 ¹	9 ¹	291	379 ¹	145 ¹	13 ¹	362
パントテン酸(mg)	6.01 ¹	2.13 ¹	0.11 ¹	5.83	5.90 ¹	2.60 ¹	0.29 ¹	5.77	5.78 ¹	1.97 ¹	0.16 ¹	5.59	6.29 ¹	2.02 ¹	0.15 ¹	6.11
ビオチン(μg)	26.1 ¹	19.0 ¹	1.2 ¹	24.0	24.6 ¹	35.5 ¹	4.4 ¹	18.4	24.6 ¹	10.4 ¹	0.7 ¹	24.1	28.1 ¹	13.4 ¹	1.0 ¹	25.1
ビタミンC(mg)	109 ¹	76 ¹	4 ¹	85	78 ¹	62 ¹	7 ¹	59	91 ¹	66 ¹	5 ¹	75	140 ¹	80 ¹	6 ¹	129
コレステロール(mg)	319 ¹	171 ¹	11 ¹	299	341 ¹	187 ¹	24 ¹	332	308 ¹	157 ¹	13 ¹	290	319 ¹	176 ¹	14 ¹	291
食物繊維総量(g)	15.6 ¹	7.0 ¹	0.4 ¹	14.9	13.4 ¹	6.9 ¹	0.7 ¹	12.6	14.3 ¹	6.1 ¹	0.4 ¹	13.9	17.8 ¹	7.3 ¹	0.6 ¹	17.3
うち水溶性(g)	3.6 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	3.4	3.0 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	3.0	3.3 ¹	1.6 ¹	0.1 ¹	3.0	4.2 ¹	1.8 ¹	0.1 ¹	4.0
うち不溶性(g)	11.4 ¹	5.3 ¹	0.3 ¹	10.9	9.9 ¹	5.5 ¹	0.6 ¹	8.8	10.4 ¹	4.5 ¹	0.3 ¹	10.0	13.1 ¹	5.6 ¹	0.4 ¹	12.7
脂肪エネルギー比率(%)	26.5 ¹	7.3 ¹	0.4 ¹	26.0	28.2 ¹	7.6 ¹	1.1 ¹	28.6	27.2 ¹	7.6 ¹	0.5 ¹	26.2	25.1 ¹	6.6 ¹	0.4 ¹	24.9
炭水化物エネルギー比率(%)	58.7 ¹	8.2 ¹	0.5 ¹	59.0	57.3 ¹	9.1 ¹	1.3 ¹	57.4	58.3 ¹	8.4 ¹	0.6 ¹	59.1	59.7 ¹	7.5 ¹	0.5 ¹	59.7
動物性たんぱく質比率(%)	52.6 ¹	13.2 ¹	0.8 ¹	54.1	54.4 ¹	14.2 ¹	1.6 ¹	57.0	52.4 ¹	13.8 ¹	1.2 ¹	53.6	51.9 ¹	12.0 ¹	1.0 ¹	53.0
穀類エネルギー比率(%)	41.3 ¹	12.7 ¹	0.9 ¹	40.8	44.8 ¹	13.9 ¹	2.2 ¹	44.8	41.4 ¹	12.4 ¹	0.9 ¹	41.5	39.5 ¹	12.0 ¹	1.0 ¹	38.9

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(1歳以上、女性、年齢階級別)

	総 数				1-6歳				7-14歳				15-19歳				20-29歳			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	577				27				37				18				40			
エネルギー(kcal)	1717 ¹	490 ¹	28 ¹	1685	1232 ¹	407 ¹	66 ¹	1273	1780 ¹	438 ¹	92 ¹	1759	1866 ¹	545 ¹	118 ¹	1978	1703 ¹	573 ¹	118 ¹	1733
たんぱく質(g)	65.3 ¹	19.1 ¹	1.0 ¹	64.3	45.4 ¹	18.0 ¹	2.8 ¹	41.6	67.3 ¹	17.1 ¹	3.2 ¹	62.5	65.5 ¹	21.2 ¹	4.5 ¹	66.3	66.0 ¹	22.8 ¹	4.5 ¹	67.5
うち動物性(g)	35.1 ¹	14.8 ¹	0.8 ¹	33.6	27.4 ¹	15.6 ¹	2.4 ¹	22.6	40.7 ¹	13.7 ¹	2.6 ¹	39.3	38.1 ¹	17.7 ¹	4.0 ¹	36.0	38.2 ¹	16.5 ¹	3.0 ¹	37.2
脂質(g)	55.3 ¹	23.8 ¹	1.4 ¹	52.3	40.7 ¹	21.5 ¹	3.1 ¹	38.9	64.0 ¹	22.0 ¹	4.5 ¹	63.4	63.4 ¹	34.4 ¹	7.7 ¹	62.9	60.8 ¹	26.9 ¹	5.3 ¹	56.4
うち動物性(g)	27.8 ¹	15.7 ¹	0.9 ¹	25.3	24.7 ¹	16.7 ¹	2.4 ¹	20.9	37.8 ¹	15.7 ¹	3.1 ¹	36.4	33.6 ¹	20.2 ¹	4.8 ¹	32.8	35.1 ¹	21.7 ¹	4.0 ¹	27.7
飽和脂肪酸(g)	15.6 ¹	8.6 ¹	0.5 ¹	14.0	13.9 ¹	8.8 ¹	1.2 ¹	12.0	20.7 ¹	8.1 ¹	1.6 ¹	19.6	17.7 ¹	9.8 ¹	2.2 ¹	15.7	18.5 ¹	12.3 ¹	2.4 ¹	15.6
一価不飽和脂肪酸(g)	18.7 ¹	9.1 ¹	0.5 ¹	17.3	13.7 ¹	7.6 ¹	1.2 ¹	12.7	21.5 ¹	8.0 ¹	1.6 ¹	20.5	22.9 ¹	15.3 ¹	3.6 ¹	22.3	20.7 ¹	9.2 ¹	2.0 ¹	19.0
多価不飽和脂肪酸(g)	11.4 ¹	5.4 ¹	0.3 ¹	10.7	7.3 ¹	3.7 ¹	0.7 ¹	6.5	11.7 ¹	4.1 ¹	0.8 ¹	11.1	12.5 ¹	6.2 ¹	1.4 ¹	11.7	11.1 ¹	5.0 ¹	0.7 ¹	9.8
n-6系脂肪酸(g)	9.3 ¹	4.5 ¹	0.2 ¹	8.7	6.2 ¹	3.2 ¹	0.6 ¹	5.9	9.8 ¹	3.5 ¹	0.7 ¹	9.3	10.3 ¹	5.4 ¹	1.3 ¹	8.8	9.2 ¹	4.3 ¹	0.6 ¹	8.2
n-3系脂肪酸(g)	2.0 ¹	1.3 ¹	0.1 ¹	1.8	1.1 ¹	0.7 ¹	0.1 ¹	1.0	1.8 ¹	0.8 ¹	0.2 ¹	1.8	2.1 ¹	1.2 ¹	0.3 ¹	2.0	1.8 ¹	1.1 ¹	0.2 ¹	1.5
炭水化物(g)	232.9 ¹	70.7 ¹	4.2 ¹	226.3	167.8 ¹	44.3 ¹	7.7 ¹	157.1	228.6 ¹	56.7 ¹	11.3 ¹	233.1	250.4 ¹	67.8 ¹	15.3 ¹	258.9	216.4 ¹	73.6 ¹	15.8 ¹	212.1
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	9.1 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	8.7	5.3 ¹	2.6 ¹	0.4 ¹	5.0	8.2 ¹	2.9 ¹	0.6 ¹	7.8	9.3 ¹	2.8 ¹	0.7 ¹	8.8	8.3 ¹	3.7 ¹	0.7 ¹	7.9
食塩(g/1,000kcal)	5.4 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.1	4.2 ¹	1.4 ¹	0.3 ¹	4.3	4.6 ¹	1.1 ¹	0.2 ¹	4.5	5.4 ¹	2.3 ¹	0.6 ¹	4.4	5.1 ¹	1.8 ¹	0.3 ¹	4.9
カリウム(mg)	2313 ¹	899 ¹	54 ¹	2204	1516 ¹	614 ¹	99 ¹	1359	2104 ¹	615 ¹	118 ¹	2094	2057 ¹	830 ¹	210 ¹	1638	2071 ¹	857 ¹	199 ¹	2095
カルシウム(mg)	536 ¹	283 ¹	14 ¹	506	480 ¹	301 ¹	41 ¹	420	673 ¹	260 ¹	48 ¹	645	488 ¹	256 ¹	68 ¹	461	520 ¹	355 ¹	72 ¹	468
マグネシウム(mg)	238 ¹	89 ¹	5 ¹	232	147 ¹	50 ¹	9 ¹	145	210 ¹	58 ¹	12 ¹	207	208 ¹	75 ¹	17 ¹	184	218 ¹	86 ¹	18 ¹	219
リン(mg)	961 ¹	310 ¹	17 ¹	921	733 ¹	353 ¹	48 ¹	668	1047 ¹	310 ¹	60 ¹	988	920 ¹	344 ¹	74 ¹	885	941 ¹	360 ¹	72 ¹	870
鉄(mg)	7.5 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	7.0	4.3 ¹	1.5 ¹	0.2 ¹	3.8	6.1 ¹	2.0 ¹	0.4 ¹	6.0	6.6 ¹	2.4 ¹	0.5 ¹	6.2	7.0 ¹	3.1 ¹	0.6 ¹	6.7
亜鉛(mg)	7.6 ¹	2.6 ¹	0.1 ¹	7.3	5.5 ¹	2.1 ¹	0.3 ¹	5.2	8.6 ¹	2.7 ¹	0.5 ¹	8.0	8.3 ¹	3.2 ¹	0.8 ¹	8.0	8.0 ¹	3.4 ¹	0.6 ¹	7.9
銅(mg)	1.08 ¹	0.38 ¹	0.02 ¹	1.05	0.64 ¹	0.17 ¹	0.03 ¹	0.61	0.96 ¹	0.26 ¹	0.05 ¹	0.94	1.08 ¹	0.39 ¹	0.10 ¹	1.05	1.02 ¹	0.37 ¹	0.08 ¹	0.99
マンガン(mg)	3.36 ¹	1.75 ¹	0.11 ¹	3.08	1.60 ¹	0.50 ¹	0.10 ¹	1.60	2.18 ¹	0.72 ¹	0.14 ¹	2.14	3.18 ¹	0.76 ¹	0.16 ¹	3.09	2.60 ¹	0.91 ¹	0.19 ¹	2.54
ヨウ素(μg)	1442 ¹	6389 ¹	310 ¹	56	319 ¹	912 ¹	179 ¹	44	1026 ¹	2922 ¹	511 ¹	88	179 ¹	476 ¹	106 ¹	42	2117 ¹	6191 ¹	1232 ¹	87
セレン(μg)	41 ¹	28 ¹	1 ¹	33	26 ¹	15 ¹	3 ¹	22	41 ¹	24 ¹	5 ¹	32	27 ¹	21 ¹	5 ¹	21	37 ¹	28 ¹	4 ¹	26
クロム(μg)	5 ¹	3 ¹	0.2 ¹	5	4 ¹	2 ¹	0.4 ¹	3	4 ¹	3 ¹	0.5 ¹	4	4 ¹	2 ¹	1 ¹	4	5 ¹	3 ¹	1 ¹	5
モリブデン(μg)	146 ¹	80 ¹	4 ¹	130	97 ¹	36 ¹	7 ¹	90	131 ¹	61 ¹	12 ¹	121	167 ¹	71 ¹	21 ¹	151	135 ¹	70 ¹	14 ¹	126
ビタミンA(μgRE)	550 ¹	538 ¹	25 ¹	443	534 ¹	305 ¹	53 ¹	425	642 ¹	468 ¹	77 ¹	560	444 ¹	301 ¹	70 ¹	346	416 ¹	216 ¹	43 ¹	397
ビタミンD(μg)	6.9 ¹	7.7 ¹	0.4 ¹	3.8	5.5 ¹	7.6 ¹	1.5 ¹	2.8	5.4 ¹	5.5 ¹	0.9 ¹	3.0	4.6 ¹	4.8 ¹	0.9 ¹	3.0	6.4 ¹	7.2 ¹	1.0 ¹	3.1
ビタミンE(mg)	6.7 ¹	3.4 ¹	0.2 ¹	6.2	4.3 ¹	2.1 ¹	0.4 ¹	3.9	5.9 ¹	2.2 ¹	0.5 ¹	5.8	6.2 ¹	3.8 ¹	0.9 ¹	5.9	6.2 ¹	3.2 ¹	0.6 ¹	5.7
ビタミンK(μg)	259 ¹	187 ¹	11 ¹	206	131 ¹	87 ¹	16 ¹	113	173 ¹	98 ¹	14 ¹	168	214 ¹	147 ¹	43 ¹	161	214 ¹	136 ¹	26 ¹	183
ビタミンB1(mg)	0.85 ¹	0.35 ¹	0.01 ¹	0.80	0.56 ¹	0.23 ¹	0.04 ¹	0.57	0.86 ¹	0.25 ¹	0.05 ¹	0.88	0.87 ¹	0.34 ¹	0.07 ¹	0.81	0.84 ¹	0.36 ¹	0.06 ¹	0.80
ビタミンB2(mg)	1.21 ¹	0.52 ¹	0.02 ¹	1.12	0.84 ¹	0.45 ¹	0.06 ¹	0.72	1.30 ¹	0.53 ¹	0.10 ¹	1.17	1.24 ¹	0.42 ¹	0.10 ¹	1.19	1.19 ¹	0.61 ¹	0.13 ¹	1.12
ナイアシン(mgNE)	13.6 ¹	6.0 ¹	0.3 ¹	12.6	7.5 ¹	3.2 ¹	0.4 ¹	7.2	10.6 ¹	3.3 ¹	0.6 ¹	10.4	11.5 ¹	4.3 ¹	1.0 ¹	11.1	13.1 ¹	5.1 ¹	1.0 ¹	12.7
ビタミンB6(mg)	1.11 ¹	0.44 ¹	0.03 ¹	1.05	0.73 ¹	0.30 ¹	0.05 ¹	0.65	0.98 ¹	0.29 ¹	0.06 ¹	0.96	1.12 ¹	0.50 ¹	0.14 ¹	0.96	1.04 ¹	0.47 ¹	0.11 ¹	1.03
ビタミンB12(μg)	5.6 ¹	5.3 ¹	0.3 ¹	3.9	2.9 ¹	2.1 ¹	0.3 ¹	2.1	5.0 ¹	4.6 ¹	0.8 ¹	3.7	3.3 ¹	2.7 ¹	0.5 ¹	2.8	4.8 ¹	3.5 ¹	0.6 ¹	4.2
葉酸(μg)	308 ¹	149 ¹	10 ¹	283	157 ¹	62 ¹	11 ¹	156	230 ¹	75 ¹	14 ¹	232	265 ¹	110 ¹	28 ¹	251	253 ¹	110 ¹	24 ¹	231
パントテン酸(mg)	5.46 ¹	1.85 ¹	0.11 ¹	5.23	4.10 ¹	1.79 ¹	0.29 ¹	3.70	5.94 ¹	1.72 ¹	0.32 ¹	5.62	5.41 ¹	1.84 ¹	0.44 ¹	5.17	5.23 ¹	2.20 ¹	0.48 ¹	5.25
ビオチン(μg)	23.7 ¹	15.4 ¹	0.9 ¹	21.3	12.6 ¹	6.0 ¹	1.0 ¹	12.2	20.0 ¹	13.0 ¹	2.2 ¹	18.0	17.3 ¹	6.7 ¹	2.0 ¹	16.8	20.5 ¹	11.2 ¹	2.4 ¹	20.0
ビタミンC(mg)	113 ¹	84 ¹	5 ¹	91	64 ¹	39 ¹	6 ¹	58	69 ¹	39 ¹	7 ¹	62	102 ¹	83 ¹	24 ¹	64	82 ¹	54 ¹	11 ¹	64
コレステロール(mg)	291 ¹	163 ¹	10 ¹	271	217 ¹	155 ¹	27 ¹	181	323 ¹	152 ¹	30 ¹	309	333 ¹	214 ¹	50 ¹	330	359 ¹	265 ¹	50 ¹	356
食物繊維総量(g)	14.8 ¹	6.7 ¹	0.4 ¹	13.8	7.9 ¹	2.7 ¹	0.5 ¹	7.9	12.3 ¹	3.9 ¹	0.8 ¹	11.8	13.2 ¹	6.1 ¹	1.6 ¹	11.0	12.8 ¹	6.4 ¹	1.6 ¹	11.3
うち水溶性(g)	3.5 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	3.3	1.9 ¹	0.8 ¹	0.2 ¹	1.9	3.1 ¹	1.1 ¹	0.2 ¹	2.9	3.2 ¹	1.6 ¹	0.4 ¹	3.0	3.2 ¹	1.8 ¹	0.4 ¹	2.6
うち不溶性(g)	10.8 ¹	5.0 ¹	0.3 ¹	9.8	5.8 ¹	2.0 ¹	0.4 ¹	5.9	8.9 ¹	2.9 ¹	0.6 ¹	8.2	9.7 ¹	4.6 ¹	1.2 ¹	8.1	9.1 ¹	4.8 ¹	1.2 ¹	8.2
脂肪エネルギー比率(%)	28.5 ¹	7.5 ¹	0.4 ¹	28.3	28.1 ¹	7.7 ¹	0.9 ¹	29.1	31.9 ¹	6.1 ¹	1.1 ¹	31.9	29.4 ¹	7.6 ¹	1.8 ¹	27.9	31.5 ¹	7.2 ¹	1.4 ¹	32.2
炭水化物エネルギー比率(%)	56.1 ¹	8.0 ¹	0.4 ¹	56.3	57.3 ¹	8.4 ¹	0.8 ¹	58.0	52.8 ¹	6.7 ¹										

30-39歲				40-49歲				50-59歲				60-69歲				70歲以上			
平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值
52				71				73				108				151			
1670	494	70	1620	1769	510	62	1767	1719	565	64	1618	1757	401	44	1767	1735	454	38	1670
62.0	15.3	2.1	59.5	63.4	18.2	1.9	61.3	66.1	20.9	2.2	66.4	68.7	17.4	1.7	65.6	67.4	18.5	1.8	66.3
32.5	10.6	1.5	31.1	35.3	15.1	1.3	33.1	33.8	15.5	1.5	33.9	35.9	14.6	1.3	33.9	34.8	14.5	1.4	32.7
55.1	22.9	3.0	52.1	59.5	26.9	2.9	54.8	57.8	25.7	3.3	54.2	53.7	21.5	2.1	52.1	51.3	19.8	1.4	48.8
27.5	12.4	2.3	25.4	29.7	17.0	1.5	27.5	27.2	17.7	2.1	23.9	25.4	12.8	1.2	22.0	24.5	12.3	0.8	23.1
15.9	7.5	1.0	16.4	16.9	10.6	1.1	14.5	15.8	8.9	1.1	13.4	14.1	7.0	0.7	12.6	14.0	6.7	0.5	12.6
19.1	8.5	1.0	17.5	20.8	9.9	1.1	18.8	19.3	10.0	1.3	16.3	18.0	8.2	0.8	16.9	16.9	7.7	0.5	15.7
10.7	5.6	0.8	9.9	12.0	5.9	0.7	11.0	11.8	5.3	0.6	11.2	12.0	5.5	0.6	11.1	11.4	5.3	0.4	10.7
9.0	4.9	0.6	8.4	9.8	5.0	0.6	9.0	9.8	4.5	0.5	9.2	9.5	4.7	0.5	8.7	9.0	4.4	0.3	8.4
1.7	1.0	0.2	1.4	2.0	1.3	0.2	1.7	2.0	1.1	0.1	1.6	2.3	1.6	0.2	2.0	2.3	1.5	0.1	1.9
222.3	72.1	10.6	215.9	230.4	69.7	9.1	224.8	227.0	81.7	9.3	211.9	243.8	59.9	5.9	235.0	247.6	71.5	6.2	239.3
9.1	3.4	0.4	8.2	9.3	3.3	0.4	8.9	9.2	3.4	0.4	9.1	9.8	3.6	0.3	9.2	9.6	3.5	0.3	9.4
5.6	1.6	0.2	5.3	5.4	1.5	0.2	5.3	5.4	1.6	0.2	5.3	5.6	1.8	0.2	5.2	5.6	1.8	0.2	5.2
1845	624	72	1816	2084	748	90	1945	2378	884	75	2326	2626	898	89	2566	2616	958	105	2390
443	234	29	407	453	297	34	389	535	270	27	512	543	250	28	535	591	284	25	538
203	69	10	194	217	72	9	206	253	95	9	242	267	86	10	260	266	93	9	253
873	260	39	835	912	309	31	890	967	321	31	905	1004	271	29	973	1010	299	28	959
6.6	2.5	0.3	6.4	6.8	2.8	0.3	6.4	7.7	3.0	0.3	7.3	8.5	3.1	0.4	8.3	8.6	3.1	0.3	7.9
7.1	2.1	0.3	7.1	7.4	2.3	0.2	7.3	7.6	2.6	0.3	7.4	7.8	2.4	0.3	7.5	7.7	2.4	0.2	7.3
0.98	0.37	0.07	0.93	0.98	0.29	0.03	1.01	1.12	0.39	0.04	1.09	1.18	0.36	0.04	1.17	1.21	0.40	0.03	1.14
2.92	1.55	0.25	2.65	3.00	1.28	0.13	2.76	3.38	1.55	0.17	3.13	3.90	1.57	0.18	3.71	4.12	2.19	0.19	3.89
874	2416	348	48	584	1963	255	41	2278	8264	893	46	2419	11069	1062	73	1214	4298	401	65
40	25	3	32	39	26	3	36	40	31	4	33	48	30	3	41	42	28	2	35
5	3	0.4	5	6	4	0.4	5	6	4	0.4	4	6	3	0.3	6	6	3	0.2	5
152	91	14	136	136	67	8	130	157	89	9	144	142	76	8	121	158	87	8	137
539	720	92	367	603	950	83	379	470	344	40	391	558	346	42	505	592	517	44	488
5.7	8.5	1.0	2.7	6.5	7.2	0.9	3.3	6.4	7.3	0.8	3.7	9.0	9.6	0.7	6.0	7.3	7.1	0.6	4.8
5.6	3.2	0.4	5.1	6.3	3.6	0.4	5.4	6.9	3.6	0.5	6.2	7.6	3.5	0.3	7.0	7.3	3.4	0.3	6.7
227	150	24	178	191	121	16	169	272	178	19	235	314	225	24	250	318	210	19	298
0.75	0.32	0.04	0.73	0.79	0.32	0.04	0.71	0.87	0.35	0.03	0.82	0.89	0.33	0.04	0.87	0.91	0.39	0.03	0.82
1.08	0.54	0.08	0.98	1.16	0.54	0.07	1.00	1.21	0.46	0.04	1.14	1.17	0.44	0.04	1.08	1.37	0.54	0.05	1.27
12.2	4.4	0.4	11.6	13.4	4.6	0.5	13.2	14.1	5.9	0.7	13.2	15.6	5.7	0.6	14.6	14.7	7.4	0.7	13.1
0.90	0.34	0.05	0.86	1.05	0.40	0.04	1.04	1.10	0.42	0.04	1.04	1.24	0.44	0.05	1.19	1.22	0.47	0.05	1.14
4.5	4.5	0.6	2.6	6.0	7.1	0.9	3.5	4.4	3.4	0.3	3.7	6.8	5.7	0.6	5.3	6.5	5.8	0.5	4.7
238	108	16	226	268	144	16	250	310	123	14	294	364	137	15	352	376	169	16	352
5.04	1.68	0.25	4.96	5.14	1.94	0.20	5.07	5.48	1.84	0.17	5.32	5.52	1.57	0.16	5.41	5.91	1.84	0.18	5.69
22.1	18.8	2.7	18.6	25.0	26.2	2.9	19.8	24.9	12.1	1.5	25.5	24.0	8.9	0.9	24.0	27.3	14.3	1.2	26.0
62	39	5	54	80	56	6	60	104	73	9	86	151	94	10	137	154	93	10	135
292	133	16	271	315	176	19	297	265	152	21	255	279	145	13	263	281	138	10	263
12.3	5.0	0.7	10.9	12.3	4.7	0.6	11.4	15.0	6.9	0.7	14.2	17.6	6.3	0.7	17.2	17.2	7.3	0.7	15.7
2.8	1.2	0.2	2.5	2.9	1.3	0.2	2.8	3.4	1.6	0.2	3.4	4.1	1.6	0.2	3.8	4.0	1.8	0.2	3.8
9.1	3.9	0.5	8.2	9.1	3.4	0.4	8.4	10.9	5.2	0.6	9.9	12.8	4.6	0.5	12.7	12.7	5.4	0.5	11.8
29.4	6.6	0.9	29.8	29.8	8.9	0.9	29.4	29.7	7.1	1.0	29.6	27.1	7.4	0.6	26.5	26.5	6.9	0.6	26.1
55.3	7.2	1.0	55.0	55.7	9.3	1.0	55.8	54.7	7.9	1.1	55.3	57.1	7.7	0.7	56.6	57.8	7.5	0.6	58.4
52.6	11.4	1.8	52.5	54.7	13.0	1.5	56.3	49.6	14.5	1.5	50.5	51.2	12.5	1.2	52.2	50.5	12.2	1.1	51.4
43.2	12.3	1.5	42.8	38.1	13.7	1.5	38.7	37.6	11.1	1.7	36.3	37.2	11.6	1.1	35.7	35.9	12.1	1.1	36.0

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(1歳以上、女性、年齢階級別)

	(再掲) 20歳以上				(再掲) 20-39歳				(再掲) 40-64歳				(再掲) 65歳以上			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	495				92				184				219			
エネルギー(kcal)	1733 ¹	482 ¹	28 ¹	1705	1684 ¹	527 ¹	63 ¹	1674	1755 ¹	512 ¹	45 ¹	1715	1735 ¹	436 ¹	31 ¹	1690
たんぱく質(g)	66.2 ¹	18.7 ¹	1.0 ¹	65.0	63.8 ¹	18.9 ¹	2.3 ¹	63.7	65.5 ¹	18.7 ¹	1.4 ¹	64.9	67.9 ¹	18.6 ¹	1.4 ¹	66.0
うち動物性(g)	35.0 ¹	14.6 ¹	0.8 ¹	33.5	35.0 ¹	13.7 ¹	1.5 ¹	33.6	34.6 ¹	14.5 ¹	0.9 ¹	32.8	35.4 ¹	15.0 ¹	1.2 ¹	34.3
脂質(g)	55.1 ¹	23.3 ¹	1.3 ¹	52.0	57.6 ¹	24.8 ¹	2.8 ¹	54.1	58.3 ¹	26.0 ¹	2.1 ¹	54.6	51.4 ¹	19.4 ¹	1.1 ¹	49.4
うち動物性(g)	27.0 ¹	15.2 ¹	0.8 ¹	24.4	30.8 ¹	17.4 ¹	2.0 ¹	27.1	28.3 ¹	16.7 ¹	1.2 ¹	24.4	24.3 ¹	12.1 ¹	0.7 ¹	22.7
飽和脂肪酸(g)	15.3 ¹	8.5 ¹	0.4 ¹	13.5	17.1 ¹	9.9 ¹	1.0 ¹	15.9	16.2 ¹	9.5 ¹	0.7 ¹	13.7	13.7 ¹	6.4 ¹	0.4 ¹	12.6
一価不飽和脂肪酸(g)	18.6 ¹	8.8 ¹	0.5 ¹	17.0	19.8 ¹	8.8 ¹	1.0 ¹	18.3	19.7 ¹	9.7 ¹	0.8 ¹	18.1	17.2 ¹	7.8 ¹	0.4 ¹	16.5
多価不飽和脂肪酸(g)	11.6 ¹	5.4 ¹	0.3 ¹	10.8	10.9 ¹	5.3 ¹	0.6 ¹	9.8	11.9 ¹	5.6 ¹	0.5 ¹	11.1	11.6 ¹	5.4 ¹	0.3 ¹	10.7
n-6系脂肪酸(g)	9.3 ¹	4.6 ¹	0.2 ¹	8.7	9.1 ¹	4.6 ¹	0.5 ¹	8.3	9.8 ¹	4.7 ¹	0.4 ¹	9.2	9.1 ¹	4.4 ¹	0.3 ¹	8.4
n-3系脂肪酸(g)	2.1 ¹	1.4 ¹	0.1 ¹	1.8	1.7 ¹	1.0 ¹	0.1 ¹	1.5	2.0 ¹	1.2 ¹	0.1 ¹	1.8	2.4 ¹	1.6 ¹	0.1 ¹	2.0
炭水化物(g)	236.1 ¹	71.2 ¹	4.2 ¹	229.2	219.7 ¹	72.4 ¹	9.1 ¹	214.1	232.5 ¹	72.0 ¹	6.4 ¹	224.8	245.9 ¹	68.9 ¹	5.1 ¹	235.6
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	9.4 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	8.9	8.8 ¹	3.5 ¹	0.4 ¹	8.2	9.4 ¹	3.4 ¹	0.3 ¹	9.1	9.7 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	9.2
食塩(g/1,000kcal)	5.5 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.2	5.4 ¹	1.7 ¹	0.2 ¹	5.2	5.4 ¹	1.6 ¹	0.1 ¹	5.3	5.7 ¹	1.8 ¹	0.1 ¹	5.2
カリウム(mg)	2382 ¹	908 ¹	50 ¹	2254	1943 ¹	739 ¹	107 ¹	1960	2304 ¹	816 ¹	62 ¹	2241	2631 ¹	967 ¹	88 ¹	2465
カルシウム(mg)	531 ¹	282 ¹	14 ¹	495	477 ¹	294 ¹	35 ¹	465	507 ¹	274 ¹	18 ¹	479	574 ¹	279 ¹	23 ¹	533
マグネシウム(mg)	247 ¹	89 ¹	5 ¹	242	210 ¹	76 ¹	11 ¹	212	241 ¹	84 ¹	7 ¹	238	267 ¹	93 ¹	7 ¹	254
リン(mg)	968 ¹	302 ¹	16 ¹	925	903 ¹	308 ¹	39 ¹	848	956 ¹	302 ¹	20 ¹	915	1007 ¹	295 ¹	24 ¹	960
鉄(mg)	7.9 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	7.4	6.8 ¹	2.8 ¹	0.4 ¹	6.5	7.6 ¹	3.0 ¹	0.2 ¹	7.2	8.5 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	8.1
亜鉛(mg)	7.6 ¹	2.5 ¹	0.1 ¹	7.3	7.5 ¹	2.8 ¹	0.3 ¹	7.2	7.6 ¹	2.4 ¹	0.1 ¹	7.5	7.7 ¹	2.5 ¹	0.2 ¹	7.2
銅(mg)	1.12 ¹	0.38 ¹	0.02 ¹	1.09	0.99 ¹	0.37 ¹	0.05 ¹	0.96	1.08 ¹	0.35 ¹	0.03 ¹	1.08	1.20 ¹	0.39 ¹	0.03 ¹	1.14
マンガン(mg)	3.55 ¹	1.78 ¹	0.10 ¹	3.24	2.78 ¹	1.31 ¹	0.17 ¹	2.64	3.29 ¹	1.40 ¹	0.09 ¹	3.07	4.10 ¹	2.06 ¹	0.16 ¹	3.80
ヨウ素(μg)	1581 ¹	6838 ¹	361 ¹	55	1415 ¹	4481 ¹	568 ¹	54	1234 ¹	5431 ¹	395 ¹	48	1942 ¹	8519 ¹	563 ¹	63
セレン(μg)	42 ¹	28 ¹	1 ¹	35	39 ¹	26 ¹	3 ¹	31	40 ¹	27 ¹	2 ¹	35	45 ¹	30 ¹	2 ¹	37
クロム(μg)	6 ¹	3 ¹	0.2 ¹	5	5 ¹	3 ¹	0.3 ¹	5	6 ¹	4 ¹	0.3 ¹	5	6 ¹	3 ¹	0.2 ¹	5
モリブデン(μg)	149 ¹	82 ¹	4 ¹	133	145 ¹	83 ¹	11 ¹	131	149 ¹	81 ¹	6 ¹	135	150 ¹	83 ¹	6 ¹	128
ビタミンA(μgRE)	548 ¹	559 ¹	26 ¹	433	486 ¹	561 ¹	59 ¹	383	538 ¹	641 ¹	36 ¹	399	583 ¹	478 ¹	36 ¹	482
ビタミンD(μg)	7.2 ¹	7.9 ¹	0.4 ¹	4.2	6.0 ¹	7.9 ¹	0.7 ¹	2.9	6.8 ¹	8.2 ¹	0.5 ¹	3.6	8.0 ¹	7.7 ¹	0.5 ¹	5.4
ビタミンE(mg)	6.9 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	6.3	5.8 ¹	3.2 ¹	0.4 ¹	5.2	6.8 ¹	3.5 ¹	0.3 ¹	6.3	7.4 ¹	3.5 ¹	0.3 ¹	6.8
ビタミンK(μg)	274 ¹	193 ¹	11 ¹	224	221 ¹	143 ¹	17 ¹	178	249 ¹	179 ¹	17 ¹	205	318 ¹	213 ¹	16 ¹	275
ビタミンB1(mg)	0.86 ¹	0.36 ¹	0.01 ¹	0.81	0.79 ¹	0.34 ¹	0.04 ¹	0.77	0.84 ¹	0.33 ¹	0.02 ¹	0.80	0.91 ¹	0.38 ¹	0.03 ¹	0.83
ビタミンB2(mg)	1.23 ¹	0.52 ¹	0.02 ¹	1.13	1.13 ¹	0.57 ¹	0.07 ¹	1.03	1.18 ¹	0.48 ¹	0.03 ¹	1.08	1.31 ¹	0.52 ¹	0.04 ¹	1.20
ナイアシン(mgNE)	14.2 ¹	6.1 ¹	0.3 ¹	13.2	12.6 ¹	4.7 ¹	0.5 ¹	11.8	14.0 ¹	5.2 ¹	0.4 ¹	13.5	15.1 ¹	7.1 ¹	0.5 ¹	13.9
ビタミンB6(mg)	1.14 ¹	0.45 ¹	0.02 ¹	1.08	0.96 ¹	0.41 ¹	0.06 ¹	0.91	1.11 ¹	0.41 ¹	0.03 ¹	1.08	1.23 ¹	0.47 ¹	0.04 ¹	1.16
ビタミンB12(μg)	5.8 ¹	5.5 ¹	0.3 ¹	4.1	4.6 ¹	4.0 ¹	0.4 ¹	2.7	5.3 ¹	5.4 ¹	0.5 ¹	3.8	6.8 ¹	5.9 ¹	0.4 ¹	5.0
葉酸(μg)	324 ¹	151 ¹	9 ¹	307	245 ¹	109 ¹	16 ¹	228	301 ¹	133 ¹	10 ¹	289	376 ¹	162 ¹	14 ¹	355
パントテン酸(mg)	5.50 ¹	1.83 ¹	0.09 ¹	5.31	5.12 ¹	1.91 ¹	0.25 ¹	4.99	5.37 ¹	1.82 ¹	0.13 ¹	5.16	5.77 ¹	1.78 ¹	0.14 ¹	5.51
ビオチン(μg)	24.8 ¹	15.8 ¹	0.8 ¹	22.7	21.4 ¹	15.9 ¹	1.8 ¹	19.0	24.6 ¹	18.4 ¹	1.3 ¹	21.8	26.4 ¹	13.0 ¹	0.9 ¹	25.3
ビタミンC(mg)	120 ¹	86 ¹	5 ¹	103	71 ¹	47 ¹	6 ¹	56	101 ¹	72 ¹	6 ¹	83	157 ¹	94 ¹	9 ¹	143
コレステロール(mg)	291 ¹	162 ¹	9 ¹	273	321 ¹	203 ¹	22 ¹	300	296 ¹	164 ¹	13 ¹	289	274 ¹	137 ¹	9 ¹	259
食物繊維総量(g)	15.4 ¹	6.8 ¹	0.4 ¹	14.7	12.5 ¹	5.6 ¹	0.8 ¹	11.0	14.4 ¹	6.1 ¹	0.6 ¹	13.2	17.5 ¹	7.1 ¹	0.6 ¹	16.3
うち水溶性(g)	3.6 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	3.4	3.0 ¹	1.5 ¹	0.2 ¹	2.5	3.3 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	3.1	4.1 ¹	1.8 ¹	0.1 ¹	3.8
うち不溶性(g)	11.3 ¹	5.0 ¹	0.3 ¹	10.8	9.1 ¹	4.3 ¹	0.7 ¹	8.2	10.5 ¹	4.5 ¹	0.4 ¹	9.4	12.8 ¹	5.3 ¹	0.5 ¹	12.1
脂肪エネルギー比率(%)	28.3 ¹	7.5 ¹	0.4 ¹	27.6	30.3 ¹	6.9 ¹	0.8 ¹	30.9	29.3 ¹	8.1 ¹	0.6 ¹	29.3	26.6 ¹	6.8 ¹	0.4 ¹	26.2
炭水化物エネルギー比率(%)	56.2 ¹	8.0 ¹	0.4 ¹	56.5	54.3 ¹	7.5 ¹	0.8 ¹	53.6	55.6 ¹	8.6 ¹	0.6 ¹	55.5	57.6 ¹	7.4 ¹	0.5 ¹	57.9
動物性たんぱく質比率(%)	51.8 ¹	12.6 ¹	0.7 ¹	52.6	54.4 ¹	11.2 ¹	1.3 ¹	54.1	51.7 ¹	13.5 ¹	1.0 ¹	52.8	50.9 ¹	12.4 ¹	0.8 ¹	51.7
穀類エネルギー比率(%)	37.6 ¹	12.2 ¹	0.6 ¹	37.2	40.7 ¹	12.1 ¹	1.3 ¹	41.2	37.8 ¹	12.5 ¹	1.1 ¹	36.9	36.2 ¹	11.7 ¹	0.9 ¹	35.9

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(20歳以上、男性、保健所別)

	総 数				習志野				市 川				松 戸				野 田			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	431				24				46				21				26			
エネルギー(kcal)	2073 ¹	540 ¹	28 ¹	2046	2107 ¹	505 ¹	37 ¹	2061	1957 ¹	490 ¹	128 ¹	1964	2214 ¹	442 ¹	129 ¹	2300	1983 ¹	519 ¹	37 ¹	1932
たんぱく質(g)	76.2 ¹	23.4 ¹	1.5 ¹	75.6	70.0 ¹	21.5 ¹	1.6 ¹	67.4	68.9 ¹	20.4 ¹	5.1 ¹	69.0	84.8 ¹	21.8 ¹	6.5 ¹	80.2	71.5 ¹	20.5 ¹	4.0 ¹	75.6
うち動物性(g)	41.4 ¹	18.5 ¹	1.2 ¹	39.5	36.0 ¹	16.9 ¹	1.7 ¹	33.7	35.2 ¹	15.7 ¹	3.2 ¹	32.9	47.1 ¹	19.2 ¹	3.9 ¹	41.9	34.4 ¹	15.6 ¹	1.5 ¹	36.6
脂質(g)	61.6 ¹	24.8 ¹	1.2 ¹	60.0	58.5 ¹	20.0 ¹	0.6 ¹	58.0	60.5 ¹	22.9 ¹	5.3 ¹	62.4	58.3 ¹	17.3 ¹	4.0 ¹	56.4	55.0 ¹	24.6 ¹	3.5 ¹	59.2
うち動物性(g)	31.1 ¹	17.1 ¹	0.7 ¹	28.6	30.0 ¹	16.6 ¹	1.1 ¹	27.9	28.4 ¹	16.1 ¹	2.5 ¹	26.4	29.8 ¹	11.2 ¹	3.5 ¹	28.7	25.0 ¹	15.2 ¹	2.3 ¹	25.4
飽和脂肪酸(g)	16.2 ¹	7.7 ¹	0.4 ¹	15.3	15.2 ¹	6.4 ¹	0.7 ¹	14.5	15.4 ¹	6.2 ¹	1.1 ¹	15.2	15.3 ¹	5.7 ¹	1.0 ¹	13.0	13.9 ¹	6.9 ¹	1.2 ¹	14.2
一価不飽和脂肪酸(g)	21.6 ¹	9.9 ¹	0.5 ¹	20.1	21.2 ¹	7.8 ¹	0.3 ¹	21.0	21.7 ¹	9.4 ¹	1.8 ¹	21.7	19.3 ¹	7.3 ¹	1.7 ¹	18.9	19.2 ¹	9.8 ¹	1.4 ¹	20.3
多価不飽和脂肪酸(g)	13.3 ¹	5.9 ¹	0.3 ¹	12.5	12.6 ¹	4.2 ¹	0.1 ¹	11.6	13.1 ¹	6.4 ¹	1.0 ¹	11.2	13.0 ¹	5.2 ¹	1.2 ¹	13.7	12.8 ¹	5.8 ¹	0.1 ¹	12.7
n-6系脂肪酸(g)	10.7 ¹	5.1 ¹	0.3 ¹	9.8	10.6 ¹	3.6 ¹	0.0 ¹	10.1	10.8 ¹	5.4 ¹	0.7 ¹	9.1	9.7 ¹	3.9 ¹	0.6 ¹	10.7	10.3 ¹	5.5 ¹	0.0 ¹	10.0
n-3系脂肪酸(g)	2.4 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	2.2	1.9 ¹	0.9 ¹	0.1 ¹	1.7	2.2 ¹	1.4 ¹	0.4 ¹	1.8	3.2 ¹	2.1 ¹	0.6 ¹	2.6	2.0 ¹	1.2 ¹	0.0 ¹	2.0
炭水化物(g)	277.2 ¹	78.4 ¹	4.4 ¹	273.8	288.8 ¹	84.6 ¹	3.2 ¹	265.6	260.2 ¹	66.7 ¹	13.3 ¹	259.4	319.5 ¹	74.1 ¹	16.6 ¹	315.6	274.0 ¹	75.6 ¹	12.3 ¹	273.8
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	10.9 ¹	3.6 ¹	0.2 ¹	10.5	10.7 ¹	4.2 ¹	0.7 ¹	10.5	10.2 ¹	3.6 ¹	0.9 ¹	10.1	11.7 ¹	3.1 ¹	0.7 ¹	12.1	10.9 ¹	2.9 ¹	0.7 ¹	10.4
食塩(g/1,000kcal)	5.4 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.1	5.0 ¹	1.4 ¹	0.2 ¹	5.0	5.2 ¹	1.5 ¹	0.2 ¹	5.1	5.3 ¹	1.3 ¹	0.0 ¹	5.1	5.7 ¹	1.5 ¹	0.2 ¹	5.7
カリウム(mg)	2506 ¹	989 ¹	57 ¹	2382	2313 ¹	783 ¹	23 ¹	2177	2440 ¹	894 ¹	175 ¹	2419	3214 ¹	1102 ¹	265 ¹	3062	2334 ¹	1176 ¹	181 ¹	1973
カルシウム(mg)	540 ¹	315 ¹	18 ¹	483	439 ¹	223 ¹	21 ¹	406	526 ¹	238 ¹	31 ¹	494	667 ¹	297 ¹	95 ¹	532	517 ¹	333 ¹	71 ¹	437
マグネシウム(mg)	271 ¹	100 ¹	6 ¹	261	264 ¹	106 ¹	9 ¹	229	262 ¹	89 ¹	19 ¹	252	320 ¹	94 ¹	25 ¹	295	262 ¹	107 ¹	20 ¹	238
リン(mg)	1078 ¹	365 ¹	22 ¹	1045	1007 ¹	346 ¹	13 ¹	946	999 ¹	313 ¹	69 ¹	975	1243 ¹	360 ¹	121 ¹	1159	982 ¹	315 ¹	68 ¹	1018
鉄(mg)	8.4 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	8.0	7.5 ¹	2.7 ¹	0.2 ¹	7.3	8.2 ¹	2.9 ¹	0.6 ¹	7.6	9.4 ¹	3.0 ¹	1.0 ¹	9.0	8.3 ¹	3.1 ¹	0.4 ¹	8.1
亜鉛(mg)	8.9 ¹	3.0 ¹	0.2 ¹	8.5	9.1 ¹	3.0 ¹	0.1 ¹	8.9	8.8 ¹	3.1 ¹	0.9 ¹	8.4	9.7 ¹	3.0 ¹	0.9 ¹	8.5	8.5 ¹	2.8 ¹	0.1 ¹	8.4
銅(mg)	1.24 ¹	0.41 ¹	0.02 ¹	1.23	1.18 ¹	0.35 ¹	0.01 ¹	1.18	1.18 ¹	0.42 ¹	0.09 ¹	1.09	1.51 ¹	0.40 ¹	0.12 ¹	1.50	1.21 ¹	0.39 ¹	0.04 ¹	1.15
マンガン(mg)	3.86 ¹	1.58 ¹	0.10 ¹	3.61	3.70 ¹	1.65 ¹	0.28 ¹	3.38	3.61 ¹	1.34 ¹	0.18 ¹	3.59	5.19 ¹	2.22 ¹	0.67 ¹	4.61	3.51 ¹	1.53 ¹	0.03 ¹	3.25
ヨウ素(μg)	1496 ¹	5492 ¹	263 ¹	68	1947 ¹	4298 ¹	500 ¹	145	1638 ¹	5469 ¹	808 ¹	85	4346 ¹	10188 ¹	1916 ¹	91	218 ¹	427 ¹	12 ¹	50
セレン(μg)	50 ¹	33 ¹	2 ¹	43	38 ¹	21 ¹	4 ¹	38	48 ¹	30 ¹	4 ¹	43	51 ¹	27 ¹	4 ¹	51	48 ¹	33 ¹	4 ¹	36
クロム(μg)	6 ¹	4 ¹	0.2 ¹	6	5 ¹	3 ¹	0.3 ¹	5	6 ¹	4 ¹	1 ¹	5	7 ¹	3 ¹	1 ¹	7	5 ¹	3 ¹	0.0 ¹	5
モリブデン(μg)	182 ¹	87 ¹	4 ¹	168	194 ¹	86 ¹	8 ¹	177	159 ¹	70 ¹	0.4 ¹	148	218 ¹	98 ¹	27 ¹	207	164 ¹	69 ¹	3 ¹	142
ビタミンA(μgRE)	560 ¹	698 ¹	35 ¹	438	475 ¹	521 ¹	74 ¹	285	481 ¹	259 ¹	60 ¹	478	609 ¹	391 ¹	97 ¹	500	647 ¹	572 ¹	92 ¹	453
ビタミンD(μg)	7.7 ¹	8.0 ¹	0.5 ¹	4.4	3.1 ¹	2.8 ¹	0.6 ¹	2.1	6.7 ¹	6.4 ¹	1.0 ¹	4.6	9.0 ¹	7.7 ¹	1.9 ¹	7.0	5.9 ¹	6.1 ¹	1.3 ¹	3.4
ビタミンE(mg)	7.3 ¹	3.6 ¹	0.2 ¹	6.7	6.9 ¹	5.4 ¹	0.1 ¹	6.2	7.2 ¹	3.9 ¹	0.8 ¹	6.4	7.6 ¹	2.4 ¹	0.6 ¹	7.3	7.6 ¹	4.1 ¹	0.9 ¹	7.2
ビタミンK(μg)	280 ¹	204 ¹	10 ¹	234	259 ¹	176 ¹	47 ¹	207	260 ¹	174 ¹	17 ¹	220	282 ¹	165 ¹	32 ¹	234	272 ¹	269 ¹	55 ¹	192
ビタミンB1(mg)	0.97 ¹	0.44 ¹	0.02 ¹	0.91	0.87 ¹	0.28 ¹	0.00 ¹	0.84	0.88 ¹	0.37 ¹	0.06 ¹	0.86	1.06 ¹	0.55 ¹	0.11 ¹	0.90	0.96 ¹	0.47 ¹	0.05 ¹	0.84
ビタミンB2(mg)	1.26 ¹	0.54 ¹	0.03 ¹	1.20	1.08 ¹	0.37 ¹	0.05 ¹	1.16	1.14 ¹	0.42 ¹	0.07 ¹	1.15	1.49 ¹	0.56 ¹	0.09 ¹	1.33	1.13 ¹	0.54 ¹	0.10 ¹	1.04
ナイアシン(mgNE)	17.3 ¹	7.8 ¹	0.5 ¹	16.2	16.1 ¹	8.2 ¹	1.8 ¹	14.4	15.9 ¹	6.5 ¹	1.4 ¹	14.7	19.5 ¹	8.3 ¹	1.8 ¹	18.1	15.5 ¹	6.5 ¹	1.1 ¹	16.6
ビタミンB6(mg)	1.29 ¹	0.54 ¹	0.03 ¹	1.21	1.16 ¹	0.59 ¹	0.07 ¹	1.06	1.17 ¹	0.49 ¹	0.12 ¹	1.15	1.65 ¹	0.80 ¹	0.06 ¹	1.66	1.24 ¹	0.72 ¹	0.11 ¹	1.07
ビタミンB12(μg)	6.9 ¹	7.0 ¹	0.4 ¹	4.8	5.6 ¹	6.5 ¹	0.6 ¹	3.0	5.8 ¹	5.1 ¹	0.9 ¹	3.5	7.6 ¹	5.5 ¹	1.4 ¹	6.7	5.3 ¹	5.3 ¹	0.5 ¹	3.3
葉酸(μg)	329 ¹	157 ¹	9 ¹	313	284 ¹	127 ¹	19 ¹	270	323 ¹	134 ¹	17 ¹	312	400 ¹	181 ¹	33 ¹	367	310 ¹	164 ¹	28 ¹	287
パントテン酸(mg)	6.01 ¹	2.13 ¹	0.11 ¹	5.83	5.76 ¹	1.89 ¹	0.04 ¹	5.15	5.57 ¹	1.91 ¹	0.24 ¹	5.31	6.80 ¹	2.01 ¹	0.33 ¹	6.85	5.48 ¹	2.03 ¹	0.23 ¹	5.73
ビオチン(μg)	26.1 ¹	19.0 ¹	1.2 ¹	24.0	22.1 ¹	8.4 ¹	0.8 ¹	19.9	26.6 ¹	10.8 ¹	1.3 ¹	25.8	29.0 ¹	10.0 ¹	2.8 ¹	29.6	22.4 ¹	8.8 ¹	0.4 ¹	23.2
ビタミンC(mg)	109 ¹	76 ¹	4 ¹	85	85 ¹	66 ¹	10 ¹	70	111 ¹	73 ¹	7 ¹	96	142 ¹	95 ¹	14 ¹	112	98 ¹	76 ¹	6 ¹	73
コレステロール(mg)	319 ¹	171 ¹	11 ¹	299	318 ¹	165 ¹	13 ¹	298	305 ¹	167 ¹	30 ¹	293	317 ¹	131 ¹	28 ¹	334	242 ¹	140 ¹	10 ¹	258
食物繊維総量(g)	15.6 ¹	7.0 ¹	0.4 ¹	14.9	14.5 ¹	6.6 ¹	0.4 ¹	13.6	15.9 ¹	6.8 ¹	1.0 ¹	15.0	19.2 ¹	8.3 ¹	2.1 ¹	16.7	15.9 ¹	7.8 ¹	1.7 ¹	14.9
うち水溶性(g)	3.6 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	3.4	3.4 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	3.2	3.5 ¹	1.6 ¹	0.3 ¹	3.3	4.1 ¹	2.0 ¹	0.6 ¹	3.7	3.9 ¹	2.0 ¹	0.3 ¹	3.7
うち不溶性(g)	11.4 ¹	5.3 ¹	0.3 ¹	10.9	10.5 ¹	5.0 ¹	0.2 ¹	9.5	11.7 ¹	5.4 ¹	0.8 ¹	11.1	14.2 ¹	6.7 ¹	1.5 ¹	13.1	11.5 ¹	5.8 ¹	1.3 ¹	11.3
脂肪エネルギー比率(%)	26.5 ¹	7.3 ¹	0.4 ¹	26.0	25.0 ¹	6.1 ¹	1.0 ¹	24.2	27.8 ¹	8.0 ¹	1.2 ¹	28.3	23.7 ¹	5.1 ¹	0.5 ¹	22.0	24.4 ¹	8.4 ¹	2.0 ¹	24.9
炭水化物エネルギー比率(%)	58.7 ¹	8.2 ¹	0.5 ¹	59.0	61.8 ¹	7.1 ¹	0.9													

印旂				香取				海匠				山武				長生				夷隅			
平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
28				12				24				33				36				27			
2107	530	46	2091	2197	607	0	2202	2200	626	33	2153	1980	555	19	2004	2073	582	75	2016	2058	458	21	2058
72.1	20.7	0.0	71.2	76.6	30.7	0.0	77.1	86.0	23.4	0.3	82.1	72.0	26.8	1.0	73.0	77.9	24.3	3.5	74.1	74.6	22.2	5.9	70.6
37.8	16.2	1.6	34.7	38.6	19.8	0.0	41.3	49.7	15.2	1.8	50.9	38.2	22.6	1.2	36.2	44.6	18.8	1.1	42.0	38.3	19.1	5.1	36.2
64.0	25.2	2.6	61.2	63.1	26.0	0.0	59.7	67.8	28.3	0.9	62.8	59.4	25.7	2.7	58.5	62.4	29.0	4.6	57.7	63.5	22.2	1.8	54.6
32.7	18.7	2.0	29.2	31.0	13.5	0.0	32.1	34.5	12.8	2.0	33.0	32.4	23.1	1.6	33.6	32.1	19.4	0.7	28.1	33.4	17.0	1.3	27.1
17.3	7.6	0.2	16.3	16.8	7.5	0.0	17.3	18.0	7.7	0.1	16.7	16.5	9.9	1.0	16.5	16.5	9.3	0.9	13.5	16.1	7.1	0.2	14.5
22.8	10.1	0.9	21.8	22.1	10.4	0.0	19.9	24.3	11.7	0.7	21.1	20.4	9.8	1.7	19.3	22.2	11.0	1.8	21.0	22.2	8.0	0.4	19.2
13.6	6.7	1.4	13.4	14.9	7.0	0.0	12.1	14.9	9.0	0.5	11.6	11.8	5.1	0.0	10.9	13.6	6.1	1.5	12.9	14.9	4.4	0.2	14.3
11.5	5.8	1.2	11.7	11.8	6.2	0.0	8.5	12.1	7.6	0.4	9.5	9.6	4.3	0.1	9.3	10.8	5.2	1.3	10.3	12.0	3.7	0.0	11.2
2.0	1.1	0.2	2.0	3.1	1.6	0.0	3.2	2.7	2.0	0.1	2.4	1.9	1.1	0.0	1.6	2.6	2.0	0.2	2.2	2.8	1.5	0.1	2.8
276.6	68.8	4.6	280.7	310.2	81.1	0.0	319.4	280.6	94.8	11.6	272.5	269.5	62.5	6.0	270.0	280.3	87.8	9.4	276.1	276.0	76.9	8.7	279.5
10.8	3.2	0.3	10.1	10.9	4.8	0.0	9.3	11.4	3.2	0.2	12.0	9.8	3.9	0.1	10.3	10.0	3.7	0.1	9.1	11.0	2.5	0.6	10.8
5.3	1.4	0.3	5.0	5.1	2.2	0.0	4.8	5.3	1.1	0.0	5.4	5.1	2.2	0.1	4.9	4.9	1.7	0.2	4.4	5.5	1.6	0.3	5.1
2314	864	158	2258	2455	865	0	2544	2823	985	26	2923	2232	1269	28	1884	2436	1191	290	2399	2294	785	85	2162
490	280	21	444	601	360	0	527	583	338	19	510	574	425	4	534	506	406	101	413	456	204	24	429
243	85	15	242	289	115	0	280	299	108	3	308	246	130	2	244	277	121	34	272	267	86	11	251
1002	309	37	1034	1185	519	0	1138	1230	367	4	1261	1023	484	17	925	1046	377	74	1015	995	328	76	955
7.0	2.5	0.4	7.0	7.9	3.3	0.0	7.4	9.5	3.2	0.1	9.3	8.1	3.8	0.0	7.1	8.4	3.8	0.9	7.4	8.7	2.6	0.0	8.2
8.6	2.0	0.3	8.6	8.7	3.3	0.0	8.6	9.7	2.2	0.3	9.5	9.1	4.1	0.0	8.5	8.6	3.0	0.5	8.7	8.1	1.7	0.4	8.1
1.15	0.38	0.10	1.08	1.37	0.57	0.00	1.25	1.33	0.49	0.01	1.27	1.19	0.45	0.02	1.11	1.27	0.41	0.09	1.26	1.20	0.32	0.00	1.23
3.52	1.42	0.28	3.32	3.48	1.46	0.00	3.42	3.85	1.18	0.06	3.84	3.63	1.30	0.04	3.35	4.02	1.74	0.54	3.76	4.03	1.52	0.24	3.99
2119	7997	939	43	95	87	0	82	1708	3715	338	79	2231	9735	456	49	1309	4194	360	56	2725	9358	1061	75
50	35	10	42	47	39	0	39	64	35	0.3	57	34	22	0.1	33	44	27	0.2	36	56	38	6	52
6	4	1	5	5	4	0	4	8	4	1	8	5	3	0.1	4	6	4	1	5	7	4	1	6
170	89	3	156	202	98	0	174	194	81	21	184	206	97	5	204	194	86	3	177	191	108	5	203
445	322	18	335	816	1332	0	407	1014	2214	140	454	469	394	74	331	534	397	78	440	407	277	20	357
5.6	6.6	0.1	2.7	12.3	12.3	0.0	7.8	7.3	7.6	0.3	6.7	7.0	9.3	0.4	2.7	9.8	9.3	0.3	7.2	7.0	6.7	0.4	5.2
7.0	3.6	1.1	7.5	6.7	3.1	0.0	5.5	7.1	3.8	0.4	6.2	6.0	3.2	0.1	5.3	7.4	3.7	1.0	6.0	6.8	2.4	0.4	6.8
246	214	17	172	224	193	0	153	364	286	24	352	279	226	6	240	332	253	31	305	293	177	14	287
1.04	0.51	0.01	0.94	0.93	0.55	0.00	0.85	1.04	0.44	0.03	0.99	0.97	0.52	0.00	0.83	0.91	0.50	0.07	0.75	0.83	0.28	0.05	0.86
1.16	0.51	0.08	1.10	1.28	0.59	0.00	1.38	1.54	0.60	0.08	1.47	1.26	0.67	0.01	1.15	1.18	0.58	0.10	1.10	1.13	0.38	0.01	1.12
16.4	7.0	0.5	15.4	18.0	13.1	0.0	11.7	20.5	7.1	0.1	19.7	13.4	5.9	0.5	13.2	16.5	6.3	0.8	15.3	15.9	6.2	1.1	16.1
1.23	0.42	0.03	1.21	1.20	0.53	0.00	1.10	1.47	0.42	0.00	1.43	1.15	0.58	0.02	1.03	1.26	0.51	0.08	1.24	1.19	0.38	0.09	1.20
3.6	2.9	0.3	2.2	7.7	6.7	0.0	5.4	10.2	13.4	1.6	5.8	5.9	6.7	0.4	4.6	7.8	7.3	0.5	5.2	8.3	7.8	0.8	3.9
268	114	17	271	271	111	0	281	415	299	19	374	289	156	2	272	336	161	39	295	307	95	9	336
5.66	1.69	0.05	5.73	6.14	2.63	0.00	5.68	7.35	2.55	0.25	7.06	5.84	2.50	0.14	5.75	5.79	2.21	0.33	5.87	5.57	1.92	0.28	5.49
19.8	8.5	1.5	19.2	24.8	12.7	0.0	21.1	42.9	62.5	6.8	28.2	20.8	11.6	0.5	17.7	25.4	12.5	2.7	24.7	24.7	10.1	0.3	24.1
87	63	14	69	82	66	0	69	94	58	4	78	89	64	7	71	109	86	24	81	101	63	14	97
238	117	7	237	320	214	0	259	434	199	22	428	318	198	8	279	348	193	13	329	269	130	17	280
14.5	6.3	0.8	14.9	13.9	9.3	0.0	12.1	16.9	7.7	0.6	15.0	13.8	7.8	0.1	12.0	15.5	7.9	2.1	13.6	14.8	4.6	0.5	13.8
3.4	1.7	0.3	3.3	3.3	2.3	0.0	2.8	4.0	1.9	0.5	3.4	3.3	1.9	0.1	2.9	3.5	2.0	0.6	3.2	3.4	1.2	0.05	3.2
10.7	4.9	0.6	10.8	10.4	6.5	0.0	9.5	12.3	6.0	0.1	11.0	9.8	5.4	0.1	8.7	11.5	5.9	1.5	10.0	10.5	3.2	0.3	9.8
27.0	7.1	0.9	28.1	25.5	6.2	0.0	23.9	27.7	6.2	0.6	27.8	26.4	7.0	1.6	25.9	26.4	8.2	1.2	25.6	27.9	7.1	0.3	25.8
59.3	7.3	0.6	60.6	60.8	7.5	0.0	59.4	56.2	8.3	1.0	56.5	59.3	8.5	1.6	59.4	58.4	8.5	1.0	59.9	57.5	8.0	1.3	57.6
50.9	11.1	1.7	51.7	48.5	14.7	0.0	51.4	58.3	11.3	2.2	57.8	50.4	16.0	0.8	54.9	56.0	10.4	1.3	54.3	48.9	15.8	2.4	52.4
43.1	11.9	0.4	44.6	43.5	9.2	0.0	40.4	33.9	11.0	2.0	30.7	47.2	15.4	0.0	44.3	43.7	13.5	1.9	44.5	42.3	11.6	1.3	41.6

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(20歳以上、男性、保健所別)

	安房				君津				市原				千葉市				船橋市			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	40				33				27				19				12			
エネルギー(kcal)	2033	554	52	1957	1998	666	59	1898	2005	543	141	1943	2225	454	48	2164	2116	494	0	2106
たんぱく質(g)	73.4	22.1	0.3	75.6	83.4	27.6	0.6	81.2	68.7	18.1	2.8	68.3	85.2	17.7	1.6	84.0	85.8	29.6	0.0	79.5
うち動物性(g)	40.2	17.1	0.1	40.9	49.9	20.5	2.4	49.5	37.7	15.6	2.3	37.5	45.7	14.8	1.9	42.7	50.7	23.0	0.0	46.4
脂質(g)	57.4	24.1	1.2	57.8	60.1	25.9	4.4	55.3	64.7	29.6	7.8	63.2	68.0	22.3	4.9	70.0	63.7	25.5	0.0	56.0
うち動物性(g)	27.9	12.1	0.1	28.2	33.7	18.4	3.5	31.9	32.1	20.1	0.2	28.2	32.8	18.5	2.1	30.7	33.7	19.8	0.0	27.9
飽和脂肪酸(g)	13.6	5.6	0.1	13.7	16.9	8.4	1.0	15.7	17.3	9.4	1.6	15.9	18.0	5.7	1.3	17.2	18.2	11.5	0.0	15.3
一価不飽和脂肪酸(g)	19.6	8.9	0.1	17.3	20.2	11.6	2.4	18.5	23.1	12.0	3.4	20.8	24.4	8.6	1.9	26.3	22.9	8.7	0.0	20.0
多価不飽和脂肪酸(g)	12.2	5.9	0.0	11.2	11.7	4.5	0.7	10.8	13.5	5.9	2.0	11.7	14.0	5.0	1.2	12.9	14.7	5.7	0.0	13.9
n-6系脂肪酸(g)	9.6	5.0	0.3	8.4	8.9	4.1	0.8	8.7	11.2	5.4	1.8	9.7	10.8	4.2	1.2	10.3	11.3	5.3	0.0	9.7
n-3系脂肪酸(g)	2.5	1.5	0.2	2.2	2.4	1.0	0.1	2.3	2.2	1.1	0.2	2.1	3.0	2.0	0.2	2.7	3.0	1.7	0.0	2.8
炭水化物(g)	281.6	78.0	7.8	267.3	259.1	87.1	6.1	235.6	240.0	85.8	11.7	214.5	300.5	72.6	10.2	291.8	280.3	75.2	0.0	283.6
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	11.3	3.7	0.4	11.1	11.2	4.2	1.0	10.0	10.0	3.6	0.0	10.2	13.2	4.2	0.9	11.9	11.5	3.9	0.0	12.4
食塩(g/1,000kcal)	5.7	1.7	0.5	5.3	5.9	2.4	0.8	4.9	5.1	1.6	0.4	5.1	6.0	1.7	0.5	5.5	5.5	1.8	0.0	5.5
カリウム(mg)	2334	728	51	2376	2546	926	22	2314	2466	768	44	2249	3185	1115	210	3133	2577	1184	0	2193
カルシウム(mg)	435	209	27	431	593	308	30	509	475	208	36	498	667	347	64	572	645	550	0	537
マグネシウム(mg)	252	82	4	255	275	94	6	269	252	76	5	240	321	104	19	314	279	112	0	253
リン(mg)	1012	283	9	1023	1155	355	20	1131	1012	274	48	991	1270	348	48	1293	1233	543	0	1102
鉄(mg)	7.9	3.0	0.4	7.8	9.2	2.9	0.2	8.9	7.6	2.6	0.2	7.6	9.7	2.9	0.5	9.9	9.3	4.1	0.0	8.6
亜鉛(mg)	8.2	2.5	0.2	8.4	8.8	3.4	0.6	8.4	7.7	2.3	0.3	7.6	10.3	4.0	0.9	9.7	9.4	3.5	0.0	8.6
銅(mg)	1.17	0.35	0.04	1.17	1.19	0.40	0.01	1.08	1.12	0.38	0.02	1.16	1.46	0.48	0.09	1.62	1.31	0.49	0.00	1.16
マンガン(mg)	3.79	1.28	0.02	3.64	3.95	1.68	0.04	3.41	3.52	1.27	0.35	3.43	4.88	2.35	0.59	3.88	3.53	1.18	0.00	3.22
ヨウ素(μg)	311	800	30	55	940	1828	164	61	468	1538	35	41	2219	3855	1257	83	1225	3430	0	165
セレン(μg)	44	27	0.3	42	59	39	4	51	39	22	1	34	66	32	7	64	79	57	0	66
クロム(μg)	6	4	0.1	5	6	4	1	6	6	4	1	5	8	3	1	8	7	3	0	8
モリブデン(μg)	183	77	15	181	158	107	4	128	159	93	9	149	167	56	16	155	180	64	0	170
ビタミンA(μgRE)	456	303	20	399	616	774	120	438	499	330	29	460	631	404	97	518	544	246	0	488
ビタミンD(μg)	7.4	7.5	1.2	4.3	11.5	8.8	1.0	9.3	6.6	6.6	0.6	3.9	11.0	11.3	2.1	6.8	11.1	11.6	0.0	5.8
ビタミンE(mg)	7.6	4.0	0.2	7.2	6.4	1.7	0.05	6.6	7.1	3.1	0.9	7.4	9.9	3.6	0.6	10.9	7.6	3.5	0.0	6.9
ビタミンK(μg)	272	185	36	234	228	165	19	166	278	184	23	260	318	202	34	257	218	171	0	148
ビタミンB1(mg)	0.98	0.41	0.03	0.98	1.02	0.46	0.03	0.92	0.92	0.39	0.03	0.88	1.04	0.38	0.04	1.01	1.14	0.63	0.00	0.94
ビタミンB2(mg)	1.16	0.44	0.00	1.13	1.44	0.63	0.08	1.31	1.27	0.51	0.03	1.14	1.58	0.51	0.08	1.64	1.26	0.70	0.00	1.00
ナイアシン(mgNE)	17.2	5.7	0.0	17.2	20.7	10.3	0.7	17.4	15.8	5.2	0.4	15.2	20.5	8.2	0.6	18.1	19.6	9.0	0.0	17.4
ビタミンB6(mg)	1.34	0.51	0.05	1.26	1.40	0.51	0.05	1.29	1.20	0.36	0.02	1.17	1.52	0.55	0.08	1.53	1.43	0.62	0.00	1.23
ビタミンB12(μg)	6.0	6.4	0.2	4.8	10.0	8.2	1.3	8.4	4.4	2.7	0.3	4.1	10.0	8.8	2.3	5.4	8.2	5.4	0.0	6.5
葉酸(μg)	316	120	8	331	334	130	5	299	318	116	22	291	432	215	42	345	327	164	0	315
パントテン酸(mg)	5.75	1.73	0.17	5.77	6.18	2.13	0.06	5.68	5.70	1.77	0.04	5.61	7.28	2.31	0.37	7.34	6.08	2.93	0.00	5.07
ビオチン(μg)	24.2	9.5	0.6	22.9	27.9	20.6	1.0	22.7	25.2	10.7	0.6	25.0	30.9	9.7	1.8	31.8	26.0	11.7	0.0	23.4
ビタミンC(mg)	114	70	6	97	132	96	4	93	102	64	13	85	171	95	18	171	102	67	0	98
コレステロール(mg)	282	154	4	298	358	175	15	352	325	160	12	310	352	172	65	312	350	109	0	331
食物繊維総量(g)	14.9	5.9	0.2	15.6	15.5	6.0	0.5	14.1	14.6	6.3	0.4	14.3	19.8	9.7	1.8	17.5	15.2	6.4	0.0	15.1
うち水溶性(g)	3.4	1.5	0.1	3.3	3.6	1.4	0.2	3.3	3.4	1.7	0.02	3.5	4.6	2.3	0.4	4.5	3.3	1.6	0.0	3.0
うち不溶性(g)	11.0	4.5	0.1	11.5	11.5	4.7	0.4	10.9	10.7	5.1	0.6	10.1	14.9	7.4	1.5	13.3	11.0	4.8	0.0	11.2
脂肪エネルギー比率(%)	25.0	6.9	1.1	25.4	27.1	7.2	0.8	27.0	28.9	9.8	1.3	27.8	27.3	6.0	1.6	28.7	27.0	7.5	0.0	27.3
炭水化物エネルギー比率(%)	60.5	8.6	1.3	59.2	55.9	7.9	0.3	56.9	57.3	10.2	1.0	59.2	57.4	6.5	1.4	56.0	57.0	9.1	0.0	56.7
動物性たんぱく質比率(%)	52.6	13.6	0.7	54.1	58.9	8.8	2.7	58.3	53.5	15.6	0.8	55.1	53.3	10.3	1.9	51.7	58.0	10.9	0.0	63.3
穀類エネルギー比率(%)	43.1	12.3	1.4	41.0	38.7	9.6	1.0	39.2	31.8	11.8	1.3	30.1	38.9	10.3	2.7	40.7	41.2	10.4	0.0	40.6

柏市			
平均	標準偏差	標準誤差	中央値
23			
2258	534	127	2151
85.8	22.6	3.5	86.9
47.6	19.3	1.7	42.9
67.2	26.6	1.2	68.8
31.9	17.3	1.8	26.6
17.6	7.7	0.3	17.3
23.7	11.1	0.1	23.7
15.4	6.6	0.5	14.5
12.6	5.8	0.4	11.9
2.6	1.2	0.1	2.3
292.1	69.8	26.2	288.0
11.4	3.8	0.3	10.8
5.1	1.6	0.1	4.6
2764	717	33	2873
693	265	9	665
298	83	7	282
1213	321	9	1258
9.1	2.5	0.5	9.1
10.6	3.3	0.2	10.4
1.37	0.27	0.01	1.40
3.90	1.54	0.37	3.75
750	2409	353	72
63	41	1	56
7	3	1	6
198	85	14	213
676	398	48	638
5.7	3.7	0.2	5.9
8.4	3.0	0.2	7.9
338	155	9	292
1.14	0.41	0.01	1.19
1.44	0.44	0.03	1.39
19.5	11.9	2.0	16.3
1.32	0.43	0.03	1.38
7.6	6.1	0.3	5.8
366	90	16	377
6.65	1.95	0.37	6.43
29.7	13.1	0.3	27.0
120	73	2	109
384	201	69	322
16.3	5.0	0.2	14.3
4.0	1.2	0.01	3.6
12.0	3.6	0.3	11.2
26.3	6.2	1.2	25.6
58.4	6.9	1.3	58.2
53.9	11.1	0.3	55.7
39.5	9.8	1.9	38.2

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(20歳以上、女性、保健所別)

	総 数				習志野				市川				松戸				野田			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	495				28				51				37				27			
エネルギー(kcal)	1733 ¹	482 ¹	28 ¹	1705	1826 ¹	397 ¹	68 ¹	1761	1822 ¹	675 ¹	96 ¹	1715	1748 ¹	375 ¹	28 ¹	1731	1714 ¹	546 ¹	19 ¹	1586
たんぱく質(g)	66.2 ¹	18.7 ¹	1.0 ¹	65.0	71.2 ¹	20.4 ¹	4.4 ¹	66.1	66.2 ¹	20.3 ¹	3.1 ¹	65.2	71.4 ¹	19.2 ¹	3.0 ¹	70.5	65.7 ¹	20.8 ¹	0.4 ¹	64.8
うち動物性(g)	35.0 ¹	14.6 ¹	0.8 ¹	33.5	37.2 ¹	14.5 ¹	3.6 ¹	35.3	31.9 ¹	12.9 ¹	1.9 ¹	33.3	40.7 ¹	16.1 ¹	2.3 ¹	40.3	31.9 ¹	15.8 ¹	0.3 ¹	30.4
脂質(g)	55.1 ¹	23.3 ¹	1.3 ¹	52.0	56.1 ¹	18.1 ¹	0.3 ¹	56.8	60.9 ¹	29.9 ¹	6.1 ¹	60.0	50.7 ¹	14.7 ¹	0.5 ¹	49.1	54.1 ¹	22.6 ¹	1.3 ¹	52.5
うち動物性(g)	27.0 ¹	15.2 ¹	0.8 ¹	24.4	27.8 ¹	12.0 ¹	0.6 ¹	27.0	25.4 ¹	14.3 ¹	2.6 ¹	24.0	27.4 ¹	13.2 ¹	0.8 ¹	25.7	23.3 ¹	13.5 ¹	0.6 ¹	23.5
飽和脂肪酸(g)	15.3 ¹	8.5 ¹	0.4 ¹	13.5	14.3 ¹	4.8 ¹	0.4 ¹	14.0	16.8 ¹	10.9 ¹	1.4 ¹	14.5	13.5 ¹	5.6 ¹	0.1 ¹	12.1	14.1 ¹	5.5 ¹	0.1 ¹	14.0
一価不飽和脂肪酸(g)	18.6 ¹	8.8 ¹	0.5 ¹	17.0	18.7 ¹	6.6 ¹	1.0 ¹	18.4	20.8 ¹	11.7 ¹	2.8 ¹	18.0	16.6 ¹	5.4 ¹	0.3 ¹	15.0	18.3 ¹	8.4 ¹	1.1 ¹	17.3
多価不飽和脂肪酸(g)	11.6 ¹	5.4 ¹	0.3 ¹	10.8	11.4 ¹	4.9 ¹	0.1 ¹	10.6	12.4 ¹	6.1 ¹	1.4 ¹	10.9	11.4 ¹	4.6 ¹	0.4 ¹	11.2	11.8 ¹	6.0 ¹	0.5 ¹	10.8
n-6系脂肪酸(g)	9.3 ¹	4.6 ¹	0.2 ¹	8.7	9.1 ¹	3.8 ¹	0.2 ¹	8.1	10.2 ¹	5.0 ¹	1.1 ¹	9.2	8.6 ¹	3.6 ¹	0.3 ¹	8.9	9.6 ¹	5.5 ¹	0.6 ¹	9.1
n-3系脂肪酸(g)	2.1 ¹	1.4 ¹	0.1 ¹	1.8	2.2 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	2.1	2.2 ¹	1.5 ¹	0.3 ¹	1.6	2.6 ¹	1.7 ¹	0.2 ¹	2.3	1.9 ¹	0.9 ¹	0.1 ¹	1.9
炭水化物(g)	236.1 ¹	71.2 ¹	4.2 ¹	229.2	257.4 ¹	60.4 ¹	12.3 ¹	249.4	247.5 ¹	100.5 ¹	10.1 ¹	226.3	244.2 ¹	56.8 ¹	3.4 ¹	234.4	226.0 ¹	73.4 ¹	4.4 ¹	209.7
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	9.4 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	8.9	9.4 ¹	3.1 ¹	0.3 ¹	9.0	9.6 ¹	4.5 ¹	0.6 ¹	9.0	9.8 ¹	3.1 ¹	0.3 ¹	9.5	9.8 ¹	3.4 ¹	0.3 ¹	9.2
食塩(g/1,000kcal)	5.5 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.2	5.2 ¹	1.5 ¹	0.3 ¹	5.0	5.3 ¹	1.6 ¹	0.2 ¹	5.1	5.7 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.5	5.9 ¹	1.6 ¹	0.2 ¹	6.0
カリウム(mg)	2382 ¹	908 ¹	50 ¹	2254	2841 ¹	880 ¹	107 ¹	2862	2411 ¹	762 ¹	120 ¹	2352	2720 ¹	978 ¹	158 ¹	2448	2316 ¹	793 ¹	43 ¹	2288
カルシウム(mg)	531 ¹	282 ¹	14 ¹	495	606 ¹	252 ¹	24 ¹	518	551 ¹	218 ¹	17 ¹	541	571 ¹	282 ¹	42 ¹	491	539 ¹	266 ¹	56 ¹	515
マグネシウム(mg)	247 ¹	89 ¹	5 ¹	242	282 ¹	95 ¹	12 ¹	279	258 ¹	83 ¹	16 ¹	241	267 ¹	83 ¹	12 ¹	252	246 ¹	74 ¹	7 ¹	254
リン(mg)	968 ¹	302 ¹	16 ¹	925	1079 ¹	284 ¹	49 ¹	1027	968 ¹	280 ¹	55 ¹	956	1019 ¹	295 ¹	41 ¹	960	953 ¹	279 ¹	28 ¹	936
鉄(mg)	7.9 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	7.4	8.7 ¹	3.2 ¹	0.3 ¹	8.1	8.4 ¹	3.3 ¹	0.4 ¹	7.8	8.3 ¹	2.9 ¹	0.4 ¹	7.6	7.7 ¹	2.5 ¹	0.2 ¹	7.4
亜鉛(mg)	7.6 ¹	2.5 ¹	0.1 ¹	7.3	8.6 ¹	2.7 ¹	0.1 ¹	8.1	8.0 ¹	2.7 ¹	0.5 ¹	7.9	8.4 ¹	3.0 ¹	0.3 ¹	7.4	7.6 ¹	2.9 ¹	0.3 ¹	7.3
銅(mg)	1.12 ¹	0.38 ¹	0.02 ¹	1.09	1.23 ¹	0.36 ¹	0.02 ¹	1.20	1.17 ¹	0.39 ¹	0.06 ¹	1.15	1.23 ¹	0.40 ¹	0.03 ¹	1.15	1.10 ¹	0.33 ¹	0.01 ¹	1.10
マンガン(mg)	3.55 ¹	1.78 ¹	0.10 ¹	3.24	3.80 ¹	1.91 ¹	0.04 ¹	3.50	3.42 ¹	1.63 ¹	0.26 ¹	3.23	4.24 ¹	3.05 ¹	0.33 ¹	3.77	3.25 ¹	1.53 ¹	0.50 ¹	2.96
ヨウ素(μg)	1581 ¹	6838 ¹	361 ¹	55	1892 ¹	4994 ¹	126 ¹	162	1437 ¹	4470 ¹	934 ¹	66	5175 ¹	10269 ¹	1162 ¹	115	155 ¹	290 ¹	54 ¹	45
セレン(μg)	42 ¹	28 ¹	1 ¹	35	33 ¹	17 ¹	0.4 ¹	28	47 ¹	33 ¹	3 ¹	35	47 ¹	37 ¹	5 ¹	34	42 ¹	29 ¹	3 ¹	32
クロム(μg)	6 ¹	3 ¹	0.2 ¹	5	6 ¹	2 ¹	0.3 ¹	6	6 ¹	4 ¹	1 ¹	5	6 ¹	3 ¹	0.4 ¹	6	5 ¹	2 ¹	0.5 ¹	5
モリブデン(μg)	149 ¹	82 ¹	4 ¹	133	142 ¹	77 ¹	4 ¹	127	148 ¹	74 ¹	15 ¹	135	162 ¹	83 ¹	2 ¹	148	145 ¹	75 ¹	1 ¹	125
ビタミンA(μgRE)	548 ¹	559 ¹	26 ¹	433	589 ¹	312 ¹	18 ¹	561	553 ¹	480 ¹	43 ¹	485	599 ¹	415 ¹	74 ¹	487	631 ¹	470 ¹	110 ¹	485
ビタミンD(μg)	7.2 ¹	7.9 ¹	0.4 ¹	4.2	6.4 ¹	7.1 ¹	0.2 ¹	3.1	6.8 ¹	6.5 ¹	0.6 ¹	4.0	7.9 ¹	7.3 ¹	0.9 ¹	6.8	6.8 ¹	5.8 ¹	1.3 ¹	5.3
ビタミンE(mg)	6.9 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	6.3	8.2 ¹	3.1 ¹	0.4 ¹	7.9	7.2 ¹	3.6 ¹	0.6 ¹	6.4	7.0 ¹	3.8 ¹	0.4 ¹	5.4	7.3 ¹	4.0 ¹	0.9 ¹	8.1
ビタミンK(μg)	274 ¹	193 ¹	11 ¹	224	311 ¹	206 ¹	8 ¹	250	286 ¹	170 ¹	36 ¹	272	265 ¹	185 ¹	18 ¹	222	287 ¹	209 ¹	31 ¹	228
ビタミンB1(mg)	0.86 ¹	0.36 ¹	0.01 ¹	0.81	0.95 ¹	0.32 ¹	0.10 ¹	0.94	0.87 ¹	0.33 ¹	0.02 ¹	0.81	0.87 ¹	0.37 ¹	0.09 ¹	0.76	0.86 ¹	0.46 ¹	0.04 ¹	0.75
ビタミンB2(mg)	1.23 ¹	0.52 ¹	0.02 ¹	1.13	1.28 ¹	0.51 ¹	0.12 ¹	1.19	1.16 ¹	0.40 ¹	0.06 ¹	1.15	1.30 ¹	0.65 ¹	0.09 ¹	1.14	1.18 ¹	0.47 ¹	0.05 ¹	1.06
ナイアシン(mgNE)	14.2 ¹	6.1 ¹	0.3 ¹	13.2	15.8 ¹	6.2 ¹	1.4 ¹	15.1	14.5 ¹	6.4 ¹	1.1 ¹	13.6	16.3 ¹	6.8 ¹	1.1 ¹	15.2	14.0 ¹	6.9 ¹	0.3 ¹	12.4
ビタミンB6(mg)	1.14 ¹	0.45 ¹	0.02 ¹	1.08	1.33 ¹	0.47 ¹	0.14 ¹	1.21	1.16 ¹	0.42 ¹	0.06 ¹	1.11	1.29 ¹	0.53 ¹	0.11 ¹	1.27	1.09 ¹	0.48 ¹	0.02 ¹	1.07
ビタミンB12(μg)	5.8 ¹	5.5 ¹	0.3 ¹	4.1	6.5 ¹	4.5 ¹	0.1 ¹	6.6	5.8 ¹	5.5 ¹	0.7 ¹	3.6	6.8 ¹	4.6 ¹	0.7 ¹	5.7	5.3 ¹	4.4 ¹	0.6 ¹	4.4
葉酸(μg)	324 ¹	151 ¹	9 ¹	307	369 ¹	172 ¹	14 ¹	333	335 ¹	122 ¹	21 ¹	322	348 ¹	204 ¹	27 ¹	300	290 ¹	108 ¹	5 ¹	296
パントテン酸(mg)	5.50 ¹	1.83 ¹	0.09 ¹	5.31	6.38 ¹	1.68 ¹	0.45 ¹	6.29	5.45 ¹	1.57 ¹	0.30 ¹	5.25	5.50 ¹	1.78 ¹	0.27 ¹	5.35	5.15 ¹	1.57 ¹	0.04 ¹	5.35
ビオチン(μg)	24.8 ¹	15.8 ¹	0.8 ¹	22.7	23.8 ¹	7.4 ¹	1.9 ¹	21.8	27.5 ¹	15.3 ¹	2.6 ¹	26.0	24.4 ¹	10.9 ¹	0.5 ¹	21.7	21.8 ¹	7.7 ¹	1.0 ¹	20.7
ビタミンC(mg)	120 ¹	86 ¹	5 ¹	103	165 ¹	120 ¹	16 ¹	120	116 ¹	67 ¹	8 ¹	107	157 ¹	108 ¹	14 ¹	141	99 ¹	65 ¹	4 ¹	97
コレステロール(mg)	291 ¹	162 ¹	9 ¹	273	297 ¹	127 ¹	34 ¹	284	263 ¹	149 ¹	18 ¹	264	280 ¹	121 ¹	10 ¹	259	231 ¹	123 ¹	27 ¹	261
食物繊維総量(g)	15.4 ¹	6.8 ¹	0.4 ¹	14.7	19.2 ¹	7.1 ¹	1.4 ¹	18.7	17.6 ¹	6.8 ¹	1.0 ¹	16.7	16.4 ¹	6.1 ¹	0.7 ¹	15.2	15.1 ¹	5.8 ¹	0.2 ¹	14.3
うち水溶性(g)	3.6 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	3.4	4.5 ¹	2.1 ¹	0.5 ¹	4.0	4.0 ¹	1.6 ¹	0.2 ¹	4.0	3.6 ¹	1.6 ¹	0.3 ¹	3.4	3.6 ¹	1.6 ¹	0.2 ¹	3.4
うち不溶性(g)	11.3 ¹	5.0 ¹	0.3 ¹	10.8	14.1 ¹	4.9 ¹	0.9 ¹	14.1	13.1 ¹	5.2 ¹	0.8 ¹	12.6	11.8 ¹	4.6 ¹	0.5 ¹	11.2	11.1 ¹	4.3 ¹	0.0 ¹	9.5
脂肪エネルギー比率(%)	28.3 ¹	7.5 ¹	0.4 ¹	27.6	27.6 ¹	6.5 ¹	1.0 ¹	27.9	29.6 ¹	8.0 ¹	2.1 ¹	29.0	26.0 ¹	5.2 ¹	0.4 ¹	24.8	28.3 ¹	7.1 ¹	0.2 ¹	30.5
炭水化物エネルギー比率(%)	56.2 ¹	8.0 ¹	0.4 ¹	56.5	56.8 ¹	7.5 ¹	0.9 ¹	54.8	55.5											

印旂				香取				海匠				山武				長生				夷隅			
平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
32				13				23				35				47				33			
1736	417	99	1777	1702	189	0	1658	1760	355	32	1794	1534	402	21	1524	1782	518	9	1733	1934	488	84	1979
62.9	15.2	2.9	65.1	68.2	15.3	0.0	66.0	68.5	16.2	0.5	68.6	59.7	17.9	0.2	52.9	67.0	22.1	0.2	64.4	72.1	18.9	0.1	74.3
35.7	13.6	1.5	34.7	29.8	10.9	0.0	30.9	38.0	13.6	0.1	37.2	30.2	13.1	0.3	31.4	37.4	16.4	0.2	35.0	40.3	17.7	0.6	38.6
58.4	22.3	7.9	58.7	54.5	11.3	0.0	54.4	55.6	18.8	0.2	53.1	48.6	21.4	2.4	43.4	57.6	27.6	1.8	51.7	65.5	27.5	2.6	64.2
32.1	16.3	3.5	32.0	19.7	7.3	0.0	17.9	26.1	12.7	0.2	27.0	24.9	16.9	0.7	20.8	27.7	17.3	0.7	27.2	37.9	22.5	0.5	34.8
18.9	9.3	2.7	17.1	14.3	5.2	0.0	13.3	15.5	7.1	0.5	15.4	13.2	7.5	0.6	12.0	15.5	9.5	0.6	13.9	19.1	10.8	0.5	17.7
19.5	8.5	2.7	19.2	17.7	3.4	0.0	17.9	19.1	7.5	0.2	18.3	16.0	8.0	1.2	14.9	19.6	10.5	0.6	17.0	22.8	9.7	1.0	22.4
10.6	4.8	1.0	9.6	14.1	6.1	0.0	12.7	12.0	4.5	0.2	11.6	10.3	5.3	0.8	8.9	12.5	6.0	0.8	11.8	12.9	4.9	0.5	11.4
9.0	3.9	0.9	8.3	11.9	5.3	0.0	11.2	9.9	4.1	0.1	8.9	8.6	4.5	0.6	7.9	10.0	5.1	0.8	8.8	10.5	4.3	0.2	9.7
1.5	1.0	0.1	1.4	2.2	1.1	0.0	1.9	2.0	0.8	0.2	1.9	1.6	1.0	0.1	1.3	2.4	1.7	0.0	1.7	2.3	1.3	0.2	2.3
225.6	62.1	5.3	232.3	230.7	36.1	0.0	233.8	240.0	59.2	6.1	243.5	209.6	62.9	1.0	194.4	241.6	69.9	1.7	240.3	253.3	68.5	14.4	263.2
9.0	3.2	0.1	8.7	8.9	2.4	0.0	8.3	9.8	2.5	0.8	9.9	8.3	3.0	0.5	8.4	9.3	4.0	0.4	8.6	10.0	3.2	0.5	10.1
5.2	1.6	0.3	4.8	5.9	1.6	0.0	4.7	5.7	1.6	0.6	5.3	5.4	1.6	0.4	5.2	5.2	1.5	0.2	5.0	5.3	1.5	0.5	5.5
2119	864	168	1971	2418	671	0	2314	2363	631	102	2273	1984	975	64	1694	2397	971	60	2517	2409	1075	5	2126
557	362	59	482	622	298	0	599	561	268	44	514	463	324	0	340	491	277	50	502	546	326	1	470
210	72	13	197	295	73	0	294	242	57	9	248	218	106	8	178	248	101	14	242	252	95	0	242
971	316	68	896	1039	229	0	1070	1042	304	23	975	847	343	17	782	944	311	28	960	1033	375	23	974
5.8	2.5	0.2	5.3	9.3	2.9	0.0	9.0	8.0	1.9	0.5	8.1	7.2	3.6	0.1	6.4	8.1	3.4	0.1	7.6	7.5	2.4	0.1	7.2
7.3	2.2	0.4	7.5	8.0	1.7	0.0	7.9	8.0	1.9	0.2	8.4	7.1	2.7	0.1	7.0	7.3	2.7	0.1	7.0	8.2	2.6	0.1	7.9
0.93	0.33	0.05	0.87	1.39	0.34	0.00	1.40	1.17	0.30	0.02	1.12	1.01	0.39	0.02	0.88	1.12	0.38	0.04	1.10	1.08	0.32	0.00	1.09
2.71	1.29	0.11	2.45	4.11	1.46	0.00	3.66	4.06	1.34	0.37	3.88	3.05	1.44	0.05	2.82	3.70	1.81	0.07	3.49	3.21	1.20	0.09	3.08
1923	7477	935	89	1835	2506	0	436	972	2715	572	52	2076	9451	582	49	1389	7030	781	41	3694	16761	1998	48
47	25	5	49	41	37	0	30	47	29	2	44	31	22	2	27	42	32	3	32	41	27	4	33
6	4	0.5	4	7	3	0	6	6	3	1	5	4	2	0.1	3	6	3	0.1	5	6	4	0.2	5
115	62	5	99	210	103	0	194	140	53	11	120	152	100	5	114	153	87	2	151	156	76	1	140
475	349	30	350	373	128	0	369	558	330	12	484	396	329	11	265	693	952	41	470	434	245	7	392
4.6	5.6	0.0	2.6	7.4	8.2	0.0	2.7	6.6	4.9	1.4	5.7	5.4	7.9	0.9	2.2	9.3	8.9	0.7	5.7	8.1	6.9	0.4	5.2
6.1	3.4	1.0	5.6	7.1	2.3	0.0	6.3	7.0	2.6	0.3	7.2	5.5	3.2	0.1	4.6	7.6	4.1	0.6	7.1	6.4	2.8	0.0	5.5
168	112	8	131	410	173	0	404	292	193	20	247	268	242	9	177	308	234	26	260	268	153	3	235
0.83	0.39	0.04	0.75	0.86	0.32	0.00	0.79	0.85	0.31	0.00	0.86	0.84	0.33	0.02	0.83	0.84	0.39	0.02	0.80	0.87	0.32	0.01	0.91
1.22	0.69	0.01	1.07	1.12	0.30	0.00	0.97	1.28	0.41	0.12	1.27	1.13	0.56	0.03	1.05	1.25	0.57	0.03	1.28	1.26	0.53	0.06	1.17
13.2	4.6	0.8	12.4	12.8	4.0	0.0	13.1	14.7	7.6	0.3	13.1	11.3	3.9	0.5	10.6	13.8	5.8	0.5	13.1	14.6	4.7	0.2	14.3
0.98	0.42	0.06	0.92	1.12	0.31	0.00	1.12	1.15	0.27	0.02	1.16	0.97	0.44	0.01	0.90	1.11	0.40	0.01	1.09	1.18	0.46	0.03	1.05
3.5	2.4	0.0	2.9	6.1	7.5	0.0	2.6	5.8	4.3	1.8	4.9	4.6	4.7	0.8	2.5	7.5	7.9	0.6	5.0	6.2	5.7	0.1	3.9
229	97	14	211	374	125	0	344	362	111	37	343	277	149	21	266	345	171	4	342	284	104	1	261
5.19	1.89	0.42	5.15	6.05	1.27	0.00	5.97	5.82	1.76	0.22	5.16	4.97	2.02	0.01	4.47	5.42	1.95	0.05	5.22	5.94	2.24	0.20	5.48
19.2	8.1	1.5	18.5	26.4	5.5	0.0	26.2	24.7	11.5	3.6	23.0	18.8	10.8	0.2	16.7	28.1	28.1	1.9	24.9	23.0	9.5	0.4	22.8
82	61	10	62	140	110	0	97	128	52	18	128	85	61	14	74	130	104	8	106	97	65	5	86
256	104	7	266	275	125	0	258	347	197	19	315	261	141	12	253	352	233	2	331	333	164	33	327
12.3	4.9	0.1	11.0	17.8	4.8	0.0	17.2	15.3	4.6	0.6	15.6	12.8	6.6	0.7	10.6	15.3	7.2	0.6	15.0	14.2	6.6	0.6	13.2
3.0	1.4	0.1	2.5	4.1	1.2	0.0	4.0	3.6	1.3	0.1	3.9	3.0	1.6	0.2	2.3	3.6	1.8	0.2	3.2	3.4	1.6	0.2	3.4
8.9	3.5	0.1	8.2	12.5	3.0	0.0	12.4	11.3	3.6	0.4	11.3	9.2	4.3	0.6	8.2	11.2	5.4	0.6	10.1	10.2	4.2	0.2	9.6
29.9	8.5	2.4	29.9	28.8	5.0	0.0	29.3	28.3	7.2	0.1	26.2	28.1	8.8	1.3	26.4	28.3	8.7	1.0	27.7	29.8	7.4	0.2	27.6
55.4	8.8	2.3	56.2	55.1	6.4	0.0	54.8	56.0	8.2	0.5	58.4	56.2	9.9	1.0	57.5	56.7	9.3	1.0	57.0	55.0	7.8	0.5	55.3
56.0	13.0	0.4	56.6	42.8	9.0	0.0	44.7	54.6	11.3	0.2	56.9	49.6	14.8	0.7	50.4	54.3	10.5	0.0	55.5	54.0	12.6	0.5	54.3
38.0	12.1	2.1	36.6	39.3	11.4	0.0	35.9	35.2	9.7	0.2	34.8	43.5	12.9	0.7	44.7	37.9	14.5	1.6	36.4	38.0	10.6	0.4	38.1

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(20歳以上、女性、保健所別)

	安房				君津				市原				千葉市				船橋市			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	49				28				30				28				10			
エネルギー(kcal)	1780 ¹	528 ¹	118 ¹	1705	1613 ¹	531 ¹	87 ¹	1478	1533 ¹	492 ¹	0.4 ¹	1570	1740 ¹	380 ¹	89 ¹	1687	1672 ¹	340 ¹	0 ¹	1692
たんぱく質(g)	67.7 ¹	16.6 ¹	3.1 ¹	64.7	65.5 ¹	17.3 ¹	2.6 ¹	62.9	57.7 ¹	22.4 ¹	0.9 ¹	58.4	64.6 ¹	13.4 ¹	3.6 ¹	65.5	67.5 ¹	20.2 ¹	0.0 ¹	68.0
うち動物性(g)	36.7 ¹	14.1 ¹	1.9 ¹	34.4	36.0 ¹	12.8 ¹	0.7 ¹	32.5	30.4 ¹	18.4 ¹	0.4 ¹	26.7	31.4 ¹	9.4 ¹	2.8 ¹	30.0	35.7 ¹	15.3 ¹	0.0 ¹	35.7
脂質(g)	53.4 ¹	24.4 ¹	2.7 ¹	49.4	52.0 ¹	29.8 ¹	2.0 ¹	45.0	51.8 ¹	20.4 ¹	2.1 ¹	47.6	53.6 ¹	20.5 ¹	4.8 ¹	51.7	52.6 ¹	15.2 ¹	0.0 ¹	53.9
うち動物性(g)	27.7 ¹	13.9 ¹	1.8 ¹	25.8	26.7 ¹	16.8 ¹	0.9 ¹	21.5	25.9 ¹	15.4 ¹	1.4 ¹	21.7	23.3 ¹	9.7 ¹	0.6 ¹	22.0	24.6 ¹	15.8 ¹	0.0 ¹	24.4
飽和脂肪酸(g)	14.5 ¹	9.5 ¹	1.4 ¹	12.5	14.3 ¹	10.3 ¹	0.8 ¹	10.6	14.6 ¹	7.6 ¹	1.2 ¹	11.7	15.9 ¹	7.0 ¹	1.6 ¹	14.9	13.7 ¹	7.6 ¹	0.0 ¹	11.9
一価不飽和脂肪酸(g)	18.2 ¹	9.4 ¹	0.9 ¹	16.8	16.7 ¹	10.7 ¹	0.0 ¹	13.8	18.0 ¹	7.2 ¹	0.6 ¹	15.9	17.8 ¹	8.2 ¹	1.7 ¹	16.6	18.3 ¹	6.3 ¹	0.0 ¹	19.2
多価不飽和脂肪酸(g)	11.6 ¹	6.4 ¹	0.2 ¹	9.6	10.3 ¹	6.1 ¹	0.6 ¹	9.8	10.6 ¹	4.9 ¹	0.2 ¹	11.1	10.6 ¹	4.4 ¹	1.0 ¹	9.8	12.4 ¹	4.1 ¹	0.0 ¹	11.5
n-6系脂肪酸(g)	9.1 ¹	5.3 ¹	0.2 ¹	7.9	8.1 ¹	4.9 ¹	0.5 ¹	8.1	8.6 ¹	4.2 ¹	0.3 ¹	8.6	8.6 ¹	3.9 ¹	0.8 ¹	8.2	9.9 ¹	3.7 ¹	0.0 ¹	9.0
n-3系脂肪酸(g)	2.4 ¹	1.6 ¹	0.0 ¹	1.8	2.0 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	1.6	1.9 ¹	1.2 ¹	0.0 ¹	1.6	1.9 ¹	1.0 ¹	0.2 ¹	1.8	2.2 ¹	1.5 ¹	0.0 ¹	2.0
炭水化物(g)	251.9 ¹	78.3 ¹	20.1 ¹	232.4	215.3 ¹	69.5 ¹	15.2 ¹	202.6	206.6 ¹	73.2 ¹	3.1 ¹	215.7	246.4 ¹	57.6 ¹	10.5 ¹	257.3	225.3 ¹	76.9 ¹	0.0 ¹	198.9
食塩(g)	9.8 ¹	3.8 ¹	0.3 ¹	8.9	9.5 ¹	3.4 ¹	0.5 ¹	9.7	8.5 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	7.8	9.6 ¹	3.8 ¹	0.3 ¹	8.9	10.4 ¹	3.6 ¹	0.0 ¹	9.8
(ナトリウム*2.54/1,000)																				
食塩(g/1,000kcal)	5.7 ¹	2.2 ¹	0.2 ¹	5.3	6.1 ¹	2.0 ¹	0.2 ¹	6.0	5.7 ¹	1.6 ¹	0.2 ¹	5.7	5.6 ¹	2.1 ¹	0.2 ¹	5.1	6.3 ¹	1.7 ¹	0.0 ¹	5.8
カリウム(mg)	2300 ¹	830 ¹	165 ¹	2206	2342 ¹	798 ¹	142 ¹	2164	2278 ¹	1247 ¹	54 ¹	2143	2625 ¹	840 ¹	153 ¹	2485	2489 ¹	919 ¹	0 ¹	2295
カルシウム(mg)	502 ¹	248 ¹	65 ¹	478	506 ¹	332 ¹	70 ¹	447	444 ¹	298 ¹	41 ¹	441	589 ¹	255 ¹	46 ¹	539	475 ¹	250 ¹	0 ¹	471
マグネシウム(mg)	242 ¹	79 ¹	12 ¹	235	242 ¹	87 ¹	15 ¹	214	227 ¹	115 ¹	4 ¹	233	258 ¹	80 ¹	14 ¹	256	244 ¹	90 ¹	0 ¹	228
リン(mg)	969 ¹	264 ¹	57 ¹	893	942 ¹	271 ¹	42 ¹	873	857 ¹	379 ¹	8 ¹	853	1002 ¹	232 ¹	59 ¹	1017	983 ¹	296 ¹	0 ¹	981
鉄(mg)	8.0 ¹	2.8 ¹	0.3 ¹	7.9	8.6 ¹	3.8 ¹	0.4 ¹	7.5	7.0 ¹	3.2 ¹	0.1 ¹	7.3	7.9 ¹	2.8 ¹	0.4 ¹	7.8	9.1 ¹	3.6 ¹	0.0 ¹	7.7
亜鉛(mg)	7.2 ¹	2.0 ¹	0.5 ¹	6.8	7.3 ¹	2.1 ¹	0.0 ¹	7.0	6.7 ¹	2.5 ¹	0.1 ¹	7.2	7.5 ¹	2.5 ¹	0.6 ¹	7.0	7.3 ¹	1.9 ¹	0.0 ¹	7.4
銅(mg)	1.12 ¹	0.35 ¹	0.07 ¹	1.05	1.04 ¹	0.37 ¹	0.07 ¹	0.90	1.02 ¹	0.47 ¹	0.03 ¹	1.08	1.16 ¹	0.41 ¹	0.09 ¹	1.02	1.15 ¹	0.40 ¹	0.00 ¹	1.02
マンガン(mg)	3.90 ¹	1.68 ¹	0.15 ¹	3.51	3.72 ¹	1.71 ¹	0.39 ¹	3.13	3.28 ¹	1.82 ¹	0.36 ¹	3.03	3.93 ¹	1.96 ¹	0.10 ¹	3.63	3.14 ¹	1.28 ¹	0.00 ¹	2.53
ヨウ素(μg)	371 ¹	908 ¹	24 ¹	68	485 ¹	1268 ¹	147 ¹	36	720 ¹	2259 ¹	308 ¹	38	747 ¹	1983 ¹	458 ¹	50	92 ¹	116 ¹	0 ¹	38
セレン(μg)	46 ¹	23 ¹	1 ¹	43	40 ¹	28 ¹	0.3 ¹	33	32 ¹	19 ¹	1 ¹	30	40 ¹	28 ¹	7 ¹	33	52 ¹	28 ¹	0 ¹	39
クロム(μg)	6 ¹	3 ¹	0.2 ¹	6	6 ¹	5 ¹	1 ¹	4	5 ¹	3 ¹	0.01 ¹	5	6 ¹	3 ¹	1 ¹	6	6 ¹	2 ¹	0 ¹	6
モリブデン(μg)	160 ¹	78 ¹	2 ¹	138	132 ¹	80 ¹	10 ¹	113	126 ¹	83 ¹	15 ¹	102	141 ¹	74 ¹	17 ¹	134	164 ¹	124 ¹	0 ¹	147
ビタミンA(μgRE)	463 ¹	244 ¹	27 ¹	444	843 ¹	1284 ¹	64 ¹	407	440 ¹	347 ¹	13 ¹	303	566 ¹	306 ¹	74 ¹	510	832 ¹	1174 ¹	0 ¹	516
ビタミンD(μg)	9.9 ¹	11.8 ¹	0.4 ¹	5.5	7.2 ¹	7.2 ¹	0.5 ¹	3.9	6.7 ¹	10.6 ¹	0.3 ¹	2.5	6.9 ¹	8.4 ¹	2.1 ¹	3.3	7.7 ¹	9.3 ¹	0.0 ¹	3.9
ビタミンE(mg)	7.3 ¹	4.0 ¹	0.8 ¹	6.9	5.8 ¹	2.7 ¹	0.1 ¹	5.5	6.1 ¹	4.0 ¹	0.2 ¹	5.2	8.1 ¹	3.4 ¹	0.6 ¹	7.4	7.1 ¹	3.3 ¹	0.0 ¹	7.6
ビタミンK(μg)	277 ¹	209 ¹	41 ¹	206	245 ¹	180 ¹	48 ¹	192	227 ¹	159 ¹	15 ¹	202	309 ¹	200 ¹	33 ¹	256	207 ¹	85 ¹	0 ¹	207
ビタミンB1(mg)	0.80 ¹	0.26 ¹	0.04 ¹	0.76	0.90 ¹	0.43 ¹	0.07 ¹	0.81	0.79 ¹	0.41 ¹	0.04 ¹	0.74	0.97 ¹	0.37 ¹	0.07 ¹	0.90	0.97 ¹	0.43 ¹	0.00 ¹	0.87
ビタミンB2(mg)	1.30 ¹	0.47 ¹	0.05 ¹	1.17	1.30 ¹	0.60 ¹	0.08 ¹	1.17	1.05 ¹	0.53 ¹	0.03 ¹	1.07	1.39 ¹	0.49 ¹	0.11 ¹	1.28	1.08 ¹	0.36 ¹	0.00 ¹	1.15
ナイアシン(mgNE)	15.6 ¹	8.4 ¹	0.6 ¹	14.0	15.2 ¹	6.6 ¹	0.6 ¹	13.2	12.4 ¹	5.7 ¹	0.4 ¹	11.3	13.7 ¹	4.6 ¹	0.7 ¹	13.6	16.3 ¹	6.8 ¹	0.0 ¹	16.6
ビタミンB6(mg)	1.17 ¹	0.50 ¹	0.05 ¹	0.99	1.18 ¹	0.44 ¹	0.07 ¹	1.13	1.05 ¹	0.52 ¹	0.02 ¹	0.96	1.17 ¹	0.36 ¹	0.06 ¹	1.15	1.28 ¹	0.59 ¹	0.00 ¹	1.19
ビタミンB12(μg)	7.0 ¹	6.0 ¹	0.2 ¹	4.9	7.4 ¹	7.7 ¹	1.0 ¹	3.8	3.8 ¹	3.9 ¹	0.3 ¹	2.1	5.4 ¹	5.2 ¹	1.1 ¹	3.1	5.6 ¹	4.6 ¹	0.0 ¹	4.8
葉酸(μg)	327 ¹	159 ¹	19 ¹	310	360 ¹	168 ¹	18 ¹	324	291 ¹	169 ¹	20 ¹	269	367 ¹	156 ¹	24 ¹	334	383 ¹	130 ¹	0 ¹	402
パントテン酸(mg)	5.51 ¹	1.78 ¹	0.30 ¹	5.28	5.54 ¹	1.80 ¹	0.27 ¹	4.93	5.03 ¹	2.23 ¹	0.06 ¹	4.72	5.94 ¹	1.68 ¹	0.37 ¹	5.33	5.47 ¹	1.71 ¹	0.00 ¹	5.73
ビオチン(μg)	26.1 ¹	10.8 ¹	0.3 ¹	24.9	32.7 ¹	30.3 ¹	0.4 ¹	21.0	22.9 ¹	13.8 ¹	1.1 ¹	20.8	24.2 ¹	10.4 ¹	2.5 ¹	25.0	33.2 ¹	29.8 ¹	0.0 ¹	24.1
ビタミンC(mg)	113 ¹	86 ¹	10 ¹	94	134 ¹	91 ¹	26 ¹	116	105 ¹	96 ¹	6 ¹	74	153 ¹	75 ¹	17 ¹	143	136 ¹	76 ¹	0 ¹	146
コレステロール(mg)	328 ¹	213 ¹	35 ¹	265	292 ¹	124 ¹	14 ¹	293	263 ¹	141 ¹	2 ¹	251	247 ¹	119 ¹	20 ¹	220	286 ¹	13		

柏市				
平均	標準偏差	標準誤差	中央値	
24				
1648	341	22	1631	
64.5	13.8	1.4	63.8	
33.0	8.6	0.2	31.9	
50.0	15.1	0.5	48.5	
23.3	6.4	0.5	22.8	
13.5	5.4	0.4	13.0	
16.5	6.1	0.5	16.1	
11.4	5.0	0.3	10.6	
9.2	4.5	0.3	8.8	
2.0	0.8	0.0	2.0	
224.1	59.0	4.2	225.0	
8.9	3.2	0.0	8.2	
5.4	1.7	0.0	5.2	
2211	774	44	2077	
529	253	3	495	
238	92	5	229	
927	259	4	903	
7.5	2.8	0.4	7.3	
7.6	2.3	0.0	7.1	
1.11	0.39	0.01	1.02	
3.26	1.39	0.09	3.11	
741	2370	351	66	
43	27	2	38	
5	3	0.0	5	
165	96	23	140	
424	254	9	370	
4.6	2.9	0.3	4.7	
6.4	2.5	0.1	6.0	
284	198	38	199	
0.84	0.32	0.01	0.82	
1.18	0.41	0.07	1.11	
13.1	2.7	0.6	13.0	
0.99	0.31	0.05	0.88	
4.4	2.6	0.4	4.6	
307	127	14	285	
5.18	1.59	0.31	5.18	
23.7	10.2	1.8	22.5	
106	77	3	89	
297	164	33	269	
13.8	5.4	0.6	12.3	
3.2	1.2	0.2	3.0	
10.2	3.9	0.4	9.2	
27.6	6.8	0.5	27.8	
56.5	7.4	0.3	56.7	
51.7	10.8	1.8	52.8	
41.0	11.6	0.4	42.2	

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(20歳以上、男性、二次医療圏別)

	総 数				東葛南部				東葛北部				印旛				香取海匝			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	431				82				70				28				36			
エネルギー(kcal)	2073 ¹	540 ¹	28 ¹	2046	2024 ¹	495 ¹	85 ¹	2011	2143 ¹	510 ¹	76 ¹	2149	2107 ¹	530 ¹	46 ¹	2091	2199 ¹	611 ¹	22 ¹	2153
たんぱく質(g)	76.2 ¹	23.4 ¹	1.5 ¹	75.6	71.7 ¹	22.7 ¹	3.9 ¹	70.5	80.2 ¹	22.3 ¹	3.6 ¹	79.5	72.1 ¹	20.7 ¹	0.0 ¹	71.2	82.9 ¹	26.0 ¹	2.8 ¹	80.7
うち動物性(g)	41.4 ¹	18.5 ¹	1.2 ¹	39.5	37.7 ¹	17.9 ¹	3.0 ¹	35.0	42.5 ¹	18.8 ¹	2.8 ¹	40.0	37.8 ¹	16.2 ¹	1.6 ¹	34.7	46.0 ¹	17.4 ¹	3.7 ¹	46.7
脂質(g)	61.6 ¹	24.8 ¹	1.2 ¹	60.0	60.4 ¹	22.3 ¹	3.0 ¹	60.4	60.0 ¹	23.7 ¹	2.9 ¹	61.3	64.0 ¹	25.2 ¹	2.6 ¹	61.2	66.2 ¹	27.3 ¹	1.7 ¹	62.2
うち動物性(g)	31.1 ¹	17.1 ¹	0.7 ¹	28.6	29.6 ¹	16.7 ¹	1.7 ¹	27.4	28.7 ¹	15.0 ¹	1.9 ¹	26.8	32.7 ¹	18.7 ¹	2.0 ¹	29.2	33.4 ¹	12.9 ¹	1.9 ¹	33.0
飽和脂肪酸(g)	16.2 ¹	7.7 ¹	0.4 ¹	15.3	15.8 ¹	7.2 ¹	0.8 ¹	15.1	15.5 ¹	6.9 ¹	0.9 ¹	15.1	17.3 ¹	7.6 ¹	0.2 ¹	16.3	17.6 ¹	7.5 ¹	0.4 ¹	17.0
一価不飽和脂肪酸(g)	21.6 ¹	9.9 ¹	0.5 ¹	20.1	21.7 ¹	8.8 ¹	1.0 ¹	21.0	20.7 ¹	9.7 ¹	1.2 ¹	20.6	22.8 ¹	10.1 ¹	0.9 ¹	21.8	23.6 ¹	11.2 ¹	0.9 ¹	20.3
多価不飽和脂肪酸(g)	13.3 ¹	5.9 ¹	0.3 ¹	12.5	13.2 ¹	5.7 ¹	0.6 ¹	11.7	13.7 ¹	5.9 ¹	0.6 ¹	13.9	13.6 ¹	6.7 ¹	1.4 ¹	13.4	14.9 ¹	8.3 ¹	0.3 ¹	11.9
n-6系脂肪酸(g)	10.7 ¹	5.1 ¹	0.3 ¹	9.8	10.8 ¹	4.9 ¹	0.4 ¹	9.6	10.9 ¹	5.3 ¹	0.5 ¹	11.0	11.5 ¹	5.8 ¹	1.2 ¹	11.7	12.0 ¹	7.1 ¹	0.3 ¹	8.8
n-3系脂肪酸(g)	2.4 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	2.2	2.2 ¹	1.3 ¹	0.3 ¹	1.9	2.5 ¹	1.6 ¹	0.3 ¹	2.2	2.0 ¹	1.1 ¹	0.2 ¹	2.0	2.9 ¹	1.9 ¹	0.1 ¹	2.5
炭水化物(g)	277.2 ¹	78.4 ¹	4.4 ¹	273.8	271.5 ¹	73.8 ¹	10.6 ¹	267.6	293.6 ¹	74.6 ¹	13.0 ¹	288.1	276.6 ¹	68.8 ¹	4.6 ¹	280.7	290.4 ¹	90.4 ¹	13.0 ¹	280.4
食塩(g)	10.9 ¹	3.6 ¹	0.2 ¹	10.5	10.5 ¹	3.8 ¹	0.6 ¹	10.6	11.3 ¹	3.2 ¹	0.3 ¹	10.7	10.8 ¹	3.2 ¹	0.3 ¹	10.1	11.2 ¹	3.7 ¹	0.2 ¹	11.0
(ナトリウム*2.54/1,000)																				
食塩(g/1,000kcal)	5.4 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.1	5.2 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	5.1	5.4 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	5.2	5.3 ¹	1.4 ¹	0.3 ¹	5.0	5.2 ¹	1.5 ¹	0.1 ¹	5.2
カリウム(mg)	2506 ¹	989 ¹	57 ¹	2382	2423 ¹	903 ¹	104 ¹	2326	2740 ¹	1071 ¹	163 ¹	2750	2314 ¹	864 ¹	158 ¹	2258	2700 ¹	951 ¹	112 ¹	2643
カルシウム(mg)	540 ¹	315 ¹	18 ¹	483	518 ¹	302 ¹	30 ¹	465	620 ¹	308 ¹	47 ¹	519	490 ¹	280 ¹	21 ¹	444	589 ¹	341 ¹	12 ¹	510
マグネシウム(mg)	271 ¹	100 ¹	6 ¹	261	265 ¹	96 ¹	11 ¹	249	291 ¹	97 ¹	13 ¹	284	243 ¹	85 ¹	15 ¹	242	295 ¹	109 ¹	4 ¹	297
リン(mg)	1078 ¹	365 ¹	22 ¹	1045	1036 ¹	368 ¹	53 ¹	993	1136 ¹	348 ¹	60 ¹	1158	1002 ¹	309 ¹	37 ¹	1034	1215 ¹	417 ¹	14 ¹	1230
鉄(mg)	8.4 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	8.0	8.1 ¹	3.0 ¹	0.4 ¹	7.5	8.9 ¹	2.9 ¹	0.4 ¹	8.9	7.0 ¹	2.5 ¹	0.4 ¹	7.0	9.0 ¹	3.2 ¹	0.5 ¹	8.4
亜鉛(mg)	8.9 ¹	3.0 ¹	0.2 ¹	8.5	9.0 ¹	3.1 ¹	0.5 ¹	8.5	9.5 ¹	3.1 ¹	0.5 ¹	9.1	8.6 ¹	2.0 ¹	0.3 ¹	8.6	9.4 ¹	2.6 ¹	0.4 ¹	9.1
銅(mg)	1.24 ¹	0.41 ¹	0.02 ¹	1.23	1.20 ¹	0.41 ¹	0.06 ¹	1.10	1.35 ¹	0.38 ¹	0.06 ¹	1.36	1.15 ¹	0.38 ¹	0.10 ¹	1.08	1.34 ¹	0.51 ¹	0.01 ¹	1.27
マンガン(mg)	3.86 ¹	1.58 ¹	0.10 ¹	3.61	3.63 ¹	1.40 ¹	0.14 ¹	3.50	4.14 ¹	1.88 ¹	0.39 ¹	3.73	3.52 ¹	1.42 ¹	0.28 ¹	3.32	3.72 ¹	1.27 ¹	0.12 ¹	3.74
ヨウ素(μg)	1496 ¹	5492 ¹	263 ¹	68	1668 ¹	4849 ¹	492 ¹	123	1631 ¹	5938 ¹	1033 ¹	73	2119 ¹	7997 ¹	939 ¹	43	1170 ¹	3109 ¹	569 ¹	82
セレン(μg)	50 ¹	33 ¹	2 ¹	43	50 ¹	35 ¹	6 ¹	43	54 ¹	35 ¹	3 ¹	50	50 ¹	35 ¹	10 ¹	42	58 ¹	37 ¹	5 ¹	52
クロム(μg)	6 ¹	4 ¹	0.2 ¹	6	6 ¹	4 ¹	0.4 ¹	5	6 ¹	3 ¹	0.4 ¹	6	6 ¹	4 ¹	1 ¹	5	7 ¹	4 ¹	1 ¹	7
モリブデン(μg)	182 ¹	87 ¹	4 ¹	168	172 ¹	75 ¹	8 ¹	158	191 ¹	85 ¹	12 ¹	178	170 ¹	89 ¹	3 ¹	156	197 ¹	86 ¹	14 ¹	180
ビタミンA(μgRE)	560 ¹	698 ¹	35 ¹	438	488 ¹	351 ¹	41 ¹	457	645 ¹	462 ¹	50 ¹	521	445 ¹	322 ¹	18 ¹	335	948 ¹	1946 ¹	122 ¹	429
ビタミンD(μg)	7.7 ¹	8.0 ¹	0.5 ¹	4.4	6.3 ¹	7.1 ¹	1.2 ¹	3.6	6.8 ¹	6.1 ¹	0.9 ¹	5.5	5.6 ¹	6.6 ¹	0.1 ¹	2.7	9.0 ¹	9.5 ¹	1.4 ¹	6.7
ビタミンE(mg)	7.3 ¹	3.6 ¹	0.2 ¹	6.7	7.2 ¹	4.3 ¹	0.4 ¹	6.6	7.8 ¹	3.3 ¹	0.4 ¹	7.3	7.0 ¹	3.6 ¹	1.1 ¹	7.5	7.0 ¹	3.5 ¹	0.3 ¹	5.9
ビタミンK(μg)	280 ¹	204 ¹	10 ¹	234	253 ¹	173 ¹	18 ¹	199	297 ¹	206 ¹	25 ¹	246	246 ¹	214 ¹	17 ¹	172	317 ¹	265 ¹	39 ¹	259
ビタミンB1(mg)	0.97 ¹	0.44 ¹	0.02 ¹	0.91	0.91 ¹	0.40 ¹	0.05 ¹	0.87	1.05 ¹	0.47 ¹	0.05 ¹	1.00	1.04 ¹	0.51 ¹	0.01 ¹	0.94	1.00 ¹	0.47 ¹	0.03 ¹	0.95
ビタミンB2(mg)	1.26 ¹	0.54 ¹	0.03 ¹	1.20	1.14 ¹	0.46 ¹	0.04 ¹	1.13	1.34 ¹	0.53 ¹	0.08 ¹	1.28	1.16 ¹	0.51 ¹	0.08 ¹	1.10	1.45 ¹	0.61 ¹	0.10 ¹	1.42
ナイアシン(mgNE)	17.3 ¹	7.8 ¹	0.5 ¹	16.2	16.5 ¹	7.4 ¹	1.2 ¹	14.9	18.0 ¹	9.1 ¹	1.2 ¹	17.1	16.4 ¹	7.0 ¹	0.5 ¹	15.4	19.7 ¹	9.4 ¹	0.7 ¹	18.2
ビタミンB6(mg)	1.29 ¹	0.54 ¹	0.03 ¹	1.21	1.21 ¹	0.54 ¹	0.08 ¹	1.12	1.39 ¹	0.68 ¹	0.07 ¹	1.35	1.23 ¹	0.42 ¹	0.03 ¹	1.21	1.38 ¹	0.47 ¹	0.08 ¹	1.29
ビタミンB12(μg)	6.9 ¹	7.0 ¹	0.4 ¹	4.8	6.1 ¹	5.6 ¹	0.7 ¹	4.1	6.8 ¹	5.7 ¹	0.6 ¹	5.6	3.6 ¹	2.9 ¹	0.3 ¹	2.2	9.4 ¹	11.6 ¹	1.5 ¹	5.5
葉酸(μg)	329 ¹	157 ¹	9 ¹	313	312 ¹	136 ¹	12 ¹	307	356 ¹	153 ¹	21 ¹	358	268 ¹	114 ¹	17 ¹	271	367 ¹	260 ¹	47 ¹	316
パントテン酸(mg)	6.01 ¹	2.13 ¹	0.11 ¹	5.83	5.70 ¹	2.06 ¹	0.16 ¹	5.28	6.26 ¹	2.06 ¹	0.28 ¹	6.20	5.66 ¹	1.69 ¹	0.05 ¹	5.73	6.95 ¹	2.61 ¹	0.43 ¹	6.71
ビオチン(μg)	26.1 ¹	19.0 ¹	1.2 ¹	24.0	25.2 ¹	10.4 ¹	1.1 ¹	23.9	26.8 ¹	11.1 ¹	1.6 ¹	26.8	19.8 ¹	8.5 ¹	1.5 ¹	19.2	36.9 ¹	51.9 ¹	7.8 ¹	25.0
ビタミンC(mg)	109 ¹	76 ¹	4 ¹	85	102 ¹	70 ¹	6 ¹	84	118 ¹	82 ¹	9 ¹	88	87 ¹	63 ¹	14 ¹	69	90 ¹	60 ¹	4 ¹	77
コレステロール(mg)	319 ¹	171 ¹	11 ¹	299	316 ¹	158 ¹	19 ¹	319	311 ¹	169 ¹	34 ¹	298	238 ¹	117 ¹	7 ¹	237	396 ¹	208 ¹	40 ¹	337
食物繊維総量(g)	15.6 ¹	7.0 ¹	0.4 ¹	14.9	15.4 ¹	6.6 ¹	0.6 ¹	14.4	17.0 ¹	7.2 ¹	1.0 ¹	15.5	14.5 ¹	6.3 ¹	0.8 ¹	14.9	15.9 ¹	8.2 ¹	0.8 ¹	14.8
うち水溶性(g)	3.6 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	3.4	3.5 ¹	1.6 ¹	0.2 ¹	3.2	4.0 ¹	1.7 ¹	0.2 ¹	3.6	3.4 ¹	1.7 ¹	0.3 ¹	3.3	3.8 ¹	2.1 ¹	0.3 ¹	3.2
うち不溶性(g)	11.4 ¹	5.3 ¹	0.3 ¹	10.9	11.3 ¹	5.2 ¹	0.5 ¹	10.6	12.5 ¹	5.5 ¹	0.7 ¹	11.5	10.7 ¹	4.9 ¹	0.6 ¹	10.8	11.6 ¹	6.2 ¹	0.5 ¹	10.8
脂肪エネルギー比率(%)	26.5 ¹	7.3 ¹	0.4 ¹	26.0	26.9 ¹	7.4 ¹	0.9 ¹	27.6	24.8 ¹	6.8 ¹	1.0 ¹	24.9	27.0 ¹	7.1 ¹	0.9 ¹	28.1	26.9 ¹	6.2 ¹	0.8 ¹	26.2

山武長生夷隅				安房				君津				市原				千葉			
平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
96				40				33				27				19			
2037	536	36	2039	2033	554	52	1957	1998	666	59	1898	2005	543	141	1943	2225	454	48	2164
75.0	24.5	2.5	72.8	73.4	22.1	0.3	75.6	83.4	27.6	0.6	81.2	68.7	18.1	2.8	68.3	85.2	17.7	1.6	84.0
40.6	20.3	2.0	37.0	40.2	17.1	0.1	40.9	49.9	20.5	2.4	49.5	37.7	15.6	2.3	37.5	45.7	14.8	1.9	42.7
61.7	25.9	2.3	58.5	57.4	24.1	1.2	57.8	60.1	25.9	4.4	55.3	64.7	29.6	7.8	63.2	68.0	22.3	4.9	70.0
32.5	20.0	0.7	29.1	27.9	12.1	0.1	28.2	33.7	18.4	3.5	31.9	32.1	20.1	0.2	28.2	32.8	18.5	2.1	30.7
16.4	8.9	0.5	14.5	13.6	5.6	0.1	13.7	16.9	8.4	1.0	15.7	17.3	9.4	1.6	15.9	18.0	5.7	1.3	17.2
21.6	9.8	1.1	19.6	19.6	8.9	0.1	17.3	20.2	11.6	2.4	18.5	23.1	12.0	3.4	20.8	24.4	8.6	1.9	26.3
13.3	5.4	0.8	12.2	12.2	5.9	0.0	11.2	11.7	4.5	0.7	10.8	13.5	5.9	2.0	11.7	14.0	5.0	1.2	12.9
10.8	4.6	0.6	10.4	9.6	5.0	0.3	8.4	8.9	4.1	0.8	8.7	11.2	5.4	1.8	9.7	10.8	4.2	1.2	10.3
2.4	1.6	0.2	2.1	2.5	1.5	0.2	2.2	2.4	1.0	0.1	2.3	2.2	1.1	0.2	2.1	3.0	2.0	0.2	2.7
275.4	76.2	5.1	274.2	281.6	78.0	7.8	267.3	259.1	87.1	6.1	235.6	240.0	85.8	11.7	214.5	300.5	72.6	10.2	291.8
10.2	3.5	0.3	10.3	11.3	3.7	0.4	11.1	11.2	4.2	1.0	10.0	10.0	3.6	0.0	10.2	13.2	4.2	0.9	11.9
5.2	1.9	0.2	5.0	5.7	1.7	0.5	5.3	5.9	2.4	0.8	4.9	5.1	1.6	0.4	5.1	6.0	1.7	0.5	5.5
2326	1114	124	2149	2334	728	51	2376	2546	926	22	2314	2466	768	44	2249	3185	1115	210	3133
515	368	44	438	435	209	27	431	593	308	30	509	475	208	36	498	667	347	64	572
264	115	15	251	252	82	4	255	275	94	6	269	252	76	5	240	321	104	19	314
1024	402	37	977	1012	283	9	1023	1155	355	20	1131	1012	274	48	991	1270	348	48	1293
8.4	3.5	0.4	7.7	7.9	3.0	0.4	7.8	9.2	2.9	0.2	8.9	7.6	2.6	0.2	7.6	9.7	2.9	0.5	9.9
8.6	3.1	0.2	8.4	8.2	2.5	0.2	8.4	8.8	3.4	0.6	8.4	7.7	2.3	0.3	7.6	10.3	4.0	0.9	9.7
1.23	0.40	0.04	1.24	1.17	0.35	0.04	1.17	1.19	0.40	0.01	1.08	1.12	0.38	0.02	1.16	1.46	0.48	0.09	1.62
3.89	1.53	0.24	3.63	3.79	1.28	0.02	3.64	3.95	1.68	0.04	3.41	3.52	1.27	0.35	3.43	4.88	2.35	0.59	3.88
2024	7920	460	61	311	800	30	55	940	1828	164	61	468	1538	35	41	2219	3855	1257	83
44	30	4	36	44	27	0.3	42	59	39	4	51	39	22	1	34	66	32	7	64
6	4	1	5	6	4	0.1	5	6	4	1	6	6	4	1	5	8	3	1	8
198	95	4	189	183	77	15	181	158	107	4	128	159	93	9	149	167	56	16	155
476	366	47	381	456	303	20	399	616	774	120	438	499	330	29	460	631	404	97	518
8.1	8.7	0.6	3.9	7.4	7.5	1.2	4.3	11.5	8.8	1.0	9.3	6.6	6.6	0.6	3.9	11.0	11.3	2.1	6.8
6.7	3.3	0.5	5.8	7.6	4.0	0.2	7.2	6.4	1.7	0.0	6.6	7.1	3.1	0.9	7.4	9.9	3.6	0.6	10.9
303	223	18	288	272	185	36	234	228	165	19	166	278	184	23	260	318	202	34	257
0.91	0.45	0.04	0.80	0.98	0.41	0.03	0.98	1.02	0.46	0.03	0.92	0.92	0.39	0.03	0.88	1.04	0.38	0.04	1.01
1.20	0.56	0.04	1.13	1.16	0.44	0.00	1.13	1.44	0.63	0.08	1.31	1.27	0.51	0.03	1.14	1.58	0.51	0.08	1.64
15.3	6.2	0.8	14.6	17.2	5.7	0.0	17.2	20.7	10.3	0.7	17.4	15.8	5.2	0.4	15.2	20.5	8.2	0.6	18.1
1.20	0.50	0.05	1.17	1.34	0.51	0.05	1.26	1.40	0.51	0.05	1.29	1.20	0.36	0.02	1.17	1.52	0.55	0.08	1.53
7.3	7.2	0.6	4.7	6.0	6.4	0.2	4.8	10.0	8.2	1.3	8.4	4.4	2.7	0.3	4.1	10.0	8.8	2.3	5.4
312	144	19	298	316	120	8	331	334	130	5	299	318	116	22	291	432	215	42	345
5.75	2.22	0.17	5.74	5.75	1.73	0.17	5.77	6.18	2.13	0.06	5.68	5.70	1.77	0.04	5.61	7.28	2.31	0.37	7.34
23.6	11.6	1.5	23.2	24.2	9.5	0.6	22.9	27.9	20.6	1.0	22.7	25.2	10.7	0.6	25.0	30.9	9.7	1.8	31.8
100	73	11	81	114	70	6	97	132	96	4	93	102	64	13	85	171	95	18	171
315	181	14	293	282	154	4	298	358	175	15	352	325	160	12	310	352	172	65	312
14.7	7.1	0.9	13.6	14.9	5.9	0.2	15.6	15.5	6.0	0.5	14.1	14.6	6.3	0.4	14.3	19.8	9.7	1.8	17.5
3.4	1.8	0.2	3.2	3.4	1.5	0.1	3.3	3.6	1.4	0.2	3.3	3.4	1.7	0.0	3.5	4.6	2.3	0.4	4.5
10.7	5.1	0.7	9.7	11.0	4.5	0.1	11.5	11.5	4.7	0.4	10.9	10.7	5.1	0.6	10.1	14.9	7.4	1.5	13.3
26.8	7.5	0.8	25.8	25.0	6.9	1.1	25.4	27.1	7.2	0.8	27.0	28.9	9.8	1.3	27.8	27.3	6.0	1.6	28.7
58.5	8.3	0.9	59.7	60.5	8.6	1.3	59.2	55.9	7.9	0.3	56.9	57.3	10.2	1.0	59.2	57.4	6.5	1.4	56.0
52.1	14.3	1.5	53.4	52.6	13.6	0.7	54.1	58.9	8.8	2.7	58.3	53.5	15.6	0.8	55.1	53.3	10.3	1.9	51.7
44.5	13.7	1.2	42.8	43.1	12.3	1.4	41.0	38.7	9.6	0.1	39.2	31.8	11.8	1.3	30.1	38.9	10.3	0.7	40.7

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

栄養素等摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(20歳以上、女性、二次医療圏別)

	総 数				東葛南部				東葛北部				印旛				香取海浜			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	495				89				88				32				36			
エネルギー(kcal)	1733 ¹	482 ¹	28 ¹	1705	1806 ¹	567 ¹	62 ¹	1723	1710 ¹	424 ¹	24 ¹	1672	1736 ¹	417 ¹	99 ¹	1777	1739 ¹	304 ¹	25 ¹	1692
たんぱく質(g)	66.2 ¹	18.7 ¹	1.0 ¹	65.0	67.9 ¹	20.2 ¹	2.4 ¹	65.2	67.8 ¹	18.5 ¹	2.0 ¹	66.4	62.9 ¹	15.2 ¹	2.9 ¹	65.1	68.4 ¹	15.7 ¹	0.3 ¹	67.7
うち動物性(g)	35.0 ¹	14.6 ¹	0.8 ¹	33.5	34.0 ¹	13.8 ¹	1.7 ¹	34.3	35.9 ¹	14.8 ¹	2.1 ¹	34.6	35.7 ¹	13.6 ¹	1.5 ¹	34.7	35.0 ¹	13.2 ¹	2.4 ¹	33.5
脂質(g)	55.1 ¹	23.3 ¹	1.3 ¹	52.0	58.5 ¹	25.3 ¹	3.9 ¹	57.7	51.5 ¹	17.5 ¹	0.8 ¹	49.3	58.4 ¹	22.3 ¹	7.9 ¹	58.7	55.2 ¹	16.3 ¹	0.3 ¹	53.8
うち動物性(g)	27.0 ¹	15.2 ¹	0.8 ¹	24.4	26.0 ¹	13.7 ¹	1.5 ¹	24.9	25.0 ¹	11.9 ¹	1.1 ¹	23.6	32.1 ¹	16.3 ¹	3.5 ¹	32.0	23.8 ¹	11.3 ¹	1.9 ¹	22.1
飽和脂肪酸(g)	15.3 ¹	8.5 ¹	0.4 ¹	13.5	15.7 ¹	9.1 ¹	1.0 ¹	14.2	13.7 ¹	5.5 ¹	0.1 ¹	12.4	18.9 ¹	9.3 ¹	2.7 ¹	17.1	15.1 ¹	6.5 ¹	0.4 ¹	14.4
一価不飽和脂肪酸(g)	18.6 ¹	8.8 ¹	0.5 ¹	17.0	19.8 ¹	9.8 ¹	1.8 ¹	18.0	17.1 ¹	6.6 ¹	0.5 ¹	16.4	19.5 ¹	8.5 ¹	2.7 ¹	19.2	18.6 ¹	6.3 ¹	0.4 ¹	17.9
多価不飽和脂肪酸(g)	11.6 ¹	5.4 ¹	0.3 ¹	10.8	12.1 ¹	5.5 ¹	0.9 ¹	10.7	11.5 ¹	5.1 ¹	0.3 ¹	11.1	10.6 ¹	4.8 ¹	1.0 ¹	9.6	12.7 ¹	5.2 ¹	0.6 ¹	12.1
n-6系脂肪酸(g)	9.3 ¹	4.6 ¹	0.2 ¹	8.7	9.8 ¹	4.5 ¹	0.7 ¹	9.0	9.0 ¹	4.5 ¹	0.3 ¹	8.9	9.0 ¹	3.9 ¹	0.9 ¹	8.3	10.6 ¹	4.6 ¹	0.6 ¹	10.1
n-3系脂肪酸(g)	2.1 ¹	1.4 ¹	0.1 ¹	1.8	2.2 ¹	1.5 ¹	0.2 ¹	1.7	2.2 ¹	1.3 ¹	0.1 ¹	2.0	1.5 ¹	1.0 ¹	0.1 ¹	1.4	2.1 ¹	0.9 ¹	0.2 ¹	1.9
炭水化物(g)	236.1 ¹	71.2 ¹	4.2 ¹	229.2	248.1 ¹	86.9 ¹	7.6 ¹	231.1	233.2 ¹	62.9 ¹	5.2 ¹	228.0	225.6 ¹	62.1 ¹	5.3 ¹	232.3	236.7 ¹	51.7 ¹	4.6 ¹	239.0
食塩(g)	9.4 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	8.9	9.6 ¹	4.0 ¹	0.3 ¹	9.1	9.6 ¹	3.2 ¹	0.2 ¹	9.2	9.0 ¹	3.2 ¹	0.1 ¹	8.7	9.5 ¹	2.5 ¹	0.6 ¹	9.5
(ナトリウム*2.54/1,000)																				
食塩(g/1, 000kcal)	5.5 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.2	5.4 ¹	1.6 ¹	0.2 ¹	5.1	5.7 ¹	1.7 ¹	0.1 ¹	5.4	5.2 ¹	1.6 ¹	0.3 ¹	4.8	5.6 ¹	1.6 ¹	0.4 ¹	5.3
カリウム(mg)	2382 ¹	908 ¹	50 ¹	2254	2555 ¹	832 ¹	105 ¹	2481	2457 ¹	892 ¹	119 ¹	2333	2119 ¹	864 ¹	168 ¹	1971	2383 ¹	637 ¹	66 ¹	2290
カルシウム(mg)	531 ¹	282 ¹	14 ¹	495	560 ¹	234 ¹	19 ¹	524	550 ¹	267 ¹	24 ¹	505	557 ¹	362 ¹	59 ¹	482	583 ¹	277 ¹	32 ¹	537
マグネシウム(mg)	247 ¹	89 ¹	5 ¹	242	264 ¹	88 ¹	11 ¹	248	253 ¹	83 ¹	8 ¹	246	210 ¹	72 ¹	13 ¹	197	261 ¹	67 ¹	16 ¹	259
リン(mg)	968 ¹	302 ¹	16 ¹	925	1004 ¹	284 ¹	39 ¹	959	974 ¹	280 ¹	24 ¹	934	971 ¹	316 ¹	68 ¹	896	1041 ¹	276 ¹	15 ¹	986
鉄(mg)	7.9 ¹	3.1 ¹	0.2 ¹	7.4	8.6 ¹	3.3 ¹	0.3 ¹	8.0	7.9 ¹	2.8 ¹	0.3 ¹	7.5	5.8 ¹	2.5 ¹	0.2 ¹	5.3	8.5 ¹	2.3 ¹	0.5 ¹	8.6
亜鉛(mg)	7.6 ¹	2.5 ¹	0.1 ¹	7.3	8.1 ¹	2.6 ¹	0.3 ¹	7.9	7.9 ¹	2.8 ¹	0.2 ¹	7.3	7.3 ¹	2.2 ¹	0.4 ¹	7.5	8.0 ¹	1.8 ¹	0.1 ¹	7.9
銅(mg)	1.12 ¹	0.38 ¹	0.02 ¹	1.09	1.19 ¹	0.38 ¹	0.04 ¹	1.15	1.16 ¹	0.38 ¹	0.02 ¹	1.10	0.93 ¹	0.33 ¹	0.05 ¹	0.87	1.25 ¹	0.33 ¹	0.06 ¹	1.19
マンガン(mg)	3.55 ¹	1.78 ¹	0.10 ¹	3.24	3.50 ¹	1.69 ¹	0.17 ¹	3.23	3.67 ¹	2.30 ¹	0.33 ¹	3.42	2.71 ¹	1.29 ¹	0.11 ¹	2.45	4.08 ¹	1.37 ¹	0.24 ¹	3.73
ヨウ素(μg)	1581 ¹	6838 ¹	361 ¹	55	1429 ¹	4390 ¹	569 ¹	76	2425 ¹	7123 ¹	1297 ¹	65	1923 ¹	7477 ¹	935 ¹	89	1284 ¹	2638 ¹	426 ¹	65
セレン(μg)	42 ¹	28 ¹	1 ¹	35	43 ¹	29 ¹	3 ¹	33	44 ¹	32 ¹	2 ¹	36	47 ¹	25 ¹	5 ¹	49	45 ¹	32 ¹	2 ¹	39
クロム(μg)	6 ¹	3 ¹	0.2 ¹	5	6 ¹	3 ¹	0.4 ¹	6	6 ¹	3 ¹	0.3 ¹	5	6 ¹	4 ¹	0.5 ¹	4	6 ¹	3 ¹	1 ¹	5
モリブデン(μg)	149 ¹	82 ¹	4 ¹	133	148 ¹	81 ¹	9 ¹	133	157 ¹	84 ¹	7 ¹	136	115 ¹	62 ¹	5 ¹	99	165 ¹	81 ¹	21 ¹	147
ビタミンA(μgRE)	548 ¹	559 ¹	26 ¹	433	596 ¹	556 ¹	38 ¹	522	561 ¹	402 ¹	55 ¹	436	475 ¹	349 ¹	30 ¹	350	491 ¹	286 ¹	54 ¹	414
ビタミンD(μg)	7.2 ¹	7.9 ¹	0.4 ¹	4.2	6.8 ¹	6.9 ¹	0.4 ¹	3.6	6.7 ¹	6.0 ¹	0.7 ¹	5.4	4.6 ¹	5.6 ¹	0.0 ¹	2.6	6.9 ¹	6.2 ¹	0.9 ¹	5.5
ビタミンE(mg)	6.9 ¹	3.5 ¹	0.2 ¹	6.3	7.5 ¹	3.4 ¹	0.4 ¹	7.0	7.0 ¹	3.5 ¹	0.4 ¹	6.2	6.1 ¹	3.4 ¹	1.0 ¹	5.6	7.1 ¹	2.5 ¹	0.2 ¹	6.6
ビタミンK(μg)	274 ¹	193 ¹	11 ¹	224	285 ¹	177 ¹	23 ¹	252	277 ¹	194 ¹	16 ¹	216	168 ¹	112 ¹	8 ¹	131	335 ¹	192 ¹	35 ¹	319
ビタミンB1(mg)	0.86 ¹	0.36 ¹	0.01 ¹	0.81	0.90 ¹	0.34 ¹	0.04 ¹	0.84	0.86 ¹	0.38 ¹	0.04 ¹	0.76	0.83 ¹	0.39 ¹	0.04 ¹	0.75	0.86 ¹	0.31 ¹	0.00 ¹	0.82
ビタミンB2(mg)	1.23 ¹	0.52 ¹	0.02 ¹	1.13	1.19 ¹	0.44 ¹	0.06 ¹	1.15	1.23 ¹	0.54 ¹	0.05 ¹	1.10	1.22 ¹	0.69 ¹	0.01 ¹	1.07	1.22 ¹	0.37 ¹	0.09 ¹	1.20
ナイアシン(mgNE)	14.2 ¹	6.1 ¹	0.3 ¹	13.2	15.1 ¹	6.3 ¹	0.8 ¹	14.2	14.7 ¹	6.1 ¹	0.8 ¹	13.6	13.2 ¹	4.6 ¹	0.8 ¹	12.4	14.1 ¹	6.5 ¹	0.6 ¹	13.1
ビタミンB6(mg)	1.14 ¹	0.45 ¹	0.02 ¹	1.08	1.23 ¹	0.46 ¹	0.06 ¹	1.18	1.15 ¹	0.48 ¹	0.07 ¹	1.07	0.98 ¹	0.42 ¹	0.06 ¹	0.92	1.14 ¹	0.28 ¹	0.01 ¹	1.14
ビタミンB12(μg)	5.8 ¹	5.5 ¹	0.3 ¹	4.1	6.0 ¹	5.1 ¹	0.4 ¹	5.0	5.7 ¹	4.2 ¹	0.5 ¹	4.7	3.5 ¹	2.4 ¹	0.0 ¹	2.9	5.9 ¹	5.6 ¹	1.2 ¹	4.8
葉酸(μg)	324 ¹	151 ¹	9 ¹	307	351 ¹	140 ¹	15 ¹	336	319 ¹	160 ¹	17 ¹	297	229 ¹	97 ¹	14 ¹	211	366 ¹	114 ¹	24 ¹	343
パントテン酸(mg)	5.50 ¹	1.83 ¹	0.09 ¹	5.31	5.75 ¹	1.66 ¹	0.27 ¹	5.79	5.31 ¹	1.66 ¹	0.17 ¹	5.24	5.19 ¹	1.89 ¹	0.42 ¹	5.15	5.90 ¹	1.58 ¹	0.15 ¹	5.61
ビオチン(μg)	24.8 ¹	15.8 ¹	0.8 ¹	22.7	27.0 ¹	15.8 ¹	2.0 ¹	24.9	23.4 ¹	9.8 ¹	0.7 ¹	22.0	19.2 ¹	8.1 ¹	1.5 ¹	18.5	25.3 ¹	9.7 ¹	2.3 ¹	24.7
ビタミンC(mg)	120 ¹	86 ¹	5 ¹	103	134 ¹	90 ¹	12 ¹	113	125 ¹	92 ¹	11 ¹	104	82 ¹	61 ¹	10 ¹	62	132 ¹	77 ¹	12 ¹	119
コレステロール(mg)	291 ¹	162 ¹	9 ¹	273	276 ¹															

山武長生夷隅				安房				君津				市原				千葉			
平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
115				49				28				30				28			
1750	498	68	1733	1780	528	118	1705	1613	531	87	1478	1533	492	0.4	1570	1740	380	89	1687
66.2	20.4	2.0	64.4	67.7	16.6	3.1	64.7	65.5	17.3	2.6	62.9	57.7	22.4	0.9	58.4	64.6	13.4	3.6	65.5
36.0	16.2	1.7	33.9	36.7	14.1	1.9	34.4	36.0	12.8	0.7	32.5	30.4	18.4	0.4	26.7	31.4	9.4	2.8	30.0
57.1	26.4	2.8	51.7	53.4	24.4	2.7	49.4	52.0	29.8	2.0	45.0	51.8	20.4	2.1	47.6	53.6	20.5	4.8	51.7
29.8	19.4	2.1	25.9	27.7	13.9	1.8	25.8	26.7	16.8	0.9	21.5	25.9	15.4	1.4	21.7	23.3	9.7	0.6	22.0
15.8	9.6	0.9	13.9	14.5	9.5	1.4	12.5	14.3	10.3	0.8	10.6	14.6	7.6	1.2	11.7	15.9	7.0	1.6	14.9
19.4	9.8	1.1	17.0	18.2	9.4	0.9	16.8	16.7	10.7	0.0	13.8	18.0	7.2	0.6	15.9	17.8	8.2	1.7	16.6
11.9	5.6	0.6	10.9	11.6	6.4	0.2	9.6	10.3	6.1	0.6	9.8	10.6	4.9	0.2	11.1	10.6	4.4	1.0	9.8
9.7	4.7	0.5	8.8	9.1	5.3	0.2	7.9	8.1	4.9	0.5	8.1	8.6	4.2	0.3	8.6	8.6	3.9	0.8	8.2
2.1	1.5	0.2	1.7	2.4	1.6	0.0	1.8	2.0	1.7	0.1	1.6	1.9	1.2	0.0	1.6	1.9	1.0	0.2	1.8
235.2	69.1	8.6	226.3	251.9	78.3	20.1	232.4	215.3	69.5	15.2	202.6	206.6	73.2	3.1	215.7	246.4	57.6	10.5	257.3
9.2	3.5	0.4	9.1	9.8	3.8	0.3	8.9	9.5	3.4	0.5	9.7	8.5	3.5	0.2	7.8	9.6	3.8	0.3	8.9
5.3	1.5	0.2	5.1	5.7	2.2	0.2	5.3	6.1	2.0	0.2	6.0	5.7	1.6	0.2	5.7	5.6	2.1	0.2	5.1
2275	1013	96	2105	2300	830	165	2206	2342	798	142	2164	2278	1247	54	2143	2625	840	153	2485
498	305	24	461	502	248	65	478	506	332	70	447	444	298	41	441	589	255	46	539
240	101	10	229	242	79	12	235	242	87	15	214	227	115	4	233	258	80	14	256
940	345	34	884	969	264	57	893	942	271	42	873	857	379	8	853	1002	232	59	1017
7.7	3.2	0.2	6.8	8.0	2.8	0.3	7.9	8.6	3.8	0.4	7.5	7.0	3.2	0.1	7.3	7.9	2.8	0.4	7.8
7.5	2.7	0.2	7.3	7.2	2.0	0.5	6.8	7.3	2.1	0.0	7.0	6.7	2.5	0.1	7.2	7.5	2.5	0.6	7.0
1.08	0.37	0.03	1.05	1.12	0.35	0.07	1.05	1.04	0.37	0.07	0.90	1.02	0.47	0.03	1.08	1.16	0.41	0.09	1.02
3.36	1.56	0.14	3.08	3.90	1.68	0.15	3.51	3.72	1.71	0.39	3.13	3.28	1.82	0.36	3.03	3.93	1.96	0.10	3.63
2260	1124	809	42	371	908	24	68	485	1268	147	36	720	2259	308	38	747	1983	458	50
38	28	3	32	46	23	1	43	40	28	0.3	33	32	19	1	30	40	28	7	33
5	3	0.3	4	6	3	0.2	6	6	5	1	4	5	3	0.0	5	6	3	1	6
154	87	2	142	160	78	2	138	132	80	10	113	126	83	15	102	141	74	17	134
529	659	62	381	463	244	27	444	843	1284	64	407	440	347	13	303	566	306	74	510
7.8	8.1	0.8	4.0	9.9	11.8	0.4	5.5	7.2	7.2	0.5	3.9	6.7	10.6	0.3	2.5	6.9	8.4	2.1	3.3
6.6	3.6	0.5	5.7	7.3	4.0	0.8	6.9	5.8	2.7	0.1	5.5	6.1	4.0	0.2	5.2	8.1	3.4	0.6	7.4
284	216	15	207	277	209	41	206	245	180	48	192	227	159	15	202	309	200	33	256
0.85	0.35	0.01	0.81	0.80	0.26	0.04	0.76	0.90	0.43	0.07	0.81	0.79	0.41	0.04	0.74	0.97	0.37	0.07	0.90
1.22	0.56	0.04	1.13	1.30	0.47	0.05	1.17	1.30	0.60	0.08	1.17	1.05	0.53	0.03	1.07	1.39	0.49	0.11	1.28
13.3	5.1	0.7	13.0	15.6	8.4	0.6	14.0	15.2	6.6	0.6	13.2	12.4	5.7	0.4	11.3	13.7	4.6	0.7	13.6
1.09	0.43	0.03	1.06	1.17	0.50	0.05	0.99	1.18	0.44	0.07	1.13	1.05	0.52	0.02	0.96	1.17	0.36	0.06	1.15
6.3	6.5	0.7	4.1	7.0	6.0	0.2	4.9	7.4	7.7	1.0	3.8	3.8	3.9	0.3	2.1	5.4	5.2	1.1	3.1
307	150	17	277	327	159	19	310	360	168	18	324	291	169	20	269	367	156	24	334
5.43	2.08	0.16	5.16	5.51	1.78	0.30	5.28	5.54	1.80	0.27	4.93	5.03	2.23	0.06	4.72	5.94	1.68	0.37	5.33
23.8	19.9	1.8	21.9	26.1	10.8	0.3	24.9	32.7	30.3	0.4	21.0	22.9	13.8	1.1	20.8	24.2	10.4	2.5	25.0
107	84	11	83	113	86	10	94	134	91	26	116	105	96	6	74	153	75	17	143
319	192	19	296	328	213	35	265	292	124	14	293	263	141	2	251	247	119	20	220
14.2	6.8	0.7	13.2	14.5	6.2	0.8	14.0	16.0	8.2	1.8	14.0	14.6	9.3	0.2	14.0	17.2	7.0	0.7	15.6
3.3	1.7	0.2	3.2	3.4	1.6	0.1	3.2	3.5	1.6	0.3	3.5	3.3	2.0	0.0	3.1	4.2	1.8	0.3	3.7
10.3	4.8	0.5	9.2	10.5	4.7	0.4	9.6	12.1	6.6	1.5	10.4	11.0	7.4	0.3	10.1	12.7	5.3	0.6	11.7
28.7	8.3	0.6	27.2	26.4	7.2	0.7	27.5	27.8	9.2	0.8	27.0	30.6	6.5	1.2	29.6	27.4	6.2	1.0	26.3
56.1	9.0	0.6	56.4	57.9	7.2	1.1	57.7	55.5	8.5	0.7	56.5	54.4	7.3	0.8	54.3	57.5	6.2	1.0	59.4
52.8	12.6	0.9	54.0	53.4	12.6	0.5	52.5	55.1	11.2	1.3	55.7	51.1	16.0	0.9	53.8	48.4	8.8	2.2	49.1
39.6	13.1	1.3	39.4	39.1	12.6	1.3	38.6	33.0	11.6	0.9	34.2	36.5	16.0	3.6	37.6	36.0	11.2	2.8	35.0

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

食品群別摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(1歳以上、全体、年齢階級別)(g)

	総 数				1-6歳				7-14歳				15-19歳				20-29歳			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	1090				49				70				45				75			
総量	2264.7	796.1	45.4	2170.9	1317.3	419.9	59.9	1268.1	1971.9	616.8	96.1	1918.7	2329.8	946.8	143.2	2213.2	2085.0	730.9	102.0	1970.2
穀類	407.8	169.9	7.8	400.0	276.4	97.0	11.1	255.0	408.3	166.3	25.2	399.6	564.7	229.2	34.9	530.0	442.9	197.3	21.1	448.0
米・加工品	293.6	177.7	8.6	267.6	213.1	95.0	14.1	200.0	323.9	190.6	27.4	303.1	468.4	245.4	36.8	420.0	326.3	186.9	21.0	320.0
小麦・加工品	102.0	101.4	4.8	72.0	60.0	61.0	9.1	35.4	79.6	66.6	9.2	74.1	82.7	117.2	15.0	42.2	103.9	106.2	10.8	70.0
その他穀類	12.2	48.9	2.3	0.0	3.3	15.5	2.1	0.0	4.8	14.3	2.0	0.0	13.6	40.4	6.3	0.0	12.7	53.2	5.8	0.0
いも類	49.6	64.0	3.0	30.0	39.0	62.9	9.7	27.9	48.9	46.6	6.1	37.1	61.0	65.3	11.1	46.8	52.0	59.7	7.1	37.5
砂糖・甘味料類	7.4	9.0	0.3	5.0	4.0	6.1	1.2	1.8	9.0	9.0	1.8	5.2	9.6	9.7	1.4	7.6	6.6	9.5	1.3	3.6
豆類	61.0	82.1	4.2	33.5	31.0	36.2	6.4	20.0	41.9	59.7	10.1	20.0	33.0	52.0	8.8	3.0	60.0	72.6	10.6	50.0
種実類	3.4	10.5	0.5	0.0	1.0	2.3	0.3	0.0	5.0	15.9	2.3	0.3	4.3	8.5	1.5	0.0	2.2	8.7	0.9	0.0
野菜類	296.2	174.3	8.2	265.6	161.4	99.6	16.2	132.9	254.6	115.5	16.8	231.1	264.9	152.2	27.5	228.6	285.6	156.2	20.0	260.0
緑黄色野菜	100.5	91.3	4.9	78.7	61.8	42.4	6.1	51.0	73.2	59.9	11.1	54.0	69.3	62.3	9.6	45.4	89.2	81.5	12.5	66.4
その他野菜	173.3	114.5	5.0	155.5	85.9	61.6	10.3	75.6	167.4	79.5	12.7	153.6	178.9	97.0	17.4	155.0	175.9	106.0	13.5	165.0
野菜ジュース	13.0	56.5	2.1	0.0	13.4	46.6	6.1	0.0	10.0	39.7	5.6	0.0	11.3	44.5	6.7	0.0	15.2	53.6	5.5	0.0
漬物	9.4	19.7	1.1	0.0	0.3	1.8	0.3	0.0	4.0	13.7	2.3	0.0	5.4	17.3	2.6	0.0	5.4	14.3	1.9	0.0
果実類	119.9	141.9	5.7	83.8	103.5	95.4	17.8	64.8	92.6	103.3	13.7	55.0	90.7	147.8	21.5	0.0	75.6	103.8	16.5	35.3
きのこ類	16.1	29.2	1.3	1.6	6.6	11.1	1.9	0.0	12.2	15.3	2.5	8.0	7.5	13.2	2.3	0.0	13.9	28.8	3.6	0.0
藻類	9.8	19.3	0.9	1.5	3.0	6.1	0.9	0.5	6.5	14.1	2.3	0.0	7.6	12.3	1.9	1.0	7.2	13.4	1.7	1.0
魚介類	69.4	66.8	3.2	54.3	28.6	35.6	6.1	14.9	48.8	48.1	7.7	37.0	53.3	57.8	10.3	40.0	47.7	61.5	8.8	20.0
魚介加工品	27.5	40.7	1.7	9.0	9.7	18.2	3.0	1.5	14.8	22.3	2.7	3.4	22.9	31.6	4.3	9.5	20.0	35.3	4.4	1.0
肉類	98.1	81.2	3.0	84.3	61.9	40.3	6.4	59.0	110.9	57.3	9.4	103.2	174.7	125.4	17.6	140.4	146.2	120.2	12.5	110.0
ハム・ソーセージ類	13.6	23.0	1.1	0.0	13.1	18.3	2.7	4.0	17.7	20.8	3.1	10.0	20.1	32.1	5.4	10.0	15.9	21.4	2.7	9.0
卵類	32.0	29.5	1.2	30.5	24.8	24.1	3.4	22.6	31.7	24.2	4.4	32.0	45.9	36.2	4.2	43.0	38.4	30.8	3.8	43.0
乳類	146.8	178.1	7.6	100.0	217.9	217.0	36.0	200.0	319.0	186.9	26.6	246.0	153.8	174.9	29.3	100.0	158.3	263.1	30.8	47.5
油脂類	10.8	9.4	0.5	9.0	6.3	5.3	0.8	5.3	9.5	5.7	0.9	9.7	16.7	13.0	1.8	12.9	12.5	10.4	1.6	10.0
菓子類	28.0	53.2	2.2	0.0	26.2	30.1	4.9	21.0	36.3	53.0	7.1	8.0	30.2	48.9	6.3	0.0	31.7	77.2	12.4	0.0
嗜好飲料類	814.0	580.4	33.2	710.0	268.5	217.7	44.9	208.0	456.8	385.9	52.4	405.0	715.3	525.9	78.2	640.0	612.9	440.5	51.8	550.0
調味料・香辛料類	94.2	90.5	5.3	65.3	57.2	76.2	16.6	27.2	80.0	60.8	10.3	57.8	96.7	86.2	10.4	74.9	91.3	67.3	9.3	72.1

	(再掲) 20歳以上				(再掲) 20-39歳				(再掲) 40-64歳				(再掲) 65歳以上			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	926				175				352				399			
総量	2333.8	779.0	42.8	2255.9	2090.2	754.0	63.7	1970.2	2286.2	698.8	46.7	2248.5	2482.7	825.2	67.1	2369.0
穀類	407.1	163.7	7.2	400.0	441.8	191.7	18.4	433.0	413.2	161.1	9.4	400.5	386.6	149.5	10.7	377.4
米・加工品	287.1	170.8	7.9	260.0	322.5	201.8	19.2	304.0	295.0	167.6	9.0	285.0	264.6	155.3	13.0	233.3
小麦・加工品	106.8	103.7	5.1	75.0	109.8	106.6	10.6	85.0	104.4	105.1	6.4	70.0	107.6	101.5	8.0	81.0
その他穀類	13.2	52.0	2.5	0.0	9.5	41.4	3.1	0.0	13.7	54.2	3.7	0.0	14.4	54.2	3.8	0.0
いも類	49.6	65.1	3.2	28.3	43.8	59.5	4.0	18.9	48.9	68.5	4.5	24.5	52.9	64.4	4.3	36.0
砂糖・甘味料類	7.4	9.1	0.4	5.0	6.5	8.9	0.7	3.8	7.1	8.4	0.5	5.0	8.0	9.7	0.6	5.5
豆類	65.4	85.7	4.2	40.0	58.1	73.8	6.7	33.3	65.9	94.0	5.7	38.8	68.2	82.9	5.0	42.0
種実類	3.4	10.3	0.6	0.0	1.8	6.6	0.5	0.0	3.5	11.8	1.0	0.0	3.9	10.2	0.4	0.0
野菜類	308.0	178.5	7.8	277.0	257.9	169.1	14.1	219.7	293.4	175.0	7.4	259.0	342.7	179.0	12.4	318.0
緑黄色野菜	106.1	95.2	5.0	85.3	81.3	89.3	8.8	60.0	98.1	90.1	5.9	75.6	124.0	98.8	7.6	110.3
その他野菜	178.1	117.8	4.4	161.5	161.9	112.2	8.9	145.0	169.5	119.2	5.4	151.9	192.9	117.5	6.6	185.0
野菜ジュース	13.2	58.6	2.3	0.0	9.1	40.3	2.7	0.0	17.8	59.9	3.2	0.0	11.0	63.7	3.7	0.0
漬物	10.5	20.4	1.2	0.0	5.6	14.5	1.4	0.0	8.0	16.3	1.0	0.0	14.8	24.7	1.6	0.0
果実類	124.3	145.9	5.8	88.0	59.7	103.5	10.0	0.0	90.3	120.3	7.9	58.5	182.6	160.4	8.7	150.0
きのこ類	17.4	30.9	1.4	1.0	15.3	28.6	2.2	0.0	17.1	34.9	2.2	0.5	18.5	28.1	1.9	5.0
藻類	10.5	20.2	1.0	1.8	6.3	11.6	1.0	1.0	10.2	15.4	1.2	2.6	12.6	25.9	1.8	2.0
魚介類	73.9	68.6	3.5	61.4	49.9	59.3	3.7	25.0	67.3	63.9	3.7	54.3	90.3	72.4	5.2	80.0
魚介加工品	29.6	42.6	1.9	10.0	19.2	32.8	2.3	1.0	27.5	40.0	2.3	10.0	36.0	47.4	2.8	15.1
肉類	95.3	79.5	2.7	80.0	130.4	98.3	6.0	109.2	100.4	77.2	3.5	87.9	75.5	65.1	3.3	66.7
ハム・ソーセージ類	13.0	22.9	1.0	0.0	15.1	23.5	1.6	1.3	13.5	22.3	1.2	0.0	11.7	23.0	1.3	0.0
卵類	31.8	29.6	1.1	30.0	34.1	28.8	2.5	34.4	32.6	29.4	1.8	30.2	30.1	30.0	1.6	24.3
乳類	129.7	167.5	6.1	80.0	121.7	199.3	15.3	30.0	119.4	163.1	8.9	74.5	142.3	155.2	8.2	103.0
油脂類	10.8	9.5	0.5	9.0	12.0	10.8	1.2	10.0	11.9	9.9	0.6	10.0	9.4	8.2	0.6	7.8
菓子類	27.3	54.4	2.3	0.0	25.9	62.5	5.9	0.0	25.4	56.6	3.3	0.0	29.7	48.3	3.1	0.0
嗜好飲料類	874.7	583.4	32.8	773.8	737.3	559.5	40.8	610.0	875.9	542.6	42.4	813.8	933.9	618.6	48.1	816.0
調味料・香辛料類	97.1	92.8	5.9	66.8	87.6	73.9	7.3	64.6	103.6	94.6	7.2	68.0	95.6	98.3	7.0	64.6

30-39歲					40-49歲					50-59歲					60-69歲					70歲以上				
平均	標準偏差	標準誤差	中央值		平均	標準偏差	標準誤差	中央值		平均	標準偏差	標準誤差	中央值		平均	標準偏差	標準誤差	中央值		平均	標準偏差	標準誤差	中央值	
100					132					147					197					275				
2094.1'	774.5'	87.3'	1996.3		2274.1'	737.8'	71.7'	2256.2		2262.2'	682.3'	66.0'	2244.9		2428.8'	749.7'	54.2'	2394.3		2487.7'	839.5'	77.9'	2365.4	
441.1'	188.3'	26.5'	426.8		421.4'	178.1'	15.7'	405.7		418.5'	160.4'	12.1'	403.9		407.0'	152.8'	10.6'	397.7		372.2'	139.3'	11.1'	372.0	
319.6'	213.2'	30.5'	300.0		311.6'	181.0'	15.9'	300.0		298.2'	169.3'	10.7'	295.0		262.0'	155.1'	15.4'	225.0		264.9'	149.6'	13.0'	238.0	
114.3'	107.1'	14.5'	85.9		100.4'	104.2'	8.5'	64.3		105.4'	102.5'	8.4'	76.0		121.3'	119.0'	10.9'	81.0		98.3'	89.1'	7.4'	75.0	
7.2'	29.8'	2.9'	0.0		9.5'	50.3'	6.0'	0.0		14.9'	52.6'	5.0'	0.0		23.7'	74.9'	8.6'	0.0		9.0'	35.0'	2.5'	0.0	
37.7'	58.9'	5.0'	9.4		52.5'	75.6'	6.5'	32.0		40.5'	61.4'	5.9'	9.5		54.8'	61.6'	3.9'	40.0		53.2'	67.2'	5.4'	35.0	
6.5'	8.5'	1.0'	4.2		6.6'	7.4'	0.7'	5.1		6.9'	8.4'	0.7'	4.0		7.0'	7.8'	0.6'	5.0		8.9'	10.8'	0.7'	6.0	
56.8'	74.9'	10.1'	27.4		45.0'	76.5'	9.3'	15.5		77.6'	106.5'	9.4'	50.0		66.9'	79.9'	7.6'	49.5		72.3'	87.0'	5.9'	42.0	
1.5'	4.5'	0.6'	0.0		1.8'	6.3'	0.5'	0.0		3.9'	12.9'	1.3'	0.0		4.3'	11.5'	0.8'	0.0		4.2'	11.2'	0.5'	0.0	
237.2'	176.0'	20.1'	210.2		279.0'	161.3'	14.5'	236.0		278.1'	161.6'	11.5'	257.5		361.6'	204.6'	15.4'	340.0		331.2'	167.4'	13.9'	311.0	
75.4'	94.6'	12.3'	49.6		82.3'	78.9'	7.9'	61.5		100.9'	93.1'	7.9'	81.6		124.4'	96.8'	9.1'	97.4		123.0'	100.0'	8.3'	112.3	
151.4'	116.1'	12.5'	135.9		172.4'	102.0'	12.7'	157.1		152.9'	102.4'	8.2'	140.6		204.1'	146.3'	10.9'	188.3		186.1'	109.1'	8.5'	180.0	
4.5'	25.6'	2.7'	0.0		17.9'	63.0'	6.0'	0.0		16.9'	60.3'	4.1'	0.0		21.6'	89.2'	8.7'	0.0		5.8'	29.9'	1.8'	0.0	
5.7'	14.7'	2.1'	0.0		6.4'	12.7'	1.3'	0.0		7.5'	14.9'	1.3'	0.0		11.5'	21.8'	2.0'	0.0		16.4'	26.1'	2.1'	2.0	
47.8'	102.1'	9.1'	0.0		70.5'	95.3'	8.9'	23.0		86.6'	123.5'	10.9'	50.0		150.5'	158.9'	9.1'	110.0		192.6'	156.5'	9.9'	164.0	
16.4'	28.6'	2.9'	0.0		15.3'	24.7'	2.9'	1.0		17.2'	45.4'	5.1'	0.0		20.9'	29.5'	2.3'	8.0		17.2'	26.2'	2.1'	1.6	
5.7'	10.0'	0.9'	1.0		8.8'	15.0'	1.8'	1.2		11.2'	15.7'	2.1'	3.3		15.0'	31.7'	2.5'	1.6		10.4'	17.6'	1.2'	2.0	
51.5'	57.9'	5.8'	26.8		61.0'	63.4'	6.1'	43.2		62.7'	61.0'	5.5'	51.5		95.5'	74.0'	5.8'	87.3		86.0'	69.5'	5.7'	79.0	
18.6'	31.0'	3.1'	0.7		24.9'	39.6'	3.5'	5.2		23.6'	37.7'	3.6'	1.8		39.3'	45.8'	3.5'	24.9		34.8'	47.3'	3.6'	12.5	
118.5'	76.4'	7.8'	109.1		115.8'	85.9'	7.7'	96.4		97.8'	72.8'	5.1'	85.1		84.6'	74.2'	4.9'	70.0		69.6'	56.3'	3.4'	61.2	
14.6'	25.0'	1.9'	0.0		14.8'	23.3'	2.3'	0.0		13.1'	21.4'	1.3'	0.0		13.4'	26.6'	2.2'	0.0		10.6'	19.7'	1.6'	0.0	
30.9'	26.9'	2.4'	32.5		31.4'	26.5'	2.1'	30.0		31.8'	30.9'	3.3'	27.0		31.3'	31.3'	2.3'	27.5		30.8'	29.6'	1.8'	25.4	
94.2'	127.8'	13.3'	23.7		116.4'	179.0'	16.1'	68.0		123.4'	166.8'	12.9'	75.0		111.1'	135.2'	12.3'	75.0		158.0'	158.3'	10.3'	125.0	
11.6'	11.1'	1.7'	9.5		12.0'	9.8'	0.8'	10.3		11.6'	9.6'	0.9'	10.0		11.3'	9.8'	1.0'	9.0		8.8'	7.7'	0.6'	7.5	
21.5'	48.8'	5.4'	0.0		30.0'	71.6'	7.0'	0.0		20.7'	41.6'	3.6'	0.0		26.0'	47.4'	4.0'	0.0		31.5'	49.8'	3.7'	3.0	
830.6'	620.2'	57.5'	658.0		900.8'	613.8'	63.3'	862.5		868.3'	492.5'	57.0'	808.0		878.8'	531.8'	40.0'	782.5		950.1'	648.4'	53.9'	816.0	
84.9'	78.8'	8.4'	59.5		106.0'	99.2'	10.1'	69.7		105.4'	100.9'	10.0'	65.3		102.1'	93.8'	8.6'	67.6		90.9'	94.9'	7.4'	63.5	

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

食品群別摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(1歳以上、男性、年齢階級別)(g)

	総 数				1- 6歳				7-14歳				15-19歳				20-29歳			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	513				22				33				27				35			
総量	2413.7	833.7	51.6	2340.4	1348.7	459.7	113.2	1324.9	2056.9	725.1	141.6	1911.4	2555.4	1097.0	232.6	2498.8	2334.3	803.3	158.6	2149.6
穀類	472.8	179.6	11.1	460.0	313.2	118.6	24.6	280.0	474.5	188.4	38.5	453.8	668.6	227.5	43.3	663.0	570.1	180.4	28.4	556.4
米・加工品	352.5	194.3	11.9	330.0	248.2	110.2	26.8	237.0	407.7	208.6	41.8	400.0	552.7	272.4	51.8	530.0	426.9	194.2	31.9	400.0
小麦・加工品	106.9	111.6	6.6	71.3	59.5	65.2	14.6	31.0	58.3	58.2	10.1	50.0	98.0	114.8	13.3	60.0	124.7	120.6	20.9	90.0
その他穀類	13.3	54.1	3.1	0.0	5.5	21.5	4.7	0.0	8.6	19.7	4.1	0.0	17.9	50.9	10.7	0.0	18.6	74.6	11.5	0.0
いも類	53.4	69.0	3.9	31.9	53.2	88.8	18.5	28.1	51.0	41.5	8.2	39.7	54.2	65.2	12.3	39.6	64.1	64.9	12.9	51.1
砂糖・甘味料類	7.4	9.5	0.5	5.0	4.3	6.3	1.4	2.4	10.0	9.7	2.1	5.1	11.4	11.6	2.0	10.6	4.3	5.7	0.9	2.0
豆類	60.2	79.3	4.3	30.0	30.1	44.4	9.4	18.0	41.0	65.0	14.3	18.2	28.5	55.5	10.7	0.0	55.8	77.7	13.2	30.0
種実類	3.3	10.7	0.7	0.0	0.8	1.6	0.4	0.0	4.0	7.9	1.6	1.0	4.0	9.7	2.2	0.0	3.9	12.4	1.9	0.0
野菜類	304.8	187.8	8.7	269.0	143.7	77.6	19.9	146.0	266.5	116.7	23.3	258.6	280.5	164.1	34.1	230.9	325.6	175.4	28.3	306.5
緑黄色野菜	95.6	90.4	5.5	73.0	50.7	35.1	8.1	43.2	72.0	59.8	13.2	52.1	66.9	63.2	10.7	42.0	95.8	85.9	16.1	70.0
その他野菜	182.6	126.5	5.3	160.8	87.7	58.1	13.5	101.2	187.6	94.0	20.1	183.3	189.0	106.1	22.6	160.0	195.1	123.5	21.1	193.1
野菜ジュース	16.5	67.5	3.4	0.0	4.7	22.2	4.3	0.0	3.1	17.9	3.0	0.0	18.9	56.7	11.1	0.0	24.6	69.4	10.2	0.0
漬物	10.1	19.7	1.3	0.0	0.5	2.6	0.6	0.0	3.8	13.9	2.4	0.0	5.7	21.1	4.0	0.0	10.1	19.7	3.9	4.0
果実類	104.4	131.1	6.5	59.3	107.5	89.6	20.5	76.4	90.5	102.1	18.3	50.0	70.2	135.2	24.5	0.0	62.7	98.0	16.7	19.1
きのこ類	17.0	32.8	1.5	0.6	8.3	13.6	3.2	1.6	12.8	13.6	1.8	10.5	6.8	10.3	1.8	0.0	14.7	36.7	5.5	0.0
藻類	10.5	20.4	1.3	1.6	3.8	7.5	1.7	1.0	4.5	11.0	1.9	0.0	8.7	13.3	2.8	1.0	7.9	17.2	3.0	0.3
魚介類	76.3	71.4	4.4	57.0	33.6	38.2	8.2	18.6	61.9	55.1	13.2	55.0	65.9	66.5	15.5	51.0	48.8	71.0	13.4	16.0
魚介加工品	29.3	41.2	2.4	11.7	7.8	13.0	2.3	1.8	15.4	19.8	4.1	7.0	26.5	36.1	5.8	12.0	15.9	26.1	5.7	2.5
肉類	114.0	92.8	4.2	95.2	55.8	32.9	7.6	53.9	113.9	58.9	13.2	100.5	210.1	140.2	30.1	200.6	173.5	135.0	18.0	130.0
ハム・ソーセージ類	14.8	25.4	1.2	0.0	10.0	16.5	4.0	3.5	15.5	20.1	4.0	10.0	24.8	38.9	8.0	10.0	16.5	23.4	3.9	10.0
卵類	32.5	30.5	1.4	30.4	25.6	19.6	5.4	25.3	31.4	25.0	5.3	31.5	46.2	35.2	5.3	43.0	40.9	34.7	6.0	43.0
乳類	137.9	177.5	7.4	80.0	170.9	183.9	37.1	127.7	313.0	161.7	32.9	276.0	149.5	198.9	36.6	70.0	162.9	262.8	41.1	25.0
油脂類	11.8	10.3	0.6	10.0	6.8	4.8	1.0	5.8	9.1	6.9	1.3	7.8	17.1	12.3	2.5	15.0	15.0	12.7	2.3	11.2
菓子類	21.9	42.4	2.2	0.0	29.5	36.1	8.5	22.5	32.1	43.8	7.8	8.0	32.0	54.7	9.1	0.0	25.6	53.8	12.0	0.0
嗜好飲料類	881.2	601.7	38.1	820.0	312.3	255.2	66.7	205.7	442.8	428.6	71.5	454.0	790.4	604.9	131.3	800.0	654.6	508.1	72.4	627.0
調味料・香辛料類	104.1	95.2	6.4	74.3	49.4	71.4	15.5	27.6	97.9	70.2	15.5	66.4	111.1	78.5	13.3	97.3	103.8	71.9	11.1	75.2

	(再掲) 20歳以上				(再掲) 20-39歳				(再掲) 40-64歳				(再掲) 65歳以上			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	431				83				168				180			
総量	2486.4	794.4	48.4	2427.1	2281.5	836.2	89.0	2149.6	2437.8	718.9	59.0	2449.6	2626.4	819.7	72.0	2510.7
穀類	468.5	168.0	11.3	460.0	520.6	205.0	25.6	508.3	474.5	163.2	13.0	464.0	439.0	146.7	14.2	429.5
米・加工品	341.1	182.2	11.8	323.0	398.4	220.4	28.6	400.0	354.1	174.5	11.8	350.0	302.4	160.9	16.5	297.5
小麦・加工品	113.6	115.0	6.9	77.5	111.0	115.7	16.2	77.0	105.6	115.1	9.2	63.3	122.3	114.5	11.2	100.0
その他穀類	13.8	57.1	3.4	0.0	11.2	53.3	5.5	0.0	14.7	57.5	4.9	0.0	14.2	58.7	4.3	0.0
いも類	53.6	70.0	4.0	29.0	50.9	65.4	6.9	25.5	52.6	76.2	6.4	23.7	55.8	66.2	4.5	40.0
砂糖・甘味料類	7.1	9.3	0.5	4.9	6.2	8.2	0.7	4.0	6.9	8.5	0.7	5.0	7.8	10.5	0.8	5.0
豆類	65.2	82.0	4.3	37.5	58.2	73.9	6.8	30.0	62.4	82.2	4.9	35.6	71.0	85.3	6.5	43.5
種実類	3.4	11.2	0.8	0.0	2.2	8.9	0.9	0.0	3.2	11.6	1.1	0.0	4.1	11.8	0.8	0.0
野菜類	317.5	193.5	8.8	283.2	282.7	207.0	22.2	236.5	296.5	190.8	9.5	257.5	353.1	184.7	13.6	334.2
緑黄色野菜	101.5	94.5	5.9	80.7	87.2	104.5	11.6	66.0	93.6	87.6	5.7	70.3	115.5	94.6	8.2	95.5
その他野菜	186.7	130.6	5.4	167.7	174.4	137.2	14.1	155.8	174.1	133.4	7.7	147.8	204.1	123.5	7.6	194.5
野菜ジュース	17.9	71.9	3.9	0.0	13.2	48.8	5.1	0.0	19.5	58.3	3.6	0.0	18.6	90.2	8.0	0.0
漬物	11.4	20.2	1.4	0.0	7.9	17.0	1.8	0.0	9.3	16.9	1.5	0.0	14.9	23.7	1.9	0.0
果実類	107.5	134.5	6.6	66.5	49.0	83.1	9.0	0.0	71.4	104.1	6.7	4.5	168.0	153.9	9.7	141.5
きのこ類	18.5	35.1	1.7	0.0	16.1	35.1	3.4	0.0	17.1	37.9	2.8	0.0	20.8	32.4	2.3	1.6
藻類	11.4	21.6	1.5	2.6	6.7	13.7	1.3	1.0	11.7	16.1	1.5	5.3	13.4	27.8	2.5	2.0
魚介類	80.2	73.3	4.8	63.0	54.7	69.0	7.3	21.5	73.3	69.1	5.9	54.3	98.4	74.7	7.4	88.0
魚介加工品	31.6	43.2	2.8	12.4	16.9	27.7	3.9	1.5	29.0	40.3	3.2	12.2	40.9	49.1	4.4	22.5
肉類	111.0	89.5	4.1	95.0	152.2	108.0	9.6	125.6	115.8	85.7	6.3	100.0	87.5	75.3	5.3	79.8
ハム・ソーセージ類	14.4	25.0	1.1	0.0	14.7	26.0	2.8	0.0	14.5	23.5	1.3	0.0	14.1	26.0	1.9	0.0
卵類	32.1	30.9	1.4	30.0	34.7	29.9	2.9	35.2	31.0	28.5	2.3	26.7	31.9	33.5	2.7	23.5
乳類	122.0	169.9	7.3	55.0	115.9	193.9	21.7	18.0	104.9	159.4	11.7	47.5	140.9	166.6	10.5	100.0
油脂類	12.0	10.4	0.7	10.0	14.4	13.3	1.8	11.1	12.8	10.2	0.8	11.5	10.1	8.8	0.9	8.3
菓子類	20.1	41.6	2.3	0.0	14.6	42.2	5.9	0.0	20.0	43.5	3.1	0.0	22.7	39.6	3.1	0.0
嗜好飲料類	949.5	596.4	37.4	882.0	808.6	644.9	63.8	727.0	964.7	559.9	51.1	954.9	1000.3	599.5	53.0	889.0
調味料・香辛料類	107.0	98.2	7.1	74.4	93.7	80.7	8.2	72.1	119.2	103.9	11.6	78.2	101.7	99.2	7.5	70.1

30-39歲				40-49歲				50-59歲				60-69歲				70歲以上			
平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值
48				61				74				89				124			
2242.9	865.7	132.5	2126.2	2413.1	738.4	100.1	2392.9	2417.2	691.4	82.9	2400.2	2608.7	785.2	68.6	2650.7	2613.3	829.5	89.1	2423.1
484.5	216.0	38.9	473.9	477.0	193.3	23.5	443.4	497.3	148.5	16.1	483.3	472.6	155.7	17.0	460.0	409.4	126.8	14.4	405.3
377.6	237.5	44.4	355.0	366.8	192.9	20.8	350.0	383.0	164.6	16.4	370.7	299.3	172.0	22.0	290.0	295.0	145.7	14.6	284.8
101.1	112.2	19.0	68.5	102.9	116.2	14.0	60.0	100.7	105.7	11.8	68.4	142.9	142.8	14.1	98.2	107.4	93.1	9.7	91.0
5.8	29.5	4.1	0.0	7.3	50.0	6.3	0.0	13.5	46.4	6.7	0.0	30.4	89.2	12.0	0.0	7.0	32.6	2.8	0.0
41.2	64.8	8.5	8.4	67.4	97.7	11.5	36.9	40.2	56.8	6.3	16.3	56.0	65.5	5.3	37.2	54.9	66.5	5.5	40.0
7.5	9.5	1.2	4.7	6.4	7.0	0.9	5.2	6.5	8.0	0.9	3.4	7.0	8.7	1.0	4.8	8.5	11.9	1.1	5.7
60.0	71.8	11.3	22.8	47.3	68.8	9.7	25.3	64.5	87.3	8.0	25.7	72.0	80.3	8.7	50.0	74.2	90.0	8.0	38.8
1.1	4.9	0.8	0.0	1.0	2.2	0.3	0.0	2.4	8.5	0.9	0.0	5.2	14.5	1.4	0.0	4.5	13.5	1.0	0.0
251.5	223.9	35.2	216.7	299.5	156.4	15.9	254.8	264.3	165.9	19.1	240.4	369.1	241.9	24.2	338.5	344.3	164.0	15.2	324.4
80.9	116.7	17.4	40.0	81.1	76.3	9.2	65.7	91.8	88.3	9.7	70.2	113.8	96.3	11.9	85.0	118.0	95.2	8.5	111.0
159.3	145.9	20.8	141.2	190.8	109.7	16.1	170.0	148.3	105.0	13.8	125.8	208.4	174.1	17.4	183.8	200.1	107.2	10.6	196.2
4.9	22.3	4.4	0.0	20.5	58.2	7.0	0.0	15.1	56.8	5.5	0.0	34.0	123.4	17.8	0.0	10.0	41.7	3.3	0.0
6.4	14.7	2.1	0.0	7.1	13.5	1.8	0.0	9.0	14.4	1.7	1.5	12.9	25.2	2.6	0.0	16.1	23.0	2.4	3.7
39.1	69.8	9.1	0.0	63.6	111.9	13.0	0.0	57.1	80.0	8.7	1.1	121.6	140.0	11.7	88.0	188.1	152.5	11.2	163.8
17.1	34.3	5.0	0.0	15.7	27.3	3.7	0.0	18.0	50.2	6.4	0.0	21.4	30.8	2.8	7.8	19.6	30.7	2.8	0.7
5.8	10.5	1.2	1.0	10.5	16.5	2.7	3.2	13.2	15.4	2.7	8.0	15.3	34.9	4.1	1.5	11.3	18.1	1.7	2.5
59.0	67.9	10.1	31.3	67.7	69.8	10.5	50.0	69.8	66.3	7.2	53.4	95.7	78.0	7.6	90.3	98.5	71.8	8.0	88.0
17.7	29.1	5.2	0.2	25.8	42.5	5.1	5.3	26.8	38.5	5.0	10.0	43.1	49.6	6.1	27.8	38.9	46.4	4.5	21.2
136.6	81.0	11.4	125.1	136.8	102.0	14.2	100.0	109.0	75.3	7.8	100.0	106.1	86.5	6.3	95.0	75.4	60.4	5.8	70.0
13.4	27.8	4.1	0.0	15.8	24.1	3.0	0.0	15.2	26.0	1.8	0.0	16.8	29.0	2.8	0.0	11.2	20.9	2.0	0.0
30.1	25.2	3.4	34.2	28.4	23.7	2.7	23.9	33.2	31.3	4.2	28.7	33.8	35.0	3.3	28.3	30.2	31.6	3.2	21.8
81.6	113.1	16.9	13.4	111.0	167.1	23.0	19.5	97.7	163.3	14.4	44.5	107.6	149.6	18.1	42.5	156.4	169.1	14.4	103.0
14.0	13.8	2.7	11.0	12.4	10.4	1.4	11.7	11.5	8.2	0.9	10.8	13.2	11.4	1.4	10.4	9.5	8.1	0.9	8.8
6.6	29.3	4.4	0.0	18.8	43.3	6.1	0.0	19.5	45.4	5.2	0.0	21.0	37.1	3.7	0.0	24.2	41.4	3.9	0.0
920.9	712.9	95.8	843.2	927.6	645.9	87.7	888.0	992.4	505.9	68.6	986.5	983.5	545.8	54.3	896.0	1004.5	615.6	59.7	876.3
86.4	86.5	11.1	61.1	122.2	112.8	18.9	80.8	120.8	106.6	12.7	74.5	107.6	87.2	10.8	75.5	99.6	102.7	10.1	68.5

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

食品群別摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(1歳以上、女性、年齢階級別)(g)

	総 数				1-6歳				7-14歳				15-19歳				20-29歳			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	577				27				37				18				40			
総量	2132.3	736.9	48.2	2038.2	1291.7	391.5	51.1	1192.8	1896.2	499.3	100.9	1925.9	1991.3	526.8	126.9	1982.3	1866.8	588.4	141.2	1929.6
穀類	350.1	137.0	7.1	342.5	246.3	62.8	9.0	229.0	349.3	117.8	23.9	358.2	408.9	118.3	28.2	412.9	331.5	135.1	22.8	352.8
米・加工品	241.3	142.4	7.6	210.0	184.4	70.5	13.4	190.0	249.2	137.0	29.1	250.0	342.1	119.0	27.5	355.2	238.3	128.1	23.3	200.0
小麦・加工品	97.5	91.3	4.0	73.0	60.4	58.6	9.0	40.0	98.6	68.7	12.8	82.8	59.8	120.3	29.1	21.1	85.7	89.5	13.2	69.0
その他穀類	11.3	43.9	1.9	0.0	1.5	7.7	1.3	0.0	1.4	4.6	0.8	0.0	7.0	13.6	3.6	0.0	7.5	21.6	3.6	0.0
いも類	46.2	59.1	3.0	29.4	27.5	25.1	4.8	23.0	47.1	51.3	8.9	35.0	71.2	65.9	17.4	58.5	41.4	53.3	8.7	26.7
砂糖・甘味料類	7.5	8.6	0.3	5.0	3.8	6.1	1.4	0.5	8.1	8.4	2.0	5.3	6.8	5.1	1.3	6.8	8.5	11.5	2.2	4.8
豆類	61.8	84.6	4.8	37.5	31.8	28.7	6.5	30.0	42.8	55.4	9.2	24.5	39.7	47.0	12.8	22.5	63.6	68.7	12.8	59.0
種実類	3.5	10.3	0.5	0.0	1.1	2.7	0.5	0.0	5.9	20.7	3.5	0.0	4.8	6.6	1.5	1.5	0.8	1.7	0.2	0.0
野菜類	288.5	161.0	9.5	263.4	175.8	114.0	19.0	120.3	244.0	114.9	20.5	212.0	241.4	133.3	35.4	192.6	250.7	129.6	26.3	235.0
緑黄色野菜	104.8	92.0	5.1	82.8	70.9	46.2	8.7	60.3	74.2	60.9	10.9	71.3	73.0	62.5	17.1	47.4	83.4	78.2	17.8	62.1
その他野菜	165.1	102.0	5.9	151.0	84.3	65.4	14.1	60.0	149.3	59.7	12.9	146.5	163.6	82.2	21.2	147.3	159.0	86.2	15.0	149.5
野菜ジュース	9.9	44.2	2.4	0.0	20.5	59.1	8.2	0.0	16.2	51.4	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	33.3	5.2	0.0
漬物	8.8	19.6	1.2	0.0	0.1	0.8	0.1	0.0	4.2	13.7	2.4	0.0	4.8	9.5	2.3	0.0	1.3	3.1	0.5	0.0
果実類	133.7	149.6	8.4	94.8	100.2	101.4	23.1	51.8	94.5	105.6	16.3	70.0	121.4	163.9	40.1	57.0	86.8	108.7	25.9	57.3
きのこ類	15.3	25.5	1.4	4.0	5.2	8.6	2.5	0.0	11.6	16.9	4.3	6.0	8.5	16.9	4.2	0.3	13.2	19.8	3.8	0.0
藻類	9.1	18.2	0.9	1.0	2.4	4.7	1.1	0.0	8.3	16.4	3.1	0.2	5.8	10.7	2.8	0.0	6.5	9.2	1.5	1.8
魚介類	63.4	62.0	3.4	51.1	24.5	33.5	6.3	11.3	37.1	38.0	6.7	27.0	34.3	35.3	8.7	15.4	46.8	52.8	7.9	36.9
魚介加工品	25.9	40.2	1.8	6.0	11.3	21.7	4.3	0.0	14.2	24.6	4.3	0.0	17.5	23.3	4.4	9.0	23.7	41.7	6.7	0.5
肉類	83.9	66.2	3.0	75.0	66.9	45.4	9.1	72.2	108.2	56.6	9.3	106.0	121.7	75.3	19.1	115.0	122.3	101.3	17.7	91.4
ハム・ソーセージ類	12.6	20.7	1.2	0.0	15.5	19.5	3.3	5.6	19.7	21.4	3.8	10.0	13.0	16.4	4.6	5.5	15.4	19.8	3.3	8.3
卵類	31.7	28.5	1.6	31.5	24.1	27.6	4.1	20.5	32.0	23.8	4.5	34.0	45.5	38.6	9.2	43.0	36.2	27.2	4.8	37.6
乳類	154.8	178.5	10.7	112.0	256.2	237.1	45.2	218.0	324.3	209.0	37.2	242.0	160.2	136.4	38.9	127.0	154.3	266.6	51.5	50.7
油脂類	9.8	8.5	0.5	8.6	5.8	5.8	1.2	4.3	9.8	4.5	0.9	10.1	16.1	14.2	3.6	10.9	10.4	7.5	1.4	9.6
菓子類	33.4	60.8	3.4	3.0	23.5	24.4	5.8	18.0	40.1	60.4	10.5	10.0	27.5	40.0	6.8	0.0	37.0	93.4	22.8	0.0
嗜好飲料類	754.3	554.6	32.9	650.0	232.9	178.7	43.0	208.0	469.2	349.0	63.6	400.0	602.5	365.8	90.7	620.0	576.4	374.3	80.8	522.4
調味料・香辛料類	85.4	85.2	5.1	58.2	63.6	80.7	19.4	25.9	64.1	46.3	10.1	49.1	75.1	94.7	22.7	51.7	80.4	61.9	14.8	59.7

	(再掲) 20歳以上				(再掲) 20-39歳				(再掲) 40-64歳				(再掲) 65歳以上			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	495				92				184				219			
総量	2200.9	741.0	48.7	2110.8	1917.7	627.3	80.5	1929.6	2147.7	651.7	60.8	2048.6	2364.6	812.6	73.3	2273.3
穀類	353.7	139.5	6.3	345.5	370.8	147.0	13.8	398.0	357.2	137.3	11.0	356.0	343.6	137.9	11.6	330.0
米・加工品	240.1	144.8	7.2	210.0	253.9	155.3	15.8	204.0	241.1	141.2	10.6	216.5	233.5	143.6	13.7	208.0
小麦・加工品	100.9	92.5	4.1	75.0	108.8	98.2	10.2	87.5	103.3	95.3	6.2	74.3	95.5	87.7	6.7	74.4
その他穀類	12.7	47.1	2.2	0.0	8.1	26.7	2.8	0.0	12.8	51.1	3.5	0.0	14.6	50.2	3.8	0.0
いも類	46.2	60.4	3.2	28.3	37.4	53.1	4.6	15.1	45.6	60.6	5.0	25.7	50.4	63.0	4.9	34.2
砂糖・甘味料類	7.6	8.8	0.4	5.0	6.9	9.5	1.2	3.7	7.4	8.2	0.6	5.0	8.1	9.0	0.5	6.0
豆類	65.6	88.9	5.0	40.0	58.0	74.0	8.1	35.5	69.0	103.7	8.3	40.0	65.9	81.0	5.5	41.0
種実類	3.4	9.5	0.5	0.0	1.4	3.3	0.3	0.0	3.9	12.0	1.1	0.0	3.8	8.7	0.6	0.0
野菜類	299.7	164.1	9.3	272.5	235.5	122.4	14.2	211.7	290.6	159.8	11.5	259.7	334.2	174.1	14.4	308.7
緑黄色野菜	110.1	95.7	5.1	89.9	76.0	73.1	9.2	55.3	102.2	92.4	7.6	81.8	131.0	101.8	9.0	115.5
その他野菜	170.7	104.9	5.4	156.2	150.7	82.7	9.6	137.1	165.3	104.8	6.8	155.4	183.7	111.9	7.3	176.3
野菜ジュース	9.2	43.5	2.1	0.0	5.4	30.6	3.1	0.0	16.2	61.5	4.4	0.0	4.8	25.6	1.6	0.0
漬物	9.7	20.6	1.2	0.0	3.5	11.4	1.3	0.0	6.8	15.7	1.1	0.0	14.7	25.5	1.8	0.0
果実類	139.0	153.7	8.3	99.3	69.3	118.5	15.6	0.6	107.6	131.3	11.3	81.5	194.6	164.9	13.6	160.0
きのこ類	16.4	26.8	1.4	5.0	14.6	21.2	2.2	0.0	17.1	32.0	2.2	4.5	16.6	24.0	2.0	5.7
藻類	9.7	19.0	0.9	1.3	6.0	9.4	1.1	1.0	8.9	14.7	1.0	1.0	11.9	24.2	1.9	2.0
魚介類	68.5	63.9	3.7	60.0	45.6	49.0	4.5	27.5	61.8	58.4	4.3	53.7	83.8	69.9	5.5	79.9
魚介加工品	27.9	42.0	2.0	6.0	21.3	36.8	3.6	0.8	26.2	39.7	2.7	5.0	32.1	45.6	3.1	12.0
肉類	81.7	66.8	3.2	71.4	110.7	84.5	9.1	98.0	86.4	65.7	4.7	77.0	65.5	53.6	2.9	55.0
ハム・ソーセージ類	11.9	20.7	1.1	0.0	15.6	21.2	2.3	5.6	12.6	21.1	1.7	0.0	9.8	20.1	1.2	0.0
卵類	31.5	28.4	1.4	31.5	33.6	28.0	3.0	32.1	34.0	30.2	2.4	35.6	28.6	26.8	1.4	25.0
乳類	136.4	165.2	8.8	100.0	126.9	205.0	24.5	43.8	132.7	165.7	10.4	100.0	143.5	145.5	9.6	115.0
油脂類	9.8	8.4	0.5	8.0	9.8	7.3	0.9	8.6	11.1	9.6	0.8	9.0	8.8	7.7	0.5	6.8
菓子類	33.6	62.8	3.6	0.0	36.0	75.2	10.0	2.0	30.2	66.1	5.6	0.0	35.4	53.9	4.0	8.0
嗜好飲料類	809.6	564.4	34.7	693.0	672.9	463.7	46.0	577.5	794.9	514.5	45.0	703.0	879.3	630.1	50.0	747.0
調味料・香辛料類	88.5	87.1	5.7	60.2	82.2	67.3	9.4	58.3	89.3	83.0	6.6	62.1	90.5	97.4	7.9	58.7

30-39歲				40-49歲				50-59歲				60-69歲				70歲以上			
平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值	平均	標準偏差	標準誤差	中央值
52				71				73				108				151			
1956.8	658.5	83.4	1928.6	2154.7	721.1	98.3	2147.6	2105.0	640.1	66.4	2008.5	2280.4	688.0	71.9	2166.3	2384.6	836.3	84.6	2294.1
401.0	149.8	19.3	406.5	373.7	149.4	17.5	373.0	338.6	130.2	16.7	340.0	352.9	127.7	10.6	340.5	341.7	142.0	14.0	330.0
266.0	173.7	24.2	222.5	264.2	156.4	17.7	256.0	212.2	125.6	15.4	200.0	231.3	132.7	13.6	200.0	240.2	148.6	16.5	215.0
126.5	101.7	14.2	94.7	98.2	93.4	9.0	66.8	110.2	99.6	10.0	90.0	103.5	92.0	10.3	80.0	90.9	85.4	7.5	72.0
8.5	30.2	4.2	0.0	11.3	50.8	6.2	0.0	16.2	58.6	5.1	0.0	18.2	60.5	6.3	0.0	10.6	36.9	3.3	0.0
34.3	53.3	5.7	10.9	39.8	46.4	6.0	28.3	40.8	66.1	8.5	7.0	53.9	58.5	4.8	40.5	51.7	68.0	6.0	33.3
5.6	7.4	1.2	2.7	6.7	7.8	1.0	5.0	7.3	8.7	0.9	4.0	7.0	7.0	0.6	5.5	9.1	9.9	0.6	6.5
53.8	78.3	10.6	28.1	43.0	83.0	11.4	3.1	90.9	122.1	16.9	51.7	62.8	79.6	9.5	40.0	70.7	84.8	6.7	50.0
1.9	4.1	0.5	0.0	2.4	8.3	0.9	0.0	5.5	16.2	1.8	0.0	3.6	8.4	1.0	0.0	4.0	8.8	0.7	0.0
223.9	116.5	14.9	207.9	261.4	164.5	18.6	207.9	292.2	157.1	13.7	262.0	355.5	168.7	17.7	342.5	320.4	169.9	16.0	289.9
70.4	69.1	9.5	51.1	83.2	81.6	10.0	58.5	110.0	97.6	9.1	95.0	133.1	96.8	9.6	110.4	127.0	103.9	9.8	116.7
144.2	80.2	12.8	130.0	156.5	92.7	12.4	153.7	157.6	100.3	9.6	152.0	200.6	119.4	12.3	199.3	174.5	109.6	8.6	155.5
4.2	28.6	3.7	0.0	15.7	67.1	7.0	0.0	18.6	64.0	7.1	0.0	11.4	42.6	3.3	0.0	2.3	13.4	1.1	0.0
5.1	14.7	2.3	0.0	5.9	12.0	1.2	0.0	6.0	15.2	1.8	0.0	10.4	18.6	2.2	0.0	16.6	28.5	2.4	0.0
55.9	125.0	15.3	0.0	76.4	78.6	10.6	59.5	116.5	150.4	20.4	70.0	174.4	170.0	15.2	126.0	196.3	160.1	14.0	166.0
15.7	22.3	2.9	1.2	15.0	22.4	3.2	5.0	16.5	40.3	4.5	0.0	20.5	28.5	2.8	8.5	15.2	21.8	2.2	3.9
5.6	9.6	1.4	0.9	7.3	13.5	1.6	0.0	9.1	16.0	1.7	1.4	14.8	28.9	2.6	3.0	9.7	17.2	1.2	2.0
44.6	46.4	6.2	25.0	55.2	57.2	6.8	40.0	55.6	54.6	6.3	50.0	95.3	71.0	6.3	84.2	75.7	66.1	6.6	65.0
19.5	32.8	4.1	1.8	24.1	37.3	4.2	5.0	20.4	36.9	3.9	1.0	36.1	42.3	4.1	23.0	31.4	47.9	4.1	10.0
101.8	68.6	9.1	100.5	97.8	64.8	6.2	89.1	86.4	68.8	8.2	71.8	66.8	56.7	4.7	55.5	64.8	52.4	3.3	60.0
15.7	22.4	3.1	4.5	13.9	22.8	2.3	0.0	10.9	15.2	2.0	0.0	10.6	24.3	2.5	0.0	10.1	18.8	1.5	0.0
31.6	28.7	3.5	31.8	34.0	28.6	3.5	34.0	30.4	30.7	4.1	26.8	29.2	27.9	2.2	25.4	31.3	28.0	1.8	40.0
105.8	140.1	19.6	27.5	121.1	189.6	18.5	74.0	149.5	167.3	19.5	112.0	114.0	122.7	11.5	94.0	159.2	149.4	11.7	147.4
9.4	7.2	0.9	8.1	11.6	9.3	1.0	9.4	11.7	10.9	1.3	9.6	9.8	8.0	0.8	8.6	8.2	7.3	0.5	6.3
35.2	58.5	8.2	7.5	39.6	88.2	10.1	2.4	22.0	37.5	4.5	0.0	30.0	54.3	5.2	0.0	37.5	55.2	5.1	10.0
747.1	513.4	57.7	618.3	877.8	588.5	76.2	819.7	742.5	447.7	50.6	686.0	792.4	506.4	46.4	703.3	905.4	672.8	57.8	756.0
83.6	71.7	10.3	54.6	92.0	84.0	8.8	66.4	89.8	92.8	11.5	58.0	97.6	99.0	9.6	60.6	83.7	87.6	8.0	59.0

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

食品群別摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(20歳以上、男性、保健所別)(g)

	総 数				習志野				市川				松戸				野田			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	431				24				46				21				26			
総量	2486.4	794.4	48.4	2427.1	2645.4	811.8	42.3	2647.2	2527.4	833.9	146.2	2468.0	3019.8	1006.1	281.3	2931.7	2210.4	782.6	47.2	2140.3
穀類	468.5	168.0	11.3	460.0	548.5	173.2	23.4	493.0	416.3	146.6	12.8	410.7	500.2	161.4	25.1	510.0	471.2	172.6	17.5	463.4
米・加工品	341.1	182.2	11.8	323.0	427.9	205.4	27.7	400.0	293.9	148.3	15.0	295.0	396.3	185.2	25.0	406.3	317.6	184.3	14.9	255.0
小麦・加工品	113.6	115.0	6.9	77.5	78.9	86.8	12.3	57.4	120.4	117.7	2.1	91.2	99.8	112.6	7.0	45.0	153.6	122.7	2.6	153.7
その他穀類	13.8	57.1	3.4	0.0	41.6	113.6	8.0	0.0	2.0	7.2	1.4	0.0	4.1	14.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
いも類	53.6	70.0	4.0	29.0	35.0	54.7	0.5	4.7	49.2	67.7	2.5	25.5	109.2	104.1	23.7	90.0	41.4	88.9	11.6	1.0
砂糖・甘味料類	7.1	9.3	0.5	4.9	5.3	7.7	1.3	3.0	7.0	6.4	1.4	5.5	9.5	9.2	2.8	9.0	5.2	5.0	0.0	4.6
豆類	65.2	82.0	4.3	37.5	53.3	61.9	7.3	41.1	65.5	76.2	8.4	37.5	82.8	97.9	32.4	50.0	92.5	100.4	2.9	70.9
種実類	3.4	11.2	0.8	0.0	0.8	3.7	0.7	0.0	3.6	6.8	0.8	0.0	2.0	4.2	0.5	0.0	1.8	3.3	0.4	0.0
野菜類	317.5	193.5	8.8	283.2	325.2	190.2	6.2	288.4	311.4	154.6	28.6	274.7	351.6	167.4	36.9	358.5	294.1	225.8	31.2	240.5
緑黄色野菜	101.5	94.5	5.9	80.7	100.0	140.7	4.4	62.8	105.8	84.5	9.0	105.1	103.1	88.6	18.7	85.5	120.4	122.5	38.8	104.0
その他野菜	186.7	130.6	5.4	167.7	194.2	105.3	0.0	174.5	192.2	98.3	15.0	173.5	209.2	120.5	20.5	208.0	148.5	125.9	4.7	113.9
野菜ジュース	17.9	71.9	3.9	0.0	18.3	62.1	2.5	0.0	7.1	26.7	6.1	0.0	22.5	60.1	5.0	0.0	15.5	54.3	1.6	0.0
漬物	11.4	20.2	1.4	0.0	12.7	23.3	4.4	3.2	6.3	11.8	1.4	0.0	16.8	22.2	3.4	5.0	9.8	25.2	1.2	0.0
果実類	107.5	134.5	6.6	66.5	38.3	77.9	2.9	0.0	112.5	126.9	4.6	85.6	177.0	180.5	17.2	100.0	102.3	140.9	0.8	8.5
きのこ類	18.5	35.1	1.7	0.0	12.1	19.1	2.8	0.6	27.1	42.7	1.7	1.2	17.8	21.8	3.7	12.2	21.7	31.9	0.4	7.5
藻類	11.4	21.6	1.5	2.6	13.1	19.7	6.5	6.3	23.0	44.3	6.4	8.0	11.7	16.3	2.9	3.0	12.5	15.7	3.2	4.5
魚介類	80.2	73.3	4.8	63.0	44.1	56.0	11.4	20.8	63.4	56.7	7.2	51.1	120.2	74.0	15.1	137.6	55.2	51.1	6.3	38.8
魚介加工品	31.6	43.2	2.8	12.4	15.4	26.4	0.0	0.6	26.2	32.7	3.5	10.0	62.4	65.1	22.0	45.0	21.7	30.2	4.4	8.9
肉類	111.0	89.5	4.1	95.0	124.5	69.1	5.7	112.5	99.9	78.7	9.1	90.8	87.8	75.5	10.4	70.8	100.5	77.8	7.1	94.1
ハム・ソーセージ類	14.4	25.0	1.1	0.0	14.1	22.8	2.9	0.0	14.4	27.8	3.5	0.0	11.8	18.6	4.5	5.0	17.1	30.0	2.0	0.0
卵類	32.1	30.9	1.4	30.0	36.8	25.0	3.4	43.0	32.8	28.4	2.1	25.7	30.6	21.5	4.5	30.0	23.7	27.0	2.9	18.0
乳類	122.0	169.9	7.3	55.0	112.5	178.8	7.0	74.3	124.6	120.9	10.6	120.5	146.2	137.8	32.6	90.0	105.7	143.1	1.1	49.0
油脂類	12.0	10.4	0.7	10.0	16.1	10.2	0.6	14.4	11.4	9.5	1.4	9.9	11.2	11.3	2.4	8.0	12.1	11.9	0.9	10.7
菓子類	20.1	41.6	2.3	0.0	7.8	25.4	6.8	0.0	16.3	31.0	7.1	0.0	13.9	28.5	5.9	0.0	9.0	23.0	1.7	0.0
嗜好飲料類	949.5	596.4	37.4	882.0	1112.2	696.9	47.5	1121.0	1040.8	713.7	98.7	923.4	1240.8	861.2	181.8	1192.8	793.1	478.9	17.2	773.2
調味料・香辛料類	107.0	98.2	7.1	74.4	159.9	145.2	24.8	92.6	122.6	113.1	36.7	82.1	107.3	89.8	21.1	74.3	68.6	29.5	1.4	60.8

	長 生				夷 隅				安 房				君 津				市 原			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	36				27				40				33				27			
総量	2305.0	786.4	105.4	2443.1	2339.1	585.2	52.1	2231.3	2371.2	721.8	67.5	2331.0	2484.4	728.3	54.4	2300.2	2489.2	568.9	13.4	2510.6
穀類	499.6	181.0	1.1	495.9	503.0	178.8	22.7	468.0	488.9	139.8	3.8	476.6	413.1	179.1	30.5	400.0	350.1	178.3	6.4	340.0
米・加工品	393.3	193.3	7.4	373.9	341.3	214.6	0.5	305.0	384.9	178.3	19.7	377.5	275.4	177.4	49.4	230.0	253.5	168.0	8.3	229.0
小麦・加工品	80.7	109.3	7.9	54.5	147.3	137.1	34.0	132.5	80.8	100.5	7.6	40.1	120.3	101.9	10.3	107.7	80.3	91.9	21.6	44.6
その他穀類	25.5	65.2	14.2	0.0	14.4	75.1	10.8	0.0	23.3	83.7	15.9	0.0	17.4	56.4	8.6	0.0	16.3	75.0	6.9	0.0
いも類	69.9	75.7	1.2	55.0	39.3	32.2	1.1	39.6	43.0	49.9	1.8	26.0	37.3	36.6	4.4	26.3	73.0	85.3	8.8	44.4
砂糖・甘味料類	7.3	7.9	0.9	6.0	7.7	8.3	1.1	4.5	6.8	9.2	1.3	4.7	9.1	7.8	0.1	6.3	6.0	10.0	0.8	4.0
豆類	49.3	68.1	10.7	47.0	73.3	92.1	21.0	45.0	34.7	53.5	6.8	5.5	71.1	79.9	12.6	33.3	64.5	72.0	8.0	37.5
種実類	2.0	4.0	0.7	0.0	1.4	3.0	0.9	0.0	10.6	29.8	6.1	0.0	2.6	5.3	0.2	0.0	2.3	6.5	0.6	0.0
野菜類	331.4	202.2	53.3	281.0	302.8	131.4	1.9	289.3	299.3	140.6	9.5	275.4	300.7	146.6	6.9	283.2	259.7	198.2	8.7	278.4
緑黄色野菜	106.0	103.8	27.6	72.6	96.0	75.1	5.4	91.0	104.3	83.7	18.7	94.7	90.0	63.8	2.4	80.5	91.9	80.7	2.4	71.5
その他野菜	192.3	122.3	27.8	192.9	191.2	91.8	2.4	175.1	169.3	109.2	4.6	139.3	188.9	107.9	8.3	174.0	155.6	157.0	9.7	122.3
野菜ジュース	24.0	61.4	0.6	0.0	7.6	39.0	5.7	0.0	5.2	32.6	3.5	0.0	12.5	47.4	1.1	0.0	7.8	40.0	3.2	0.0
漬物	9.2	20.8	1.6	0.0	8.0	13.8	0.3	2.4	20.6	27.5	1.1	0.0	9.4	11.7	0.2	4.5	4.3	8.6	1.8	0.0
果実類	87.8	133.7	24.0	0.0	69.0	107.5	19.2	0.0	94.6	121.6	10.7	43.8	149.3	162.0	1.1	102.5	125.2	126.8	9.8	100.0
きのこ類	13.1	22.7	0.5	0.0	11.6	17.3	6.0	8.0	9.2	14.6	1.9	0.0	21.5	31.8	4.5	7.5	24.9	68.0	4.9	0.0
藻類	7.7	18.4	1.2	2.8	12.9	17.5	2.0	6.0	13.2	19.1	3.4	2.0	6.6	13.0	0.7	1.0	4.3	8.7	1.5	1.5
魚介類	101.5	85.9	2.6	81.5	82.2	75.2	10.1	63.0	74.0	57.6	0.2	62.0	122.5	90.7	6.5	90.3	61.9	58.7	3.2	55.5
魚介加工品	40.1	47.2	0.1	21.3	27.6	38.1	7.9	10.0	26.9	33.8	1.1	12.7	57.9	62.2	3.1	40.0	31.0	36.7	1.0	11.0
肉類	129.2	128.8	1.9	96.1	101.8	82.1	16.3	80.0	112.2	61.2	1.9	110.7	106.7	110.8	20.1	93.7	111.6	92.0	4.7	88.3
ハム・ソーセージ類	9.2	17.6	0.7	0.0	17.6	26.0	4.1	0.0	11.3	24.3	3.3	0.0	13.1	20.4	3.0	0.0	17.1	31.7	2.3	0.0
卵類	25.0	26.3	0.8	12.8	30.2	25.6	2.0	23.9	30.2	29.7	0.9	29.3	34.7	33.5	1.4	36.6	34.3	34.6	1.8	33.6
乳類	84.6	171.3	30.0	5.5	80.8	141.6	17.6	4.8	67.4	98.1	10.5	7.0	139.9	154.5	9.9	80.0	114.4	115.8	15.1	103.0
油脂類	10.6	9.1	2.5	10.2	13.9	7.5	0.6	12.8	11.3	9.2	0.3	10.0	8.6	10.9	3.5	7.2	13.7	15.4	6.0	9.0
菓子類	24.8	43.7	2.6	0.0	24.9	48.8	16.4	0.0	20.7	43.0	4.0	0.0	19.1	27.0	2.2	0.0	20.1	51.3	1.0	0.0
嗜好飲料類	790.0	452.6	9.0	870.0	903.4	401.6	108.7	894.0	963.2	535.7	45.7	901.0	928.2	574.0	83.3	819.7	1144.5	483.0	10.7	1077.0
調味料・香辛料類	71.2	42.0	4.5	63.5	81.1	61.3	16.5	75.4	91.9	59.0	4.1	82.7	113.4	120.8	12.2	67.1	78.7	51.0	3.3	74.7

印旂				香取				海匠				山武			
平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
28				12				24				33			
2341.2	724.6	128.1	2203.5	2804.4	983.9	0.0	2401.5	2780.5	657.7	37.7	2689.3	2188.2	849.5	65.9	2135.5
501.8	179.3	21.9	482.5	535.8	178.4	0.0	553.6	425.8	173.3	25.9	385.8	503.0	144.9	0.1	476.7
347.6	185.3	1.0	330.0	394.5	157.5	0.0	380.0	326.1	157.5	4.2	310.0	386.8	173.4	18.1	350.0
151.1	110.9	24.7	147.9	129.1	163.5	0.0	99.0	98.7	106.4	29.0	61.5	116.2	128.8	18.0	62.7
3.1	11.5	1.8	0.0	12.2	42.3	0.0	0.0	1.1	3.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44.8	53.0	16.8	31.4	22.0	22.6	0.0	20.6	74.1	67.0	1.4	66.5	42.8	57.7	0.1	13.4
5.4	5.8	1.5	3.0	3.5	4.8	0.0	2.1	6.5	8.4	3.0	2.2	7.4	11.5	0.8	3.0
54.3	78.5	8.5	15.5	120.3	107.2	0.0	137.5	79.9	118.2	0.6	40.0	65.5	83.9	4.2	25.0
1.9	4.0	0.1	0.0	1.6	3.7	0.0	0.0	4.8	10.9	1.3	0.0	2.3	7.3	0.5	0.0
298.6	177.9	32.4	291.6	324.0	314.1	0.0	236.7	333.8	164.8	7.2	331.9	299.9	285.4	3.8	205.4
100.9	97.4	18.5	63.2	36.6	31.1	0.0	37.3	79.9	80.5	19.0	55.7	75.2	71.2	4.4	50.7
169.0	107.0	16.3	166.3	145.7	100.2	0.0	111.5	216.6	138.1	19.2	204.4	191.9	221.1	7.9	146.5
22.1	58.5	1.9	0.0	132.5	299.3	0.0	0.0	9.2	42.0	3.3	0.0	22.4	71.4	6.4	0.0
6.5	8.9	0.4	0.0	9.2	17.4	0.0	0.0	28.0	34.0	3.8	8.5	10.5	17.5	0.9	4.0
79.9	108.0	1.7	0.0	104.9	115.4	0.0	84.0	165.4	201.0	2.8	123.0	92.5	129.2	3.1	0.0
23.2	39.8	2.6	0.0	12.8	29.0	0.0	0.3	29.9	57.9	4.6	3.3	10.4	23.8	1.9	0.0
5.7	8.8	0.2	0.0	11.0	29.9	0.0	0.0	12.5	14.6	3.3	7.6	11.3	17.8	0.5	1.0
56.5	70.8	5.5	35.3	93.8	68.8	0.0	85.6	95.6	85.8	12.6	88.7	63.6	74.6	5.1	18.0
17.4	26.5	1.1	0.0	77.4	80.8	0.0	65.0	24.9	34.6	1.1	5.5	25.6	40.6	7.5	1.0
133.0	70.8	6.9	140.8	69.7	63.2	0.0	49.7	136.0	93.1	19.4	127.0	109.8	112.7	4.5	100.0
20.7	24.3	4.5	10.0	16.3	39.2	0.0	0.0	5.9	8.2	0.8	0.0	13.5	32.7	4.1	0.0
19.5	22.0	1.6	7.1	40.1	50.4	0.0	31.4	46.9	45.0	1.2	37.7	36.8	33.6	2.4	42.3
121.6	133.1	14.4	76.8	158.9	223.2	0.0	65.5	127.4	176.6	21.8	24.5	131.4	236.2	5.2	5.4
14.6	13.2	3.9	13.6	10.6	6.9	0.0	8.8	9.5	9.9	1.2	7.1	9.3	6.8	0.1	8.4
25.7	61.3	3.9	0.0	23.8	55.3	0.0	0.0	46.2	65.5	4.2	8.4	13.8	29.9	4.2	0.0
806.3	392.3	36.9	727.1	1214.8	921.0	0.0	991.0	1109.5	645.3	36.1	1158.5	678.7	548.0	67.2	540.0
148.5	157.9	13.7	73.5	57.0	54.0	0.0	41.6	76.6	59.1	11.1	59.3	109.8	93.4	6.1	68.6

千葉市				船橋市				柏市			
平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
19				12				23			
3013.7	925.6	186.5	3045.4	2089.1	715.3	0.0	1927.6	2624.9	631.9	151.4	2645.7
468.2	118.2	11.3	463.0	489.2	164.4	0.0	528.3	460.5	143.1	57.3	435.0
275.4	131.1	22.6	304.0	370.2	159.1	0.0	342.5	312.8	198.3	50.9	300.0
159.7	129.2	36.2	134.7	100.5	90.0	0.0	90.0	129.8	113.0	4.1	104.3
33.1	76.8	15.4	0.0	18.5	57.5	0.0	0.0	17.9	50.3	10.5	0.0
85.1	124.2	28.6	38.8	83.8	76.6	0.0	78.8	34.8	45.4	1.7	26.5
9.0	9.2	2.1	7.0	5.8	5.9	0.0	5.6	10.5	21.5	4.6	4.0
47.2	54.5	5.6	22.5	81.9	111.4	0.0	2.0	66.0	68.1	2.5	53.3
6.9	14.5	1.4	0.0	1.9	2.5	0.0	0.0	3.6	9.0	2.0	0.0
426.6	269.7	44.6	394.5	277.4	180.3	0.0	265.5	394.7	162.7	9.5	422.4
172.7	144.5	32.3	112.2	114.4	108.6	0.0	90.7	123.4	79.4	5.4	123.7
232.6	193.8	15.7	165.0	160.8	83.9	0.0	191.3	219.7	125.9	6.4	224.3
5.6	23.6	3.7	0.0	0.3	0.9	0.0	0.0	39.6	78.9	13.4	0.0
15.8	24.5	4.4	5.0	1.9	3.2	0.0	0.0	11.9	17.4	2.8	0.0
131.1	103.4	21.2	128.3	92.3	99.5	0.0	77.4	113.7	119.8	26.2	72.0
28.2	44.4	10.3	0.0	18.2	22.8	0.0	5.3	14.2	21.2	0.3	7.8
11.2	17.4	3.0	6.0	11.2	17.0	0.0	3.7	8.0	13.1	0.1	0.0
115.4	84.0	27.0	122.3	92.6	73.4	0.0	72.7	72.7	56.0	1.5	65.0
20.4	21.7	0.5	16.3	16.8	21.1	0.0	5.9	30.9	37.6	8.3	15.1
80.5	69.8	13.9	60.0	118.7	75.1	0.0	120.0	129.3	101.1	7.0	104.1
17.9	23.4	4.0	9.5	14.7	15.1	0.0	15.5	20.5	26.0	2.5	17.5
31.8	31.9	11.1	9.0	36.1	25.2	0.0	50.0	33.6	33.3	6.1	42.5
176.9	188.1	14.5	91.7	193.4	340.3	0.0	33.8	188.0	230.4	7.7	113.4
15.1	8.0	1.7	16.0	14.8	8.8	0.0	16.4	12.9	13.0	0.5	12.0
20.4	40.5	7.8	0.0	17.4	23.7	0.0	0.0	20.5	42.0	0.5	0.0
1161.7	580.5	139.1	1300.0	457.0	254.9	0.0	500.0	928.5	520.9	75.3	950.0
198.3	115.8	21.0	234.5	97.2	53.5	0.0	95.4	133.2	105.1	5.8	85.2

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

食品群別摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(20歳以上、女性、保健所別)(g)

	総 数				習志野				市川				松戸				野田			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	495				28				51				37				27			
総量	2200.9	741.0	48.7	2110.8	2354.7	718.9	35.6	2198.1	2299.7	735.1	19.4	2095.2	2548.3	1046.3	83.5	2382.3	2095.7	659.3	31.9	1947.8
穀類	353.7	139.5	6.3	345.5	359.6	156.5	0.6	327.0	335.4	140.9	5.9	340.0	364.7	127.8	16.8	362.0	357.8	138.1	17.8	345.0
米・加工品	240.1	144.8	7.2	210.0	243.7	176.2	2.1	189.0	208.4	126.1	4.1	200.0	282.7	135.7	13.5	256.7	223.6	154.0	21.1	176.0
小麦・加工品	100.9	92.5	4.1	75.0	86.4	75.1	1.9	79.4	112.6	99.3	1.6	75.0	78.2	95.8	5.9	45.0	133.5	101.2	3.7	112.6
その他穀類	12.7	47.1	2.2	0.0	29.5	80.8	0.8	0.0	14.4	49.0	4.0	0.0	3.7	9.7	1.9	0.0	0.8	3.2	0.4	0.0
いも類	46.2	60.4	3.2	28.3	35.4	50.1	13.4	0.0	46.8	65.3	5.8	21.6	84.0	86.5	7.7	66.0	31.0	51.8	5.7	0.0
砂糖・甘味料類	7.6	8.8	0.4	5.0	10.9	10.5	1.7	8.3	9.5	11.1	1.1	5.3	7.1	7.0	0.3	4.8	8.6	11.2	1.0	3.9
豆類	65.6	88.9	5.0	40.0	94.6	130.2	16.0	62.0	67.1	70.5	6.8	58.0	73.0	88.9	19.7	57.5	98.0	95.5	12.7	70.0
種実類	3.4	9.5	0.5	0.0	1.6	2.6	0.2	0.0	5.4	8.9	1.4	0.0	2.5	3.5	0.4	0.0	2.0	5.5	0.0	0.0
野菜類	299.7	164.1	9.3	272.5	364.6	151.2	10.8	416.5	324.7	159.6	35.0	287.9	325.4	180.0	32.2	268.4	302.5	202.6	18.7	262.0
緑黄色野菜	110.1	95.7	5.1	89.9	153.5	112.8	11.7	126.6	121.2	82.2	10.2	115.0	113.6	105.5	17.3	68.8	117.2	100.2	27.6	82.5
その他野菜	170.7	104.9	5.4	156.2	199.4	84.2	16.1	185.8	193.2	115.4	21.3	171.0	184.7	101.8	18.2	167.5	158.4	134.0	18.3	129.1
野菜ジュース	9.2	43.5	2.1	0.0	0.9	2.8	0.7	0.0	2.3	14.0	1.5	0.0	13.1	66.8	11.3	0.0	19.7	79.7	11.3	0.0
漬物	9.7	20.6	1.2	0.0	10.8	24.5	7.0	0.0	8.1	17.0	3.7	0.0	14.0	32.7	4.2	0.0	7.3	16.4	2.0	0.0
果実類	139.0	153.7	8.3	99.3	195.6	158.0	8.9	153.8	133.5	135.8	23.7	88.5	152.8	151.2	26.5	100.0	109.3	131.8	6.4	75.0
きのこ類	16.4	26.8	1.4	5.0	20.4	25.6	5.2	8.7	22.3	30.3	2.6	6.0	10.5	15.2	2.4	5.0	17.0	30.3	2.2	0.0
藻類	9.7	19.0	0.9	1.3	12.6	21.5	3.5	5.0	11.3	17.6	0.6	1.5	11.4	14.6	0.8	3.2	7.8	12.4	0.4	1.0
魚介類	68.5	63.9	3.7	60.0	54.6	45.7	6.7	52.9	59.7	59.1	2.5	64.9	101.9	74.5	10.1	91.8	60.4	53.8	5.7	55.9
魚介加工品	27.9	42.0	2.0	6.0	22.8	30.1	5.1	8.2	23.8	49.4	6.2	2.5	44.8	54.6	5.3	22.0	29.6	33.8	6.8	14.0
肉類	81.7	66.8	3.2	71.4	96.1	56.2	16.1	87.5	80.3	70.3	10.3	60.0	76.8	56.6	14.5	72.5	73.8	72.1	5.8	50.0
ハム・ソーセージ類	11.9	20.7	1.1	0.0	11.5	16.5	1.6	8.5	8.9	18.1	2.9	0.0	12.1	18.6	2.3	0.0	16.8	26.8	0.3	10.0
卵類	31.5	28.4	1.4	31.5	33.6	24.0	5.2	38.7	25.7	23.1	4.5	22.0	29.9	27.1	1.6	28.7	23.7	20.7	6.5	21.5
乳類	136.4	165.2	8.8	100.0	176.5	127.3	6.0	169.0	138.7	120.6	4.1	121.0	134.5	149.9	10.7	100.5	114.8	111.8	24.8	104.0
油脂類	9.8	8.4	0.5	8.0	10.7	8.1	0.6	9.4	9.7	9.4	1.8	7.0	7.5	6.8	0.7	5.5	9.6	7.6	1.4	9.0
菓子類	33.6	62.8	3.6	0.0	23.4	42.0	14.9	0.0	48.8	69.2	4.7	15.8	22.8	48.4	2.9	0.0	22.9	39.5	1.4	0.0
嗜好飲料類	809.6	564.4	34.7	693.0	745.9	470.6	7.7	649.9	858.6	472.5	54.0	770.0	1063.9	980.3	51.2	915.8	792.9	509.4	37.5	701.5
調味料・香辛料類	88.5	87.1	5.7	60.2	118.6	96.1	0.6	89.1	122.2	110.7	19.9	77.3	79.7	60.7	9.8	61.9	63.5	30.2	0.8	56.0

	長 生				夷 隅				安 房				君 津				市 原			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	47				33				49				28				30			
総量	2100.7	725.9	22.6	2085.1	2411.0	803.1	150.4	2380.0	2314.5	702.6	117.6	2291.5	2185.1	738.7	108.1	1944.9	2015.0	794.8	38.3	2008.2
穀類	358.2	163.7	3.3	335.6	399.8	137.2	9.6	374.3	387.6	146.3	10.7	400.0	281.1	97.6	3.2	297.5	291.5	159.4	34.0	262.5
米・加工品	251.9	158.2	0.2	213.0	268.4	138.2	14.3	260.0	283.4	165.4	30.9	245.0	193.6	103.7	4.7	202.5	196.2	150.2	30.6	162.5
小麦・加工品	89.9	82.2	6.5	60.0	117.7	71.8	12.5	111.1	84.5	91.0	10.3	60.0	84.0	85.3	2.3	66.5	68.7	93.6	3.0	33.5
その他穀類	16.4	62.4	3.4	0.0	13.6	68.0	7.8	0.0	19.7	59.8	9.9	0.0	3.5	10.4	0.8	0.0	26.6	60.3	6.4	0.0
いも類	45.4	49.2	2.1	26.5	42.5	54.2	5.5	30.0	43.9	43.4	5.2	37.5	50.2	71.2	4.4	24.6	65.8	80.9	5.3	29.9
砂糖・甘味料類	6.9	6.2	0.5	6.4	8.0	8.4	0.6	7.0	8.6	10.0	0.8	6.5	9.0	10.6	0.6	6.9	5.4	6.4	1.0	4.0
豆類	48.0	76.0	13.0	24.0	58.6	69.4	7.9	45.0	46.3	68.8	11.1	18.0	71.6	69.9	9.3	40.0	55.9	65.9	1.0	32.0
種実類	2.9	7.5	0.9	0.0	1.3	3.9	0.8	0.0	5.2	19.6	2.1	0.0	2.6	7.6	0.0	0.0	5.5	9.1	0.9	0.0
野菜類	303.6	184.5	30.0	293.2	296.1	130.6	7.7	271.5	284.5	158.9	36.5	260.4	302.1	120.5	7.2	279.1	225.3	139.3	2.9	201.7
緑黄色野菜	113.9	94.4	19.5	103.6	101.7	84.4	5.2	108.0	102.8	101.6	19.5	87.0	91.7	71.5	13.5	76.7	84.1	87.0	2.6	64.3
その他野菜	164.3	105.4	14.7	152.8	185.8	94.6	12.4	180.0	157.0	87.6	6.7	164.5	189.7	87.4	0.6	183.8	138.0	85.3	5.4	131.0
野菜ジュース	17.5	56.3	2.2	0.0	1.7	8.7	0.9	0.0	8.7	39.6	5.4	0.0	11.2	56.6	6.3	0.0	0.2	0.9	0.2	0.0
漬物	8.0	15.0	2.0	0.0	6.9	11.9	0.5	0.0	15.9	29.9	4.8	0.0	9.5	13.5	0.7	0.0	3.0	8.2	0.1	0.0
果実類	180.5	188.5	18.3	115.0	101.7	123.1	12.1	40.0	128.9	167.5	7.9	88.0	130.5	153.5	46.7	109.1	183.1	239.2	5.0	112.8
きのこ類	11.0	16.3	0.2	2.0	15.0	24.9	1.8	10.0	11.2	16.1	4.9	2.8	19.6	29.3	10.9	0.0	21.8	60.3	4.2	0.0
藻類	8.2	21.5	2.7	1.2	9.1	21.7	2.2	1.0	10.4	14.8	2.2	2.8	9.2	18.3	2.5	0.0	3.9	9.4	1.4	0.0
魚介類	83.8	74.5	1.7	80.0	58.0	61.5	5.4	50.0	93.0	74.2	8.0	80.0	75.9	58.8	5.1	71.3	48.6	65.5	0.5	36.9
魚介加工品	26.4	41.7	3.4	3.0	27.0	42.7	7.4	4.0	39.9	44.9	8.0	25.4	34.0	39.2	5.8	23.2	21.0	42.8	1.3	0.0
肉類	83.9	94.4	10.6	54.0	109.5	66.7	1.7	119.7	65.5	50.2	0.3	60.0	92.8	66.4	3.9	84.9	87.3	72.4	4.0	70.0
ハム・ソーセージ類	9.0	16.5	1.6	0.0	18.9	25.2	6.1	10.0	7.2	24.9	2.7	0.0	12.0	19.8	0.6	0.0	10.7	20.5	3.5	0.0
卵類	38.2	28.6	1.3	43.0	44.0	32.7	6.2	43.0	30.4	27.1	2.1	31.5	27.9	24.5	0.7	23.3	28.1	25.0	2.1	30.8
乳類	104.0	127.0	23.0	46.0	188.7	278.0	9.0	66.0	112.7	123.8	11.9	62.5	96.9	107.2	16.1	65.1	112.3	145.4	24.2	43.0
油脂類	11.8	9.5	2.0	10.8	11.9	9.6	1.2	9.6	10.0	8.7	0.3	6.6	6.3	6.1	1.1	4.2	7.9	7.5	1.5	5.9
菓子類	34.8	50.1	0.9	4.0	24.1	41.6	4.4	0.0	55.9	120.7	19.3	0.0	45.0	67.5	6.1	8.0	15.3	30.2	4.1	0.0
嗜好飲料類	724.4	498.8	11.9	703.0	952.1	687.6	135.3	850.0	946.5	552.9	43.9	902.0	847.1	541.1	19.1	671.2	785.6	415.7	29.2	652.0
調味料・香辛料類	55.1	27.2	0.8	50.3	90.8	91.1	1.1	71.2	74.0	42.0	2.0	62.2	117.4	132.2	39.0	73.2	71.5	59.1	9.7	55.2

印旂				香取				海匠				山武			
平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
32				13				23				35			
1956.7	589.4	62.6	1936.9	2263.3	605.0	0.0	2071.9	2237.0	422.3	126.3	2120.7	1712.8	567.8	78.3	1645.3
355.6	131.4	5.7	367.5	376.9	129.1	0.0	357.0	349.7	145.0	14.1	330.9	373.8	103.0	6.0	403.9
209.1	121.5	5.6	200.0	254.1	145.9	0.0	200.0	258.2	128.3	16.5	230.0	250.2	142.1	6.5	260.0
134.2	90.4	3.5	112.5	106.1	80.1	0.0	90.0	90.8	77.7	3.0	84.4	123.3	126.6	12.6	100.0
12.3	38.1	3.7	0.0	16.7	42.1	0.0	0.0	0.7	3.4	0.6	0.0	0.4	2.2	0.2	0.0
24.9	34.7	3.6	3.3	53.6	45.1	0.0	37.4	58.8	72.1	0.6	31.6	32.3	47.5	0.1	9.5
4.9	6.5	0.8	1.5	4.9	6.8	0.0	2.7	9.9	11.7	1.0	5.6	5.5	7.0	0.6	3.0
30.3	58.4	12.2	0.0	122.7	121.0	0.0	80.0	38.3	47.2	11.9	20.0	79.6	97.6	7.5	50.0
2.3	4.4	0.3	0.0	2.3	4.8	0.0	0.0	6.4	16.7	4.9	0.0	2.0	7.0	0.5	0.0
264.3	172.1	8.9	197.4	353.6	151.9	0.0	350.1	297.4	125.4	19.7	288.7	248.8	169.8	17.0	203.2
88.6	89.0	8.8	58.4	107.6	108.5	0.0	50.0	115.2	76.5	5.4	111.9	92.7	111.7	12.3	55.8
137.7	78.8	3.7	128.1	218.4	140.8	0.0	208.4	166.9	100.4	21.4	141.7	139.3	104.5	1.9	127.4
34.4	74.3	3.2	0.0	14.8	53.5	0.0	0.0	0.8	2.0	0.2	0.0	2.9	16.9	1.2	0.0
3.5	6.0	0.7	0.0	12.8	27.2	0.0	0.0	14.5	23.2	3.5	2.5	14.0	25.8	7.8	0.0
82.4	91.1	4.2	71.5	90.8	121.5	0.0	41.0	162.1	156.5	24.1	120.0	93.6	121.4	15.4	49.0
15.2	22.4	0.3	0.0	12.9	14.1	0.0	10.0	23.6	19.1	2.9	28.0	14.9	23.5	5.3	0.0
6.2	9.7	0.8	0.0	32.8	60.0	0.0	9.6	5.9	6.6	0.2	2.0	11.1	16.9	1.8	3.0
50.6	57.2	8.6	31.9	65.4	54.9	0.0	70.0	82.2	53.6	1.5	65.0	52.8	71.2	10.8	12.0
23.2	48.9	9.5	0.0	27.8	48.6	0.0	0.0	20.7	29.3	4.4	9.9	26.7	44.1	1.2	0.6
99.1	65.8	6.4	100.0	57.3	72.2	0.0	20.0	71.2	48.0	0.2	70.0	81.8	76.8	9.1	66.2
20.4	24.4	1.5	8.3	9.6	23.8	0.0	0.0	11.5	20.8	2.7	0.0	8.7	17.2	3.6	0.0
24.0	25.3	1.3	20.2	36.9	38.6	0.0	43.0	39.1	40.8	2.5	29.3	36.0	32.5	0.4	44.0
241.5	305.4	62.6	142.5	105.7	136.7	0.0	34.6	171.5	169.8	0.2	115.0	95.2	151.4	0.4	1.2
11.8	11.6	3.7	9.8	9.7	5.5	0.0	11.9	11.1	7.7	0.8	11.4	9.3	8.1	0.8	6.4
36.1	55.6	2.4	17.0	35.4	56.2	0.0	16.0	33.1	46.0	13.9	10.0	18.6	36.2	1.9	0.0
607.2	340.3	37.2	555.0	834.0	619.9	0.0	600.0	823.7	519.8	91.6	783.0	485.5	390.3	36.5	462.0
100.3	130.1	17.4	56.4	68.5	101.0	0.0	40.5	53.0	18.4	7.6	50.8	72.2	62.2	4.7	47.7

千葉市				船橋市				柏市			
平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
28				10				24			
2512.1	763.2	140.8	2491.4	1932.8	465.8	0.0	1870.0	2038.0	522.3	114.9	2083.0
336.3	123.2	24.5	334.0	360.5	140.9	0.0	339.0	361.6	136.3	12.8	297.0
216.7	118.1	22.0	208.0	242.5	132.4	0.0	187.5	243.0	175.2	6.2	197.5
103.8	93.0	18.2	74.0	105.9	88.8	0.0	95.0	106.7	85.2	1.8	95.0
15.8	41.2	8.8	0.0	12.0	37.9	0.0	0.0	11.9	34.8	4.8	0.0
46.7	59.6	16.4	29.6	72.3	84.2	0.0	61.7	20.0	32.8	1.9	0.0
7.9	8.1	1.4	7.0	5.0	5.6	0.0	4.0	6.4	7.1	1.2	5.2
64.3	84.0	16.3	45.5	145.0	256.0	0.0	5.0	59.9	56.8	8.9	58.5
3.5	9.9	1.4	0.0	2.4	4.2	0.0	0.0	4.3	7.0	0.7	0.1
342.1	206.1	20.1	285.9	318.4	137.8	0.0	298.2	282.7	143.3	2.2	273.7
147.2	106.9	16.1	121.4	138.5	117.3	0.0	144.2	90.6	76.7	5.2	72.5
180.9	143.3	11.2	154.3	179.6	79.7	0.0	186.9	172.1	114.1	5.0	164.9
4.1	19.4	2.7	0.0	0.3	0.9	0.0	0.0	9.3	31.4	5.5	0.0
9.9	20.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	14.9	2.5	2.8
185.1	126.1	36.6	160.0	135.0	120.7	0.0	121.4	135.1	133.0	18.8	105.3
20.5	26.4	5.9	8.5	21.6	26.6	0.0	5.0	12.2	14.6	3.6	8.0
8.1	16.4	2.2	0.6	7.0	17.3	0.0	0.0	9.1	11.3	0.6	5.8
68.3	55.9	15.8	79.0	52.1	31.1	0.0	51.7	54.1	43.7	0.5	50.0
22.6	28.0	5.9	13.5	12.3	23.6	0.0	0.9	22.7	27.4	5.7	9.0
58.6	45.6	5.9	49.8	98.3	61.3	0.0	97.3	74.4	45.8	0.4	84.8
10.9	20.2	3.5	0.0	17.5	15.0	0.0	17.5	13.2	18.1	0.5	8.0
23.0	20.6	3.2	21.5	33.5	28.6	0.0	50.0	35.9	35.9	6.1	40.1
164.7	154.0	22.6	146.3	91.1	106.3	0.0	45.0	117.4	104.4	27.3	121.0
10.4	6.4	0.5	11.0	10.8	8.8	0.0	12.8	8.7	7.2	0.3	7.3
51.5	69.1	21.6	20.2	14.4	25.5	0.0	0.0	21.8	56.2	2.4	0.0
986.2	569.3	116.7	900.3	456.8	177.4	0.0	455.5	740.3	442.9	130.4	627.1
134.8	135.4	8.0	67.5	108.8	67.0	0.0	88.6	94.2	77.3	7.8	75.5

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

食品群別摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(20歳以上、男性、二次医療圏別)(g)

	総 数				東葛南部				東葛北部				印旛				香取海匝			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	431				82				70				28				36			
総量	2486.4	794.4	48.4	2427.1	2497.8	821.4	106.9	2447.5	2589.4	868.0	164.6	2537.9	2341.2	724.6	128.1	2203.5	2788.4	767.2	24.2	2586.7
穀類	468.5	168.0	11.3	460.0	465.6	166.2	29.9	454.9	476.4	158.5	22.8	465.3	501.8	179.3	21.9	482.5	462.5	180.2	40.0	441.9
米・加工品	341.1	182.2	11.8	323.0	344.3	176.8	31.2	330.0	339.6	190.2	24.3	311.5	347.6	185.3	1.0	330.0	348.9	158.6	19.1	345.0
小麦・加工品	113.6	115.0	6.9	77.5	105.3	106.2	9.7	78.7	129.6	117.0	8.6	108.7	151.1	110.9	24.7	147.9	108.8	126.7	23.3	74.2
その他穀類	13.8	57.1	3.4	0.0	16.0	66.7	8.5	0.0	7.1	30.4	4.5	0.0	3.1	11.5	1.8	0.0	4.8	24.5	3.5	0.0
いも類	53.6	70.0	4.0	29.0	50.1	66.5	6.2	22.7	59.6	88.0	13.6	26.5	44.8	53.0	16.8	31.4	56.7	61.1	15.3	40.3
砂糖・甘味料類	7.1	9.3	0.5	4.9	6.3	6.7	0.9	5.0	8.2	13.7	1.9	5.4	5.4	5.8	1.5	3.0	5.5	7.5	1.9	2.2
豆類	65.2	82.0	4.3	37.5	64.3	78.0	6.0	37.5	80.9	89.7	10.9	57.0	54.3	78.5	8.5	15.5	93.4	114.8	11.5	41.0
種実類	3.4	11.2	0.8	0.0	2.5	5.7	0.8	0.0	2.5	6.0	0.8	0.0	1.9	4.0	0.1	0.0	3.7	9.2	1.1	0.0
野菜類	317.5	193.5	8.8	283.2	310.5	167.9	17.3	272.6	344.4	192.0	23.0	334.5	298.6	177.9	32.4	291.6	330.5	221.1	6.2	299.4
緑黄色野菜	101.5	94.5	5.9	80.7	105.4	105.9	5.4	86.8	116.2	99.0	16.3	99.4	100.9	97.4	18.5	63.2	65.5	70.6	15.1	45.7
その他野菜	186.7	130.6	5.4	167.7	188.2	98.0	9.5	176.1	190.1	126.8	15.2	187.0	169.0	107.0	16.3	166.3	193.0	129.8	26.9	170.7
野菜ジュース	17.9	71.9	3.9	0.0	9.4	39.1	4.3	0.0	25.5	64.9	6.2	0.0	22.1	58.5	1.9	0.0	50.3	181.1	34.9	0.0
漬物	11.4	20.2	1.4	0.0	7.5	15.7	2.3	0.0	12.6	21.9	2.1	0.0	6.5	8.9	0.4	0.0	21.7	30.6	6.6	5.5
果実類	107.5	134.5	6.6	66.5	87.8	114.4	14.2	59.4	128.5	149.2	14.8	76.0	79.9	108.0	1.7	0.0	145.3	177.7	17.0	101.3
きのこ類	18.5	35.1	1.7	0.0	21.4	35.1	3.4	1.1	18.1	25.7	1.7	7.9	23.2	39.8	2.6	0.0	24.2	50.3	6.5	1.1
藻類	11.4	21.6	1.5	2.6	18.4	35.6	5.2	6.3	10.8	15.0	1.8	2.4	5.7	8.8	0.2	0.0	12.0	20.5	2.1	3.3
魚介類	80.2	73.3	4.8	63.0	62.0	60.4	8.4	48.6	80.5	65.4	11.1	75.0	56.5	70.8	5.5	35.3	95.0	79.5	8.3	85.6
魚介加工品	31.6	43.2	2.8	12.4	21.7	29.7	2.6	5.0	36.9	48.0	8.3	15.3	17.4	26.5	1.1	0.0	42.4	58.9	14.9	11.7
肉類	111.0	89.5	4.1	95.0	109.8	75.4	8.1	100.0	106.2	86.0	8.7	83.0	133.0	70.8	6.9	140.8	113.9	89.2	25.8	100.0
ハム・ソーセージ類	14.4	25.0	1.1	0.0	14.4	24.6	2.1	0.0	16.6	25.6	2.5	6.0	20.7	24.3	4.5	10.0	9.3	23.5	3.2	0.0
卵類	32.1	30.9	1.4	30.0	34.4	26.8	1.8	43.0	29.0	27.8	3.2	24.4	19.5	22.0	1.6	7.1	44.6	46.3	2.3	37.7
乳類	122.0	169.9	7.3	55.0	131.1	183.4	11.6	100.0	144.9	176.2	17.6	84.5	121.6	133.1	14.4	76.8	137.9	190.7	14.8	24.5
油脂類	12.0	10.4	0.7	10.0	13.3	9.7	1.3	11.9	12.1	12.0	0.9	9.7	14.6	13.2	3.9	13.6	9.8	8.9	0.8	8.2
菓子類	20.1	41.6	2.3	0.0	14.0	28.4	4.7	0.0	14.3	31.8	2.7	0.0	25.7	61.3	3.9	0.0	38.7	62.4	7.7	0.0
嗜好飲料類	949.5	596.4	37.4	882.0	976.3	691.0	100.3	894.0	971.9	647.5	102.2	970.0	806.3	392.3	36.9	727.1	1144.6	736.8	33.0	1047.0
調味料・香辛料類	107.0	98.2	7.1	74.4	129.8	118.0	23.0	88.8	101.4	83.2	13.4	72.8	148.5	157.9	13.7	73.5	70.0	57.5	8.0	55.7

	山武長生夷隅				安房				君津				市原				千葉市			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	96				40				33				27				19			
総量	2274.4	754.2	52.0	2221.7	2371.2	721.8	67.5	2331.0	2484.4	728.3	54.4	2300.2	2489.2	568.9	13.4	2510.6	3013.7	925.6	186.5	3045.4
穀類	501.7	167.0	6.4	478.3	488.9	139.8	3.8	476.6	413.1	179.1	30.5	400.0	350.1	178.3	6.4	340.0	468.2	118.2	11.3	463.0
米・加工品	376.5	192.3	11.8	350.0	384.9	178.3	19.7	377.5	275.4	177.4	49.4	230.0	253.5	168.0	8.3	229.0	275.4	131.1	22.6	304.0
小麦・加工品	111.6	125.9	16.5	60.0	80.8	100.5	7.6	40.1	120.3	101.9	10.3	107.7	80.3	91.9	21.6	44.6	159.7	129.2	36.2	134.7
その他穀類	13.6	56.8	8.4	0.0	23.3	83.7	15.9	0.0	17.4	56.4	8.6	0.0	16.3	75.0	6.9	0.0	33.1	76.8	15.4	0.0
いも類	52.0	61.0	6.1	26.9	43.0	49.9	1.8	26.0	37.3	36.6	4.4	26.3	73.0	85.3	8.8	44.4	85.1	124.2	28.6	38.8
砂糖・甘味料類	7.4	9.3	0.5	4.8	6.8	9.2	1.3	4.7	9.1	7.8	0.1	6.3	6.0	10.0	0.8	4.0	9.0	9.2	2.1	7.0
豆類	61.6	80.6	8.0	45.0	34.7	53.5	6.8	5.5	71.1	79.9	12.6	33.3	64.5	72.0	8.0	37.5	47.2	54.5	5.6	22.5
種実類	1.9	5.1	0.5	0.0	10.6	29.8	6.1	0.0	2.6	5.3	0.2	0.0	2.3	6.5	0.6	0.0	6.9	14.5	1.4	0.0
野菜類	312.5	217.8	22.3	260.0	299.3	140.6	9.5	275.4	300.7	146.6	6.9	283.2	259.7	198.2	8.7	278.4	426.6	269.7	44.6	394.5
緑黄色野菜	92.6	86.0	13.2	71.1	104.3	83.7	18.7	94.7	90.0	63.8	2.4	80.5	91.9	80.7	2.4	71.5	172.7	144.5	32.3	112.2
その他野菜	191.8	155.8	10.8	159.9	169.3	109.2	4.6	139.3	188.9	107.9	8.3	174.0	155.6	157.0	9.7	122.3	232.6	193.8	15.7	165.0
野菜ジュース	18.8	59.8	3.7	0.0	5.2	32.6	3.5	0.0	12.5	47.4	1.1	0.0	7.8	40.0	3.2	0.0	5.6	23.6	3.7	0.0
漬物	9.3	17.8	0.7	1.2	20.6	27.5	1.1	0.0	9.4	11.7	0.2	4.5	4.3	8.6	1.8	0.0	15.8	24.5	4.4	5.0
果実類	84.1	124.4	11.4	0.0	94.6	121.6	10.7	43.8	149.3	162.0	1.1	102.5	125.2	126.8	9.8	100.0	131.1	103.4	21.2	128.3
きのこ類	11.8	21.5	1.8	0.0	9.2	14.6	1.9	0.0	21.5	31.8	4.5	7.5	24.9	68.0	4.9	0.0	28.2	44.4	10.3	0.0
藻類	10.4	17.9	1.3	3.0	13.2	19.1	3.4	2.0	6.6	13.0	0.7	1.0	4.3	8.7	1.5	1.5	11.2	17.4	3.0	6.0
魚介類	83.0	80.0	7.8	60.8	74.0	57.6	0.2	62.0	122.5	90.7	6.5	90.3	61.9	58.7	3.2	55.5	115.4	84.0	27.0	122.3
魚介加工品	31.6	42.6	4.1	12.3	26.9	33.8	1.1	12.7	57.9	62.2	3.1	40.0	31.0	36.7	1.0	11.0	20.4	21.7	0.5	16.3
肉類	114.8	111.2	7.0	87.4	112.2	61.2	1.9	110.7	106.7	110.8	20.1	93.7	111.6	92.0	4.7	88.3	80.5	69.8	13.9	60.0
ハム・ソーセージ類	13.0	25.9	2.3	0.0	11.3	24.3	3.3	0.0	13.1	20.4	3.0	0.0	17.1	31.7	2.3	0.0	17.9	23.4	4.0	9.5
卵類	30.5	29.0	2.9	25.7	30.2	29.7	0.9	29.3	34.7	33.5	1.4	36.6	34.3	34.6	1.8	33.6	31.8	31.9	11.1	9.0
乳類	99.6	188.7	16.2	5.4	67.4	98.1	10.5	7.0	139.9	154.5	9.9	80.0	114.4	115.8	15.1	103.0	176.9	188.1	14.5	91.7
油脂類	11.1	8.0	1.2	9.9	11.3	9.2	0.3	10.0	8.6	10.9	3.5	7.2	13.7	15.4	6.0	9.0	15.1	8.0	1.7	16.0
菓子類	21.0	41.0	5.2	0.0	20.7	43.0	4.0	0.0	19.1	27.0	2.2	0.0	20.1	51.3	1.0	0.0	20.4	40.5	7.8	0.0
嗜好飲料類	783.6	478.2	47.0	822.5	963.2	535.7	45.7	901.0	928.2	574.0	83.3	819.7	1144.5	483.0	10.7	1077.0	1161.7	580.5	139.1	1300.0
調味料・香辛料類	87.3	70.0	9.0	67.7	91.9	59.0	4.1	82.7	113.4	120.8	12.2	67.1	78.7	51.0	3.3	74.7	198.3	115.8	21.0	234.5

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

食品群別摂取量 平均値、標準偏差、標準誤差、中央値(20歳以上、女性、二次医療圏別)(g)

	総 数				東葛南部				東葛北部				印旛				香取海匝			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	495				89				88				32				36			
総量	2200.9	741.0	48.7	2110.8	2275.8	709.6	46.4	2112.0	2270.3	843.9	117.9	2241.4	1956.7	589.4	62.6	1936.9	2246.5	487.6	80.5	2076.1
穀類	353.7	139.5	6.3	345.5	345.8	144.8	5.8	338.3	361.7	131.8	10.1	353.0	355.6	131.4	5.7	367.5	359.5	138.2	12.4	348.5
米・加工品	240.1	144.8	7.2	210.0	223.3	143.7	7.8	189.0	253.7	153.3	16.1	210.0	209.1	121.5	5.6	200.0	256.7	132.8	10.5	230.0
小麦・加工品	100.9	92.5	4.1	75.0	103.6	91.0	5.3	80.0	102.9	96.6	9.5	73.5	134.2	90.4	3.5	112.5	96.3	77.8	4.7	86.9
その他穀類	12.7	47.1	2.2	0.0	18.9	59.7	3.5	0.0	5.1	19.5	2.2	0.0	12.3	38.1	3.7	0.0	6.5	26.0	4.6	0.0
いも類	46.2	60.4	3.2	28.3	46.1	63.5	6.7	21.7	50.3	71.0	12.4	22.4	24.9	34.7	3.6	3.3	56.9	63.0	1.6	35.7
砂糖・甘味料類	7.6	8.8	0.4	5.0	9.5	10.5	1.0	5.4	7.4	8.5	0.6	4.9	4.9	6.5	0.8	1.5	8.1	10.4	1.5	3.3
豆類	65.6	88.9	5.0	40.0	84.5	123.9	11.0	54.0	77.1	84.1	12.0	58.0	30.3	58.4	12.2	0.0	68.8	90.1	24.9	37.3
種実類	3.4	9.5	0.5	0.0	3.8	7.2	1.2	0.0	2.8	5.3	0.4	0.0	2.3	4.4	0.3	0.0	4.9	13.7	3.3	0.0
野菜類	299.7	164.1	9.3	272.5	336.6	154.3	21.9	306.3	306.7	177.3	15.4	267.1	264.3	172.1	8.9	197.4	317.7	136.2	19.8	312.0
緑黄色野菜	110.1	95.7	5.1	89.9	133.3	96.8	9.0	117.5	108.4	96.3	12.4	81.8	88.6	89.0	8.8	58.4	112.5	87.9	3.9	103.8
その他野菜	170.7	104.9	5.4	156.2	193.6	102.1	13.4	176.0	173.2	115.0	10.9	163.5	137.7	78.8	3.7	128.1	185.5	117.3	19.4	159.5
野菜ジュース	9.2	43.5	2.1	0.0	1.6	10.7	1.0	0.0	14.1	63.4	6.4	0.0	34.4	74.3	3.2	0.0	5.8	32.1	4.0	0.0
漬物	9.7	20.6	1.2	0.0	8.0	18.9	3.3	0.0	11.0	24.3	2.0	0.0	3.5	6.0	0.7	0.0	13.9	24.3	2.3	1.3
果実類	139.0	153.7	8.3	99.3	153.2	143.1	17.1	117.0	134.6	140.3	12.5	90.6	82.4	91.1	4.2	71.5	136.4	147.2	26.6	94.0
きのこ類	16.4	26.8	1.4	5.0	21.6	28.2	2.3	6.0	13.0	20.8	1.9	5.1	15.2	22.4	0.3	0.0	19.8	18.0	3.7	21.2
藻類	9.7	19.0	0.9	1.3	11.3	18.7	1.3	2.4	9.7	13.1	0.8	2.4	6.2	9.7	0.8	0.0	15.6	37.9	7.7	6.8
魚介類	68.5	63.9	3.7	60.0	57.2	52.3	2.7	54.5	76.1	64.5	8.8	66.5	50.6	57.2	8.6	31.9	76.1	53.9	4.9	67.5
魚介加工品	27.9	42.0	2.0	6.0	22.2	41.7	4.0	2.5	34.1	43.2	4.7	15.0	23.2	48.9	9.5	0.0	23.3	36.9	3.3	2.5
肉類	81.7	66.8	3.2	71.4	87.3	65.0	8.0	80.0	75.3	58.6	6.6	70.0	99.1	65.8	6.4	100.0	66.2	57.3	4.0	66.0
ハム・ソーセージ類	11.9	20.7	1.1	0.0	10.6	17.3	2.0	0.0	13.8	21.1	1.4	7.0	20.4	24.4	1.5	8.3	10.8	21.7	1.9	0.0
卵類	31.5	28.4	1.4	31.5	29.1	24.1	3.2	27.7	29.6	28.2	3.3	28.7	24.0	25.3	1.3	20.2	38.3	39.5	1.8	33.7
乳類	136.4	165.2	8.8	100.0	145.3	122.7	10.1	121.0	123.8	126.5	11.9	103.5	241.5	305.4	62.6	142.5	147.7	159.8	18.9	105.5
油脂類	9.8	8.4	0.5	8.0	10.1	8.8	1.0	8.7	8.5	7.1	0.7	7.2	11.8	11.6	3.7	9.8	10.6	6.9	0.7	11.6
菓子類	33.6	62.8	3.6	0.0	37.0	59.4	7.9	0.0	22.6	47.6	1.5	0.0	36.1	55.6	2.4	17.0	33.9	49.1	8.9	10.0
嗜好飲料類	809.6	564.4	34.7	693.0	778.0	462.4	52.6	681.0	892.5	741.0	85.3	710.2	607.2	340.3	37.2	555.0	827.4	549.2	58.4	757.8
調味料・香辛料類	88.5	87.1	5.7	60.2	119.6	101.3	11.7	77.9	78.7	59.3	6.8	61.4	100.3	130.1	17.4	56.4	58.6	61.4	6.3	49.4

	山武長生夷隅				安房				君津				市原				千葉市			
	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	平均	標準偏差	標準誤差	中央値
対象者数	115				49				28				30				28			
総量	2071.7	750.4	128.7	2014.4	2314.5	702.6	117.6	2291.5	2185.1	738.7	108.1	1944.9	2015.0	794.8	38.3	2008.2	2512.1	763.2	140.8	2491.4
穀類	374.9	139.8	8.2	364.0	387.6	146.3	10.7	400.0	281.1	97.6	3.2	297.5	291.5	159.4	34.0	262.5	336.3	123.2	24.5	334.0
米・加工品	256.1	146.8	5.4	240.0	283.4	165.4	30.9	245.0	193.6	103.7	4.7	202.5	196.2	150.2	30.6	162.5	216.7	118.1	22.0	208.0
小麦・加工品	108.0	95.8	8.7	90.0	84.5	91.0	10.3	60.0	84.0	85.3	2.3	66.5	68.7	93.6	3.0	33.5	103.8	93.0	18.2	74.0
その他穀類	10.7	54.0	4.1	0.0	19.7	59.8	9.9	0.0	3.5	10.4	0.8	0.0	26.6	60.3	6.4	0.0	15.8	41.2	8.8	0.0
いも類	40.6	50.1	3.0	23.0	43.9	43.4	5.2	37.5	50.2	71.2	4.4	24.6	65.8	80.9	5.3	29.9	46.7	59.6	16.4	29.6
砂糖・甘味料類	6.8	7.1	0.5	5.0	8.6	10.0	0.8	6.5	9.0	10.6	0.6	6.9	5.4	6.4	1.0	4.0	7.9	8.1	1.4	7.0
豆類	60.7	81.9	7.6	40.0	46.3	68.8	11.1	18.0	71.6	69.9	9.3	40.0	55.9	65.9	1.0	32.0	64.3	84.0	16.3	45.5
種実類	2.1	6.5	0.6	0.0	5.2	19.6	2.1	0.0	2.6	7.6	0.0	0.0	5.5	9.1	0.9	0.0	3.5	9.9	1.4	0.0
野菜類	284.8	166.5	18.8	256.4	284.5	158.9	36.5	260.4	302.1	120.5	7.2	279.1	225.3	139.3	2.9	201.7	342.1	206.1	20.1	285.9
緑黄色野菜	103.9	97.0	10.6	92.0	102.8	101.6	19.5	87.0	91.7	71.5	13.5	76.7	84.1	87.0	2.6	64.3	147.2	106.9	16.1	121.4
その他野菜	162.9	102.8	10.1	152.0	157.0	87.6	6.7	164.5	189.7	87.4	0.6	183.8	138.0	85.3	5.4	131.0	180.9	143.3	11.2	154.3
野菜ジュース	8.5	38.0	3.3	0.0	8.7	39.6	5.4	0.0	11.2	56.6	6.3	0.0	0.2	0.9	0.2	0.0	4.1	19.4	2.7	0.0
漬物	9.5	18.4	2.5	0.0	15.9	29.9	4.8	0.0	9.5	13.5	0.7	0.0	3.0	8.2	0.1	0.0	9.9	20.6	2.1	0.0
果実類	131.4	157.1	20.3	87.5	128.9	167.5	7.9	88.0	130.5	153.5	46.7	109.1	183.1	239.2	5.0	112.8	185.1	126.1	36.6	160.0
きのこ類	13.3	21.2	1.8	0.0	11.2	16.1	4.9	2.8	19.6	29.3	10.9	0.0	21.8	60.3	4.2	0.0	20.5	26.4	5.9	8.5
藻類	9.3	20.1	1.6	1.2	10.4	14.8	2.2	2.8	9.2	18.3	2.5	0.0	3.9	9.4	1.4	0.0	8.1	16.4	2.2	0.6
魚介類	67.0	70.8	8.0	50.0	93.0	74.2	8.0	80.0	75.9	58.8	5.1	71.3	48.6	65.5	0.5	36.9	68.3	55.9	15.8	79.0
魚介加工品	26.7	42.3	2.6	1.6	39.9	44.9	8.0	25.4	34.0	39.2	5.8	23.2	21.0	42.8	1.3	0.0	22.6	28.0	5.9	13.5
肉類	90.6	82.2	7.0	71.8	65.5	50.2	0.3	60.0	92.8	66.4	3.9	84.9	87.3	72.4	4.0	70.0	58.6	45.6	5.9	49.8
ハム・ソーセージ類	11.8	19.9	3.0	0.0	7.2	24.9	2.7	0.0	12.0	19.8	0.6	0.0	10.7	20.5	3.5	0.0	10.9	20.2	3.5	0.0
卵類	39.2	30.9	2.2	43.0	30.4	27.1	2.1	31.5	27.9	24.5	0.7	23.3	28.1	25.0	2.1	30.8	23.0	20.6	3.2	21.5
乳類	125.7	191.5	18.2	24.0	112.7	123.8	11.9	62.5	96.9	107.2	16.1	65.1	112.3	145.4	24.2	43.0	164.7	154.0	22.6	146.3
油脂類	11.1	9.1	1.1	9.0	10.0	8.7	0.3	6.6	6.3	6.1	1.1	4.2	7.9	7.5	1.5	5.9	10.4	6.4	0.5	11.0
菓子類	26.8	44.0	3.3	0.0	55.9	120.7	19.3	0.0	45.0	67.5	6.1	8.0	15.3	30.2	4.1	0.0	51.5	69.1	21.6	20.2
嗜好飲料類	717.0	557.7	87.3	570.0	946.5	552.9	43.9	902.0	847.1	541.1	19.1	671.2	785.6	415.7	29.2	652.0	986.2	569.3	116.7	900.3
調味料・香辛料類	70.5	63.2	6.4	53.9	74.0	42.0	2.0	62.2	117.4	132.2	39.0	73.2	71.5	59.1	9.7	55.2	134.8	135.4	8.0	67.5

2. 夕食・夕食等の食事状況調査の結果

朝、昼、夕別にみた1日の食事構成比(1歳以上、性・年齢階級別)

<朝>

	総 数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 20歳以上			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65歳以上				
	人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%						
全 体	総数	1090	100.0	49	100.0		70	100.0		45	100.0		75	100.0		100	100.0		132	100.0		147	100.0		197	100.0		275	100.0		926	100.0		175	100.0		352	100.0		399	100.0
	家庭食	885	81.2	44	89.8		66	94.3		41	91.1		54	72.0		73	73.0		90	68.2		111	75.5		171	86.8		235	85.5		734	79.3		127	72.6		265	75.3		342	85.7
	調理済み食	76	7.0	4	8.2		2	2.9		1	2.2		4	5.3		6	6.0		7	5.3		19	12.9		12	6.1		21	7.6		69	7.5		10	5.7		30	8.5		29	7.3
	外食・給食	9	0.8	0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	1.3		1	1.0		3	2.3		0	0.0		2	1.0		2	0.7		9	1.0		2	1.1		3	0.9		4	1.0
	菓子・果物などのみ	74	6.8	1	2.0		1	1.4		1	2.2		11	14.7		9	9.0		17	12.9		13	8.8		8	4.1		13	4.7		71	7.7		20	11.4		34	9.7		17	4.3
	飲料などビタミシ、ミネラルのみ	3	0.3	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	0.8		0	0.0		0	0.0		0	0.0		3	0.3		1	0.6		1	0.3		1	0.3
男 性	何もし口にできなかった	43	3.9	0	0.0		1	1.4		2	4.4		5	6.7		10	10.0		14	10.6		4	2.7		4	2.0		3	1.1		40	4.3		15	8.6		19	5.4		6	1.5
	調査不能	0	0.0	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0
	総数	513	100.0	22	100.0		33	100.0		27	100.0		35	100.0		48	100.0		61	100.0		74	100.0		89	100.0		124	100.0		431	100.0		83	100.0		168	100.0		180	100.0
	家庭食	393	76.6	19	86.4		31	93.9		24	88.9		27	77.1		29	60.4		37	60.7		49	66.2		74	83.1		103	83.1		319	74.0		56	67.5		113	67.3		150	83.3
	調理済み食	47	9.2	2	9.1		1	3.0		1	3.7		3	8.6		4	8.3		6	9.8		13	17.6		7	7.9		10	8.1		43	10.0		7	8.4		21	12.5		15	8.3
	外食・給食	7	1.4	0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	2.9		1	2.1		2	3.3		0	0.0		1	1.1		2	1.6		7	1.6		2	2.4		2	1.2		3	1.7
女 性	菓子・果物などのみ	40	7.8	1	4.5		0	0.0		0	0.0		0	0.0		3	6.6		9	14.8		8	10.8		4	4.5		8	6.5		39	9.0		10	12.0		20	11.9		9	5.0
	飲料などビタミシ、ミネラルのみ	2	0.4	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	2.1		0	0.0		0	0.0		1	0.8		2	0.5		1	1.2		0	0.0		1	0.6
	何もし口にできなかった	24	4.7	0	0.0		1	3.0		2	7.4		1	2.9		6	12.5		7	11.5		4	5.4		3	3.4		0	0.0		21	4.9		7	8.4		12	7.1		2	1.1
	調査不能	0	0.0	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0
	総数	577	100.0	27	100.0		37	100.0		18	100.0		40	100.0		52	100.0		71	100.0		73	100.0		108	100.0		151	100.0		495	100.0		92	100.0		184	100.0		219	100.0
	家庭食	492	85.3	25	92.6		35	94.6		17	94.4		27	67.5		44	84.6		53	74.6		62	84.9		97	89.8		132	87.4		415	83.8		71	77.2		152	82.6		192	87.7
全 体	調理済み食	29	5.0	2	7.4		1	2.7		0	0.0		1	2.5		2	3.8		1	1.4		6	8.2		5	4.6		11	7.3		26	5.3		3	3.3		9	4.9		14	6.4
	外食・給食	2	0.3	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	1.4		0	0.0		1	0.9		0	0.0		2	0.4		0	0.0		1	0.5		1	0.5
	菓子・果物などのみ	34	5.9	0	0.0		1	2.7		1	5.6		8	20.0		2	3.8		8	11.3		5	6.8		4	3.7		5	3.3		32	6.5		10	10.9		14	7.6		8	3.7
	飲料などビタミシ、ミネラルのみ	1	0.2	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	1.4		0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	0.2		0	0.0		1	0.5		0	0.0
	何もし口にできなかった	19	3.3	0	0.0		0	0.0		0	0.0		4	10.0		4	7.7		7	9.9		0	0.0		1	0.9		3	2.0		19	3.8		8	8.7		7	3.8		4	1.8
	調査不能	0	0.0	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0

<昼>

	総 数			1-6歳			7-14歳			15-19歳			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 20歳以上			(再掲) 40-64歳			(再掲) 65歳以上				
	人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%		人数	%						
全 体	総数	1090	100.0	49	100.0		70	100.0		45	100.0		75	100.0		100	100.0		132	100.0		147	100.0		197	100.0		275	100.0		926	100.0		175	100.0		352	100.0		399	100.0
	家庭食	584	53.6	18	36.7		7	10.0		27	60.0		33	44.0		45	45.0		55	41.7		75	51.0		128	65.0		196	71.3		532	57.5		78	44.6		175	49.7		279	69.9
	調理済み食	120	11.0	1	2.0		0	0.0		3	6.7		8	10.7		11	11.0		17	12.9		15	10.2		24	12.2		41	14.9		116	12.5		19	10.9		41	11.6		56	14.0
	外食・給食	340	31.2	29	59.2		63	90.0		13	28.9		29	38.7		37	37.0		50	37.9		47	32.0		39	19.8		33	12.0		235	25.4		66	37.7		114	32.4		55	13.8
	菓子・果物などのみ	23	2.1	1	2.0		0	0.0		0	0.0		1	1.3		3	3.0		7	5.3		4	2.7		3	1.5		4	1.5		22	2.4		4	2.3		13	3.7		5	1.3
	飲料などビタミ・ミネラルのみ	0	0.0	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0
	何も口にできなかった	22	2.0	0	0.0		0	0.0		2	4.4		4	5.3		4	4.0		2	1.5		6	4.1		3	1.5		1	0.4		20	2.2		8	4.6		8	2.3		4	1.0
調査不能	1	0.1	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	0.1		0	0.0		1	0.3		0	0.0	
男 性	総数	513	100.0	22	100.0		33	100.0		27	100.0		35	100.0		48	100.0		61	100.0		74	100.0		89	100.0		124	100.0		431	100.0		83	100.0		168	100.0		180	100.0
	家庭食	227	44.2	8	36.4		2	6.1		14	51.9		11	31.4		16	33.3		17	27.9		24	32.4		50	56.2		85	68.5		203	47.1		27	32.5		56	33.3		120	66.7
	調理済み食	65	12.7	1	4.5		0	0.0		3	11.1		3	8.6		6	12.5		6	9.8		12	16.2		13	14.6		21	16.9		61	14.2		9	10.8		22	13.1		30	16.7
	外食・給食	199	38.8	13	59.1		31	93.9		8	29.6		18	51.4		22	45.8		33	54.1		34	45.9		23	25.8		17	13.7		147	34.1		40	48.2		80	47.6		27	15.0
	菓子・果物などのみ	8	1.6	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	2.1		3	4.9		1	1.4		2	2.2		1	0.8		8	1.9		1	1.2		5	3.0		2	1.1
	飲料などビタミ・ミネラルのみ	0	0.0	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0
	何も口にできなかった	13	2.5	0	0.0		0	0.0		2	7.4		3	8.6		3	6.3		1	1.6		3	4.1		1	1.1		1	0.4		11	2.6		6	7.2		4	2.4		1	0.6
調査不能	1	0.2	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	0.2		0	0.0		1	0.6		0	0.0	
女 性	総数	577	100.0	27	100.0		37	100.0		18	100.0		40	100.0		52	100.0		71	100.0		73	100.0		108	100.0		151	100.0		495	100.0		92	100.0		184	100.0		219	100.0
	家庭食	357	61.9	10	37.0		5	13.5		13	72.2		22	55.0		29	55.8		38	53.5		51	69.9		78	72.2		111	73.5		329	66.5		51	55.4		119	64.7		159	72.6
	調理済み食	55	9.5	0	0.0		0	0.0		0	0.0		5	12.5		5	9.6		11	15.5		3	4.1		11	10.2		20	13.2		55	11.1		10	10.9		19	10.3		26	11.9
	外食・給食	141	24.4	16	59.3		32	86.5		5	27.8		11	27.5		15	28.8		17	23.9		13	17.8		16	14.8		16	10.6		88	17.8		26	28.3		34	18.5		28	12.8
	菓子・果物などのみ	15	2.6	1	3.7		0	0.0		0	0.0		1	2.5		2	3.8		4	5.6		3	4.1		1	0.9		3	2.0		14	2.8		3	3.3		8	4.3		3	1.4
	飲料などビタミ・ミネラルのみ	0	0.0	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0
	何も口にできなかった	9	1.6	0	0.0		0	0.0		0	0.0		1	2.5		1	1.9		1	1.4		3	4.1		2	1.9		1	0.7		9	1.8		2	2.2		4	2.2		3	1.4
調査不能	0	0.0	0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0		0	0.0	

2. 夕食・外食等の食事状況調査の結果

朝、昼、夕別にみた1日の食事構成比(性・年齢階級別)

＜タ＞

	総 数		1-6歳		7-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全 体	1090	100.0	49	100.0	70	100.0	45	100.0	75	100.0	100	100.0	132	100.0	147	100.0	197	100.0	275	100.0	926	100.0	352	100.0	399	100.0
家庭食	962	88.3	44	89.8	67	95.7	43	95.6	68	90.7	84	84.0	114	86.4	121	82.3	178	90.4	243	88.4	808	87.3	298	84.7	358	89.7
調理済み食	75	6.9	3	6.1	3	4.3	1	2.2	4	5.3	6	6.0	8	6.1	16	10.9	11	5.6	23	8.4	68	7.3	30	8.5	28	7.0
外食・給食	46	4.2	2	4.1	0	0.0	1	2.2	3	4.0	10	10.0	9	6.8	9	6.1	6	3.0	6	2.2	43	4.6	22	6.3	8	2.0
菓子・果物などのみ	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.5	2	0.7	5	0.5	2	0.6	3	0.8
飲料などビタミン・ミネラルのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も口にできなかった	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	2	0.2	0	0.0	2	0.5
調査不能	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男 性	513	100.0	22	100.0	33	100.0	27	100.0	35	100.0	48	100.0	61	100.0	74	100.0	89	100.0	124	100.0	431	100.0	168	100.0	180	100.0
家庭食	439	85.6	18	81.8	33	100.0	26	96.3	30	85.7	36	75.0	50	82.0	57	77.0	78	87.6	111	89.5	362	84.0	132	78.6	164	91.1
調理済み食	43	8.4	2	9.1	0	0.0	0	0.0	4	11.4	5	10.4	5	8.2	9	12.2	8	9.0	10	8.1	41	9.5	19	11.3	13	7.2
外食・給食	29	5.7	2	9.1	0	0.0	1	3.7	1	2.9	7	14.6	5	8.2	7	9.5	3	3.4	3	2.4	26	6.0	8	4.9	3	1.7
菓子・果物などのみ	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.1	0	0.0	2	0.5	2	1.2	0	0.0
飲料などビタミン・ミネラルのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も口にできなかった	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
調査不能	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女 性	577	100.0	27	100.0	37	100.0	18	100.0	40	100.0	52	100.0	71	100.0	73	100.0	108	100.0	151	100.0	495	100.0	184	100.0	219	100.0
家庭食	523	90.6	26	96.3	34	91.9	17	94.4	38	95.0	48	92.3	64	90.1	64	87.7	100	92.6	132	87.4	446	90.1	166	93.5	194	88.6
調理済み食	32	5.5	1	3.7	3	8.1	1	5.6	0	0.0	1	1.9	3	4.2	7	9.6	3	2.8	13	8.6	27	5.5	11	6.0	15	6.8
外食・給食	17	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	3	5.8	4	5.6	2	2.7	3	2.8	3	2.0	17	3.4	5	5.4	7	3.8
菓子・果物などのみ	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.3	3	0.6	0	0.0	3	1.4
飲料などビタミン・ミネラルのみ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も口にできなかった	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7	2	0.4	0	0.0	2	0.9
調査不能	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別栄養素等摂取量 平均値(20歳以上、男性、調査不能除く)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	62	369	19	411	2	429
エネルギー(kcal)	1696	2136	1643	2094	1488	2075
たんぱく質(g)	59.2	79.1	58.2	77.1	45.0	76.4
うち動物性(g)	33.2	42.7	32.3	41.8	19.0	41.5
脂質(g)	53.3	63.0	49.9	62.2	49.4	61.7
うち動物性(g)	27.0	31.8	26.3	31.3	13.5	31.2
飽和脂肪酸(g)	13.7	16.6	13.6	16.3	11.0	16.2
一価不飽和脂肪酸(g)	19.7	22.0	17.9	21.8	16.2	21.7
多価不飽和脂肪酸(g)	11.1	13.7	9.9	13.5	16.2	13.3
n-6系脂肪酸(g)	9.0	11.0	8.4	10.8	13.9	10.7
n-3系脂肪酸(g)	2.0	2.5	1.5	2.5	2.3	2.4
炭水化物(g)	221.0	286.6	222.5	280.0	191.4	277.6
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	8.8	11.2	7.7	11.0	5.7	10.9
食塩(g/1, 000kcal)	5.3	5.4	4.8	5.4	3.8	5.4
カリウム(mg)	1823	2621	1963	2534	1289	2512
カルシウム(mg)	392	565	418	546	453	540
マグネシウム(mg)	200	283	194	275	217	272
リン(mg)	837	1118	810	1091	638	1080
鉄(mg)	6.4	8.7	6.4	8.5	6.1	8.4
亜鉛(mg)	6.9	9.2	7.3	9.0	5.4	8.9
銅(mg)	0.92	1.30	0.92	1.26	0.80	1.24
マンガン(mg)	2.92	4.02	2.91	3.91	2.75	3.86
ヨウ素(μg)	349	1689	728	1536	104	1503
セレン(μg)	39	52	38	51	20	50
クロム(μg)	4	6	5	6	10	6
モリブデン(μg)	134	190	139	184	152	182
ビタミンA(μgRE)	626	549	1069	537	107	563
ビタミンD(μg)	6.5	7.9	3.9	7.9	3.0	7.7
ビタミンE(mg)	5.9	7.5	5.5	7.3	4.8	7.3
ビタミンK(μg)	179	297	206	284	104	281
ビタミンB1(mg)	0.78	1.00	0.77	0.98	0.40	0.97
ビタミンB2(mg)	1.00	1.31	1.05	1.28	0.54	1.27
ナイアシン(mgNE)	13.8	17.8	11.4	17.5	10.7	17.3
ビタミンB6(mg)	0.97	1.35	1.09	1.30	0.65	1.30
ビタミンB12(μg)	7.0	6.9	5.9	7.0	2.3	7.0
葉酸(μg)	255	341	309	330	141	329
パントテン酸(mg)	4.70	6.23	5.31	6.05	2.59	6.03
ビオチン(μg)	25.6	26.2	33.8	25.8	23.4	26.1
ビタミンC(mg)	71	115	85	110	23	109
コレステロール(mg)	257	329	260	322	179	319
食物繊維総量(g)	11.1	16.3	12.4	15.8	5.5	15.6
うち水溶性(g)	2.6	3.8	2.8	3.6	1.4	3.6
うち不溶性(g)	8.2	12.0	9.1	11.6	4.0	11.5
脂肪エネルギー比率(%)	27.8	26.3	27.8	26.4	29.5	26.5
炭水化物エネルギー比率(%)	58.2	58.8	58.1	58.8	58.5	58.7
動物性たんぱく質比率(%)	52.9	52.5	53.7	52.5	46.2	52.6
穀類エネルギー比率(%)	42.2	41.1	40.5	41.3	33.9	41.3

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別栄養素等摂取量 平均値(20歳以上、女性)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	52	443	23	472	5	490
エネルギー(kcal)	1545	1755	1558	1741	1274	1738
たんぱく質(g)	57.0	67.3	60.3	66.5	42.3	66.5
うち動物性(g)	32.5	35.3	30.8	35.2	18.8	35.2
脂質(g)	55.8	55.0	52.9	55.2	37.0	55.3
うち動物性(g)	28.7	26.8	24.3	27.1	14.9	27.1
飽和脂肪酸(g)	17.1	15.1	14.3	15.3	9.7	15.3
一価不飽和脂肪酸(g)	19.0	18.5	17.5	18.6	12.2	18.7
多価不飽和脂肪酸(g)	10.9	11.6	11.6	11.6	7.3	11.6
n-6系脂肪酸(g)	8.6	9.4	9.2	9.4	5.9	9.4
n-3系脂肪酸(g)	2.2	2.1	2.2	2.1	1.3	2.1
炭水化物(g)	196.2	240.8	205.9	237.6	195.7	236.5
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	7.6	9.6	8.2	9.5	4.7	9.4
食塩(g/1, 000kcal)	5.1	5.6	5.3	5.5	3.8	5.5
カリウム(mg)	2010	2425	2114	2395	1790	2388
カルシウム(mg)	523	532	505	532	389	533
マグネシウム(mg)	200	252	221	248	157	248
リン(mg)	883	978	888	972	667	971
鉄(mg)	6.3	8.0	7.7	7.9	5.4	7.9
亜鉛(mg)	6.5	7.8	6.7	7.7	5.0	7.7
銅(mg)	0.87	1.15	0.98	1.12	0.76	1.12
マンガン(mg)	2.81	3.64	3.01	3.58	2.52	3.56
ヨウ素(μg)	137	1750	1183	1600	64	1596
セレン(μg)	34	43	41	42	22	42
クロム(μg)	5	6	6	6	5	6
モリブデン(μg)	98	155	116	150	63	150
ビタミンA(μgRE)	481	556	630	544	484	549
ビタミンD(μg)	8.4	7.0	8.1	7.1	4.2	7.2
ビタミンE(mg)	6.0	7.0	6.4	6.9	5.5	6.9
ビタミンK(μg)	179	285	210	277	168	275
ビタミンB1(mg)	0.76	0.87	0.78	0.87	0.67	0.86
ビタミンB2(mg)	1.14	1.24	1.12	1.23	0.85	1.23
ナイアシン(mgNE)	12.7	14.4	13.3	14.3	8.1	14.3
ビタミンB6(mg)	0.94	1.16	1.05	1.14	0.85	1.14
ビタミンB12(μg)	5.7	5.9	8.0	5.7	4.7	5.9
葉酸(μg)	237	334	298	325	257	324
パントテン酸(mg)	4.81	5.58	4.92	5.53	4.07	5.52
ビオチン(μg)	23.1	25.0	26.6	24.7	16.6	24.9
ビタミンC(mg)	80	124	97	121	189	119
コレステロール(mg)	290	291	231	293	235	291
食物繊維総量(g)	11.5	15.9	12.7	15.5	12.9	15.4
うち水溶性(g)	2.7	3.7	2.8	3.6	3.1	3.6
うち不溶性(g)	8.5	11.6	9.5	11.4	9.5	11.3
脂肪エネルギー比率(%)	32.2	27.8	30.5	28.2	26.3	28.3
炭水化物エネルギー比率(%)	52.6	56.7	53.3	56.4	60.1	56.2
動物性たんぱく質比率(%)	56.3	51.3	53.2	51.8	44.0	51.9
穀類エネルギー比率(%)	31.8	38.3	32.7	37.9	32.7	37.7

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別栄養素等摂取量 標準偏差(20歳以上、男性、調査不能除く)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	62	369	19	411	2	429
エネルギー(kcal)	460	527	556	531	97	540
たんぱく質(g)	22.5	22.4	25.3	23.0	22.6	23.4
うち動物性(g)	19.4	18.0	18.3	18.5	3.4	18.5
脂質(g)	25.3	24.5	22.5	24.8	22.0	24.8
うち動物性(g)	19.8	16.6	17.4	17.1	2.1	17.1
飽和脂肪酸(g)	7.0	7.7	7.6	7.7	5.7	7.7
一価不飽和脂肪酸(g)	10.6	9.7	8.0	9.9	4.6	9.9
多価不飽和脂肪酸(g)	6.2	5.8	4.8	5.9	10.0	5.9
n-6系脂肪酸(g)	5.2	5.1	4.0	5.1	8.8	5.1
n-3系脂肪酸(g)	1.8	1.4	1.0	1.5	1.2	1.5
炭水化物(g)	64.4	76.7	83.2	77.2	25.0	78.4
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	3.6	3.5	3.5	3.6	1.1	3.6
食塩(g/1, 000kcal)	2.2	1.6	2.3	1.7	0.5	1.7
カリウム(mg)	794	973	1186	973	121	988
カルシウム(mg)	246	319	361	312	480	315
マグネシウム(mg)	77	99	117	98	112	100
リン(mg)	329	355	357	360	240	364
鉄(mg)	2.6	3.0	3.7	3.0	5.1	3.1
亜鉛(mg)	2.4	3.0	3.3	3.0	2.1	3.0
銅(mg)	0.30	0.40	0.41	0.41	0.21	0.41
マンガン(mg)	1.26	1.57	1.57	1.57	1.81	1.58
ヨウ素(μg)	1043	5900	2884	5589	13	5504
セレン(μg)	31	33	39	33	4	33
クロム(μg)	3	4	3	4	12	4
モリブデン(μg)	73	87	73	87	76	87
ビタミンA(μgRE)	1497	443	2524	467	63	699
ビタミンD(μg)	8.8	7.8	5.9	8.0	3.1	8.0
ビタミンE(mg)	3.1	3.6	3.4	3.6	0.5	3.6
ビタミンK(μg)	159	206	273	200	94	204
ビタミンB1(mg)	0.39	0.44	0.51	0.44	0.14	0.44
ビタミンB2(mg)	0.54	0.53	0.69	0.53	0.30	0.54
ナイアシン(mgNE)	6.8	7.8	5.4	7.8	0.0	7.8
ビタミンB6(mg)	0.42	0.53	0.81	0.52	0.21	0.54
ビタミンB12(μg)	10.1	6.4	13.8	6.6	1.1	7.0
葉酸(μg)	217	140	355	142	46	156
パントテン酸(mg)	2.05	2.07	2.79	2.09	0.60	2.12
ビオチン(μg)	42.4	11.1	72.3	12.0	12.0	19.0
ビタミンC(mg)	66	76	78	76	17	76
コレステロール(mg)	157	171	150	172	78	171
食物繊維総量(g)	5.2	7.0	8.2	7.0	2.7	7.0
うち水溶性(g)	1.4	1.7	2.0	1.7	1.1	1.7
うち不溶性(g)	4.1	5.4	6.2	5.3	1.4	5.3
脂肪エネルギー比率(%)	8.7	7.0	9.5	7.2	11.4	7.3
炭水化物エネルギー比率(%)	9.6	8.0	10.8	8.1	16.6	8.2
動物性たんぱく質比率(%)	17.0	12.5	16.1	13.1	15.6	13.2
穀類エネルギー比率(%)	13.1	12.6	18.6	12.4	2.2	12.7

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別栄養素等摂取量 標準偏差(20歳以上、女性)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	52	443	23	472	5	490
エネルギー(kcal)	570	467	858	456	361	482
たんぱく質(g)	17.8	18.5	26.1	18.3	9.9	18.6
うち動物性(g)	13.8	14.7	12.2	14.7	5.9	14.6
脂質(g)	27.7	22.7	34.1	22.6	9.6	23.3
うち動物性(g)	19.0	14.7	17.1	15.1	6.7	15.2
飽和脂肪酸(g)	12.9	7.8	10.8	8.3	5.6	8.5
一価不飽和脂肪酸(g)	9.6	8.7	12.7	8.6	5.0	8.8
多価不飽和脂肪酸(g)	5.9	5.4	8.5	5.2	2.8	5.4
n-6系脂肪酸(g)	4.7	4.6	7.3	4.4	2.4	4.6
n-3系脂肪酸(g)	1.9	1.3	1.4	1.4	0.6	1.4
炭水化物(g)	81.9	68.5	126.7	67.3	67.7	71.2
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	3.1	3.5	5.4	3.4	0.8	3.5
食塩(g/1, 000kcal)	1.7	1.7	1.9	1.7	0.8	1.7
カリウム(mg)	912	899	790	913	621	909
カルシウム(mg)	394	267	378	277	196	283
マグネシウム(mg)	85	88	101	89	41	89
リン(mg)	355	294	384	297	224	301
鉄(mg)	2.7	3.1	4.7	3.0	1.5	3.1
亜鉛(mg)	2.3	2.5	3.2	2.5	1.6	2.5
銅(mg)	0.32	0.38	0.50	0.37	0.19	0.38
マンガン(mg)	1.70	1.77	2.27	1.76	1.74	1.78
ヨウ素(μg)	293	7210	3235	6968	87	6871
セレン(μg)	24	29	34	28	13	28
クロム(μg)	4	3	4	3	2	3
モリブデン(μg)	62	82	82	82	16	82
ビタミンA(μgRE)	640	549	1036	527	195	562
ビタミンD(μg)	11.5	7.4	7.0	8.0	3.9	8.0
ビタミンE(mg)	3.7	3.5	3.6	3.5	2.2	3.5
ビタミンK(μg)	133	196	213	192	103	194
ビタミンB1(mg)	0.36	0.36	0.32	0.36	0.27	0.36
ビタミンB2(mg)	0.57	0.51	0.49	0.52	0.32	0.52
ナイアシン(mgNE)	4.9	6.2	7.2	6.1	1.7	6.1
ビタミンB6(mg)	0.43	0.44	0.43	0.45	0.20	0.45
ビタミンB12(μg)	5.6	5.5	7.0	5.4	3.1	5.5
葉酸(μg)	132	150	167	151	106	152
パントテン酸(mg)	2.03	1.79	2.26	1.81	1.30	1.83
ビオチン(μg)	18.0	15.5	24.5	15.3	7.4	15.8
ビタミンC(mg)	73	87	73	87	192	85
コレステロール(mg)	205	156	140	162	123	162
食物繊維総量(g)	6.2	6.7	8.2	6.7	7.0	6.8
うち水溶性(g)	1.5	1.7	1.8	1.7	1.5	1.7
うち不溶性(g)	5.0	5.0	6.5	5.0	5.5	5.0
脂肪エネルギー比率(%)	9.1	7.1	9.7	7.3	3.4	7.5
炭水化物エネルギー比率(%)	9.5	7.7	10.1	7.8	5.3	8.0
動物性たんぱく質比率(%)	13.6	12.4	15.5	12.5	8.0	12.7
穀類エネルギー比率(%)	12.4	12.0	15.7	11.9	12.8	12.2

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別栄養素等摂取量 標準誤差(20歳以上、男性、調査不能除く)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	62	369	19	411	2	429
エネルギー(kcal)	62	26	113	28	49	28
たんぱく質(g)	3.5	1.4	5.4	1.4	11.4	1.5
うち動物性(g)	3.0	1.1	3.4	1.2	1.7	1.2
脂質(g)	3.4	1.3	5.2	1.2	11.1	1.2
うち動物性(g)	3.0	0.7	3.1	0.8	1.1	0.7
飽和脂肪酸(g)	1.1	0.4	1.6	0.4	2.9	0.4
一価不飽和脂肪酸(g)	1.2	0.6	2.1	0.5	2.4	0.5
多価不飽和脂肪酸(g)	0.7	0.4	1.0	0.3	5.1	0.3
n-6系脂肪酸(g)	0.6	0.3	0.9	0.3	4.4	0.3
n-3系脂肪酸(g)	0.2	0.1	0.2	0.1	0.6	0.1
炭水化物(g)	9.2	4.0	18.5	4.4	12.7	4.4
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	0.6	0.2	0.9	0.2	0.6	0.2
食塩(g/1, 000kcal)	0.3	0.1	0.5	0.1	0.3	0.1
カリウム(mg)	107	57	257	58	62	56
カルシウム(mg)	29	20	59	19	244	18
マグネシウム(mg)	12	6	30	6	57	6
リン(mg)	47	22	67	22	122	22
鉄(mg)	0.4	0.2	0.9	0.2	2.6	0.2
亜鉛(mg)	0.4	0.2	0.6	0.2	1.1	0.2
銅(mg)	0.04	0.02	0.10	0.02	0.10	0.02
マンガン(mg)	0.15	0.11	0.32	0.11	0.92	0.10
ヨウ素(μg)	112	301	634	277	7	263
セレン(μg)	4	2	8	2	2	2
クロム(μg)	0.5	0.2	1	0.2	6	0.2
モリブデン(μg)	10	5	20	5	38	4
ビタミンA(μgRE)	180	26	583	23	32	36
ビタミンD(μg)	1.2	0.5	1.4	0.5	1.6	0.5
ビタミンE(mg)	0.4	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
ビタミンK(μg)	18	11	70	10	48	10
ビタミンB1(mg)	0.05	0.02	0.09	0.02	0.07	0.02
ビタミンB2(mg)	0.07	0.03	0.13	0.03	0.15	0.03
ナイアシン(mgNE)	1.0	0.5	1.5	0.5	0.0	0.5
ビタミンB6(mg)	0.06	0.03	0.19	0.03	0.11	0.03
ビタミンB12(μg)	1.4	0.4	3.2	0.4	0.5	0.4
葉酸(μg)	26	8	82	8	23	9
パントテン酸(mg)	0.22	0.11	0.59	0.11	0.30	0.11
ビオチン(μg)	5.2	0.7	16.7	0.7	6.1	1.2
ビタミンC(mg)	9	4	16	5	9	4
コレステロール(mg)	20	12	29	11	40	11
食物繊維総量(g)	0.7	0.4	1.7	0.4	1.4	0.4
うち水溶性(g)	0.2	0.1	0.4	0.1	0.6	0.1
うち不溶性(g)	0.5	0.3	1.2	0.3	0.7	0.3
脂肪エネルギー比率(%)	1.1	0.4	2.8	0.4	5.8	0.4
炭水化物エネルギー比率(%)	1.4	0.4	2.7	0.4	8.4	0.5
動物性たんぱく質比率(%)	2.6	0.7	2.9	0.8	7.9	0.8
穀類エネルギー比率(%)	2.2	0.9	3.4	0.9	1.1	0.9

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別栄養素等摂取量 標準誤差(20歳以上、女性)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	52	443	23	472	5	490
エネルギー(kcal)	101	25	172	26	104	29
たんぱく質(g)	3.0	0.9	5.1	0.9	4.2	1.0
うち動物性(g)	2.0	0.8	2.5	0.8	2.6	0.8
脂質(g)	3.8	1.4	6.5	1.2	4.1	1.3
うち動物性(g)	2.7	0.8	3.7	0.7	3.2	0.8
飽和脂肪酸(g)	1.9	0.4	2.2	0.4	2.8	0.4
一価不飽和脂肪酸(g)	1.2	0.6	2.4	0.5	1.8	0.5
多価不飽和脂肪酸(g)	0.8	0.3	1.5	0.3	1.0	0.3
n-6系脂肪酸(g)	0.6	0.2	1.4	0.2	0.9	0.2
n-3系脂肪酸(g)	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1
炭水化物(g)	15.8	3.3	26.0	3.8	15.1	4.2
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	0.4	0.1	1.1	0.1	0.4	0.1
食塩(g/1, 000kcal)	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1
カリウム(mg)	147	46	163	50	249	50
カルシウム(mg)	65	13	77	14	97	14
マグネシウム(mg)	13	4	20	5	17	5
リン(mg)	60	14	79	15	110	16
鉄(mg)	0.4	0.1	0.8	0.2	0.5	0.2
亜鉛(mg)	0.3	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1
銅(mg)	0.05	0.02	0.10	0.02	0.07	0.02
マンガン(mg)	0.25	0.10	0.46	0.11	0.71	0.10
ヨウ素(μg)	44	401	638	380	36	367
セレン(μg)	4	1	7	1	5	1
クロム(μg)	1	0.2	1	0.1	1	0.2
モリブデン(μg)	10	4	15	4	6	4
ビタミンA(μgRE)	71	26	217	23	80	26
ビタミンD(μg)	1.4	0.4	1.1	0.4	1.7	0.4
ビタミンE(mg)	0.6	0.2	0.7	0.2	0.8	0.2
ビタミンK(μg)	22	11	40	11	41	11
ビタミンB1(mg)	0.05	0.02	0.07	0.02	0.13	0.01
ビタミンB2(mg)	0.10	0.02	0.10	0.02	0.15	0.02
ナイアシン(mgNE)	0.6	0.3	1.4	0.3	0.7	0.3
ビタミンB6(mg)	0.06	0.02	0.09	0.02	0.07	0.02
ビタミンB12(μg)	0.7	0.3	1.6	0.3	1.5	0.3
葉酸(μg)	21	9	33	9	43	9
パントテン酸(mg)	0.30	0.09	0.46	0.09	0.56	0.09
ビオチン(μg)	3.0	0.8	5.1	0.8	2.5	0.8
ビタミンC(mg)	12	5	16	5	78	5
コレステロール(mg)	42	9	29	9	49	9
食物繊維総量(g)	0.9	0.4	1.7	0.4	2.5	0.4
うち水溶性(g)	0.2	0.1	0.3	0.1	0.7	0.1
うち不溶性(g)	0.8	0.3	1.3	0.3	1.9	0.3
脂肪エネルギー比率(%)	1.3	0.4	1.9	0.4	1.1	0.4
炭水化物エネルギー比率(%)	1.4	0.4	2.0	0.4	1.4	0.4
動物性たんぱく質比率(%)	1.8	0.7	3.0	0.7	3.3	0.7
穀類エネルギー比率(%)	1.5	0.6	3.1	0.6	5.4	0.6

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別栄養素等摂取量 中央値(20歳以上、男性、調査不能除く)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	62	369	19	411	2	429
エネルギー(kcal)	1700	2073	1752	2054	1488	2046
たんぱく質(g)	55.6	78.3	58.8	76.3	45.0	75.8
うち動物性(g)	33.0	40.3	29.4	40.0	19.0	39.6
脂質(g)	46.9	61.6	45.1	60.5	49.4	60.0
うち動物性(g)	22.2	29.3	22.1	28.9	13.5	28.7
飽和脂肪酸(g)	13.0	15.9	10.4	15.4	11.0	15.3
一価不飽和脂肪酸(g)	16.8	20.8	17.0	20.2	16.2	20.1
多価不飽和脂肪酸(g)	9.8	12.9	9.6	12.5	16.2	12.5
n-6系脂肪酸(g)	7.7	10.1	8.2	9.9	13.9	9.8
n-3系脂肪酸(g)	1.5	2.3	1.5	2.2	2.3	2.2
炭水化物(g)	217.6	281.6	240.0	275.0	191.4	274.0
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	8.4	10.9	7.3	10.7	5.7	10.6
食塩(g/1, 000kcal)	5.0	5.1	4.4	5.1	3.8	5.1
カリウム(mg)	1652	2542	1429	2423	1289	2397
カルシウム(mg)	345	509	287	489	453	483
マグネシウム(mg)	184	272	171	266	217	261
リン(mg)	786	1090	765	1055	638	1047
鉄(mg)	5.9	8.5	5.4	8.2	6.1	8.0
亜鉛(mg)	6.6	8.9	6.5	8.6	5.4	8.6
銅(mg)	0.87	1.28	0.82	1.24	0.80	1.23
マンガン(mg)	2.63	3.73	2.73	3.63	2.75	3.61
ヨウ素(μg)	35	80	57	70	104	66
セレン(μg)	28	44	22	43	20	43
クロム(μg)	4	6	4	6	10	6
モリブデン(μg)	115	177	142	171	152	168
ビタミンA(μgRE)	363	445	453	436	107	439
ビタミンD(μg)	2.0	5.2	1.7	4.8	3.0	4.4
ビタミンE(mg)	5.5	6.8	5.1	6.7	4.8	6.7
ビタミンK(μg)	122	253	120	241	104	236
ビタミンB1(mg)	0.70	0.92	0.60	0.92	0.40	0.91
ビタミンB2(mg)	0.90	1.23	1.13	1.20	0.54	1.20
ナイアシン(mgNE)	12.4	16.6	11.2	16.3	10.7	16.2
ビタミンB6(mg)	0.89	1.28	0.85	1.23	0.65	1.21
ビタミンB12(μg)	2.4	4.9	1.7	4.9	2.3	4.8
葉酸(μg)	210	326	208	317	141	313
パントテン酸(mg)	4.32	6.09	5.40	5.83	2.59	5.83
ビオチン(μg)	17.5	24.5	15.5	24.2	23.4	24.0
ビタミンC(mg)	46	94	54	87	23	87
コレステロール(mg)	247	309	300	298	179	299
食物繊維総量(g)	10.7	15.4	12.0	14.9	5.5	14.9
うち水溶性(g)	2.4	3.5	2.3	3.4	1.4	3.4
うち不溶性(g)	7.5	11.3	7.8	11.1	4.0	11.0
脂肪エネルギー比率(%)	26.3	25.9	28.9	25.8	29.5	26.0
炭水化物エネルギー比率(%)	60.0	58.8	58.4	59.2	58.5	59.0
動物性たんぱく質比率(%)	54.7	54.1	47.7	54.1	46.2	54.1
穀類エネルギー比率(%)	43.1	40.3	42.9	40.8	33.9	40.8

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別栄養素等摂取量 中央値(20歳以上、女性)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	52	443	23	472	5	490
エネルギー(kcal)	1431	1715	1426	1711	1150	1709
たんぱく質(g)	55.8	65.6	57.0	65.3	44.1	65.3
うち動物性(g)	32.4	34.2	28.7	33.9	20.0	33.8
脂質(g)	50.7	52.2	43.4	52.2	33.3	52.0
うち動物性(g)	26.2	24.1	18.9	24.7	16.3	24.5
飽和脂肪酸(g)	13.1	13.6	11.0	13.7	7.0	13.5
一価不飽和脂肪酸(g)	16.9	17.0	14.4	17.2	10.1	17.1
多価不飽和脂肪酸(g)	9.6	10.9	10.5	10.8	7.6	10.8
n-6系脂肪酸(g)	8.0	8.8	7.0	8.7	6.0	8.8
n-3系脂肪酸(g)	1.5	1.8	1.7	1.8	1.5	1.8
炭水化物(g)	180.2	233.6	195.3	231.1	188.3	230.4
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	7.2	9.2	7.2	9.0	4.6	9.0
食塩(g/1, 000kcal)	4.9	5.3	5.1	5.2	4.0	5.2
カリウム(mg)	2020	2275	2236	2269	1759	2256
カルシウム(mg)	447	499	374	501	358	496
マグネシウム(mg)	191	243	202	242	162	242
リン(mg)	855	940	789	934	671	927
鉄(mg)	6.0	7.6	6.4	7.4	6.0	7.4
亜鉛(mg)	6.2	7.4	6.0	7.4	4.6	7.4
銅(mg)	0.85	1.10	0.97	1.09	0.72	1.09
マンガン(mg)	2.33	3.36	2.07	3.30	1.83	3.26
ヨウ素(μg)	46	58	35	59	18	56
セレン(μg)	28	36	33	35	20	35
クロム(μg)	4	5	5	5	3	5
モリブデン(μg)	92	138	93	135	66	135
ビタミンA(μgRE)	343	454	355	441	508	433
ビタミンD(μg)	3.8	4.3	5.4	4.0	2.5	4.2
ビタミンE(mg)	4.7	6.4	5.8	6.3	6.2	6.3
ビタミンK(μg)	150	241	168	233	117	226
ビタミンB1(mg)	0.76	0.81	0.81	0.81	0.56	0.81
ビタミンB2(mg)	0.98	1.15	1.13	1.14	0.84	1.14
ナイアシン(mgNE)	12.5	13.3	12.1	13.3	8.8	13.3
ビタミンB6(mg)	0.89	1.10	1.06	1.09	0.83	1.09
ビタミンB12(μg)	3.6	4.1	5.1	4.1	3.6	4.1
葉酸(μg)	224	317	258	309	248	308
パントテン酸(mg)	4.57	5.36	4.73	5.36	4.04	5.31
ビオチン(μg)	19.5	22.9	21.3	22.7	16.1	22.7
ビタミンC(mg)	50	107	68	105	148	102
コレステロール(mg)	234	277	217	278	219	273
食物繊維総量(g)	10.5	15.2	9.9	14.9	10.4	14.7
うち水溶性(g)	2.2	3.5	2.8	3.4	3.0	3.4
うち不溶性(g)	7.9	11.0	7.2	10.9	6.6	10.8
脂肪エネルギー比率(%)	32.6	27.5	29.0	27.6	24.9	27.7
炭水化物エネルギー比率(%)	51.6	57.0	55.3	56.5	61.2	56.4
動物性たんぱく質比率(%)	56.9	52.2	46.7	52.7	45.4	52.7
穀類エネルギー比率(%)	29.7	37.9	33.6	37.2	29.2	37.2

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別食品群別摂取量 平均値(20歳以上、男性、調査不能除く)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	62	369	19	411	2	429
総量	2046.3	2560.4	1996.7	2512.4	2134.0	2488.1
穀類	398.0	480.4	356.6	474.2	300.0	469.3
米・加工品	278.6	351.6	269.9	344.7	300.0	341.3
小麦・加工品	104.7	115.2	86.7	115.0	0.0	114.2
その他穀類	14.7	13.7	0.0	14.5	0.0	13.9
いも類	31.4	57.3	58.8	53.3	3.0	53.8
砂糖・甘味料類	6.3	7.2	7.0	7.1	6.0	7.1
豆類	36.5	70.0	49.7	66.1	75.0	65.1
種実類	0.8	3.8	1.1	3.5	0.0	3.4
野菜類	232.2	331.8	237.1	321.2	93.5	318.5
緑黄色野菜	73.3	106.2	89.3	102.1	6.6	102.0
その他野菜	145.2	193.7	146.8	188.5	84.4	187.2
野菜ジュース	7.0	19.8	0.0	18.8	2.5	18.0
漬物	6.7	12.2	1.0	11.9	0.0	11.4
果実類	49.6	117.2	88.2	108.6	0.0	108.0
きのこ類	18.7	18.4	11.6	18.8	3.3	18.5
藻類	4.3	12.6	9.8	11.5	5.3	11.5
魚介類	63.7	83.0	23.5	82.9	26.4	80.4
魚介加工品	18.3	33.9	12.7	32.4	0.0	31.8
肉類	101.2	112.6	123.1	110.5	70.0	111.2
ハム・ソーセージ類	8.9	15.3	12.0	14.5	0.0	14.5
卵類	18.3	34.4	24.6	32.4	15.9	32.1
乳類	82.2	128.7	152.4	120.9	65.5	122.3
油脂類	11.8	12.0	9.2	12.1	12.5	12.0
菓子類	15.1	21.0	18.5	20.2	27.0	20.1
嗜好飲料類	892.9	959.0	773.3	959.5	1404.5	947.4
調味料・香辛料類	83.4	110.9	52.2	109.7	26.1	107.4

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別食品群別摂取量 平均値(20歳以上、女性)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	52	443	23	472	5	490
総量	1887.0	2237.7	1844.7	2218.3	1817.7	2204.8
穀類	252.9	365.5	258.5	358.3	212.5	355.1
米・加工品	161.4	249.3	170.0	243.5	155.2	241.0
小麦・加工品	85.1	102.7	87.4	101.5	50.0	101.4
その他穀類	6.4	13.5	1.2	13.3	7.3	12.8
いも類	29.1	48.2	62.7	45.4	15.0	46.5
砂糖・甘味料類	7.8	7.6	11.1	7.5	3.7	7.7
豆類	40.3	68.6	73.2	65.2	54.3	65.7
種実類	2.3	3.5	2.4	3.4	0.6	3.4
野菜類	228.0	308.1	234.3	302.8	212.8	300.5
緑黄色野菜	73.1	114.4	104.1	110.4	120.2	110.0
その他野菜	142.5	174.0	110.2	173.7	88.2	171.5
野菜ジュース	8.2	9.3	13.2	9.0	0.0	9.3
漬物	4.1	10.4	6.8	9.9	4.4	9.8
果実類	82.3	145.6	89.3	141.4	272.4	137.6
きのこ類	21.2	15.8	9.4	16.7	12.0	16.4
藻類	5.6	10.2	6.3	9.9	2.8	9.8
魚介類	62.8	69.2	62.2	68.8	20.4	69.0
魚介加工品	25.6	28.1	8.4	28.8	8.4	28.1
肉類	73.7	82.6	60.9	82.7	47.2	82.0
ハム・ソーセージ類	7.8	12.4	6.3	12.1	20.0	11.8
卵類	18.6	33.1	24.6	31.9	27.2	31.6
乳類	170.6	132.4	145.5	136.0	98.6	136.8
油脂類	10.1	9.8	8.9	9.9	5.7	9.9
菓子類	69.4	29.4	37.5	33.4	98.2	32.9
嗜好飲料類	752.4	816.3	681.4	815.8	704.4	810.6
調味料・香辛料類	59.9	91.9	76.6	89.1	30.0	89.1

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別食品群別摂取量 標準偏差(20歳以上、男性、調査不能除く)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	62	369	19	411	2	429
総量	745.1	779.2	930.0	779.4	239.0	795.8
穀類	145.3	168.8	168.9	166.2	0.0	168.0
米・加工品	149.5	185.2	170.7	182.3	0.0	182.6
小麦・加工品	123.2	113.6	115.1	115.1	0.0	115.0
その他穀類	60.5	56.6	0.0	58.4	0.0	57.3
いも類	43.4	72.9	96.8	68.7	1.4	70.1
砂糖・甘味料類	8.3	9.5	11.8	9.2	0.0	9.4
豆類	57.6	84.5	109.4	80.6	106.1	82.0
種実類	2.1	12.0	3.2	11.5	0.0	11.2
野菜類	179.8	192.3	217.4	192.0	48.0	193.3
緑黄色野菜	68.5	97.5	113.0	93.8	9.3	94.5
その他野菜	134.7	128.8	130.3	130.7	53.8	130.7
野菜ジュース	36.4	76.1	0.0	73.5	3.5	72.0
漬物	11.4	21.3	3.2	20.6	0.0	20.3
果実類	95.0	137.8	136.4	134.6	0.0	134.6
きのこ類	48.5	32.4	25.6	35.6	4.7	35.2
藻類	11.5	22.6	15.4	21.8	7.4	21.6
魚介類	79.9	71.8	35.4	73.6	37.3	73.3
魚介加工品	30.8	44.6	24.6	43.7	0.0	43.2
肉類	91.6	89.1	127.2	87.6	42.4	89.6
ハム・ソーセージ類	18.5	25.8	21.5	25.2	0.0	25.0
卵類	27.3	30.9	25.7	31.1	5.5	31.0
乳類	134.8	174.4	232.7	166.8	78.5	170.2
油脂類	11.6	10.3	9.4	10.5	6.4	10.5
菓子類	36.8	42.4	47.0	41.5	1.4	41.7
嗜好飲料類	657.7	585.9	811.3	584.1	501.3	596.5
調味料・香辛料類	77.1	100.8	31.3	99.5	23.9	98.2

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別食品群別摂取量 標準偏差(20歳以上、女性)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	52	443	23	472	5	490
総量	762.7	730.5	892.1	729.5	854.2	739.7
穀類	97.7	139.0	177.5	135.9	36.1	139.4
米・加工品	107.4	145.9	122.9	145.1	60.0	145.2
小麦・加工品	88.6	92.9	106.4	91.9	48.0	92.8
その他穀類	27.1	48.9	5.5	48.1	16.4	47.3
いも類	40.8	62.1	80.8	59.3	22.4	60.6
砂糖・甘味料類	10.7	8.6	12.3	8.6	5.4	8.8
豆類	61.6	91.2	92.1	88.8	95.5	88.9
種実類	5.1	9.9	7.6	9.6	1.3	9.5
野菜類	161.5	162.5	157.1	163.9	96.0	164.5
緑黄色野菜	77.4	96.7	94.6	95.8	56.9	96.0
その他野菜	102.4	104.8	77.4	105.3	57.4	105.0
野菜ジュース	40.0	43.9	62.5	42.4	0.0	43.7
漬物	9.4	21.5	17.6	20.8	7.8	20.7
果実類	150.8	152.8	126.6	154.6	227.5	152.5
きのこ類	51.7	22.1	16.4	27.1	21.7	26.8
藻類	10.9	19.6	11.7	19.2	6.2	19.0
魚介類	67.7	63.5	49.6	64.5	23.6	64.0
魚介加工品	42.2	42.0	16.3	42.7	18.2	42.2
肉類	65.2	67.0	53.3	67.3	34.1	67.0
ハム・ソーセージ類	18.1	21.0	11.2	21.1	34.6	20.6
卵類	25.2	28.4	33.2	28.1	24.9	28.4
乳類	265.3	149.1	316.8	154.7	138.0	165.6
油脂類	9.9	8.2	10.9	8.3	4.6	8.4
菓子類	127.0	48.8	56.0	63.2	96.7	62.2
嗜好飲料類	544.0	567.0	541.5	565.3	830.5	562.2
調味料・香辛料類	45.8	90.1	94.7	86.7	11.5	87.3

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果(g)

欠食状況別食品群別摂取量 標準誤差(20歳以上、男性、調査不能除く)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	62	369	19	411	2	429
総量	105.8	47.0	179.9	49.3	121.3	48.5
穀類	24.2	10.8	35.6	11.1	0.0	11.3
米・加工品	22.0	11.9	39.1	11.8	0.0	11.8
小麦・加工品	14.5	6.8	23.3	6.9	0.0	7.0
その他穀類	8.2	3.3	0.0	3.5	0.0	3.4
いも類	5.7	4.4	15.2	4.2	0.7	4.0
砂糖・甘味料類	0.9	0.6	2.8	0.5	0.0	0.5
豆類	9.9	4.5	21.8	4.3	53.8	4.4
種実類	0.4	1.0	0.7	0.9	0.0	0.8
野菜類	20.5	9.1	44.4	9.2	24.3	8.8
緑黄色野菜	8.6	6.4	25.0	5.7	4.7	5.8
その他野菜	15.3	5.6	25.5	5.9	27.3	5.3
野菜ジュース	4.3	4.5	0.0	4.0	1.8	3.9
漬物	1.8	1.5	0.7	1.4	0.0	1.4
果実類	8.3	7.4	24.8	6.8	0.0	6.7
きのこ類	6.3	1.8	4.6	1.8	2.4	1.7
藻類	1.2	1.6	3.9	1.5	3.8	1.5
魚介類	8.5	5.3	8.8	4.6	18.9	4.8
魚介加工品	4.0	3.2	5.1	2.9	0.0	2.9
肉類	12.2	3.7	25.6	4.3	21.5	4.1
ハム・ソーセージ類	2.2	1.3	3.9	1.1	0.0	1.1
卵類	3.0	1.6	5.1	1.6	2.8	1.4
乳類	16.5	8.3	43.6	7.8	39.8	7.3
油脂類	1.0	0.8	2.3	0.7	3.2	0.7
菓子類	4.1	2.6	10.6	2.2	0.7	2.3
嗜好飲料類	97.9	34.0	165.3	38.0	254.4	37.2
調味料・香辛料類	8.5	7.9	4.8	7.4	12.1	7.1

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別食品群別摂取量 標準誤差(20歳以上、女性)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	52	443	23	472	5	490
総量	135.3	43.4	185.4	47.6	356.1	48.8
穀類	10.4	6.3	34.6	6.3	15.0	6.3
米・加工品	12.5	7.5	22.2	7.3	25.2	7.2
小麦・加工品	11.7	4.3	20.9	4.2	19.7	4.2
その他穀類	3.8	2.4	1.2	2.2	5.1	2.2
いも類	6.3	3.6	15.8	3.3	6.3	3.2
砂糖・甘味料類	1.5	0.4	2.6	0.4	1.4	0.4
豆類	8.5	5.0	17.7	5.1	39.5	5.0
種実類	0.9	0.5	1.6	0.5	0.4	0.5
野菜類	22.6	9.3	32.4	9.0	35.3	9.3
緑黄色野菜	13.9	5.5	19.5	5.2	24.7	5.2
その他野菜	13.7	5.2	15.1	5.3	17.1	5.4
野菜ジュース	5.2	2.1	13.1	2.2	0.0	2.1
漬物	1.2	1.4	3.8	1.3	3.4	1.3
果実類	21.2	8.3	28.0	8.3	88.6	8.1
きのこ類	6.6	1.3	3.4	1.5	6.3	1.4
藻類	1.7	1.0	2.5	1.0	2.6	0.9
魚介類	8.2	3.4	11.0	3.7	11.2	3.7
魚介加工品	5.2	1.9	4.4	2.1	7.8	2.1
肉類	10.5	3.3	11.7	3.3	15.9	3.3
ハム・ソーセージ類	2.1	1.2	2.4	1.1	14.1	1.1
卵類	2.8	1.5	6.5	1.4	8.1	1.4
乳類	41.9	6.4	65.8	7.5	69.3	8.8
油脂類	1.5	0.5	2.2	0.5	0.7	0.5
菓子類	27.1	2.5	11.8	3.6	43.1	3.6
嗜好飲料類	101.0	32.4	110.3	35.6	243.2	34.6
調味料・香辛料類	5.0	6.2	20.0	5.8	5.7	5.8

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別食品群別摂取量 中央値(20歳以上、男性、調査不能除く)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	62	369	19	411	2	429
総量	2025.3	2499.6	1891.4	2448.1	2134.0	2436.1
穀類	404.7	465.0	396.8	461.4	300.0	460.0
米・加工品	255.0	333.0	260.0	330.0	300.0	326.9
小麦・加工品	52.2	78.0	49.0	79.8	0.0	77.5
その他穀類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
いも類	9.0	37.5	3.1	30.0	3.0	30.0
砂糖・甘味料類	4.2	5.0	4.8	4.9	6.0	4.9
豆類	12.7	45.0	0.0	40.0	75.0	37.5
種実類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	198.0	303.2	171.7	287.0	93.5	283.5
緑黄色野菜	60.8	82.5	60.0	80.7	6.6	81.2
その他野菜	108.0	180.4	97.6	170.0	84.4	167.8
野菜ジュース	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
漬物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
果実類	0.0	83.8	0.0	72.0	0.0	69.0
きのこ類	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0
藻類	0.0	3.6	1.5	2.8	5.3	2.6
魚介類	30.0	70.0	0.0	67.9	26.4	63.0
魚介加工品	2.8	15.0	0.0	13.0	0.0	12.5
肉類	75.7	100.0	75.0	96.2	70.0	95.0
ハム・ソーセージ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	6.4	35.0	17.0	30.0	15.9	30.0
乳類	11.5	75.0	50.0	60.0	65.5	55.0
油脂類	8.4	10.5	6.6	10.5	12.5	10.0
菓子類	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0
嗜好飲料類	757.5	896.0	360.0	896.0	1404.5	880.4
調味料・香辛料類	52.2	77.4	42.6	75.5	26.1	74.6

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

欠食状況別食品群別摂取量 中央値(20歳以上,女性)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし	欠食あり	欠食なし
対象者数	52	443	23	472	5	490
総量	1900.7	2151.3	1778.4	2129.7	1879.4	2114.7
穀類	264.3	360.0	220.5	350.2	210.0	347.5
米・加工品	150.0	220.0	150.0	214.0	150.0	210.0
小麦・加工品	63.5	75.0	63.0	75.0	60.0	75.0
その他穀類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
いも類	4.8	30.0	6.0	28.3	0.0	28.8
砂糖・甘味料類	3.6	5.0	7.0	5.0	1.5	5.0
豆類	0.0	45.0	40.0	40.0	5.0	40.0
種実類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	190.8	281.6	189.3	274.9	230.1	272.7
緑黄色野菜	52.8	96.8	67.2	91.0	144.5	89.8
その他野菜	132.7	162.0	103.2	162.3	101.5	158.8
野菜ジュース	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
漬物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
果実類	0.0	108.0	3.0	100.0	249.0	98.2
きのこ類	0.0	6.0	0.0	5.1	0.0	5.0
藻類	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	1.4
魚介類	50.6	60.5	64.0	58.9	11.0	60.3
魚介加工品	4.0	7.0	0.5	8.7	0.0	7.0
肉類	60.0	75.0	50.0	72.3	62.8	71.9
ハム・ソーセージ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	8.3	37.7	1.1	32.1	43.0	31.3
乳類	60.8	100.0	80.0	100.0	0.0	100.0
油脂類	6.6	8.2	5.0	8.3	5.0	8.1
菓子類	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0
嗜好飲料類	580.0	705.6	570.0	700.0	240.0	696.5
調味料・香辛料類	41.5	62.0	51.2	60.5	29.4	60.5

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別栄養素等摂取量 平均値(20歳以上、男性、欠食除外、調査不能除く)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	50	319	208	203	67	362
エネルギー(kcal)	2175	2130	2090	2099	1987	2092
たんぱく質(g)	77.0	79.4	75.2	79.1	70.0	77.6
うち動物性(g)	42.8	42.7	41.2	42.4	40.2	41.7
脂質(g)	68.1	62.2	64.0	60.4	61.0	61.8
うち動物性(g)	32.2	31.7	32.2	30.4	30.8	31.2
飽和脂肪酸(g)	18.4	16.3	16.8	15.9	16.2	16.2
一価不飽和脂肪酸(g)	24.8	21.5	22.8	20.8	22.5	21.5
多価不飽和脂肪酸(g)	14.7	13.5	13.8	13.2	13.5	13.3
n-6系脂肪酸(g)	2.2	2.5	2.3	2.6	2.2	2.5
n-3系脂肪酸(g)	12.3	10.8	11.2	10.4	11.1	10.6
炭水化物(g)	281.0	287.5	275.3	284.8	262.4	280.4
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	10.5	11.3	10.8	11.2	9.9	11.1
食塩(g/1, 000kcal)	5.0	5.4	5.3	5.4	5.1	5.4
カリウム(mg)	2273	2676	2369	2704	2045	2599
カルシウム(mg)	467	580	499	595	418	563
マグネシウム(mg)	251	288	258	293	230	279
リン(mg)	1061	1127	1041	1144	971	1100
鉄(mg)	7.5	8.9	7.9	9.1	7.2	8.6
亜鉛(mg)	8.7	9.3	9.0	9.0	8.6	9.0
銅(mg)	1.17	1.32	1.18	1.34	1.10	1.27
マンガン(mg)	3.61	4.08	3.66	4.16	3.40	3.95
ヨウ素(μg)	795	1830	1450	1624	672	1657
セレン(μg)	59	51	50	51	54	50
クロム(μg)	6	6	6	7	5	6
モリブデン(μg)	159	195	176	192	173	184
ビタミンA(μgRE)	468	562	519	556	610	554
ビタミンD(μg)	4.8	8.4	6.8	9.0	4.5	8.3
ビタミンE(mg)	7.4	7.5	7.1	7.6	6.6	7.4
ビタミンK(μg)	227	309	256	313	220	292
ビタミンB1(mg)	0.92	1.02	0.96	1.01	0.84	1.00
ビタミンB2(mg)	1.16	1.33	1.21	1.34	1.19	1.28
ナイアシン(mgNE)	18.1	17.8	17.2	17.9	16.0	17.5
ビタミンB6(mg)	1.19	1.37	1.23	1.38	1.11	1.33
ビタミンB12(μg)	5.3	7.2	6.2	7.8	7.2	6.9
葉酸(μg)	285	350	301	360	285	338
パントテン酸(mg)	5.61	6.33	5.81	6.30	5.40	6.15
ビオチン(μg)	22.7	26.7	24.9	26.7	27.1	25.9
ビタミンC(mg)	81	121	95	126	84	114
コレステロール(mg)	324	330	318	325	351	314
食物繊維総量(g)	13.5	16.8	14.4	17.1	11.3	16.4
うち水溶性(g)	3.3	3.8	3.3	4.0	2.5	3.8
うち不溶性(g)	9.8	12.3	10.6	12.6	8.1	12.1
脂肪エネルギー比率(%)	27.5	26.1	27.2	25.7	27.0	26.4
炭水化物エネルギー比率(%)	58.2	58.9	58.4	59.2	58.6	58.7
動物性たんぱく質比率(%)	53.3	52.4	52.6	52.4	55.3	52.1
穀類エネルギー比率(%)	43.5	40.7	42.5	40.1	43.4	40.9

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別栄養素等摂取量 平均値(20歳以上、女性、欠食除外)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	28	415	143	329	44	446
エネルギー(kcal)	1783	1753	1719	1751	1770	1734
たんぱく質(g)	72.6	67.0	64.8	67.3	66.8	66.5
うち動物性(g)	44.2	34.7	35.4	35.1	36.7	35.0
脂質(g)	61.9	54.6	56.3	54.8	57.4	55.1
うち動物性(g)	31.5	26.5	28.5	26.5	28.2	27.0
飽和脂肪酸(g)	17.0	14.9	15.8	15.1	14.9	15.4
一価不飽和脂肪酸(g)	21.3	18.4	19.2	18.4	20.0	18.5
多価不飽和脂肪酸(g)	12.7	11.6	11.4	11.6	12.9	11.5
n-6系脂肪酸(g)	2.2	2.1	2.0	2.2	2.5	2.1
n-3系脂肪酸(g)	10.2	9.4	9.3	9.4	10.3	9.3
炭水化物(g)	225.7	241.8	228.9	241.3	238.3	236.3
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	9.3	9.6	9.2	9.5	9.1	9.5
食塩(g/1, 000kcal)	5.4	5.6	5.5	5.6	5.2	5.6
カリウム(mg)	2267	2436	2184	2487	2096	2417
カルシウム(mg)	517	533	482	554	489	537
マグネシウム(mg)	232	253	226	258	225	250
リン(mg)	1007	976	931	990	955	973
鉄(mg)	7.0	8.1	7.2	8.2	7.7	7.9
亜鉛(mg)	8.4	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6
銅(mg)	1.07	1.15	1.04	1.16	1.09	1.12
マンガン(mg)	3.06	3.68	3.28	3.71	3.51	3.57
ヨウ素(μg)	1086	1795	1308	1727	525	1702
セレン(μg)	57	42	43	41	46	42
クロム(μg)	5	6	5	6	5	6
モリブデン(μg)	128	156	137	156	151	149
ビタミンA(μgRE)	513	559	578	530	685	536
ビタミンD(μg)	6.3	7.1	5.6	7.8	7.8	7.2
ビタミンE(mg)	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9
ビタミンK(μg)	236	289	242	293	265	276
ビタミンB1(mg)	0.83	0.88	0.82	0.88	0.79	0.87
ビタミンB2(mg)	1.12	1.24	1.20	1.24	1.21	1.23
ナイアシン(mgNE)	15.5	14.3	13.9	14.4	14.8	14.2
ビタミンB6(mg)	1.16	1.16	1.04	1.18	1.01	1.15
ビタミンB12(μg)	5.2	5.9	5.4	5.9	7.4	5.7
葉酸(μg)	287	337	298	337	324	324
パントテン酸(mg)	5.45	5.59	5.31	5.63	5.26	5.54
ビオチン(μg)	20.9	25.3	24.7	24.7	28.2	24.6
ビタミンC(mg)	96	126	103	129	109	120
コレステロール(mg)	303	290	310	286	323	288
食物繊維総量(g)	13.6	16.0	13.5	16.4	13.0	15.7
うち水溶性(g)	3.2	3.7	3.2	3.8	3.0	3.7
うち不溶性(g)	9.7	11.7	9.7	12.1	9.4	11.5
脂肪エネルギー比率(%)	30.6	27.6	29.2	27.7	29.1	28.2
炭水化物エネルギー比率(%)	52.9	56.9	55.5	56.7	55.6	56.3
動物性たんぱく質比率(%)	58.6	50.8	53.4	51.1	54.2	51.7
穀類エネルギー比率(%)	37.9	38.3	38.6	37.6	41.2	37.3

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別栄養素等摂取量 標準偏差(20歳以上、男性、欠食除外、調査不能除く)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	50	319	208	203	67	362
エネルギー(kcal)	646	507	569	490	571	533
たんぱく質(g)	25.0	22.0	24.6	21.2	22.5	23.4
うち動物性(g)	21.7	17.5	20.2	16.5	20.1	18.2
脂質(g)	32.9	22.8	26.4	23.0	29.2	24.0
うち動物性(g)	17.8	16.4	18.8	15.3	17.2	17.1
飽和脂肪酸(g)	10.2	7.3	8.3	7.0	8.6	7.5
一価不飽和脂肪酸(g)	13.0	9.1	10.4	9.4	12.2	9.4
多価不飽和脂肪酸(g)	7.7	5.5	6.3	5.6	7.9	5.5
n-6系脂肪酸(g)	1.2	1.5	1.3	1.7	1.2	1.6
n-3系脂肪酸(g)	6.8	4.7	5.5	4.7	7.0	4.7
炭水化物(g)	86.2	75.2	81.0	73.0	82.4	77.4
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	3.6	3.5	3.5	3.6	3.1	3.7
食塩(g/1, 000kcal)	1.8	1.6	1.8	1.6	1.3	1.8
カリウム(mg)	934	969	921	998	886	983
カルシウム(mg)	276	323	283	333	271	317
マグネシウム(mg)	90	99	89	104	87	101
リン(mg)	377	351	368	346	377	359
鉄(mg)	2.8	3.0	2.8	3.2	2.5	3.1
亜鉛(mg)	2.8	3.0	3.2	2.7	3.0	3.0
銅(mg)	0.44	0.39	0.37	0.43	0.40	0.41
マンガン(mg)	1.49	1.58	1.63	1.46	1.28	1.61
ヨウ素(μg)	2446	6262	5359	5827	1568	5943
セレン(μg)	35	33	34	32	40	32
クロム(μg)	4	4	4	3	3	4
モリブデン(μg)	63	89	82	92	87	87
ビタミンA(μgRE)	379	452	548	368	1375	483
ビタミンD(μg)	5.2	8.1	7.6	8.4	4.6	8.4
ビタミンE(mg)	3.8	3.6	3.5	3.6	3.3	3.6
ビタミンK(μg)	171	209	181	215	177	207
ビタミンB1(mg)	0.41	0.45	0.45	0.43	0.41	0.44
ビタミンB2(mg)	0.55	0.52	0.53	0.52	0.58	0.53
ナイアシン(mgNE)	7.7	7.9	8.1	7.5	8.2	7.7
ビタミンB6(mg)	0.62	0.52	0.53	0.50	0.57	0.52
ビタミンB12(μg)	4.4	6.6	5.8	7.3	8.8	6.7
葉酸(μg)	120	142	135	143	201	146
パントテン酸(mg)	2.01	2.06	2.17	1.98	2.36	2.06
ビオチン(μg)	8.9	11.3	13.3	10.5	39.2	12.2
ビタミンC(mg)	63	77	72	77	69	77
コレステロール(mg)	186	169	187	156	200	165
食物繊維総量(g)	6.2	7.0	6.2	7.4	5.1	7.0
うち水溶性(g)	1.7	1.7	1.5	1.8	1.4	1.7
うち不溶性(g)	4.7	5.4	4.9	5.5	3.7	5.4
脂肪エネルギー比率(%)	7.7	6.9	7.0	7.3	8.0	7.2
炭水化物エネルギー比率(%)	8.2	7.9	8.0	8.2	8.4	8.2
動物性たんぱく質比率(%)	14.7	12.1	13.6	12.5	14.3	12.9
穀類エネルギー比率(%)	13.0	12.5	12.2	12.5	12.9	12.6

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別栄養素等摂取量 標準偏差(20歳以上、女性、欠食除外)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	28	415	143	329	44	446
エネルギー(kcal)	411	471	433	466	451	485
たんぱく質(g)	17.5	18.6	17.3	18.7	18.1	18.7
うち動物性(g)	18.4	14.2	14.4	14.8	14.3	14.6
脂質(g)	23.4	22.6	21.8	23.0	19.4	23.6
うち動物性(g)	17.0	14.5	14.9	15.1	14.7	15.3
飽和脂肪酸(g)	8.1	7.8	8.3	8.4	6.7	8.6
一価不飽和脂肪酸(g)	8.9	8.7	8.3	8.7	8.4	8.8
多価不飽和脂肪酸(g)	5.6	5.3	4.9	5.4	5.0	5.5
n-6系脂肪酸(g)	1.6	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4
n-3系脂肪酸(g)	4.7	4.6	4.2	4.5	4.2	4.6
炭水化物(g)	55.7	69.2	62.9	68.8	69.5	71.5
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	3.1	3.5	3.3	3.4	3.5	3.5
食塩(g/1, 000kcal)	2.4	1.6	1.7	1.7	1.5	1.7
カリウム(mg)	605	915	772	954	821	913
カルシウム(mg)	240	269	249	286	269	284
マグネシウム(mg)	55	90	75	92	85	89
リン(mg)	205	299	274	306	284	303
鉄(mg)	2.0	3.1	2.7	3.1	2.7	3.1
亜鉛(mg)	2.3	2.5	2.6	2.4	2.4	2.5
銅(mg)	0.29	0.38	0.35	0.38	0.33	0.38
マンガン(mg)	1.33	1.80	2.05	1.60	1.41	1.82
ヨウ素(μg)	4544	7356	6084	7324	1504	7179
セレン(μg)	37	28	30	27	35	28
クロム(μg)	3	3	3	3	3	3
モリブデン(μg)	61	83	77	83	83	82
ビタミンA(μgRE)	390	558	739	401	1041	490
ビタミンD(μg)	7.7	7.4	6.2	8.6	9.7	7.8
ビタミンE(mg)	2.7	3.5	3.2	3.6	2.8	3.6
ビタミンK(μg)	173	197	167	200	198	193
ビタミンB1(mg)	0.30	0.36	0.32	0.37	0.29	0.36
ビタミンB2(mg)	0.38	0.52	0.53	0.52	0.46	0.53
ナイアシン(mgNE)	7.5	6.1	5.9	6.1	7.1	6.0
ビタミンB6(mg)	0.52	0.44	0.41	0.46	0.41	0.45
ビタミンB12(μg)	2.9	5.6	5.4	5.4	6.4	5.4
葉酸(μg)	109	152	157	146	174	149
パントテン酸(mg)	1.43	1.82	1.66	1.86	1.98	1.82
ビオチン(μg)	7.1	15.9	21.4	11.7	31.5	13.4
ビタミンC(mg)	64	88	86	87	84	85
コレステロール(mg)	155	156	176	155	165	161
食物繊維総量(g)	4.6	6.8	5.0	7.1	5.9	6.8
うち水溶性(g)	1.3	1.7	1.3	1.8	1.4	1.7
うち不溶性(g)	3.0	5.0	3.6	5.3	4.2	5.1
脂肪エネルギー比率(%)	7.2	7.1	7.5	7.2	7.4	7.5
炭水化物エネルギー比率(%)	7.9	7.6	7.8	7.9	7.3	8.1
動物性たんぱく質比率(%)	15.6	12.1	11.5	12.9	11.7	12.7
穀類エネルギー比率(%)	10.5	12.1	11.5	12.2	11.7	12.2

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別栄養素等摂取量 標準誤差(20歳以上、男性、欠食除外、調査不能除く)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	50	319	208	203	67	362
エネルギー(kcal)	100	25	43	22	80	25
たんぱく質(g)	3.5	1.4	1.9	1.7	3.2	1.5
うち動物性(g)	3.1	1.1	1.7	1.4	2.8	1.2
脂質(g)	4.4	1.2	1.7	1.6	3.6	1.3
うち動物性(g)	2.2	0.8	1.2	1.1	1.8	0.8
飽和脂肪酸(g)	1.4	0.3	0.5	0.5	1.0	0.4
一価不飽和脂肪酸(g)	1.8	0.5	0.7	0.7	1.5	0.6
多価不飽和脂肪酸(g)	1.1	0.3	0.5	0.4	0.9	0.3
n-6系脂肪酸(g)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
n-3系脂肪酸(g)	1.0	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3
炭水化物(g)	11.8	4.4	6.5	4.7	10.6	4.3
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2
食塩(g/1, 000kcal)	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
カリウム(mg)	115	61	75	79	124	62
カルシウム(mg)	30	21	20	30	36	22
マグネシウム(mg)	11	6	7	7	12	6
リン(mg)	49	22	29	29	55	23
鉄(mg)	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2
亜鉛(mg)	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2
銅(mg)	0.07	0.02	0.03	0.03	0.05	0.02
マンガン(mg)	0.21	0.12	0.16	0.11	0.18	0.11
ヨウ素(μg)	291	336	432	402	241	321
セレン(μg)	5	2	3	3	6	2
クロム(μg)	1	0.2	0.3	0.3	1	0.3
モリブデン(μg)	9	6	6	6	13	5
ビタミンA(μgRE)	53	29	35	30	155	29
ビタミンD(μg)	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
ビタミンE(mg)	0.6	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2
ビタミンK(μg)	26	11	13	13	26	11
ビタミンB1(mg)	0.05	0.02	0.03	0.03	0.06	0.02
ビタミンB2(mg)	0.08	0.03	0.04	0.04	0.09	0.03
ナイアシン(mgNE)	1.1	0.5	0.6	0.7	1.1	0.5
ビタミンB6(mg)	0.09	0.03	0.04	0.04	0.08	0.03
ビタミンB12(μg)	0.6	0.4	0.4	0.5	1.1	0.5
葉酸(μg)	17	8	11	10	34	9
パントテン酸(mg)	0.25	0.11	0.17	0.12	0.43	0.10
ビオチン(μg)	1.1	0.8	1.0	0.7	5.7	0.8
ビタミンC(mg)	9	5	6	6	9	5
コレステロール(mg)	28	13	16	10	26	11
食物繊維総量(g)	0.7	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4
うち水溶性(g)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
うち不溶性(g)	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3
脂肪エネルギー比率(%)	0.8	0.4	0.5	0.7	0.9	0.4
炭水化物エネルギー比率(%)	0.9	0.5	0.6	0.8	0.9	0.5
動物性たんぱく質比率(%)	1.9	0.7	1.1	0.9	2.0	0.8
穀類エネルギー比率(%)	2.2	0.9	1.1	1.0	1.8	0.9

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別栄養素等摂取量 標準誤差(20歳以上、女性、欠食除外)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	28	415	143	329	44	446
エネルギー(kcal)	83	27	44	26	64	30
たんぱく質(g)	3.3	1.0	1.5	1.0	2.4	1.0
うち動物性(g)	3.4	0.8	1.1	1.0	2.0	0.8
脂質(g)	4.7	1.5	1.9	1.3	3.0	1.4
うち動物性(g)	3.1	0.9	1.3	0.9	2.3	0.8
飽和脂肪酸(g)	1.5	0.5	0.8	0.5	1.1	0.5
一価不飽和脂肪酸(g)	1.8	0.6	0.8	0.6	1.2	0.5
多価不飽和脂肪酸(g)	1.0	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3
n-6系脂肪酸(g)	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
n-3系脂肪酸(g)	0.8	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2
炭水化物(g)	11.2	3.6	6.6	4.0	10.6	4.4
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	0.5	0.1	0.3	0.2	0.5	0.2
食塩(g/1, 000kcal)	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1
カリウム(mg)	115	48	87	54	114	54
カルシウム(mg)	47	13	24	15	48	15
マグネシウム(mg)	9	5	7	5	13	5
リン(mg)	37	14	25	17	45	16
鉄(mg)	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
亜鉛(mg)	0.4	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1
銅(mg)	0.05	0.02	0.03	0.02	0.05	0.02
マンガン(mg)	0.24	0.11	0.23	0.11	0.20	0.11
ヨウ素(μg)	869	418	485	447	234	405
セレン(μg)	6	1	3	1	5	1
クロム(μg)	1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2
モリブデン(μg)	13	4	5	4	11	4
ビタミンA(μgRE)	77	26	65	25	127	27
ビタミンD(μg)	1.6	0.4	0.5	0.4	1.4	0.4
ビタミンE(mg)	0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2
ビタミンK(μg)	33	11	14	13	32	11
ビタミンB1(mg)	0.06	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02
ビタミンB2(mg)	0.07	0.02	0.05	0.03	0.07	0.02
ナイアシン(mgNE)	1.3	0.4	0.5	0.4	0.9	0.3
ビタミンB6(mg)	0.10	0.02	0.04	0.03	0.05	0.03
ビタミンB12(μg)	0.6	0.3	0.5	0.3	0.9	0.3
葉酸(μg)	21	9	17	10	25	9
パントテン酸(mg)	0.29	0.09	0.14	0.11	0.27	0.10
ビオチン(μg)	1.5	0.8	1.8	0.8	3.8	0.8
ビタミンC(mg)	12	5	10	5	12	6
コレステロール(mg)	29	8	19	9	25	9
食物繊維総量(g)	0.9	0.4	0.6	0.5	1.0	0.4
うち水溶性(g)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
うち不溶性(g)	0.6	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3
脂肪エネルギー比率(%)	1.4	0.5	0.6	0.5	1.2	0.4
炭水化物エネルギー比率(%)	1.5	0.4	0.6	0.4	1.2	0.4
動物性たんぱく質比率(%)	2.8	0.8	0.8	0.9	1.8	0.7
穀類エネルギー比率(%)	2.1	0.7	0.8	0.7	1.6	0.7

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別栄養素等摂取量 中央値(20歳以上、男性、欠食除外、調査不能除く)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	50	319	208	203	67	362
エネルギー(kcal)	2064	2073	2051	2059	2045	2048
たんぱく質(g)	76.2	78.4	75.2	78.3	68.7	77.4
うち動物性(g)	37.0	40.7	38.7	41.2	36.4	40.0
脂質(g)	61.9	61.6	61.1	60.0	55.9	60.5
うち動物性(g)	28.9	29.6	29.1	28.8	27.0	28.9
飽和脂肪酸(g)	15.9	15.7	15.7	15.0	14.7	15.4
一価不飽和脂肪酸(g)	21.5	20.4	21.3	19.6	19.8	20.2
多価不飽和脂肪酸(g)	13.2	12.9	12.9	12.5	11.3	12.5
n-6系脂肪酸(g)	2.0	2.3	2.2	2.3	2.0	2.2
n-3系脂肪酸(g)	10.9	10.0	10.5	9.5	9.0	9.9
炭水化物(g)	279.4	281.6	268.9	282.3	262.4	275.4
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	10.9	10.9	10.6	10.7	9.5	10.7
食塩(g/1, 000kcal)	4.5	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1
カリウム(mg)	2129	2594	2223	2625	1959	2497
カルシウム(mg)	427	516	444	539	342	505
マグネシウム(mg)	226	277	248	283	222	269
リン(mg)	977	1098	1011	1119	920	1074
鉄(mg)	7.0	8.5	7.5	8.8	7.0	8.2
亜鉛(mg)	8.5	9.0	8.5	8.8	8.3	8.6
銅(mg)	1.04	1.29	1.17	1.30	1.01	1.25
マンガン(mg)	3.25	3.77	3.36	3.91	3.23	3.65
ヨウ素(μg)	72	83	72	68	81	65
セレン(μg)	50	43	43	43	45	42
クロム(μg)	5	6	5	6	4	6
モリブデン(μg)	155	186	159	177	151	173
ビタミンA(μgRE)	346	460	400	465	344	450
ビタミンD(μg)	2.8	5.9	3.6	6.1	2.8	5.6
ビタミンE(mg)	6.7	6.9	6.7	6.8	6.2	6.8
ビタミンK(μg)	183	263	209	279	162	247
ビタミンB1(mg)	0.87	0.94	0.90	0.96	0.73	0.92
ビタミンB2(mg)	1.12	1.25	1.12	1.27	1.01	1.21
ナイアシン(mgNE)	16.9	16.5	16.1	17.1	14.0	16.3
ビタミンB6(mg)	1.13	1.30	1.18	1.33	1.04	1.27
ビタミンB12(μg)	3.9	5.2	4.3	5.3	4.0	4.8
葉酸(μg)	263	336	291	351	257	323
パントテン酸(mg)	5.29	6.13	5.39	6.12	4.66	5.99
ビオチン(μg)	22.7	25.1	22.7	25.1	20.8	24.5
ビタミンC(mg)	61	101	74	111	62	90
コレステロール(mg)	314	306	287	306	334	295
食物繊維総量(g)	12.6	16.2	13.7	16.4	11.2	15.7
うち水溶性(g)	2.8	3.6	3.1	3.7	2.5	3.5
うち不溶性(g)	9.3	11.7	10.1	11.9	7.3	11.5
脂肪エネルギー比率(%)	27.5	25.8	26.8	25.5	26.1	25.9
炭水化物エネルギー比率(%)	58.2	59.0	58.8	59.5	60.2	58.7
動物性たんぱく質比率(%)	55.0	53.6	54.4	54.0	56.1	53.4
穀類エネルギー比率(%)	43.3	39.9	42.0	39.6	42.9	40.5

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別栄養素等摂取量 中央値(20歳以上、女性、欠食除外)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	28	415	143	329	44	446
エネルギー(kcal)	1741	1713	1733	1685	1888	1690
たんぱく質(g)	74.4	65.3	64.2	66.3	66.7	65.1
うち動物性(g)	46.8	33.3	33.9	33.8	35.3	33.4
脂質(g)	63.0	51.9	53.7	51.9	57.7	51.8
うち動物性(g)	29.6	23.9	26.3	24.4	24.3	24.5
飽和脂肪酸(g)	16.0	13.5	13.8	13.5	12.9	13.6
一価不飽和脂肪酸(g)	21.9	16.9	18.2	16.9	19.3	16.9
多価不飽和脂肪酸(g)	11.9	10.9	10.7	10.8	11.9	10.7
n-6系脂肪酸(g)	1.8	1.8	1.6	1.9	2.0	1.8
n-3系脂肪酸(g)	9.7	8.8	8.6	8.8	9.8	8.6
炭水化物(g)	222.5	234.1	226.5	231.4	245.3	229.2
食塩(g) (ナトリウム*2.54/1,000)	8.4	9.3	8.9	9.1	8.9	9.0
食塩(g/1, 000kcal)	4.7	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3
カリウム(mg)	2209	2283	2126	2351	1998	2277
カルシウム(mg)	517	491	474	520	484	498
マグネシウム(mg)	223	244	224	251	217	242
リン(mg)	975	936	889	965	902	930
鉄(mg)	6.6	7.6	6.7	7.8	6.9	7.4
亜鉛(mg)	8.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3
銅(mg)	1.05	1.10	1.01	1.13	1.10	1.09
マンガン(mg)	2.78	3.38	2.96	3.50	3.19	3.27
ヨウ素(μg)	73	55	55	60	41	60
セレン(μg)	44	35	38	34	41	35
クロム(μg)	4	5	5	5	5	5
モリブデン(μg)	114	142	120	138	134	135
ビタミンA(μgRE)	448	454	409	462	430	433
ビタミンD(μg)	3.8	4.3	2.9	4.8	4.0	4.3
ビタミンE(mg)	6.7	6.4	6.4	6.3	7.2	6.3
ビタミンK(μg)	203	246	190	254	232	226
ビタミンB1(mg)	0.82	0.81	0.77	0.82	0.77	0.81
ビタミンB2(mg)	1.05	1.15	1.13	1.14	1.16	1.14
ナイアシン(mgNE)	14.5	13.2	13.1	13.3	13.1	13.3
ビタミンB6(mg)	1.09	1.10	1.01	1.11	0.98	1.10
ビタミンB12(μg)	4.9	4.1	3.6	4.4	6.2	4.0
葉酸(μg)	275	320	269	324	301	309
パントテン酸(mg)	5.18	5.37	5.19	5.43	4.75	5.36
ビオチン(μg)	20.4	23.3	20.6	23.9	21.0	22.9
ビタミンC(mg)	68	109	71	112	75	105
コレステロール(mg)	263	279	283	278	341	269
食物繊維総量(g)	13.1	15.3	13.1	15.7	11.6	15.0
うち水溶性(g)	3.1	3.5	3.1	3.7	2.8	3.5
うち不溶性(g)	9.4	11.1	9.3	11.6	8.7	10.9
脂肪エネルギー比率(%)	30.6	27.3	29.7	27.1	28.0	27.6
炭水化物エネルギー比率(%)	51.3	57.3	55.1	57.2	56.7	56.4
動物性たんぱく質比率(%)	61.0	51.6	52.9	52.6	56.3	52.4
穀類エネルギー比率(%)	37.6	37.9	37.3	37.2	38.5	37.2

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別食品群別摂取量 平均値(20歳以上、男性、欠食除外、調査不能除く)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	50	319	208	203	67	362
総量	2421.7	2582.1	2409.9	2617.5	2315.1	2520.1
穀類	505.3	476.5	482.3	465.9	470.3	469.1
米・加工品	342.2	353.0	347.4	341.9	351.5	339.4
小麦・加工品	142.9	110.8	122.9	107.0	108.8	115.2
その他穀類	20.2	12.6	12.1	17.0	10.0	14.6
いも類	30.7	61.5	47.1	59.5	26.8	58.8
砂糖・甘味料類	4.6	7.7	6.5	7.7	6.0	7.3
豆類	44.2	74.1	54.4	78.0	34.7	70.8
種実類	3.2	3.9	2.8	4.1	1.5	3.7
野菜類	264.7	342.4	300.2	342.8	205.2	339.5
緑黄色野菜	70.4	111.9	91.6	112.9	55.1	110.6
その他野菜	152.6	200.1	179.5	197.6	119.7	199.6
野菜ジュース	31.1	18.0	19.7	17.8	18.5	17.9
漬物	10.5	12.4	9.4	14.4	11.8	11.4
果実類	72.3	124.2	80.2	137.7	88.2	111.6
きのこ類	16.4	18.7	14.6	23.1	4.3	21.2
藻類	9.0	13.2	10.3	12.8	12.1	11.3
魚介類	74.5	84.3	69.2	96.9	70.1	82.4
魚介加工品	22.6	35.6	26.0	39.0	20.2	33.9
肉類	130.3	109.9	127.1	93.4	114.9	110.5
ハム・ソーセージ類	19.6	14.6	15.4	13.6	16.9	14.0
卵類	29.6	35.1	31.3	33.4	38.7	30.9
乳類	119.8	130.1	117.5	124.4	104.2	125.6
油脂類	14.7	11.6	13.5	10.7	14.0	11.6
菓子類	26.9	20.0	17.0	23.6	22.0	19.7
嗜好飲料類	984.8	955.0	908.7	1011.5	1004.9	936.7
調味料・香辛料類	90.6	114.1	127.0	91.9	97.3	109.2

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別食品群別摂取量 平均値(20歳以上、女性、欠食除外)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	28	415	143	329	44	446
総量	2100.8	2247.0	2105.8	2267.1	2235.5	2201.8
穀類	363.6	365.6	354.8	359.8	401.2	350.6
米・加工品	249.7	249.3	241.4	244.4	283.9	236.7
小麦・加工品	98.1	103.0	103.3	100.7	117.2	99.8
その他穀類	15.8	13.3	10.0	14.7	0.1	14.0
いも類	31.7	49.3	27.8	53.1	34.2	47.7
砂糖・甘味料類	7.3	7.6	8.1	7.2	8.1	7.6
豆類	38.4	70.6	52.4	70.8	60.5	66.2
種実類	3.8	3.5	2.2	4.0	3.8	3.4
野菜類	290.0	309.3	276.7	314.2	234.1	307.1
緑黄色野菜	95.0	115.7	97.6	115.9	91.3	111.8
その他野菜	154.3	175.3	160.1	179.6	130.4	175.6
野菜ジュース	29.4	7.9	9.8	8.6	3.1	9.9
漬物	11.3	10.3	9.2	10.1	9.2	9.8
果実類	88.8	149.4	115.3	152.7	100.9	141.2
きのこ類	12.8	16.0	14.4	17.8	8.3	17.2
藻類	16.8	9.7	10.6	9.5	11.5	9.6
魚介類	88.7	67.8	62.4	71.6	78.5	68.0
魚介加工品	26.0	28.3	21.9	31.8	25.6	28.3
肉類	110.5	80.7	93.7	77.9	80.9	82.1
ハム・ソーセージ類	12.8	12.3	10.9	12.7	13.4	11.6
卵類	26.6	33.5	30.8	32.3	33.5	31.4
乳類	158.0	130.7	126.9	139.9	121.8	138.3
油脂類	12.1	9.6	11.5	9.2	11.7	9.7
菓子類	25.2	29.7	39.3	30.8	28.9	33.3
嗜好飲料類	763.4	819.9	776.4	833.0	929.4	798.9
調味料・香辛料類	62.8	93.9	102.6	83.3	88.1	89.2

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別食品群別摂取量 標準偏差(20歳以上、男性、欠食除外、調査不能除く)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	50	319	208	203	67	362
総量	730.0	785.5	765.2	781.7	736.6	803.1
穀類	182.8	166.5	172.1	160.0	169.6	167.9
米・加工品	167.9	188.0	185.6	179.3	172.4	184.6
小麦・加工品	108.6	114.0	117.1	112.6	99.6	117.7
その他穀類	80.7	52.0	47.6	67.8	57.9	57.2
いも類	45.2	75.6	68.2	68.9	38.0	73.5
砂糖・甘味料類	6.1	9.9	7.5	10.7	6.3	9.8
豆類	76.7	85.1	67.9	90.5	53.9	85.1
種実類	9.4	12.4	10.3	12.6	5.0	12.0
野菜類	160.3	194.9	188.0	194.2	143.5	194.2
緑黄色野菜	68.5	100.2	92.0	94.7	64.3	96.7
その他野菜	105.7	131.1	127.7	133.3	94.9	132.7
野菜ジュース	72.6	76.6	85.2	59.3	59.2	74.2
漬物	18.4	21.7	15.6	24.4	19.8	20.4
果実類	125.0	138.6	123.7	139.3	138.0	133.9
きのこ類	32.1	32.5	32.7	37.8	8.5	37.6
藻類	13.2	23.7	16.6	26.1	16.7	22.4
魚介類	77.9	70.9	67.3	77.2	63.3	74.9
魚介加工品	38.6	45.2	40.5	45.9	32.3	44.7
肉類	84.7	89.6	95.0	75.9	94.9	88.7
ハム・ソーセージ類	33.8	24.4	24.5	25.9	32.7	23.4
卵類	30.2	31.0	32.1	30.2	35.2	30.0
乳類	196.4	171.0	182.1	149.9	206.2	162.8
油脂類	13.0	9.7	11.4	9.3	11.6	10.2
菓子類	50.1	41.1	39.8	43.0	48.7	40.4
嗜好飲料類	586.7	586.6	585.2	579.7	615.5	593.1
調味料・香辛料類	76.1	103.9	112.0	81.3	93.7	99.1

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別食品群別摂取量 標準偏差(20歳以上、女性、欠食除外)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	28	415	143	329	44	446
総量	593.2	738.5	796.4	694.1	808.1	733.5
穀類	139.4	139.1	138.4	135.0	146.4	138.1
米・加工品	151.8	145.7	152.7	141.9	150.8	144.1
小麦・加工品	83.3	93.6	88.9	93.3	98.8	92.1
その他穀類	47.5	49.0	36.2	52.5	0.8	49.4
いも類	50.0	62.7	36.8	65.3	47.6	61.7
砂糖・甘味料類	10.7	8.4	9.4	8.2	8.5	8.9
豆類	81.2	91.5	75.5	93.6	87.5	89.1
種実類	9.3	9.9	7.3	10.4	10.8	9.4
野菜類	144.7	163.7	142.8	171.2	146.5	164.8
緑黄色野菜	83.4	97.5	82.1	100.8	95.4	96.0
その他野菜	102.5	105.0	88.7	111.3	90.7	105.5
野菜ジュース	85.6	39.4	41.0	43.1	15.2	45.5
漬物	20.7	21.5	17.2	22.1	19.9	20.8
果実類	103.0	154.9	144.2	157.8	129.4	154.2
きのこ類	17.2	22.4	20.6	29.5	15.2	27.6
藻類	39.7	17.5	23.5	17.1	32.2	17.2
魚介類	89.3	61.2	63.2	65.0	65.8	63.8
魚介加工品	68.3	39.8	35.3	45.2	42.4	42.2
肉類	92.0	64.7	68.5	66.3	76.2	66.1
ハム・ソーセージ類	19.5	21.1	17.5	22.5	26.2	20.0
卵類	31.3	28.2	29.7	27.4	29.2	28.4
乳類	139.2	149.8	136.6	162.0	160.9	166.1
油脂類	9.7	8.1	9.5	7.6	8.1	8.5
菓子類	36.5	49.6	84.0	51.6	44.3	63.7
嗜好飲料類	471.5	573.2	692.7	500.2	639.1	553.5
調味料・香辛料類	35.4	92.4	100.2	79.6	88.1	87.3

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別食品群別摂取量 標準誤差(20歳以上、男性、欠食除外、調査不能除く)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	50	319	208	203	67	362
総量	106.7	49.6	67.0	54.1	119.5	50.2
穀類	31.1	11.5	16.0	12.9	19.8	11.9
米・加工品	27.2	13.7	17.0	14.0	18.3	13.5
小麦・加工品	18.1	7.0	8.9	8.8	13.2	8.1
その他穀類	15.2	3.1	4.1	5.0	6.9	3.6
いも類	6.0	5.1	5.2	5.0	4.9	4.8
砂糖・甘味料類	0.9	0.6	0.5	0.8	0.8	0.5
豆類	9.6	5.1	3.6	7.6	6.8	5.2
種実類	1.3	1.1	0.7	1.1	0.5	1.0
野菜類	22.3	10.6	13.0	14.4	17.8	10.1
緑黄色野菜	10.0	7.3	6.3	8.7	7.5	6.4
その他野菜	16.1	6.5	8.8	9.1	10.1	6.3
野菜ジュース	8.3	5.3	5.3	4.2	7.1	4.8
漬物	2.9	1.5	1.7	1.7	4.3	1.2
果実類	16.3	7.7	9.9	10.5	17.9	7.3
きのこ類	4.8	2.0	1.9	3.4	1.3	2.3
藻類	2.7	1.5	1.6	1.9	3.5	1.2
魚介類	11.8	5.3	5.2	6.7	7.4	5.6
魚介加工品	7.2	3.3	3.4	3.7	3.9	3.3
肉類	11.7	4.2	7.7	5.8	12.5	4.2
ハム・ソーセージ類	4.7	1.5	1.5	2.1	3.7	1.4
卵類	4.7	1.7	2.3	1.6	3.2	1.4
乳類	24.0	9.4	11.9	10.2	23.5	8.5
油脂類	2.0	0.7	1.0	0.8	1.4	0.8
菓子類	7.3	2.7	2.5	3.5	5.3	2.4
嗜好飲料類	95.4	34.4	55.5	38.5	95.7	38.3
調味料・香辛料類	11.8	8.8	9.7	7.1	13.2	7.7

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別食品群別摂取量 標準誤差(20歳以上、女性、欠食除外)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	28	415	143	329	44	446
総量	113.6	44.4	92.5	44.7	121.4	50.5
穀類	30.7	7.0	8.7	7.8	18.5	7.1
米・加工品	34.5	7.9	9.5	9.9	20.0	7.8
小麦・加工品	13.7	4.5	5.1	5.8	16.2	4.8
その他穀類	9.4	2.5	3.1	2.9	0.1	2.4
いも類	9.0	4.0	3.0	3.8	7.1	3.3
砂糖・甘味料類	1.8	0.4	1.0	0.5	1.5	0.5
豆類	15.3	5.4	7.1	6.0	12.7	5.2
種実類	1.7	0.5	0.7	0.6	1.7	0.4
野菜類	29.8	9.8	15.9	9.4	21.6	9.6
緑黄色野菜	15.2	6.0	8.2	6.7	14.6	5.3
その他野菜	20.6	5.4	8.9	5.7	13.2	6.1
野菜ジュース	15.8	1.9	3.7	2.4	2.3	2.4
漬物	4.2	1.3	1.5	1.6	2.9	1.2
果実類	17.6	8.8	15.7	10.0	15.2	9.0
きのこ類	2.6	1.4	1.8	2.1	2.1	1.6
藻類	7.5	0.7	1.9	0.9	5.2	0.8
魚介類	17.3	3.4	5.7	3.9	10.9	3.7
魚介加工品	13.2	2.0	3.1	2.3	7.3	2.0
肉類	16.7	3.7	5.4	3.8	10.2	3.4
ハム・ソーセージ類	3.6	1.3	1.8	1.3	4.2	1.3
卵類	5.4	1.5	2.0	1.5	4.3	1.4
乳類	29.4	7.0	13.3	9.5	29.7	8.8
油脂類	1.9	0.5	0.9	0.5	1.2	0.5
菓子類	7.9	2.7	10.0	3.0	7.8	3.8
嗜好飲料類	87.2	33.1	73.9	31.8	112.1	36.5
調味料・香辛料類	6.3	6.7	10.3	5.8	13.4	6.1

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別食品群別摂取量 中央値(20歳以上、男性、欠食除外、調査不能除く)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	50	319	208	203	67	362
総量	2374.9	2507.9	2327.9	2527.8	2322.4	2449.7
穀類	508.6	463.0	464.8	446.5	454.0	460.0
米・加工品	356.0	332.0	336.5	310.0	350.0	318.4
小麦・加工品	120.5	72.0	94.6	71.3	83.9	75.5
その他穀類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
いも類	4.7	44.4	23.9	44.4	9.0	39.2
砂糖・甘味料類	2.3	5.0	4.1	5.4	4.3	4.9
豆類	8.3	50.0	30.0	50.0	6.7	48.0
種実類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	245.5	311.0	264.9	329.0	201.9	307.7
緑黄色野菜	45.2	86.5	70.3	92.0	35.0	86.2
その他野菜	130.2	187.4	158.3	181.5	100.0	180.2
野菜ジュース	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
漬物	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
果実類	0.0	88.0	7.0	102.5	0.0	75.0
きのこ類	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.0
藻類	2.7	4.4	3.0	2.0	3.0	2.4
魚介類	53.9	72.0	51.0	91.0	60.0	64.5
魚介加工品	2.5	16.3	7.5	24.0	2.0	15.0
肉類	120.0	95.0	109.5	80.0	90.0	95.5
ハム・ソーセージ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	22.7	37.4	26.2	35.5	43.0	28.3
乳類	22.0	80.0	35.5	80.0	5.0	76.0
油脂類	12.5	10.0	11.2	9.3	11.9	10.0
菓子類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	876.3	900.0	874.0	919.0	900.0	877.5
調味料・香辛料類	60.9	78.7	82.1	68.3	65.0	76.3

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果

外食状況別食品群別摂取量 中央値(20歳以上、女性、欠食除外)(g)

	朝食		昼食		夕食	
	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし	外食あり	外食なし
対象者数	28	415	143	329	44	446
総量	2011.2	2157.9	2018.5	2231.0	1981.8	2119.1
穀類	360.0	360.0	341.0	358.0	384.0	345.0
米・加工品	210.0	220.0	200.0	220.0	263.6	200.0
小麦・加工品	77.5	75.0	87.5	74.0	99.0	74.3
その他穀類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
いも類	7.3	30.0	15.0	36.0	17.4	30.0
砂糖・甘味料類	2.7	5.3	5.3	5.0	5.8	5.0
豆類	3.5	50.0	20.0	50.0	30.0	40.0
種実類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野菜類	274.9	281.6	249.8	284.3	228.2	275.7
緑黄色野菜	94.5	96.8	83.8	94.0	41.3	91.0
その他野菜	129.2	163.0	155.5	165.0	114.4	163.0
野菜ジュース	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
漬物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
果実類	57.3	109.0	70.0	110.5	64.0	100.0
きのこ類	2.1	6.0	5.0	5.7	0.0	5.4
藻類	4.1	1.5	3.0	1.0	1.1	1.5
魚介類	66.3	60.0	51.1	63.5	82.5	58.9
魚介加工品	0.8	10.0	4.0	12.0	0.1	9.6
肉類	92.4	72.5	82.7	70.0	66.4	72.3
ハム・ソーセージ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
卵類	9.5	38.7	22.0	38.0	41.7	30.1
乳類	156.5	100.0	86.5	100.0	41.7	100.0
油脂類	9.5	8.0	9.3	8.0	11.9	8.0
菓子類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嗜好飲料類	684.0	705.6	604.5	750.0	810.8	683.5
調味料・香辛料類	53.5	63.6	70.9	58.0	59.2	60.6

3. 身体状況調査の結果

身長・体重(1歳以上、体重は妊婦除外、性・年齢階級別)

	男 性						女 性													
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)										
	人数	平均値	標準 偏差	中央値	人数	平均値	標準 偏差	中央値	人数	平均値	標準 偏差	中央値	人数	平均値	標準 偏差	中央値				
総 数	545	164.0	17.0	0.8	168.0	545	62.5	16.1	0.8	64.0	618	151.2	14.3	0.8	154.3	619	51.0	13.5	0.7	51.8
1歳	3	69.7	8.4	4.0	74.5	3	9.8	1.1	0.5	9.2	5	78.4	5.0	2.1	82.0	6	9.4	1.4	0.5	9.5
2歳	4	88.4	3.8	1.7	87.8	4	13.1	0.8	0.4	13.2	5	86.9	4.8	2.1	88.0	5	12.5	1.7	0.4	12.5
3歳	5	99.2	4.6	1.9	99.5	5	15.8	2.1	0.9	16.8	3	97.7	4.5	2.2	98.0	3	14.6	2.3	1.1	13.6
4歳	5	104.2	3.3	1.4	103.8	5	16.9	2.1	0.9	17.4	3	102.1	0.9	0.1	101.9	3	17.1	0.7	0.0	17.1
5歳	3	113.2	2.8	1.4	112.2	3	19.2	1.0	0.5	19.5	5	107.7	6.6	2.7	107.0	5	17.1	1.7	0.7	16.0
6歳	2	116.1	1.6	0.8	116.1	2	19.4	0.3	0.1	19.4	6	113.0	7.4	2.7	112.0	6	19.1	2.5	1.0	19.0
7歳	4	124.3	8.2	3.6	125.0	4	25.7	6.8	3.0	25.1	5	120.0	2.6	1.1	120.0	5	21.6	3.0	1.2	22.0
8歳	4	127.8	5.3	2.4	129.7	4	25.1	2.2	1.0	25.4	5	125.7	2.9	1.2	124.9	5	25.1	4.0	1.6	27.6
9歳	4	132.5	8.6	3.8	135.7	4	30.3	7.5	3.3	28.0	8	131.6	3.2	1.1	132.5	8	28.3	2.6	0.9	27.7
10歳	5	136.6	1.8	0.7	137.6	5	34.3	3.3	1.3	34.0	4	137.6	8.8	3.9	137.5	4	29.7	4.8	2.1	30.2
11歳	6	141.9	4.4	0.8	142.4	6	38.4	7.5	2.6	36.3	5	144.3	7.1	2.9	141.5	5	38.1	8.5	3.5	33.8
12歳	2	157.3	20.2	10.3	157.3	2	51.5	27.6	14.1	51.5	5	154.6	4.8	2.0	155.0	5	45.0	5.0	2.0	44.7
13歳	7	163.7	5.9	1.6	165.0	7	51.4	8.6	3.0	52.0	5	154.4	3.7	1.5	155.8	5	50.8	5.3	2.2	48.2
14歳	3	169.3	4.4	2.2	169.0	3	51.5	2.7	1.3	51.5	3	156.0	4.4	2.1	154.0	3	44.0	4.6	2.2	43.0
15歳	4	166.9	2.8	1.4	167.0	4	56.3	7.1	2.8	54.8	7	158.3	4.5	1.6	159.7	7	51.6	6.8	2.4	52.5
16歳	7	174.2	6.3	2.3	176.0	7	61.2	8.0	2.9	61.0	4	155.6	4.5	2.0	155.0	4	49.9	6.1	2.7	48.0
17歳	8	171.9	5.0	1.2	172.5	8	61.8	13.5	4.5	57.5	4	162.6	4.7	2.1	162.7	4	60.5	18.6	8.2	53.3
18歳	4	175.9	12.2	1.4	176.3	4	68.8	16.5	1.2	67.5	4	158.0	2.6	1.1	158.0	4	54.0	3.8	1.6	55.0
19歳	2	171.1	5.5	2.8	171.1	2	57.7	10.4	5.3	57.7	2	151.6	6.2	3.2	151.6	2	43.1	6.9	3.5	43.1
20歳	5	172.4	5.4	2.2	173.0	5	60.5	7.3	3.0	60.0	5	160.6	5.8	2.3	162.0	5	52.7	4.2	1.5	54.0
21歳	4	170.5	6.1	2.7	170.7	4	61.9	10.9	4.8	61.0	3	158.8	3.9	1.0	161.0	3	51.3	6.0	0.3	52.0
22歳	4	177.2	4.6	2.0	176.9	4	75.9	13.9	6.1	80.0	8	159.7	4.9	1.7	160.1	8	51.4	5.5	2.2	51.0
23歳	3	172.8	6.0	2.9	174.1	3	70.2	7.1	3.4	70.5	4	160.6	3.5	1.5	160.6	4	51.1	5.3	2.3	53.5
24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	163.0	-	-	163.0	1	79.0	-	-	79.0
25歳	5	167.4	4.7	1.9	169.0	5	64.3	10.3	4.2	58.5	9	157.6	6.2	2.1	158.7	9	55.1	14.9	5.2	50.0
26-29歳	16	171.1	5.5	1.0	171.6	16	67.3	12.5	3.2	65.0	12	158.3	7.2	2.0	157.8	12	54.9	11.3	3.2	53.8
30-39歳	48	172.7	5.0	0.8	172.2	49	70.3	12.1	1.9	68.0	54	157.3	5.3	0.7	157.0	53	54.9	12.0	1.8	50.3
40-49歳	68	170.7	5.5	0.6	171.1	68	71.2	12.8	1.3	69.6	81	158.9	5.0	0.4	158.0	81	58.0	9.6	1.1	57.0
50-59歳	82	170.4	5.8	0.5	170.0	82	69.5	10.8	1.2	68.7	77	157.2	4.3	0.4	157.0	77	54.1	10.7	1.2	52.7
60-69歳	97	167.9	5.7	0.5	168.3	96	66.2	8.6	0.7	65.0	116	153.2	5.2	0.5	153.5	116	55.0	8.6	0.5	54.0
70歳以上	131	163.4	6.2	0.7	165.0	131	61.4	9.0	0.9	61.5	160	150.1	6.9	0.5	150.0	161	51.4	9.2	0.7	50.6
(再掲)20歳以上	463	168.3	6.6	0.4	168.6	463	66.6	11.0	0.7	65.0	530	154.6	6.7	0.3	155.0	530	54.1	10.0	0.5	53.0
(再掲)20-39歳	85	172.2	5.3	0.6	172.0	86	68.7	11.9	1.6	66.6	96	158.1	5.5	0.5	157.8	95	54.5	11.3	1.5	52.0
(再掲)40-64歳	186	170.0	5.6	0.3	170.0	185	69.5	11.3	0.7	68.2	202	157.0	5.2	0.4	157.0	202	55.5	9.8	0.6	54.0
(再掲)65歳以上	192	164.8	6.5	0.6	166.0	192	62.9	9.1	0.7	63.0	232	151.1	6.6	0.5	151.7	233	52.8	9.4	0.5	52.0
(再掲)20-29歳	37	171.5	5.6	1.0	172.0	37	66.5	11.5	2.2	65.0	42	159.0	5.6	0.9	159.4	42	54.0	10.3	1.8	53.4
(再掲)60-64歳	36	167.8	5.3	1.1	168.2	35	66.3	8.6	1.4	64.9	44	153.0	5.0	0.8	153.0	44	53.4	7.6	1.0	53.2
(再掲)65-69歳	61	167.9	6.0	0.8	168.5	61	66.2	8.6	0.9	65.0	72	153.4	5.3	0.7	154.0	72	55.9	9.1	0.8	54.0
(再掲)70-74歳	49	164.7	6.4	1.0	167.0	49	63.0	8.4	1.3	62.0	74	152.5	6.3	0.9	152.3	73	52.3	8.5	1.0	50.6
(再掲)75-79歳	46	164.0	5.4	1.0	165.0	46	62.8	8.8	1.4	62.7	36	150.1	6.6	1.3	150.3	36	53.1	10.8	1.7	50.9
(再掲)80歳以上	36	160.9	6.3	0.8	160.0	36	57.4	9.0	1.3	56.9	50	146.5	6.7	0.9	147.0	52	48.9	8.7	1.0	50.8

3. 身体状況調査の結果

体型の状況(15歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)

低体重(やせ):BMI<18.5 普通:18.5≤BMI<25 肥満:BMI≥25

	総数				低体重(やせ)				普通				肥満			
	人数	割合	人数	割合	標準 偏差	標準 誤差	人数	割合	標準 偏差	標準 誤差	人数	割合	標準 偏差	標準 誤差	人数	割合
男 性	総 数	487	100.0	24	4.9	21.7	0.9	343	70.4	45.7	1.8	120	24.6	43.1	2.1	
	15-19歳	25	100.0	8	32.0	47.6	7.5	16	64.0	49.0	7.2	1	4.0	20.0	4.0	
	20-29歳	37	100.0	2	5.4	22.9	3.8	25	67.6	47.5	7.8	10	27.0	45.0	7.6	
	30-39歳	48	100.0	2	4.2	20.2	3.0	33	68.8	46.8	6.1	13	27.1	44.9	5.7	
	40-49歳	68	100.0	1	1.5	12.1	1.5	44	64.7	48.1	5.3	23	33.8	47.7	5.2	
	50-59歳	82	100.0	2	2.4	15.5	1.7	55	67.1	47.3	4.2	25	30.5	46.3	4.7	
	60-69歳	96	100.0	3	3.1	17.5	1.7	69	71.9	45.2	3.3	24	25.0	43.5	3.0	
	70歳以上	131	100.0	6	4.6	21.0	1.8	101	77.1	42.2	3.7	24	18.3	38.8	3.8	
	(再掲) 20歳以上	462	100.0	16	3.5	18.3	0.8	327	70.8	45.5	1.9	119	25.8	43.8	2.2	
	(再掲) 20-39歳	85	100.0	4	4.7	21.3	2.4	58	68.2	46.8	5.5	23	27.1	44.7	5.1	
	(再掲) 40-64歳	185	100.0	4	2.2	14.6	1.0	124	67.0	47.1	3.0	57	30.8	46.3	3.0	
	(再掲) 65歳以上	192	100.0	8	4.2	20.0	1.3	145	75.5	43.1	2.4	39	20.3	40.3	2.5	
	(再掲) 20-69歳	331	100.0	10	3.0	17.1	0.9	226	68.3	46.6	2.2	95	28.7	45.3	2.3	
	(再掲) 40-69歳	246	100.0	6	2.4	15.5	0.9	168	68.3	46.6	2.4	72	29.3	45.6	2.3	
	(再掲) 65-69歳	61	100.0	2	3.3	18.0	2.1	44	72.1	45.2	4.1	15	24.6	43.4	3.7	
	(再掲) 70-74歳	49	100.0	0	0.0	0.0	0.0	42	85.7	35.4	6.1	7	14.3	35.4	6.1	
	(再掲) 75-79歳	46	100.0	2	4.3	20.6	2.9	33	71.7	45.5	6.2	11	23.9	43.1	5.7	
	(再掲) 80-84歳	19	100.0	1	5.3	22.9	4.7	14	73.7	45.2	10.1	4	21.1	41.9	10.4	
	(再掲) 80歳以上	36	100.0	4	11.1	31.9	3.6	26	72.2	45.4	7.4	6	16.7	37.8	7.0	
	(再掲) 85歳以上	17	100.0	3	17.6	39.3	6.7	12	70.6	47.0	9.2	2	11.8	33.2	6.8	
女 性	総 数	549	100.0	55	10.0	30.1	1.2	376	68.5	46.5	2.2	118	21.5	41.1	2.2	
	15-19歳	21	100.0	4	19.0	40.2	10.4	16	76.2	43.6	11.0	1	4.8	21.8	4.8	
	20-29歳	42	100.0	7	16.7	37.7	6.0	31	73.8	44.5	5.9	4	9.5	29.7	4.5	
	30-39歳	53	100.0	6	11.3	32.0	3.8	38	71.7	45.5	7.0	9	17.0	37.9	6.0	
	40-49歳	81	100.0	6	7.4	26.4	2.6	53	65.4	47.9	5.2	22	27.2	44.8	4.4	
	50-59歳	77	100.0	8	10.4	30.7	2.7	61	79.2	40.8	3.7	8	10.4	30.7	3.2	
	60-69歳	116	100.0	5	4.3	20.4	2.1	77	66.4	47.4	4.0	34	29.3	45.7	4.1	
	70歳以上	159	100.0	19	11.9	32.5	2.9	100	62.9	48.5	3.0	40	25.2	43.5	3.0	
	(再掲) 20歳以上	528	100.0	51	9.7	29.6	1.1	360	68.2	46.6	2.3	117	22.2	41.6	2.3	
	(再掲) 20-39歳	95	100.0	13	13.7	34.6	3.2	69	72.6	44.8	4.6	13	13.7	34.6	4.5	
	(再掲) 40-64歳	202	100.0	17	8.4	27.8	1.6	142	70.3	45.8	3.2	43	21.3	41.0	2.8	
	(再掲) 65歳以上	231	100.0	21	9.1	28.8	2.1	149	64.5	48.0	3.1	61	26.4	44.2	2.7	
	(再掲) 20-69歳	369	100.0	32	8.7	28.2	1.1	260	70.5	45.7	2.6	77	20.9	40.7	2.6	
	(再掲) 40-69歳	274	100.0	19	6.9	25.5	1.2	191	69.7	46.0	3.0	64	23.4	42.4	2.7	
	(再掲) 65-69歳	72	100.0	2	2.8	16.5	2.0	49	68.1	47.0	5.0	21	29.2	45.8	4.9	
	(再掲) 70-74歳	73	100.0	10	13.7	34.6	4.9	44	60.3	49.3	5.7	19	26.0	44.2	5.2	
	(再掲) 75-79歳	36	100.0	2	5.6	23.2	3.9	24	66.7	47.8	8.2	10	27.8	45.4	8.2	
	(再掲) 80-84歳	27	100.0	1	3.7	19.2	3.7	22	81.5	39.6	8.9	4	14.8	36.2	6.7	
	(再掲) 80歳以上	50	100.0	7	14.0	35.1	6.1	32	64.0	48.5	7.7	11	22.0	41.8	5.2	
	(再掲) 85歳以上	23	100.0	6	26.1	44.9	10.6	10	43.5	50.7	9.6	7	30.4	47.0	8.8	

3. 身体状況調査の結果

体型の状況(20歳以上、性別、妊婦除外、保健所別)

	保健所	人数	やせ			普通			肥満		
			割合	標準偏差	標準誤差	割合	標準偏差	標準誤差	割合	標準偏差	標準誤差
男性	総数	462	3.5	18.3	0.8	70.8	45.5	1.9	25.8	43.8	2.2
	習志野	25	-	-	-	52.0	51.0	7.6	48.0	51.0	7.6
	市川	46	6.5	25.0	2.7	69.6	46.5	4.9	23.9	43.1	5.9
	松戸	23	0.0	0.0	0.0	60.9	49.9	7.4	39.1	49.9	7.4
	野田	30	3.3	18.3	2.9	76.7	43.0	5.7	20.0	40.7	2.9
	印旛	31	-	-	-	67.7	47.5	0.6	32.3	47.5	0.6
	香取	12	8.3	28.9	0.0	66.7	49.2	0.0	25.0	45.2	0.0
	海匝	26	3.8	19.6	1.7	69.2	47.1	2.5	26.9	45.2	0.8
	山武	33	3.0	17.4	3.4	63.6	48.9	2.4	33.3	47.9	5.8
	長生	37	2.7	16.4	1.6	70.3	46.3	6.0	27.0	45.0	7.5
	東隅	28	3.6	18.9	2.7	82.1	39.0	3.5	14.3	35.6	0.7
	君津	43	7.0	25.8	1.8	76.7	42.7	3.0	16.3	37.4	4.7
	安房	35	0.0	0.0	0.0	71.4	45.8	7.6	28.6	45.8	7.6
	市原	29	3.4	18.6	1.5	82.8	38.4	2.7	13.8	35.1	1.2
	千葉市	27	7.4	26.7	6.1	70.4	46.5	5.1	22.2	42.4	5.2
	船橋市	12	-	-	-	58.3	51.5	0.0	41.7	51.5	0.0
	柏市	25	4.0	20.0	2.3	80.0	40.8	0.0	16.0	37.4	2.3
女性	総数	528	9.7	29.6	1.1	68.2	46.6	2.3	22.2	41.6	2.3
	習志野	32	3.1	17.7	2.2	68.8	47.1	17.9	28.1	45.7	15.7
	市川	52	19.2	39.8	3.4	75.0	43.7	6.7	5.8	23.5	3.3
	松戸	38	13.2	34.3	3.4	63.2	48.9	5.1	23.7	43.1	2.7
	野田	30	6.7	25.4	1.3	73.3	45.0	0.3	20.0	40.7	1.0
	印旛	34	8.8	28.8	3.6	79.4	41.0	5.6	11.8	32.7	2.0
	香取	13	-	-	-	61.5	50.6	0.0	38.5	50.6	0.0
	海匝	28	10.7	31.5	8.8	50.0	50.9	10.3	39.3	49.7	1.5
	山武	35	11.4	32.3	0.6	65.7	48.2	2.3	22.9	42.6	2.9
	長生	49	10.2	30.6	3.3	65.3	48.1	2.1	24.5	43.4	5.4
	夷隅	34	8.8	28.8	2.1	61.8	49.3	2.1	29.4	46.2	0.0
	君津	51	9.8	30.0	1.8	54.9	50.3	6.1	35.3	48.3	4.3
	安房	27	3.7	19.2	2.2	77.8	42.4	3.0	18.5	39.6	5.1
	市原	33	12.1	33.1	3.4	66.7	47.9	2.9	21.2	41.5	0.5
	千葉市	37	2.7	16.4	2.2	81.1	39.7	6.6	16.2	37.4	8.2
	船橋市	9	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-
	柏市	26	15.4	36.8	3.0	69.2	47.1	0.4	15.4	36.8	2.5

※ 低体重(やせ):BMI<18.5 普通:18.5≤BMI<25 肥満: BMI≥25

3. 身体状況調査の結果

体型の状況(20歳以上、性別、妊婦除外、二次医療圏別)

	医療圏	人数	やせ			普通			肥満		
			割合	標準偏差	標準誤差	割合	標準偏差	標準誤差	割合	標準偏差	標準誤差
男性	総数	462	3.5	18.3	0.8	70.8	45.5	1.9	25.8	43.8	2.2
	東葛南部	83	3.6	18.8	2.1	62.7	48.7	4.8	33.7	47.6	6.1
	東葛北部	78	2.6	15.9	1.5	73.1	44.6	4.2	24.4	43.2	4.3
	印旛	31	-	-	-	67.7	47.5	0.6	32.3	47.5	0.6
	香取海浜	38	5.3	22.6	1.5	68.4	47.1	1.7	26.3	44.6	0.9
	山武長生夷隅	98	3.1	17.3	1.5	71.4	45.4	4.3	25.5	43.8	5.1
	君津	43	7.0	25.8	1.8	76.7	42.7	3.0	16.3	37.4	4.7
	安房	35	-	-	-	71.4	45.8	7.6	28.6	45.8	7.6
	市原	29	3.4	18.6	1.5	82.8	38.4	2.7	13.8	35.1	1.2
	千葉	27	7.4	26.7	6.1	70.4	46.5	5.1	22.2	42.4	5.2
女性	総数	528	9.7	29.6	1.1	68.2	46.6	2.3	22.2	41.6	2.3
	東葛南部	93	11.8	32.5	3.8	75.3	43.4	7.8	12.9	33.7	7.5
	東葛北部	94	11.7	32.3	2.2	68.1	46.9	2.2	20.2	40.4	1.8
	印旛	34	8.8	28.8	3.6	79.4	41.0	5.6	11.8	32.7	2.0
	香取海浜	41	7.3	26.4	6.4	53.7	50.5	7.4	39.0	49.4	1.0
	山武長生夷隅	118	10.2	30.4	1.6	64.4	48.1	1.5	25.4	43.7	2.7
	君津	51	9.8	30.0	1.8	54.9	50.3	6.1	35.3	48.3	4.3
	安房	27	3.7	19.2	2.2	77.8	42.4	3.0	18.5	39.6	5.1
	市原	33	12.1	33.1	3.4	66.7	47.9	2.9	21.2	41.5	0.5
	千葉	37	2.7	16.4	2.2	81.1	39.7	6.6	16.2	37.4	8.2

※ 低体重(やせ):BMI<18.5 普通:18.5≤BMI<25 肥満: BMI≥25

3. 身体状況調査の結果

腹囲・BMI(6歳以上、妊婦除外、性・年齢階級別)

	男 性										女 性									
	腹囲(cm)					BMI(kg/m ²)					腹囲(cm)					BMI(kg/m ²)				
	人数	平均値	標準 偏差	標準 誤差	中央値	人数	平均値	標準 偏差	標準 誤差	中央値	人数	平均値	標準 偏差	標準 誤差	中央値	人数	平均値	標準 偏差	標準 誤差	中央値
総 数	513	84.0	10.7	0.5	85.0	487	23.3	3.3	0.2	23.0	583	78.6	11.9	0.7	78.5	549	22.6	4.0	0.2	21.8
6-8歳	10	56.2	4.7	1.5	54.5	-	-	-	-	-	16	53.4	4.6	1.2	52.5	-	-	-	-	-
9-11歳	13	63.0	7.8	2.4	62.0	-	-	-	-	-	17	59.8	5.8	1.4	58.0	-	-	-	-	-
12-14歳	9	70.7	8.6	2.8	67.9	-	-	-	-	-	12	66.5	4.7	1.3	66.0	-	-	-	-	-
15-19歳	25	73.8	7.2	1.1	74.0	25	20.7	3.2	0.6	20.4	20	69.1	6.4	1.5	67.3	21	21.0	2.9	0.7	20.5
20-29歳	34	79.5	8.1	1.4	79.0	37	22.6	3.4	0.6	21.7	39	71.5	7.8	1.2	70.0	42	21.4	4.4	0.7	20.3
30-39歳	49	85.6	9.3	1.3	86.0	48	23.5	3.2	0.5	23.2	52	77.1	9.7	1.5	74.5	53	22.2	4.6	0.7	20.6
40-49歳	68	85.8	10.4	1.2	85.6	68	24.4	4.3	0.5	24.0	80	78.3	10.0	1.2	78.3	81	23.0	3.9	0.4	22.5
50-59歳	82	87.2	9.3	1.0	85.0	82	23.9	3.1	0.4	23.7	77	77.9	10.1	1.2	78.0	77	21.9	3.8	0.4	21.5
60-69歳	93	87.0	6.9	0.6	86.0	96	23.5	2.5	0.2	23.4	114	83.4	9.1	0.8	84.0	116	23.4	3.4	0.3	23.2
70歳以上	130	86.7	8.7	0.8	85.5	131	23.0	2.9	0.3	22.7	156	84.5	11.1	0.9	84.0	159	22.9	4.0	0.3	22.4
(再掲) 20歳以上	456	86.1	8.9	0.4	85.0	462	23.5	3.2	0.2	23.1	518	80.6	10.7	0.6	80.0	528	22.7	4.0	0.2	21.9
(再掲) 20-39歳	83	83.1	9.3	1.0	81.0	85	23.1	3.3	0.4	22.8	91	74.7	9.3	1.1	73.0	95	21.8	4.5	0.6	20.4
(再掲) 40-64歳	184	86.5	9.3	0.7	85.0	185	24.0	3.5	0.2	23.7	200	78.9	9.8	0.6	78.5	202	22.5	3.7	0.2	21.7
(再掲) 65歳以上	189	86.9	8.1	0.5	86.0	192	23.1	2.8	0.2	22.9	227	84.5	10.5	0.8	84.0	231	23.1	3.9	0.3	22.6
(再掲) 20-69歳	326	85.8	9.0	0.5	85.0	331	23.7	3.3	0.2	23.3	362	78.9	10.1	0.6	78.5	369	22.6	4.0	0.3	21.6
(再掲) 40-69歳	243	86.7	8.8	0.5	85.5	246	23.9	3.3	0.2	23.5	271	80.3	10.0	0.6	80.0	274	22.8	3.7	0.2	22.0
(再掲) 65-69歳	59	87.4	6.8	0.7	87.0	61	23.4	2.4	0.3	23.3	71	84.4	9.3	1.1	84.0	72	23.8	3.6	0.4	23.2
(再掲) 70-74歳	49	86.0	7.0	1.1	85.0	49	23.2	2.3	0.4	22.7	73	83.0	10.4	1.3	82.5	73	22.5	3.6	0.5	22.0
(再掲) 75-79歳	45	88.8	9.1	1.3	89.0	46	23.4	3.4	0.5	23.1	35	85.8	13.7	2.4	86.0	36	23.7	5.5	0.9	23.0
(再掲) 80-84歳	19	86.9	10.2	2.4	85.5	19	22.6	3.0	0.7	21.9	27	87.3	7.4	1.5	89.0	27	22.9	2.3	0.3	22.6
(再掲) 80歳以上	36	85.3	9.9	1.4	84.5	36	22.1	3.0	0.4	22.0	48	85.9	9.8	1.6	85.5	50	22.8	3.4	0.4	22.6
(再掲) 85歳以上	17	83.4	9.5	1.3	84.0	17	21.6	3.0	0.4	22.1	21	84.1	12.1	3.2	83.0	23	22.6	4.4	0.9	21.8

3. 身体状況調査の結果

歩行数(20歳以上、性別、保健所別)(歩/日、1日装着していた者のみ)

	保健所	人数	歩行数				(年齢)			
			平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値
男性	総数	358	7253	4288	314	6624	58.1	17.0	1.1	60.0
	習志野	21	9639	4407	255	8500	49.0	17.1	1.7	48.0
	市川	44	7536	5289	724	6573	59.9	16.3	2.8	60.0
	松戸	18	7709	4117	971	7094	59.5	17.2	2.0	57.0
	野田	21	6914	4207	277	6119	61.7	14.8	1.2	67.0
	印旛	27	8260	4022	741	8113	53.4	15.2	3.1	56.0
	香取	8	5823	4666	0	4151	57.3	14.6	0.0	61.5
	海匝	19	6794	4524	1062	6629	60.4	21.0	3.5	63.0
	山武	21	8033	4089	583	7235	55.2	16.3	2.5	58.0
	長生	33	8241	4471	945	7262	56.4	14.9	0.4	60.0
	夷隅	23	6275	3238	889	6518	53.2	14.2	1.6	56.0
	君津	31	5143	3607	12	4407	59.2	19.5	0.9	62.0
	安房	33	5854	3688	440	5596	59.5	18.7	2.8	65.0
	市原	18	7628	3455	26	6434	65.2	16.8	2.0	68.5
	千葉市	16	8728	3805	1376	9609	59.4	17.1	3.8	63.0
	船橋市	7	9314	5322	0	8022	53.9	19.6	0.0	57.0
女性	柏市	18	5562	3464	134	4495	66.2	16.0	4.9	70.5
	総数	410	6821	4004	304	6259	57.9	17.1	1.3	61.0
	習志野	26	8946	4590	490	7240	52.6	17.5	4.5	50.5
	市川	49	7134	4215	964	7607	58.6	19.0	6.5	61.0
	松戸	30	8182	4732	1214	8124	59.7	17.8	2.4	67.0
	野田	24	7487	3933	438	6767	55.5	16.2	3.3	62.5
	印旛	30	6141	3561	81	5599	51.8	14.7	0.7	49.5
	香取	13	6215	3341	0	6247	54.9	16.7	0.0	60.0
	海匝	18	4211	2860	327	3726	66.6	18.3	0.4	69.0
	山武	24	8501	4878	481	7374	55.3	15.3	1.8	57.0
	長生	42	6327	3033	48	6241	54.9	16.9	0.7	56.0
	夷隅	27	6680	4227	456	5129	54.9	13.1	2.4	56.0
	君津	39	5136	3459	164	4982	63.8	16.9	0.5	65.0
	安房	24	5783	3496	882	5605	60.3	16.7	2.5	68.0
	市原	22	7807	4008	3	7788	59.0	19.6	2.2	63.0
	千葉市	19	7703	2783	187	6994	61.5	16.7	2.6	66.0
	船橋市	9	8326	3962	0	6678	47.4	15.5	0.0	44.0
	柏市	14	4730	3320	493	5200	68.9	11.4	2.2	68.0

※参考として、歩行数の算出対象者の平均年齢を併記した。

年齢・体型別 平均歩行数(1日装着した者のみ)(20歳以上、性別)

	年代	やせ	普通	肥満
男性	20-39歳	8627	8187	8207
	(人数)	2	37	17
	40-64歳	5885	8228	7353
	(人数)	3	101	42
女性	65歳以上	4155	6503	6309
	(人数)	6	116	31
	20-39歳	5945	8636	4818
	(人数)	9	52	9
女性	40-64歳	9043	7270	7271
	(人数)	13	122	28
	65歳以上	5092	5876	6253
	(人数)	14	119	38

4 食塩摂取量との関係

図1 野菜摂取量と食塩摂取量の関係 (20歳以上)




図2 エネルギー摂取量と食塩摂取量の関係 (20歳以上)






図3 たんぱく質摂取量と食塩摂取量の関係(20歳以上)



※たんぱく質摂取量の4分位階級別平均値


図4 BMIと食塩摂取量の関係(20歳以上)



※BMIの4分位階級別平均値


5 野菜摂取量との関係

図5 野菜摂取量と食物繊維摂取量の関係(20歳以上)




※括弧内は野菜摂取量を食事バランスガイドのSVに換算したもの

図6 野菜摂取量とカリウム摂取量の関係(20歳以上)



※括弧内は野菜摂取量を食事バランスガイドのSVに換算したもの

図 7 野菜摂取量別（350g 以上、350g 未満） 主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が 1 日 2 回以上である頻度の状況（20 歳以上）



6. 職業の状況

職業の状況(性・年齢階級別)

		総数		専門的・技術的職業従事者		管理的職業従事者		事務従事者		販売従事者		サービス職業従事者		保安職業従事者		農業従事者		漁業従事者		運輸・通信従事者		生産工程・労務作業	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1217	100	99	100	47	100	78	100	55	100	72	100	11	100	29	100	2	100	18	100	89	100
	1-6歳	52	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7-14歳	78	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-19歳	48	3.9	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1
	20-29歳	83	6.8	9	9.1	0	0	11	14.1	8	14.5	11	15.3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
	30-39歳	107	8.8	20	20.2	1	2.1	16	20.5	5	9.1	7	9.7	1	9.1	4	13.8	0	0	4	22.2	17	19.1
	40-49歳	158	13	25	25.3	13	27.7	20	25.6	15	27.3	12	16.7	2	18.2	0	0	0	0	4	22.2	24	27
	50-59歳	164	13.5	30	30.3	21	44.7	17	21.8	11	20.0	14	19.4	3	27.3	2	6.9	0	0	6	33.3	14	15.7
	60-69歳	219	18	11	11.1	8	17	13	16.7	10	18.2	24	33.3	4	36.4	14	48.3	0	0	3	16.7	17	19.1
	70歳以上	308	25.3	4	4.0	4	8.5	1	1.3	5	9.1	4	5.6	1	9.1	9	31.0	2	100	1	5.6	8	9.0
男 性	総数	564	100	61	100	43	100	29	100	26	100	17	100	10	100	16	100	2	100	18	100	64	100
	1-6歳	22	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7-14歳	36	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-19歳	27	4.8	0	0	0	0	0	0	1	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.6
	20-29歳	38	6.7	6	9.8	0	0	1	3.4	3	11.5	6	35.3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12.5
	30-39歳	49	8.7	14	23.0	1	2.3	7	24.1	3	11.5	0	0	1	10.0	3	18.8	0	0	4	22.2	11	17.2
	40-49歳	73	12.9	15	24.6	12	27.9	4	13.8	6	23.1	2	11.8	2	20.0	0	0	0	0	4	22.2	18	28.1
	50-59歳	82	14.5	16	26.2	18	41.9	9	31.0	6	23.1	3	17.6	2	20.0	2	12.5	0	0	6	33.3	8	12.5
	60-69歳	101	17.9	8	13.1	8	18.6	8	27.6	4	15.4	5	29.4	4	40.0	6	37.5	0	0	3	16.7	12	18.8
	70歳以上	136	24.1	2	3.3	4	9.3	0	0	3	11.5	1	5.9	1	10.0	5	31.3	2	100	1	5.6	6	9.4
女 性	総数	653	100	38	100	4	100	49	100	29	100	55	100	1	100	13	100	0	0	0	0	25	100
	1-6歳	30	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7-14歳	42	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-19歳	21	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	45	6.9	3	7.9	0	0	10	20.4	5	17.2	5	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-39歳	58	8.9	6	15.8	0	0	9	18.4	2	6.9	7	12.7	0	0	1	7.7	0	0	0	0	6	24.0
	40-49歳	85	13	10	26.3	1	25.0	16	32.7	9	31.0	10	18.2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24.0
	50-59歳	82	12.6	14	36.8	3	75.0	8	16.3	5	17.2	11	20.0	1	100	0	0	0	0	0	0	6	24.0
	60-69歳	118	18.1	3	7.9	0	0	5	10.2	6	20.7	19	34.5	0	0	8	61.5	0	0	0	0	5	20.0
	70歳以上	172	26.3	2	5.3	0	0	1	2.0	2	6.9	3	5.5	0	0	4	30.8	0	0	0	0	2	8.0

		家事従事者		その他(無職)		保育園児		幼稚園児		その他幼児		小学校低学年		小学校中学年		小学校高学年		中学生		その他の学生		不明	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	235	100	203	100	14	100	17	100	17	100	17	100	20	100	18	100	31	100	58	100	87	100
	1-6歳	0	0	0	0	14	100	17	100	17	100	3	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1
	7-14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	82.4	20	100	18	100	22	71.0	0	0	4	4.6
	15-19歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	29.0	37	63.8	0	0
	20-29歳	6	2.6	5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	36.2	4	4.6
	30-39歳	24	10.2	5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3.4
	40-49歳	22	9.4	4	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	19.5
	50-59歳	31	13.2	6	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10.3
	60-69歳	58	24.7	39	19.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20.7
	70歳以上	94	40.0	144	70.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	35.6
男 性	総数	16	100	138	100	7	100	9	100	6	100	6	100	7	100	9	100	15	100	32	100	33	100
	1-6歳	0	0	0	0	7	100	9	100	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7-14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100	7	100	9	100	12	80.0	0	0	2	6.1
	15-19歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20.0	22	68.8	0	0
	20-29歳	0	0	4	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31.3	0	0
	30-39歳	0	0	4	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	40-49歳	1	6.3	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	24.2
	50-59歳	2	12.5	6	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12.1
	60-69歳	5	31.3	31	22.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21.2
	70歳以上	8	50.0	92	66.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	33.3
女 性	総数	219	100	65	100	7	100	8	100	11	100	11	100	13	100	9	100	16	100	26	100	54	100
	1-6歳	0	0	0	0	7	100	8	100	11	100	3	27.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.9
	7-14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	72.7	13	100	9	100	10	62.5	0	0	2	3.7
	15-19歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	37.5	15	57.7	0	0
	20-29歳	6	2.7	1	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	42.3	4	7.4
	30-39歳	24	11.0	1	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.7
	40-49歳	21	9.6	3	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16.7
	50-59歳	29	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9.3
	60-69歳	53	24.2	8	12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	20.4
	70歳以上	86	39.3	52	80.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	37.0

平成27年県民健康・栄養調査報告書

平成29年3月発行

集計・解析 千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科

編集・発行 千葉県健康福祉部健康づくり支援課

〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町一番一号

電話番号 043-223-2667