

家畜衛生だより

From 中央家保 豚用



中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656
Tel: 043-250-4141 (夜間・休日対応)
Fax: 043-286-0090
(公社)千葉県畜産協会

豚熱ワクチン接種農場における豚熱の患畜確認に伴う今後の発生防止対策について

第17回拡大豚熱疫学調査チーム検討会において、ワクチン接種農場における豚熱発生についての検討結果と今後の発生予防対策「提言」が取りまとめられました。

農林水産省HP<<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/domestic.html>> 疫学調査の概要

農場・豚舎出入り時の衛生対策

～汚染エリアと清浄エリアを分け、境界を明確にして交差汚染を防止～

- ✓ 農場進入車両は動噴による薬液消毒が適当(石灰帯の通過だけでは不十分)
- ✓ 土等が残りやすいタイヤやタイヤハウス等は動噴による洗浄・消毒を併用する
- ✓ 消毒後に公道を走行する場合は農場進入時に再度消毒する
- ✓ 豚舎入口で手指の消毒又は手袋を着用する
- ✓ 豚舎ごとに衣服・靴を交換する(豚舎外で着用した衣服、靴は豚舎出入口の外側で脱ぎ、舎内に汚染物を持ち込まない)



農場・豚舎内への野生動物等の侵入防止

～ネズミ・ネコなどの動物の糞でPCR陽性が確認された事例もある～

- ✓ 飼料保管庫や堆肥舎、死体保管庫にも防鳥ネット等の侵入防止対策を講じる
- ✓ 豚舎の壁や天井を点検し、破損箇所は修繕する
- ✓ 農場周囲に侵入防護柵を設置。防護柵周囲の草刈りや整理整頓をする

豚・資材等を介した病原体の侵入防止

- ✓ 豚舎間の豚の移動に使用するケージは、使用前に洗浄・消毒する
- ✓ 母豚を移動する際は清浄なケージや屋内の通路等を用いる。屋外の通路を歩行させる場合は、事前に十分に消毒する(単に石灰を散布しただけでは不十分)

子豚の飼養管理及び早期通報の徹底

～移行抗体が低下した離乳豚やワクチン接種後の経過が短い肥育豚での発生～

- ✓ 産子間で偏りが無いよう初乳を十分接種させる
- ✓ 死亡豚の増加やチアノーゼ等の特定症状が見られたらすぐ家畜保健衛生所に連絡


ワクチン接種だけで100%の感染防御は期待できません。
併せて、飼養衛生管理基準の遵守徹底をお願いします！！

豚の様子がおかしいな?と思ったら中央家畜保健衛生所まで

TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送) FAX. 043-286-0090

※必ず5回以上コールしてください

豚舎出入り時の衛生対策



豚熱発生農場における環境検査結果

	豚舎内				農場内施設		資材等		
	床・壁等	飼料	水飲場	糞便	堆肥置場	その他 倉庫 農場内通路 等	衣服・長靴	一輪車 車両等	小動物 (ネズミ糞等)
PCR陽性事例数/ サンプリングした 事例数	48/79	22/62	3/30	12/32	6/39	3/39	11/57	9/59	6/41
陽性率	60%	36%	10%	38%	15%	8%	19%	15%	15%