

家畜衛生だより

令和3年度号外（鶏） 令和3年12月発行



南部家畜防疫協議会
（公社）千葉県畜産協会
千葉県南部家畜保健衛生所
〒296-0033 鴨川市八色52
電話 04(7092)2304
FAX 04(7092)1434

高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認！！ 熊本県南関町の養鶏農場・国内5例目

1. 農場の概要

所在地：熊本県南関町

飼養状況：肉用鶏（約6万7千羽）

2. 経緯

- ・12/2（木）農場から、死亡羽数が増加している旨の通報を受けて、当該農場に対し移動の自粛を要請するとともに農場への立入検査を実施。
- ・12/3（金）に遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

国内養鶏場での発生状況

（R3.11月～）

例目	発生場所	飼養種類	ウイルス型
1例目（11/10）	秋田県横手市	採卵鶏	H5N8
2例目（11/13）	鹿児島県出水市	採卵鶏	H5N1
3例目（11/15）	鹿児島県出水市	採卵鶏	H5N8
4例目（11/17）	兵庫県姫路市	採卵鶏	H5N1
5例目（12/3）	熊本県南関町	肉用鶏	検査中

野鳥での確認状況

（R3.10月～）

野鳥でも各地でウイルスが確認されています。厳重警戒を！

回収日	回収場所	検体	病原性	亜型
1例目（10/26）	北海道旭川市	マガモ（死亡野鳥）	LP AI（低）	H5N3
2例目（11/8）	鹿児島県出水市	環境試料（水）	HP AI（高）	H5
3例目（11/9）	宮崎県宮崎市	野鳥糞便	HP AI（高）	H5N1
4例目（11/19）	鹿児島県出水市	ナベヅル（死亡野鳥）	HP AI（高）	H5N8
5-6例目（11/22）	鹿児島県出水市	環境試料（水）	HP AI（高）	H5N8

こまめに**健康観察**を行い、いつもと様子が違ったり、**異常を見つけたら直ちに**家畜保健衛生所までご連絡下さい


千葉県南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX 04-7092-1434

※休日、夜間は転送されますので必ず5回以上のコールをお願いします。

鳥インフルエンザを防ぎましょう！重要7項目

①衛生管理区域に入る時の手指消毒

- 石けんで手洗いしている
または
アルコール消毒している
または
専用の手袋をしている
→専用の手袋はきれいですか？



②衛生管理区域専用の服・靴の使用

- 専用の服に着替えている
- 専用の靴に履き替えている



③衛生管理区域に入る車の消毒

- 車の消毒をしている
→消毒液の温度が低いと効果が低下(冬場注意)！温水使用または薬液濃度を濃くしましょう。
- 運転手の座席・足元を消毒している
→運転手も衛生管理区域内で降車する場合は衛生管理区域専用の服・靴(ブーツカバーも可)の着用が必要です。
着用しても、座席や足元が汚れているとまた汚染されてしまいます。
座席・足元のアルコール消毒も行いましょう。
フロアマットの交換ができればとても良いです。



④家きん舎に入る時の手指消毒

- 石けんで手洗いしている
または
アルコール消毒している
または
専用の手袋をしている
→汚れた手で家きんの世話をしていませんか？
ウイルスは目に見えません！



⑤家きん舎ごとの専用の靴がある

- 家きん舎専用の靴がある
→履き替え時も交差汚染に注意！外用長靴と中用長靴で同じ場所を歩くと中用長靴が汚染されます。
- 作業時に靴が汚れたら洗浄・消毒している
- 家きん舎用の靴で家きん舎の外に出していない(家きん・糞の搬出時、家きん舎間の移動時)
→家きん舎の外で履いていた長靴には何が付着しているかわかりません！そのまま家きん舎に入らないでください。



家きん舎専用




⑥防鳥ネットの設置

- 鶏舎、袋詰め飼料等を保管する倉庫、鶏糞処理施設
→生糞・未完熟堆肥にはウイルスが含まれている可能性があります。生糞・未完熟堆肥置き場にはネットを張りましょう。
- ネットの網目は2cm以下
→2cm以上だとスズメが入ります。



2cm



- ネットは破れていない
- ネットはきれい
→ホコリが溜まると換気不足に...。箒・コンプレッサー等できれいにしましょう。

⑦ねずみ・害虫の駆除

- ねずみ・害虫の駆除をしている(殺そ剤、殺虫剤、粘着シート)
→虫にひかれて野鳥が寄ってくることも！
ハエから高病原性鳥インフルエンザウイルスが分離されたこともあります。
- 家きん舎に隙間は無い

