



北部家畜保健衛生所
東部・北部家畜防疫獣医師会
〒287-0004 香取市岩ヶ崎台12-1
Tel: 0478-54-1291 Fax: 54-5996
夜間・休日緊急(転送されます)
(公社)千葉県畜産協会
〒260-0021 千葉市中央区新宿1-2-3

岐阜県で発生した豚コレラについて

☞防疫措置完了(9月11日) 移動制限区域設定・消毒ポイント設置(継続中)

☞発生農場と同一の堆肥場を使用していた農場、同一のと畜場を使用していた農場及び同一の獣医師に受診していた農場の計13農場について豚コレラ遺伝子検査陰性を確認(9月12日)

☞感染時期・経路等について調査中

※農研機構動物衛生研究部門が遺伝子解析を行った結果、**当該ウイルスは海外から侵入した可能性が高い**ことが判明。今後詳細な解析を進める。

★豚コレラとは★

- ・豚・イノシシが感染する。高い致死率と強い伝染力が特徴。
- ・感染豚は唾液、涙、ふん尿中にウイルスを排せつし、感染豚や汚染物品等との接触等により感染が拡大。
- ・治療法は無く、発生した場合の影響が甚大であるため家畜伝染病に指定。
- ・世界各国に分布しているが、北米、オーストラリア、スウェーデン等及び日本では清浄化を達成。

★豚コレラの症状★


- ・ **死亡率が高い**
- ・ 発熱・食欲不振
- ・ 豚房のすみに集まってうづくまる
(↑岐阜県の発生事例でも確認された)
- ・ 目やに・結膜炎
- ・ 便秘に次ぐ下痢
- ・ 紫斑(耳翼・尾・腹部・内股部など)
- ・ 奇声・遊泳運動・起立困難
- ・ 慢性感染では、発症と回復を繰り返してヒネ豚となり、30日程度で死亡



中国ではアフリカ豚コレラの発生が続いており、 現在14例の発生が確認されています！

(アフリカ豚コレラは今まで日本での発生はありません。)

中国におけるアフリカ豚コレラの発生状況



疾病侵入防止のため、飼養衛生管理の再徹底を！

○衛生管理区域、豚舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底

- ・衛生管理区域専用の衣服、靴の設置と使用の徹底
- ・人・物の出入りの記録

○飼料に肉や肉製品を含む食品残さを含む場合の適正使用

○野生動物侵入対策の実施

○毎日の健康観察と異常時の早期通報

豚の様子がおかしいな、と思ったらすぐに通報を!

北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291 Fax.0478-54-5996
夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください