



北部家畜保健衛生所

〒287-0004 香取市岩ヶ崎台12-1

Tel: 0478-54-1291 夜間・休日緊急（転送されます）


Fax: 0478-54-5996

<https://www.pref.chiba.lg.jp/kh-hokubu/index.html>

(公社)千葉県畜産協会、東部・北部家畜防疫獣医師会



## 北海道（乙部町）の死亡野鳥から 高病原性鳥インフルエンザウイルス （H5亜型）が検出されました



ハヤブサ1羽の死亡個体について

令和6年10月 1日（火） A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応

令和6年10月 4日（金） 高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5亜型）  
であることを確認

### 今一度、飼養衛生管理の確認と徹底をお願いします！

- 野生動物の農場侵入防止対策  
防鳥ネット、鶏舎の破損箇所の確認と修復
- 農場内専用の衣服、靴の設置、使用
- 衛生管理区域内への部外者の侵入防止
- 畜産関係車両、関係者の消毒の徹底
- 発生地域への渡航の自粛
- 毎日の健康観察
- 早期発見・早期通報



家きんの特定症状: 死亡率の急激な上昇(1日の死亡率が過去3週間の平均の2倍以上)

**飼養衛生管理者の方は従業員への周知徹底を！！**

北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291 Fax.0478-54-5996

夜間・休日は転送されます、必ず5回以上コールしてください

# 正しく消毒できていますか？ ～逆性石けん～

逆性石けん(アストップ、パコマ、ロンテクト、パンパックス等)は

- ・低温下で消毒効果が著しく低下 ↓↓↓
- ・有機物存在下で効果低下 ↓

## どうする？

△逆性石けんの濃度を濃くする。

◎**逆性石けんにアルカリ剤を添加**する。→低温化でも効果が維持・増強

例:水 1t  
逆性石けん(×500～×1000) 1～2L  
水酸化カルシウム 1.7kg

## どこで使う？

- ・車両消毒 ※1 ★荷台の消毒も重要！！
- ・オールアウト後の鶏舎消毒
- ・資材(輸送かご、卵トレイ)の漬け込み消毒 ※2、3
- ・作業後の長靴、衣服の漬け込み消毒 ※2、3 等

<注意>

- ※1 初めての使用時は、アルカリで配管に詰まっていたヘドロ等がはがれてノズルが詰まる恐れがあるのでご注意ください。
- ※2 糞便等の有機物があると、消毒薬の効果が落ちます。必ずきれいに洗浄してから消毒をお願いします。
- ※3 各種消毒薬使用時はそれぞれの添付文書に記載の用途別濃度の確認をお願いします。

その他 ～消毒薬の凍結防止対策～

低温下の消毒薬凍結時は、**動物用消毒薬に使用可能な不凍液の使用等対策**をお願いします。

今回の発生を受け、飼養規模に応じ消毒薬の緊急配付を実施します。  
対象の方は別添調査票で期日までに回答をお願いします。



## 鳥インフルエンザの臨床症状(例)

【症状】死亡率増加、沈鬱、肉冠のチアノーゼ等

### 鳥インフルエンザの症状

