

農林総研の「幸水」の収穫始は7月29日、収穫盛は8月17日でした。「豊水」のみつ症の発生は少ないと予測されますが、適期収穫と慎重な選果を心がけましょう。

【気 象】

■気象条件

気温は、7月は第3～6半旬で平年より高くなり、平均気温は平年を1.5℃上回りました。8月は平年並で推移しています。降水量は、7月は第1半旬以外で平年を下回り、7月の合計も平年の5割程度となりました。8月も第2半旬までは平年を下回って推移していましたが、8月13日に239mmの豪雨がありました。日照時間は、7月第1半旬以外は平年より長く、7月の合計も平年より長くなりました。

表1. 令和8年7～8月の気象（アメダス佐倉）

月	半旬	平均気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（hr）		
		本年	前年	平年	本年	前年	平年	本年	前年	平年
7月	1	22.8	28.1	23.7	59	0	28	6	33	21
	2	24.0	28.8	24.4	2	6	29	29	39	24
	3	27.5	24.7	24.9	1	74	25	30	9	25
	4	28.4	27.8	25.2	0	8	20	32	38	26
	5	29.4	29.4	25.7	9	0	18	45	59	28
	6	27.4	28.4	26.4	6	0	17	41	69	38
7月平均/計		26.6	27.9	25.1	77	88	140	182	246	162
8月	1	26.3	28.8	26.7	1	52	12	29	42	33
	2	27.0	28.1	26.7	12	25	15	38	24	33

注）平年は平成3～令和2年の30年間の平均

【生育状況】

■果実の肥大、糖度、収穫日

「幸水」果実の大きさを満開後日数の横径の平年値と比較すると、平年と比べ農林総研では107%、市川市では109%と大きくなりました。同様に、「豊水」果実の大きさは平年と比べて農林総研では103%、鎌ヶ谷市では110%と大きくなっています。

農林総研の「幸水」の収穫始は7月29日でした。収穫盛は農林総研では8月17日で平年並、市川市では8月10日で平年より6日早くなりました。果実糖度は農林総研で13.2%、市川市で13.8%と、いずれの調査園でも平年より高くなりました。

表2. 基準調査園における生育調査の結果（8月10日調査）

品 種	調査地	樹 齢	横径（cm、%）			縦径（cm、%）			収穫盛	糖度
			果径	暦日	満開後	果径	暦日	満開後		
幸 水	農林総研	21	9.37	（－，112）	（－，107）	7.32	（－，108）	（－，102）	8月17日	13.2%
	市川市	41	9.92	（－，115）	（－，109）	7.74	（－，111）	（－，104）	8月10日	13.8%
豊 水	農林総研	46	8.85	（101，108）	（100，103）	7.72	（98，107）	（96，102）		
	鎌ヶ谷市	22	9.61	（115，116）	（109，110）	8.13	（112，114）	（108，108）		

注）横径及び縦径の（ ）は、前年及び平年の値を100とした比で表した。

■「豊水」のみつ症について

「豊水」のみつ症は、満開後 91～100 日の日最高気温の平均値が低い年に多発する傾向にあります。農林総研では 7 月 6 日～7 月 15 日がその期間に当たり、この 10 日間の最高気温の平均値は 30.8℃で平年より高くなりました。「豊水」のみつ症重症果の発生予測値は 9 %で、直近 5 年間のみつ症重症果の発生予測値の平均 14%より低いと予測されます。ただし、近年の研究では 8 月の高温もみつ症の発生を増加させると推定されています。試しどりを行って適期収穫を心がけるとともに、選果には十分注意してください。

■気象予報と病虫害対策

気象庁（8 月 20 日発表）の 1 か月予報によると、平年と比べ、気温が高く、降水量が少なく、日照時間は長いと予想されています。

千葉県（8 月 13 日発表）の病虫害発生予報によると、向こう 1 か月間の予想発生量は、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ハダニ類、カメムシ類が並と予想されています。シンクイムシ類については選果時に果実をよく観察し、食入孔や虫糞があるものの出荷は控えてください。また、被害果は、ほ場外に持ち出し土中深く埋めるなど適切に処分してください。

表 3. 協力調査地における生育調査の結果（8 月 10 日）

品種	調査地	樹齢	果径 (cm、%)		病虫害発生状況及び特記事項
			横径	縦径	
幸水	市原市	19	(-)	(-)	収穫盛8/4、糖度12.7%
	木更津市	26	(-)	(-)	収穫盛8/12、糖度13%
	印西市	28	(-)	(-)	収穫盛8/7、糖度12.9%、黒星病少発生
	柏市	15	(-)	(-)	収穫盛8/8、糖度13.2%
	いすみ市	41	(-)	(-)	収穫盛8/2、糖度12.5%
	一宮町	31	(-)	(-)	収穫盛8/5、糖度11.8%
	香取市	33	(-)	(-)	収穫盛8/12、糖度12%
豊水	八千代市	20	8.26 (103)	7.21 (106)	調査日7月31日
	館山市	23	9.21 (104)	8.15 (106)	
	旭市	11	9.62 (114)	8.23 (109)	収穫盛8/16、糖度13% シンクイムシ
	香取市	23	8.43 (98)	7.58 (101)	
	四街道市	12	10.16 (118)	8.58 (112)	カメムシ少発生
あきづき	鎌ヶ谷市	27	9.13 (116)	7.29 (111)	
	船橋市	15	9.34 (108)	7.69 (114)	
	松戸市	28	7.70 (90)	6.95 (102)	台風被害なし
	いすみ市	17	8.70 (107)	7.30 (106)	

注) () 内の値は、前年対比を記載。

【生育情報の問合せ先:千葉県農林総合研究センター 果樹研究室 電話 043-291-9989】

※果樹の生育情報は「ちばの農林水産業」の「生育情報」でも御覧いただけます。

<https://www.pref.chiba.lg.jp/seisan/seiiku/seiiku-zyoho.html>