

感染性胃腸炎の集団発生について

野田市内の保育所で、ノロウイルスによる感染性胃腸炎の集団発生がありました。

感染性胃腸炎は、通年で発生していますが、今後、特に冬場から春先にかけて多く発生するシーズンを迎えるので、日頃からこまめに手洗いをすよう心掛けましょう。

また、感染拡大を防止するため、便や嘔吐物は適正に処理し、汚れた床や用具などは適切に消毒しましょう。

10月20日（金）

野田市子ども保育課から野田保健所に対し、市内保育所の複数の園児及び職員が胃腸炎症状を呈している旨の連絡があり、当該保育所に対する現地調査を実施した。

その結果、10月13日（金）から10月20日（金）にかけて、園児及び職員複数名が嘔吐、下痢等の症状を呈しており、受診した医療機関で胃腸炎等と診断されていたことが判明した。

当該保健所では、園児等の便検査への協力を依頼するとともに、衛生指導を実施した。

10月21日（土）

保健所に提出のあった園児14名、職員10名の便について検査したところ、21名からノロウイルスが検出された。

10月27日（金）

これまでに発症が確認されているのは園児79名、職員9名の計88名で、重症者は確認されていない。

○施設等における注意事項

- ・ 日頃から従業員の健康管理に注意してください。
- ・ 施設内でふん便や嘔吐物を処理する時は、使い捨てのガウン（エプロン）・ビニール手袋・マスクを着用し、汚れた床や用具などは**適正な濃度の塩素系消毒薬で速やかに消毒**してください。作業が終わったら、手をよく洗い、窓を開けて、十分に換気をしましょう。
- ・ 詳しい消毒方法や同様の症状を呈する方が複数名発生した場合には、お近くの保健所（健康福祉センター）に御相談ください。

○県民の皆様へ

- ・ 調理の前や食事の前、トイレの後などには手を十分に洗いましょう。

【参考】

ノロウイルスによる感染性胃腸炎について

1 ノロウイルスによる感染性胃腸炎とは

嘔吐、下痢を主症状とし、その結果種々の程度の脱水、電解質喪失症状、全身症状が加わる。1歳以下の乳児は症状の進行が早い。

2 感染経路

- ・ ノロウイルスが大量に含まれる患者のふん便や嘔吐物から人の手を介して感染する。
- ・ 感染者が取り扱ったためにノロウイルスに汚染された食品を食べて感染する。
- ・ ノロウイルスに汚染された二枚貝を生あるいは十分に加熱しないで食べて感染する。
- ・ ノロウイルスに汚染された井戸水などを飲んで感染する。
- ・ 飛沫感染、あるいは比較的狭い空間などでの空気（塵埃）感染例の報告もある。

3 症状等

- ・ 潜伏期間 24時間～48時間
- ・ 主症状 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱
- ・ 症状が1～2日続いた後、治癒し後遺症もない。
- ・ 感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もある。
- ・ 高齢者や乳幼児では重症となることがある。

4 治療

- ・ ノロウイルスに効果のある抗ウイルス剤はない。
- ・ 脱水症状がひどい場合に、輸液を行うなどの対症療法が行われる。
- ・ 症状がなくなったあとも、1～2週間ほど便中に排出されるため、二次感染に注意が必要。

◎ 年度別感染性胃腸炎集団発生件数 (千葉県全域)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
2023	15	20	16	4	5	2	1※						63
2022	13	37	23	5	0	2	6	11	34	32	28	13	204
2021	17	11	8	4	1	0	2	3	14	18	9	11	98
2020	0	0	0	0	0	1	2	0	7	2	11	9	32
2019	18	16	14	7	0	0	0	8	29	25	15	4	136

※2023年10月は10月27日10時時点における判明件数（本件を含む）であって、千葉市、船橋市、柏市の件数を除く。